

10697/3

Ere to the Caroli Cod: medicina
Doctory

43374
SYNOPSIS
UNIVERSÆ
MEDICINÆ PRACTICÆ,

S I V E

DOCTISSIMORUM VIRORUM

DE MORBIS

Eorumque Causis ac Remediis Judicia.

ACCESSERUNT NUNC DEMUM

Casus nonnulli oppido rari.

P A R S P R I M A.

A U T H O R E

J O. A L L E N, M. D.

EDITIO NOVISSIMA

Omnibus auctior, additis præterea FORMULIS remediorum ex
quinta AMSTELODAMENSI desumptis.

Τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶ γινῶναι τὰ ὀρθῶς ἀρνημένα.

Ἰπποκράτ. περὶ διαίτης.

WARANUS

EMARANUS



IN TYPOGRAPHIA BASSANENSI,
M D C C L X V I.

SUMPTIBUS REMONDINIANIS.
SUPERIORUM PERMISSU.



143.2.

VIRIS PERILLUSTRIBUS,

Eruditissimisque D. D.

ORNATISSIMO SPECTATISSIMOQUE

PRÆSIDI,

SENSORIBUS MERITISSIMIS,

ET RELIQUIS

INCLYTI MEDICORUM

LONDINENSIIUM COLLEGII

Sociis Doctissimis :

Exiguum hoc OPUS,

Obsequii & Honoris ergo,

Quam humillime D. D. C. Q.

Suorumque Indignissimus :

I. A.

Y 2

AD

LECTOREM.



MEDICINA, omnium artium nobilissima, ad ejusdem præcognita, institutiones, & theoriam spectemus, nuperis annis progressus & incrementa admiranda accepit; agnoscendum est tamen & vehementer dolendum, quod praxis, pars ejus longe utilissima, haud pari passu processerit. Ars medendi non nisi tardo pede progreditur. In seculorum revolutione, ingenio singulari valens perraro assurgit, qui in hac etiam parte artem cudit; scæd homines istiusmodi indolis, teste medicorum ab Hippocrate catalogo, in ingenti temporis tractu apparent rari nantes in gurgite vasto. Interim loco sanioris praxeos & melioris medendi methodi hypotheses novæ & theoriæ novæ quotannis ad nauseam usque nobis obtruduntur, quæ ostentationis multum, utilitatis parum habent. Tritum utcunque sit illud, Qui speculantur, non medentur, non tamen a veritate prorsus alienum esse ex observatione satis frequenti constat.

Præsentis instituti propositum est praxim legitimam & laudabilem UNDECUNQUE DESUMPTAM VEL MUTUATAM omni opera maxime compendiario exhibere, & optimorum scriptorum auctoritate firmiter stabilire. Hoc est, quod impresentiarum subiri munus, quo officio (sperare fas est) fortassis aliquando manus magis idonea cum majori laude & utilitate defungetur; ut uno intuitu videamus, quo usque ventum est in vera ac solida medendi cognitione.

Ut plurimum tantum monitoris officium præsto. Morbi omnes ex præstantissimis scriptoribus hic ad vivum depinguntur; præcipue morborum causæ, & de eorundem eventu judicia traduntur; indicationes curativæ exponuntur, & remedia nonnulla, præstantiora saltem, breviter attinguntur, & concinnæ aliquot formulæ subduntur, ut cito, tuto, & jucunde, & quâ fieri potest certitudine, medeamur.

Citationes authorum non ex numero, sed ex pondere & momenti sunt æstimandæ. Aphorismos præclarissimi Boerhaavii
haud

haud satis pro merito laudari; quoniam uniuscujusque manibus praesto esse, & charissimos haberi nullus dubito; est enim opus omnibus numeris absolutum, & tantum non divino afflatu exaratum, auro contra aestimandum, decies & amplius perlegi dignissimum, immo in sinu perpetuo gestari.

De morborum Aetiologiis (ingenue fateor) non nisi paucissima in medio protuli: origines & causae proximae morborum plerumque longe abstrusiores sunt, quam ut nostrae mentis acies eo usque penetrare possit; & revera, si dissimulare nolimus, agnoscendum est, quod haec ut plurimum usque adeo nos lateant, ut in iisdem pervidendis hactenus talpae simus: In alto navigamus **LONGITUDINIS IGNARI**.

Meipsum quod attinet, ne sim plane ἀνοήτος, de proprio penu ex adversariis meis depromptum, ubique fere, nunc demum in hac tertia Editione, nonnihil interspersi, quae usui publico libenter mancipavi, & utinam ne illa sint sola omnium manca & jejuna.

Qualescumque tamen sunt haec lucubrationes, satis novi non esse aliquid, quod hoc loco proferre possim, quod limatiores vel utiliores illas reddat; neque ornatiores in futurum polliceor, ut sint hujusce opusculi aliquid praesidii.

Unicum tantum praefandum restare censui, nempe, ut te certiore faciam me hac collectanea in lucem edidisse non ex suasu amicorum, vel questus, aut gloriolae captandae gratia; sed inductu consilii, ut mihi visum est, recti honestique, & publicum, tam egrotantium quam medentium (maxime juniorum) emolumentum respicientis.

Valeas itaque, Candide Lector, & hasce versuras sine fastidio accipias, atque hoc levidense φιλανθρωπίας nostrae pignus, animique erga te benevoli documentum, fac æqui bonique consulas.

Medicus est Minister, Natura Medicatrix; Deus interim hisce clementer benedicat.

NOI RIFORMATORI

dello Studio di Padova.

COncediamo Licenza a Gio. Battista Remondini Stampator di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato: *Synopsis Universæ Medicinæ Practicæ*, Jo. Allen, osservando gli ordini soliti in materia di stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 22. Luglio 1766.

(Angelo Contarini Proc. Rif.

(Andrea Tron Cav. Rif.

(Girolamo Grimani Rif.

Registrato in Libro a Carte 286. al
Num. 1846.

Davidde Marchesini Segr.



SYNOPSIS

UNIVERSÆ

MEDICINÆ PRACTICÆ, &c.

CAPUT PRIMUM,

Sive Fasciculus Morborum primus.

FEBRES IN GENERE

Ex observatione & inter legendum.

(Proæ-
mium.)
Art. 1.



EBRES (ut recte annotavit clarissimus Sydenhamus) cum Appendicibus suis duas fere tertias partes omnium, quæ sunt morborum, complent; ideoque his exponendis, utpote quæ etiam totis corporibus inhære scunt, merito exordiri statuimus.

(*Febris quid.*) Art. 2. Febris autem (inquit idem) nihil aliud est, quam nature conamen materiæ morbificæ, corpori valde ini-

mice, exterminationem in ægri salutem omni ope molientis.

(*Februm divisio.*) Art. 3. Februm divisio maxime generalis & genuina est in *Essentialem & Symptomaticam.*

(*Essentialis.*) Art. 4. Febris essentialis est cujus causa primaria in ipso sanguine delitescit, a nullo alio morbo solidarum partium originem ducens, aut quocunque modo pendens, atque hæc est *Febris absoluta & proprie dicta.*

(*Symptomatica.*) Art. 5. Febris symptomatica est Febris secundaria, quæ non propriam subsistentiam habet, sed a graviore alicujus partis affectu originem trahit, & frequentissime ab insigni aliqua inflammatione pendet, unde *Febres variæ inflammatoriæ dictæ.*

(*Essentialis divisio.*) Art. 6. Febris essentialis dividitur in *Ephemeram, Intermittentem, Continentem & Continuum.*

(*Ephemera*.) Art. 7. Febris omnium mitissima est Febris ephemera, five diaria, i. e. Febris unius diei; ab insolatu, exercitio nimio, vel aliquo alio accidente externo oritur, & spatio 24. horarum ultro terminari solet. Sola quiete, & in lecto decubitu curatur.

(*Intermittens*.) Art. 8. Huic proximæ sunt Febres intermittentes, scilicet, quotidianæ, tertianæ, quartanæ simplices, tertianæ, quartanæ duplices; &c. Hæ more Febris diariæ spatio 24. horarum plus minus pro isthac vice finiuntur; verum pro peculiari illarum genio, singulis, vel alternis diebus; vel quarto quoque die, recrudescere solent.

(*Continens*.) Art. 9. His congener est Febris *συνεχὴς*, seu continens, quæ quidem est Febris continua, sed non uno tenore pergens; ad plures dies sine *ἀπουσίᾳ* protenditur, habet tamen sua remissionis & exacerbationis tempora, statis, vel incertis periodis se invicem excipientia; intermissionem vero nullam habet.

(*Continua*.) Art. 10. Febrium gradus proximus & ultimus est *σύννοσος*, five Febris continua proprie dicta, quæ ab initio ad finem ubique est æquabilis, sine symptomatum exacerbatione & remissione periodica: hujus generis sunt Febres malignæ, Febres pestilenciales, ipsa pestis, &c.

Sydenhami sententia.

(*Ratio habenda est anni constitutionis*.) Art. 11. Ille dubio tramite errat, atque incerto ducitur filo, qui in Febrium curatione non continenter ob oculos habet anni constitutionem; quatenus huic aut alteri morbo epidemice producendo favet, cæterisque morbis omnibus una concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis: hæ autem variæ constitutiones aut habitudines ab occulta & inexplicabili quadam aeris alteratione pendent, quæ proprias ac sibi peculiare Febres producant, quæ stationariæ nobis audiunt.

(*Et in novæ Febris ingressu paulisper cunctandum est*.) Art. 12. In novis Febribus cunctandum est paulisper, & ad magna remedia non nisi pede tardo procedendum; interim morbi genium ac morem diligenter persequendo indicationes præsertim a *ledentibus*, & *juvantibus* sumendæ sunt; neque pudet fateri me non semel in curandis Febribus, ubi nondum constaret, quid mihi agendum esset, nihil prorsus agendo & mihi & agro consuluisse optime; dum enim morbo invigilarem, quo eum opportunius confodere valeam, Febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum se typum redegit, ut jam mihi innotesceret, quibus armis esset debellanda. „ Non enim levis est consolatio viro probò in rebus dubiis, facileque errori obnoxiiis se saltem inculpatum tueri, si se minus utilem præbere nequeat. „

(*Febris cause*.) Art. 13. „ Calidum solum non est Febris causa, „ (*inquit Hippocrates de vet. medic.*) sed est calidum & amarum frigidum, calidum & acidum, calidum & falsum, aliaque innumera. „

(*Evenire potest in corporibus sanis*.) Ex frequenti etiam observatione compertum est Febrem in corporibus sanis evenire posse, in quibus nullus apparatus morbosus, vel quoad plethoram, vel cacochymiam, &c. occasionem subministraret; nihilominus hujusmodi homines præcedente insigni aliqua aeris, victus, &c. rerum non naturalium, mutatione, Febre corripuntur, propterea quod eorum sanguis novum statum & conditionem adipisci gestit, qualem ejusmodi aer aut victus postulaverit.

(*Indicatio generalis*.) Art. 14. Indicatio generalis in curatione Febrium est, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito

sito congruentem contineatur, ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat, unde periculosa symptomata, nec illinc nimium torpeat, ne naturæ conamen frustretur; atque hinc exurgit norma sanguinem mittendi plus minus, vel prorsus omittendi.

(*Vomitorium.*) Art. 14. Si adsit vomendi proclivitas, vomitorium propinare necessum esse omnino videtur; alias etenim accidere solet diarrhœa in Febris progressu, ægro interdum admodum periculosa. In initio Febris emeticum propinari debet, sed, si omissum fuerit, quovis morbi tempore adhiberi potest, modo vires ægri ferre valeant; post hoc autem paregoricum hora somni propinandum est, diebus insequentibus, si repetitio venæsectionis minus indicetur, & non aderit diarrhœa, enemata alternis diebus in usum venire possunt, usque ad decimum vel duodecimum diem, quo tempore negotio ad secretiorem vergente medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo ad concoctionem accelerandam. Si fermentatio recte progredietur, nullis omnino remediis opus est; despumatio etenim est opus naturæ.

(*Catharticum exhibendum sub finem.*) Art. 16. Usitato circa diem decimumquintum, si adsit in urina laudabilis separatio, & symptomatum remissio; catharticum adhiberi debet, ne sedimentum a fermentatione hic illic depositum in sanguinem remigrans recidivam conciliet; quandoque tamen ad diem decimum septimum differendum est.

(*Catharsis post V. S.*) Art. 17. Pro comperto affirmo, nihil ita certo atque ita potenter ægrum refrigerare, atque catharsin post venæsectionem celebratam: testatur enim experientia catharsin post venæsectionem quibuslibet aliis remediis felicius certiusque Febrem perdomare, tum quatenus intestinis illuviem dimovet, tum quatenus anodyno viam sternit. (Schedul. Monit.)

(*Duplex secretio.*) Art. 18. Ad genuinam sanguinis depurationem duplex secretio requiritur; una per feces fit, altera per flores, hæc sensim & paulo pleniori diaænesi; potius quam sudore manifesto ut plurimum peragitur; separatione hac per flores jam facta, minus periculosa est diarrhœa.

Boerhaavii sententia.

(*Febris quid.*) Art. 19. Febris est frequentissimus morbus, inflammationi individuus comes, qui ingenti symptomatum numero plerumque stipatur.

(*Symptomata quæ in omni Febre adsunt.*) Art. 20. In omni Febre, a causis internis orta, horripilatio, pulsus velox, & calor, vario tempore, & vario gradu, adsunt; hæc autem ubi velociter decurrunt, Febris acuta, ubi tarde, lenta audit. Febris fere semper cum sensu frigoris incipit, & progrediente morbo maxime a velocitate pulsus primario cognoscitur; adeoque velocior cordis contractio cum aucta residentia ad capillaria Febris omnis acutæ ideam absolvit, quæ a causis infinitis produci potest. Sanitas ægroti videtur esse cynosura primaria, in quam natura in Febribus collimat; frequenter vero Febris in mortem definit, quandoque in alium transit morbum.

(*Curatio generalis.*) Art. 21. Curatio Februm generalis summam comprehenditur in vitæ ejusque viribus consulendo, acre irritans corrigendo & deturbando, lentorem dissolvendo, expellendoque, & symptomata mitigando. Si in Febre exorbitare natu-

ra deprehendatur, moderamen sit abſtinentia, viſtu tenui, potu aquæ, venæſectione, clyſmate refrigerante, &c. Si ſegnior appareat, excitabitur ope cardiacorum, aromaticorum, volatiliū, &c.

(*De ſymptomatis.*) Sublata Febris cauſa ſymptomata reliqua ceſſabunt, quatenus ab ea primario pendent, adeoque, ſi ferri queunt ſine vitæ periculo, ſingularem curationem vix requirunt, nec temere turbari debent: Si vero intempeſtiva & nimis ſæva fuerint, ſingula ſunt lenienda ſuis remediis propriis, habita ſemper ratione cauſæ & ſtatus morbi ipſius.

Ettmulleri ſententia.

(*Quid vult natura per Febrem.*) Art. 22. Febris eſt *motus nature*, ſeu quædam luſta, quæ ſpirituū plus minus alteratorum ope id, quod eſt hoſtile œconomix animali, eliminare ſatagit.

(*De diætâ.*) Art. 23. Quo magis acuta eſt Febris, eo tenuior convenit diætâ; licet ægri ad plures dies jejuni jaceant, perinde erit, nec unquam vidi febricitantem fame pereuntem, ſed potius ſi quid ingeritur, Febris exaſperatur, &c. nam in alimentis appetitus præſcribit rationem, quantum, & quale, & tempus.

(*Vomitoria & ſudorifera.*) Art. 24. Vomitoria in Febribus fere omnibus in principio ſunt proficua. Sudoriferorum uſum ipſa natura nobis monſtrat, ſignis coctionis apparentibus ſunt optima; & etiam in toto morbi decurſu ſunt utilia; immo horum uſu promiſcuo Febres non raro curantur. Spiritus ſalis armoniaci, vel ſal volatile ejusdem, eſt febrifugum univerſale, & in uſu repetito raro fallax. Saccharata quæcunque in Febribus inſigniter nocent. Hippocrates in omni Febre vinum porrigit. Semper obſervavi quamdiu urinæ ſunt crudæ, tamdiu res ægri in ſtatu exiſtunt ambiguo; quando vero adſunt ſigna coctionis ſauſta poſſumus ominari; opus hoc coctionis eſt ſolius nature. Inter ſigna lethalia nullum eſt certius, quam frequens manuum ad nares admotio ſine ulla materiæ effluſione.

Baglivii ſententia.

(*Nature ductus ſequendi ſunt.*) Art. 25. In morbis acutis, atque inflammatoriis paucis opus eſt remediis; ſatis enim fuerit viam obſervare diligenter, qua natura exitum tentat, curamque eo perducere, nature obſecundando, alioquin ægrotus peſſum dabitur.

(*Inanes ſpeculationes miſſæ faciendæ.*) Art. 26. In Febribus univerſalibus, id eſt, quæ ipſo de ſanguine ſuſcitantur, non admodum laborandum eſt circa partem affectam, ut inde curativæ deducantur indicationes: Februm ſiquidem primordia, partesque affectæ in iſſa dem, nos plerumque latent, & ſi unquam paterent, oportet indicationem dirigere ad conſtitutionem mæſſæ ſanguineæ febricitantis, potius quam ad ſophiſticam ſpeculationem cauſarum proximarum, aut quæ in Febribus primoprime ſunt, quæ noſtræ aciei minime ſubjiciuntur.

(*Tria præcepta de curandis Febribus.*) Art. 27. Ideo ſi primæ viæ ſint obduſtæ, eæque egerendæ atque expurgandæ fuerint, danda opera, ut Februm fomes tollatur; Si vero ſanguis febricitans ſit exaltatus, & vehemens, ejus reprimendus eſt impetus; ſi nimis craſſis humoribus irretitus, atque coagulatus; exaltetur, ac diſſolvatur. In hiſce enim tribus præceptis omnium prope illarum Februm cura verſatur, quæ ortum non ducunt ab organi læſione, verum ab humo-
rum

rum congerie, aut in ipso sanguine, aut in primis viis. Et cum ad crisin natura vergit, aut eas jam exciverit, tum a remediorum copia tanquam à peste cavendum.

(*Odor cadaverosus motis præsagium.*) Art. 28. Ex odore, quem ægri spirant, soleo sæpe, utrum morbus facilis vel difficilis, brevis vel diuturnus, vel alterius generis futurus sit, judicare. In ægris qui morituri sunt, nonnullis ante mortem diebus solet, dum pulsum tangimus, ab eorum exalare corpore foedus quidam ac veluti cadavericus odor, qualem spirant in templis cadavera, ut sæpe observavi, & velim, ut serio animadvertant medici. *Animadv. in præct. nov.*

Farrago sententiarum.

(*Regula de dieta.*) Art. 29. Hippocratis Aphorismus de dieta in morbis acutis sic se habet: ubi peracutus est morbus, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu uti necesse est; ubi vero non, sed plenius cibare licet, tantum a tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit. *Señ. 1. Ab. 7.*

(*Incommodum nimie remediorum copiae.*) Art. 30. Graviter errant illi, qui acutos & inflammatorios morbos remediorum copia tamdiu afficiunt, donec natura, quo se vertat nesciat, & hinc inde, tum a morbi vehementia, tum a remediorum pondere, varie distracta, tandem cogatur succumbere: perturbato enim, distractoque motu illo ordinato naturæ a repetitis toties, vel absque methodo exhibitis medicamentis, nec Febris minuitur, nec crisis stato tempore succedit, sed patiens dubio Marte colluctatur, vel in perniciem, vel in chronicos morbos delabitur. *Baglivius.*

(*Incommodum V. S. nimis crebræ.*) Art. 31. Observatione constat, quod crebra sanguinis missio homines Febri aptiores reddat præ cæteris: quare vulgo dicitur, quibus sanguis semel detrahatur, eos, nisi quotannis idem faciant, in Febrem proclives esse, & pinguescere. *Willis.*

(*Prognosticon generale.*) Art. 32. In Febribus continuis, si pulsus sit fortis uno tenore pergens, ut ut deliria, tremores, tendinum subsultus, cæteraque dira in genere nervoso symptomata subitam ruinam minari videantur, semper bene præsagit: e contra vero pulsus celer, debilis ac vacillans mortem præ foribus adstantem indubitanter prædicat, ut ut reliqua symptomata adblandiantur. *Morton.*

(*Acumen ingenii opus est.*) Art. 33. In curatione Februm summum ac acerrimum medici ingenium requiritur. Judicio præpollenti, facultati innatæ, & incommunicabili, plurimum debetur. Morbi genius, anni constitutio, ægroti temperamentum, & vivendi modus, symptomata singula & universa, & innumera alia incidentia, omnia conjunctim & divisim animo præsentis & sereno diligenter perpendenda sunt; e quibus omnibus inter se rite collatis sagaci medico, lente festinanti, exurgit clara ac distincta medendi methodus; & plerumque insequitur felix morbi exitus. Veritatem hujusce mei effati longa jam annorum serie non sine gratissimo animi delectamento feliciter expertus sum.

FEBRES INTERMITTENTES.

Mortoni Sententia.

(*Definitio Febris intermittentis* .) Art. 34. Febris intermittens est calor præternaturalis in sanguine accensus ab insolita spirituum expansione statis periodicis redeunte ; in hac autem Febre calor, rigor, calor, & sudores se invicem excipiunt ; adant etiam in paroxysmo ægritudo universalis, nausea & vomitus, dolor capitis, lumbago, &c. Paroxysmus quidem acutus est, morbus vero ipse ut plurimum plus minus chronicus. Febris intermittens simplex facillime cognoscitur ; ultro enim sese in conspectum dat : quocunque autem sint earum varietates (sint quotidianæ, tertianæ, quartanæ, &c.) fermentum morbosum omnium idem est, & viribus corticis Peruviani certo ac cito cedit.

(*Species Feb. intermitt.*) Art. 35. Species Februm intermittentium communes sunt quotidiana, tertiana, & quartana simplex ; quotidiana, tertiana, & quartana duplex ; semitertiana, &c. Sunt etiam Febres intermittentes quinto, sexto, vel septimo die recurrentes.

(*Historia rara* .) Contigit mihi in præxi videre foeminam per integram septimanam Febre laborantem, deinde proxima septimana omnino liberam ; atque ita alternis septimanis febricitantem, & alternis apyrexiam habentem, idque per longum tempus. Cortice Peruviano curata fuit.

(*Curatio* .) Art. 36. Neque venæsectio, neque vomitoria, cathartica, aut diaphoretica, neque aliud quodcunque remedium in paroxysmo exhibitum aliquid ad curationem hujus morbi promovendam conducere observantur ; a justa dosi vini benedicti trihorio ante tertium paroxysmum expectatum exhibita sæpius Febrem tertiam curatam novi. Antimonium diaphoreticum paulo ante adventum paroxysmi datum interdum morbum tollit ; Sal absynthii febrifugum audit, & sequentem haustum usum comprobavi, ℞. Aq. card. ben. theriacal. stil. ana ℥ij sal. absynth. ʒss. syrup. limon. misce ; sumat æger dimidiam partem trihorio ante paroxysmum, & reliquam in primo insultu. In Febribus intermittens (inquit Dolæus) pro singulari secreto mihi est lapis Lazuli a ʒss. ad ʒj : cum spiritu vini ante paroxysmum traditus. Efficacia plurimorum amarorum (antequam vires corticis Peruv. fatis exploratæ fuissent) experta fuit, uti absynthii, cardui benedicti, rad. gentian. flor. chamæ. (fere specifici) & privatim decocti amari febrifugi. seq. ℞. Fol. matricar. card. ben. absynth. summit. centaur. min. flor. cham. ana mʒ. sem. card. ben. citr. ana ʒj. sal. absynth. ʒiss. coq. in aq. font. q. s. ad ℞ss. dosis ʒiij. vel iv. quarta quaque hora extra paroxysmum. Item pulvis febrifugus sequens ; ℞. flor. cham. subtilissime pulverisat. ʒi. antimon. diaphoret. sal. absynth. ana ʒss. m. f. pulvis pro una dosi quarta quaque hora extra paroxysmum utilissimus est quidem iis, quibus vires corticis defecerunt, vel quando ob ιδιόσυγκρουσιν non possumus exhibere. In confesso est his & hujusmodi remediis Febres intermittentes æstivo tempore quandoque curari.

(*Cortex Peruvianus remedium polychrestum* .) Cortex vero Peruvianus consensu medicorum (hodie omnium) est catholicum febrifugum, quod omnes Febres intermittentes, in quavis anni tempestate, in omni ætate, & temperamento, penitus, cito, tuto, & feliciter sanat : neque

opus est, ut medici ingenia sua amplius torqueant in aliis febrifugis explorandis. „ Cortex Peruvianus sudorem omnino nullum excitat ; „ tantum omnigenas concoctiones e vestigio emendat sine ulla sensibili evacuatione nisi aliquibus alvum aliquoties, idque leniter admodum movet. Modus exhibendi nunc dierum omnibus innotescit. *Haftenus* de Febribus intermittentibus simplicibus. „

(*Febris intermittens spuria.*) Art. 37. Symptomata vero Febrium intermittentium *spuriarum* nonnunquam sunt perquam vehementia, & typus Febris ipsius in variis suis stadiis sub larva vomitionis, diarrhoeæ, doloris alicujus gravissimi, &c. absconditur. A periodica symptomatum vehementium exacerbatione & remissione, nec non ab urina lateritii coloris verus morbus potissimum dignoscitur : alios etenim morbos frequentissime simulat, unde arrepta occasione creantur nunc hæc, nunc illa gravissima symptomata, vomitiones, Diarrhoeæ tormentosæ, cholera morbus, colica, dolores lateris punctorii, tanquam pleuritici, ophthalmia, apoplexia, hemicrania, spasmi universales, vel particulares, dolores nephritici, &c. „ Item *dolores parturientium æmuli* ; in foemina quadam hujusmodi dolores, alternis diebus recurrentes, duobus vel tribus a partu septimanis accedentes semel ipse observavi, idemque ab alio observatum fuisse audiui. Et (quod rarius adhuc videatur) *dolorem unius cruris* periodice revertentem in homine quadragenario semel in praxi adnotavi : dolor fuit vehementissimus per 24. interdum per 30. horas durans, unde ingens intumescencia totius membri superveniebat ; tumor cruris erat quasi partim *flatulentus* & partim *œdematosus*, qui non nisi longo post tempore, fasciatione ad pristinam dimensionem redactus erat. Ambo hi ægroti cortice Peruviano sanati fuerunt. „

(*Curatio.*) Art. 38. Versatilis quidem est horum affectuum Proteiformium genius, sed ab uno eodemque fermento pendent omnes, & unica antidoto, nempe *cortice Peruviano*, cum prudentia adhibito, facile profligantur.

(*Prognosis.*) Art. 39. Nemo unquam a Febre intermittente interimitur, nisi in primo paroxysmi stadio, durante, scilicet, algore ex spirituum oppressione orto. Febres intermittentes, ubi valde chronicæ evadunt, viam sternunt ad alios morbos maxime funestos.

(*Historia.*) Art. 40. „ Sequens historia inter casus oppido raros „ merito recenseri potest. Paucis abhinc annis Wincauntionæ in „ agro Somersetenfi mortuus est senex, Theologus, nomine *Bulgin* ; hic annum agens trigesimum quartum in Febrem intermittentem quotidianam incidit, quæ per totum vitæ cursum (dictu mirabile ! verissimum tamen) per sexaginta scilicet annos, usque ad vitæ in extrema senectute terminum, duravit. Febris cum frigore præeunte, calore & sudore succedentibus per diuturnum istud spatium, utcumque non semper cum eodem savissimo impetu, constanter tamen, quotidie illum invasit. Postremo, *senio* potius quam morbo confectus, nonagesimum quintum agens annum obiit. Hæc narratio a filio & filia prædicti senis adhuc viventibus, fidei indubitatae ambobus, renuntiata est.

Farrago sententiarum.

(*Causa proxima Feb. intermittentium.*) Art. 41. Post accuratum examen totius historię Febrium intermittentium causa proxima constituitur *viscositas* liquidi arteriosi, superveniente dein causa quacunque velocioris & fortioris contractionis cordis; atque resolutionis ejus, quod stagnaverat. Boerhaave.

(*Galenus methodus in quartanis.*) Art. 42. Galenus hac methodo curavit quartanas; primo propinavit vomitorium, die sequenti dedit *succum absynthii* bibendum, & denique bihorio ante paroxysmum dedit *theviacam*. Sed his adminiculis tuto inniti nequimus. Febris tertiana, veteribus, quibus vires antidoti Peruvianę ignotę fuerunt, curatu erat valde difficilis, & quartana opprobrium medicorum audiebat; at hodie secus esse nemo non novit. quo enim longius recedunt intermittantium paroxysmi a natura Febrium continuarum, aut quo majus fuerit intervallum inter accessiones, eo minus periculi ab illis impendet, quoniam amplior est locus commodiorque curationi.

(*Epithemata.*) Art. 43. Epithemata & epicarpia quandoque profunt Febribus intermittentibus abigendis; ejusmodi est *Empl. febrile pro carpis* D. Michaelis ℥℥. Fulig. furni splendent. ℥i℥. terebinth. ℥vj. tel. aranear. ℥℥. camphor. ℥ij. ol. scorpion. q. f. m. f. emplastr. pro carpis. Mortonius duo sequentia ex propria experientia commendat. ℥℥. Pulv. oliban. terebinth. venet. ana p. æ. f. pericarpia. ℥℥. Fol. chelidon maj. rutę ana m. j. fuliginis e lignis combustis, sapon. venet. salis marin. ana p. æ. cum aceto acerrimo f. massa, &c. *Empl. rubrum febrifugum*, sequens scrobiculo cordis applicatum in tenellis infantibus frequenter prodesse deprehendi. ℥℥. Thur. subtilissime pulv. ℥v. minii ℥j. ol. olivar. q. f. f. empl.

(*Enema febrifugum.*) Art. 44. Qui corticem Peruvianum ore assumere pertinaciter respiciunt, curari possunt cum enematis ex ejusdem decocto; istiusmodi est *enema febrifug.* Fulleri, sed pueris certius solet opem ferre quam adultis.

(*Ad algorem.*) Art. 45. Dum febrilis horror, aut frigus universam cutem convellit, tum oleum distillatum caryophyllorum epigastricę regioni illitum remissionem horroris undequaque procurat. Baglivus.

(*Vires succi limonum.*) Art. 46. Ansam mihi suppeditari autumnam aliquid ad artis nostrę incrementum ediscendi, idque aliquoties tentans, non infeliciter processit, in Febribus scilicet intermittentibus, circa initium paroxysmi, haustu calido succi limonum cum saccharo & aq. fontan. tanti semel atque iterum exhibito, exacerbationes vel in totum cessasse, vel saltem in dies præter expectationem simul cum siti deferbuisset, & intra paucos dies plane siluisse, deprehendi, subsequente utique manifesto effectu, urinę scilicet, & imprimis sudorum larga promotione. Piso. p. 313.

(*Specifica alia.*) Art. 47. Sunt & alia nonnulla remedia a quibusdam plurimum decantata, tanquam Feb. intermit. specificè curantia. Nempe pulvis corticis interioris fraxini a ℥℥. ad ℥j. cum paucis sale absynthii in vehiculo idoneo exhibitus, more corticis Peruv. vires ejusdem adæquare, immo superare dicitur; felici cum successu sæpe exhibuit doctissimus & insignis medicus D. Hen. Vagban. Idem perhibetur

tur de cortice ulni prope radicem. Flores salis armoniaci optimum febrifugum censentur, præcipue in Febribus intermittentibus. De quo remedio audiatur clarissimus Boerhaave; non novi (inquit ille) melius febrifugum quam gr. xx. salis armoniaci in calido haustu, una vel duabus horis ante paroxysmum. Succus rad. gentian. inspissatus, & in vehiculo appropriato cum myrrha assumptus propter ejus vim febrifugam non immerito usurpari potest ad instar cort. Peruv. cujus succedaneum fere est (inquit Ettmullerus.) Sed forsitan cortex radice prunæ Sylvestris, i.e. spinæ nigrae vulgo appellatae, est adhuc præstantius medicamentum, quod olim honorandus D. Sloan in literis mihi datis communicavit. Camphora est remedium diaphoreticum nobilissimum, & omnium adhuc notorum certissimum. Insignis est ejusdem usus in curandis Febribus intermittentibus, & viribus corticis Peruviani magnopere opitulatur.

(Recidivationis præcautio.) Art. 48. Unicum hic, quod multa experientia didici, in bonum commune evulgari volo de Recidivatione præcavenda: nimirum, Febre cortice Peruviano prius fugata, cui penso istius remedii uncia vel ad summum sesquiuncia semper sufficit, intra triduum vel quatrimum propinare soleo medicamentum aliquod chalybeatum, & huic operi levissimas præparationes eligo, & in hunc fere modum præscribo. ℞. Vin. chalybeat. pharm. Londinens. ℥ij. infund. stomach. amar. Quincii ℥ij. vel iv. misce dosis coch. iv. vel v. bis in die;

(Infusum chalybeat. amar.) Vel loco hujus infusum chalybeatum amarum sequens. ℞. Limatur. ferri ℥iv. succ. limon. N. iv. aurant. acid. N. vj. infund. per hor. 24. deinde add. rad. gentian. ℥℞. aristoloch. rotand. ℥j. cort. winteran. rad. calam. arom. ana ℥ij. summit. absynth. centaur. min. ana p. j. vin. alb. ℥iv. aq. gent. comp. ℥ij. infund. frigide per septimanam & decantetur pro usu. Vel ℞. Flor. sal. ammoniac. martiat. ℥ij. myrrh. elect. ℥j. rubig. ferri ℥ij. extract. rad. gent. q. s. m. f. pil. med. dos. iv. bis in die, superbibendo infus. stomach. amar. sequent.

(Infusum stomach. amar.) ℞. Rad. zedoar. cassumaniar. ana ℥℞. cort. flav. aurant. Hispalens. ℥ij. sem. cardamom. min. ℥℞. Summit. absynth. Rom. p. ℞. infund. in aq. bullient. ℥ij. coletur frigide. Atque ita ventriculo optime consultum est, & res in vado fit; Febris nullatenus recrudescit, nisi ex gravi aliquo sex ferum non naturalium errore. Interdum in casu ancipiti & in corporibus valde debilitatis chalybs & cortex Peruvianus junctim maritati melius cedunt, quam alteruter eorum seorsim exhibitus:

(Decoctum nigrum.) In hunc finem decoctum nigrum sequens est remedium appropriatum; ℞. Cort. Peruv. pulverisat. ℥ij. chalyb. cum tart. præp. ℥j. coq. in aq. font. ℥vij. lento igne ad ℥℞. addendo sub finem coctionis cinnam. acutissim. ℥ij. colatur. add. aq. absynth. magis comp. ℥℞. m.

(Tinctura Burgundica.) Vel in magis delicatulis vinum chalybeatum prædict. & tinctura sequens usus tempore commista; dosis a coch. iij. ℞. Cort. Peruv. pulverisat. ℥x. calam. arom. cinnam. ana ℥j. cort. aurant. ℥ij. cochinel. ℥℞. macera per biduum in vin. ab Ulyssiponens. ℥vij. filtretur, &c. hanc ob venustum colorem tincturam Burgundicam vocant.

FEBRES REMITTENTES.

Mortoni sententia.

(*Typus Febris remittentis simplicis.*) Art. 49. Febris *Συρεχίς*, continens sive remittens ex manifesta *exacerbatione* & *remissione*, singulis ut plurimum, vel alternis diebus, stata & certa hora, periodice recurrentibus, facillime dignosci potest; atque equidem ab intermittente inde duntaxat discriminatur, quod calor febrilis in intervallis huius Febris nunquam penitus extinguatur, & singuli exacerbationis paroxysmi cum algore & horrore minus incipiant. Sub finem cujuscunque paroxysmi æger sudoribus plerumque perfunditur; & urina, quæ durante paroxysmo rubedine multa perpetuo tingitur, in remissionibus hypostasim laudabilem ut plurimum deponit. Atque sic se habet typus Febris remittentis simplicis.

(*Spuria.*) Art. 50. In Febre vero remittente *spuria* gravia symptomata in genere nervoso suboriuntur, nempe, dolore in musculis, tendinibus, & membranis, rheumatismum, pluritudinem, colicam, cæterosque id genus morbos inflammatorios, & spasmodicos simulantia, & a partibus glandulosis enormes subsequuntur humorum excretiones, vomitio scilicet immodica, cholera morbus, diarrhœa, dysenteria; &c. unde typus *Συρεχίς spuria* multum obscuratur; paroxysmi periodici inde incerto, & nonnunquam sæpius eodem die recurrere solent, scilicet evacuatione, vel dolore aucto, calor & pulsus minuuntur; his autem diminutis illi augentur.

(*Prognosis.*) Art. 51. Febris remittens simplex, qua talis, & quam diu talis, raro admodum, si unquam, est funesta; priusquam exitialis evadat, typum ac genium suum mutat, & transit in *Συνοχον malignam*. Spuria vero sive mixta, ut ut in se non sit funesta, ratione symptomatum adjunctorum ægrotantes haud raro e vivis tollit. Quo exacerbationes & remissiones diei hora magis certa redeunt, & quo remissiones magis sunt protensæ, eo melius, & vice versa. Evacuationes in *Συρεχίς* a natura institutæ fere semper sunt *infidæ*, atque ut plurimum *symptomatiæ*. Evacuatio critica & salutifera fit solummodo *per sudores*, vel *salivationem*; prior est magis cita; altera vero æque certa, licet tarda & molesta. Durante morbi augmento pessimum signum est, si urina sensim in tenuem & pallidam mutetur, & pulsus magis celer, debilis ac vacillans evadat, &c. e contra pulsus fortis & constans, urina rubedine multum tincta, & contentis saturata, multo magis quæ hypostasim laudabilem deponit, ubi morbus ad statum pervenerit, optimum præsagium exhibet, ut ut reliqua symptomata contrarium prognosticon denunciare videantur.

(*Curatio.*) Art. 52. Febris remittens simplex viribus *corticis Peruviani* æque certo cedit, ac ipsa intermittens; quippe fermentum febrile in utraque fere idem est. Efficacia ejusdem Antidoti in *Συρεχίς*, supra debellanda est propemodum æque certa, ac in simplici (modo rite ministretur, respectu ad symptomata vehementia habito) non autem adeo cita est, quoniam morbus est intensior, ideoque majorem remedii quantitatem postulat: in iusta autem ac regulari hujusce antidoti exhibitione, atque repetitione, harum Februm cura radicalis consistit.

(*Curatio debet esse alia, si Febris typum mutaverit.*) Art. 53. Curationem symptomatum maxime urgentium quod attinet, vel potius

„ potius mitigationem, in his sicut in aliis febribus, alibi (Art. 102. „ 103. &c.) dicendum erit. Interim sat erit impræsentiarum adnota- „ re, quod, si quando Febris remittens, vel ex errore aliquo typum „ mutaverit, & in continuam vel malignam migraverit, curationem „ tunc prorsus aliam exposcit, ut infra videbitur.

FEBRES CONTINUÆ.

(*Febris continua quid.*) Art. 54. „ Febris *Σύνοχος*, continua, sive „ Febris putrida dicta, est, quæ per plures dies sine *exacerbationibus* „ & *remissionibus* usque ad ultimam & integram sui cessationem per- „ durat, aut saltem ita perhibetur.

(*Fomes Februm harum omnium fere idem.*) „ Fermenta febrilia, „ seu fomes morbosus in febribus omnibus ante dictis; & in hac quoque „ gradu tantummodo differre videntur.

(*Venæsectio.*) Art. 55. „ Febres continuæ putridæ plerumque venæ- „ sectionem requirunt; intermittentes & malignæ rarissime aut nun- „ quam eandem admittunt. In Februm progressu ad statum appro- „ pinquantium sanguinem detrahare nefas est juxta antiquorum præ- „ cepta; *Cælius Aurelianus*, *Celsus*, & reliqui sanguinem mitti solum- „ modo *prima diatritho* requirunt, ultra vero nunquam. „

(*Non sine necessitate.*) Art. 56. „ De venæsectione in genere dicen- „ dum est; in sanguine est *radix vitæ*, & sanguis est ipse *vitæ the-* „ *saurus*; unde, si aliis modis ægro vel sine periculo, vel æque com- „ mode succurrere poterimus, sanguini parcatur. Rariores sunt sangui- „ nis emittendi occasiones, quam vulgo creditur. *Itali*, *Galli*, & „ *Hispani* sanguinem mittunt, non unciatim, sed libratim. In Ger- „ mania non ultra quinque vel sex uncias emittunt. Inter hos nos „ *Angli* mediam viam amplectimur. „

(*In qua vena.*) Art. 57. „ In brachio subter venam basilicam ja- „ cet arteria, subter medianam nervus, subter utramque tendo; jux- „ ta cephalicam nulla est arteria, neque nervus, neque tendo; At- „ que hanc ob causam hæc ultima minimo cum periculo aperiri pot- „ est. „

Willisi Sententia.

(*Quatuor stadia Februm putridarum.*) Art. 58. In Febribus putri- „ lis continuis quatuor numerantur stadia, vid. initium, augmentum „ tatus, & declinatio; in initio plerumque adsunt symptomata sequen- „ tia, rigor aut horror, lassitudo & perturbatio cum siti & vigiliis, de- „ or in capite aut lumbis, nausea aut vomitus. In incremento sequen- „ tia, sitis intolerabilis, dolor capitis & vigiliæ pertinaces, deliria, „ phrenitis, motus convulsivi, oris amaror, sapor ingratus, linguæ sca- „ rities, pulsus vehemens & citatus, urina summe rubicunda, plerum- „ que turbida, contentis saturata, sine hypostasi aut sedimento lauda- „ bili.

(*Crisis.*) Status morbi *crisin* continet, quæ in Febre continua fere „ dem est ac paroxysmus intermittentium, qui non nisi statotempore, „ t post totidem horas, evenire solet, sic etiam motus critici in Fe- „ bribus continuis a die quarto in quartum aut forsan a septimo ad „ eptimum contingunt: Hæ *Crises* sunt plerumque per sudorem, vel „ hæmorrhagiam; sunt etiam aliquando *crises imperfectæ*, quæ morbum „ non solvunt, quales sunt per urinas, vomitum, secessum, exan- „

themata, bubones. &c. *Criseos* tempora sunt valde incerta. Si Febris in principio sit vehemens, plerumque intra dies quatuor expectandum est *crisis*; quod si tardior sit Febris in initio, circa diem septimum ad *crisis* perveniet; si vero adhuc remissius incipiat, ad diem undecimum, aut decimumquartum, vel ultra protrahi solet.

(*Nota bene.*) Art. 59. Interea notandum est, quod sicut paroxysmi intermittentium statis redeunt temporibus, ita *motus critici in continuis*; (diem autem quartum ut plurimum observant,) nam licet *crisis* perfecta ad 14. 17. aut 20. diem prorogetur, tamen intermedio tempore motus leviores contingunt, quibus materia Febrilis velut per partes amputatur, donec pleniorē ejus discussionem natura aggredi valeat; *natura etenim ut plurimum, nisi alias perturbata, quarto quovis die partem eneris sui excutere tentat*; quare ut plurimum 4. 7. 11. 14. motus critici, non planetarum directione, sed ob naturæ necessitatem eveniunt.

(*Declinatio.*) Art. 60. Per declinationis stadium intelligo conditionem ægri & morbi, quæ statum sequitur, sive in salutem sive in mortem tendat, vel alterationem quam sanguis subit post *crisin* bonam vel malam, cum res adhuc in dubio versetur, quandoque etenim *crisi imperfecta* existente, ægri diuturna imbecillitate labefactantur & non nisi longo tempore, si omnino, convalescunt.

(*Ptyalismus.*) Art. 61. Aliquando in declinatione Februm *incuratio* in partibus oris succedit. (quasi species *aphtharum*) & etiam ad est *salivatio* copiosa, velut ab assumpto Mercurio, cum foetore anhelitus, item linguæ & gingivarum intumescencia.

(*Divisio in Febr. ardentem & lentam.*) Ut instituatur harum Februm therapia rationalis, utilissima est earum divisio in *Febr. ardentem & lentam*, utpote quoad medendi methodum toto (quod ajunt) cælo a se invicem discrepantes.

FEBRES ARDENTES.

(*Causus quid.*) Art. 62. Causus seu Febris ardens ea est, quæ cum majori æstu, siti fere intolerabili, aliisque symptomatibus insigniorem sanguinis *phlogosin* arguentibus, cursum suum peragit; symptomatis magis horrendis stipatur; *crisin* habet difficilem & eventum periculosum. (Calor ad tactum fere urens, est hujus Febris *signum pathognomonicum*, & ut plurimum, habet conjunctam insignem alicujus visceris inflammationem.)

(*Lipyria, Affodes, Elodes, &c.*) Art. 63. Huic Februm classi alio modo referri potest 1. Febris *lipyria* dicta (Art. 104.) in qua interiora uruntur, exteriora vero frigent. 2. *Affodes*, in qua ægri decubitus eundem non ferentes jacendi situm perpetuo variant in lecto indefinenter jactitantes. 3. *Elodes*, in qua ægri profundissime sudant, sudore nihil proficiente, &c. Sed revera hæc sunt potius Februm symptomata, quam novæ species. Eiusdem quoque communitatis est Febris *Calentura* dicta, quæ nihil aliud est quam peculiaris *delirii* species.

(*Calentura.*) Art. 64. *Calentura* est Febris nauticis peculiaris. Hoc morbo correpti singulari *delirii* specie afficiuntur, nimirum ajunt se in vireto, quod semper in conspectu habent, & præsto esse arbitrantur, ambulare velle; & nisi vi detineantur, in mare profiliunt; atque hoc symptoma est *signum hujus morbi pathognomonicum*. In mari *mediterraneo* frequenter occurrit; juvenes robustiores

, flores & temperamento sanguineo præditi, huic Febri sunt magis obnoxii. Larga sanguinis missione ut plurimum sublevantur.

Boerhaavii sententia.

(*Symptomata frequentiora.*) Art. 65. In Causo adest calor ardentissimus, siccitas in cute tota, naribus, ore, lingua; respiratio densa, anhelosa, cita; lingua sicca, flava, nigra, exusta, aspera; sitis inextinguibilis; nausea, vomitus; anxietas, inquietudo, lassitudo summa; sufficula, vox clangosa; delirium, phrenitis, pervigilium, coma, convulsio; diebus imparibus exacerbationes.

(*Prognosis.*) Art. 66. Tertio & quarto die sæpe lethalis evadit, optimum raro transit, si perfecta; solvitur sæpe hæmorrhagia (quæ, si tertio vel quarto die parca, lethalis;) hæc prænunciatur cervicis dolore, temporum gravitate, tenebrosa caligine, præcordiorum contentione sine doloris sensu, invitis lacrymis sine lethali signo alio, rubore faciei, pruritu narium, optima sit die decretorio; solvitur & die decretorio vomitu, alvo, sudore, urina, sputo crasso; accessio die pari pessima, si id ante diem sextum; urina nigra, pauca, tenuis huic lethalis; lethale sanguinis sputum: lethalis sanguinis mictus; leglutitio læsa, mala, extremorum refrigeratio, pessima; facies rufa & sudans mala; parotis non suppurans exitialis, alvus nimis fluctuans lethalis; cum tremore abit in delirium, inde in mortem; transit in peripneumoniam sæpe cum delirio. „ In Febre ardente (inquit Hippocrates) si tinnitus aurium cum visus hebetudine fiant, & ad nares accedat gravitatis sensus, delirium portenditur. „

(*Intentiones curativæ.*) Art. 67. In hoc casu integumenta debent esse minime aggravantia corpus; situs corporis paulo erectior; potus copiosus, blandus, demulcens, subacidus, aqueus, calidus; cibi leves, farinacei, hordeati, avenacei, ex fructibus subacidis confecti; requiritur Venæsectio, si morbi initium, plethoræ indicia, inflammationis singularis signa, calor intolerabilis, rarefactio nimia, revulsio necessaria, symptomata urgentia, neque alio remedio facile superanda, tunc exigant. Indicantur etiam quandoque *clysmata* blande *laxantia* & *refrigerantia*, prout vis ardoris, siccitas alvi, imperant; medicamenta *diluentia*, *nitrosa*, alvum lenissime *laxantia*, &c. „ Interim in animo probe tenenda est Waldschmidii admonitio; Febris maligna, (inquit ille) in principio sæpe speciem Causæ præfert; cautus itaque sit medicus, ne in errorem incidat: animadvertendum ergo est, an Febricitans de cordis anxietate, virium jactura, aliisque gravioribus accidentibus conqueratur, & qualis sit urina, &c. nam longe diversa est harum Februm curatio.

„ Remedia particularia his intentionibus satisfacienda a sectione de Februm symptomatis (Art. 102. 103.) &c. petenda sunt.

FEBRES LENTÆ.

Ettmulleri sententia.

(*Febres lentæ.*) Art. 68. Febres lentæ, etiam si sint minus acutæ, sunt tamen continuæ, in quantum continuo affligunt ægros, sed tardiore motu sua absolvunt tempora; hinc diuturniores sunt, & symptomata habent minus urgentia. De Febris his apud practicos pauca prostant. A vitiis lymphæ (vel pituitæ) potissimum oriuntur; & a Sylvio Febres lymphaticæ appellantur, (forsan rectius pituitosæ.)

(*Febres catarrhales.*) Art. 69. Inter has eminent *Febres catarrhales*, dictæ, quæ in principio & incremento conjunctum habent *catarrhum*, *coryzam*, *tussim*, *raucedinem*, &c. Hæ Febres sunt plerumque lentæ, interdum mites, vesperi vero aliquanto exacerbari solent; adest lassitudo artuum, durant symptomata sub coryza & tussi gravioribus usque ad statum morbi, donec materia catarrhalis (ut vocant) coacta fuerit, & spissior mucus emungitur, & deinde cessat Febris. Sedes morbi est in glandulis conglobatis.

(*Curatio.*) Art. 70. In Febre catarrhali *decoctum ligai sassafr.* (cum *rad. liquiritiæ & passulis* ad humorum acrimoniam) item *succus raparum expressus* cum paucis saccharo; item *volatilia & sudorifera*; solutio *gum. ammoniac.* &c. vid. *catarrhum*, *tussim*, *raucedinem*, &c. alibi.

(*Febres pituitosæ.*) Art. 71. Præter dictas observantur quoque *Febres lymphaticæ* (potius *pituitosæ*) vitio lymphæ (pituitæ) glandularum conglomerationum, quæ in certam cavitatem suam effundunt succum; inter quas eminent parotides & pancreas, quæ in os & intestina, & consequenter in massam sanguineam secretos liquores evomunt. Peccant hi humores, quando sunt nimis viscosi, falsi & acres; unde excitantur hæ Febres, (quæ quoque non improprie interdum *Febres scorbuticæ* audiunt.) Acutæ continuæ, nonnunquam etiam intermittentes, in huiusmodi lentas degenerant, & quandoque in *hecticas* transeunt. Origo harum Februm est plerumque in stomacho ex indigestione & cruditatibus.

(*Curatio*) Art. 72. Ideoque tam in principio quam in incremento mitius vomitorium ad curam optime viam sternit, & postea visciditas vel acrimonia pro re nata corrigenda est, & symptomata mitiganda, & ventriculus roborandus, &c. Pro his scopis consequendis aliquo modo valent remedia sequentia, *Tartarus vitriolatus*, *pulveres testacei*, *antimonium diaphoreticum*, *antihæcticum Poterii*, *tinctura corallii*, *salia volatilia*, &c.

(*Febres colliquativæ.*) Art. 73. „ *Febres colliquativæ* sunt, in quibus
„ corpus brevi tempore insigniter consumitur, & emaciatur; partes
„ solidiores & ipsa pinguedo colliquescit, nunc per diarrhœam, nunc
„ per sudorem, nunc per urinam, nunc solo ardore febrili sine ulla
„ sensibili excretionem; Febris aliquando *colliquativa* ex cancro mammarum cum diarrhœa observata est. Hactenus de Febribus benignis.

FEBRES MALIGNÆ.

Ettmulleri sententia.

(*Febris malignæ Diagnôsis.*) Art. 74. Febris malignæ primum signum est subitanea virium prostratio citra causam manifestam cum pulsu debili; calor externus non adeo intensus ac in quibusdam aliis Febribus, potius interiora uruntur; adsunt vigilæ pertinaces mox a principio morbi, inquietudo anxiosa: conquæuntur ægri, & monstrant regionem stomachi seu præcordiorum; urina est sanorum similis; facies interdum solet esse tetra, & a statu naturali multum mutata, livida interdum, aut plumbea. In his Febribus, quod æstus & Febrilis ebullitio ut plurimum remissior sit, malignitati, quæ sanguinem occupat, prorsus debetur, & spirituum magis affectorum & quasi sideratorum, quam turbatorum humorum indicium est: aut saltem in humoribus,
præ-

præsertim sanguine, a fermentativis malignis miasmatis confusionem, & in textura & in motu intestino eorum inordinationem indicat, & ita incallescencia quidem, sed interne tantum gliscens, non vero ad exteriora pergens, accidit; unde natura quasi oppressa non potens est symptomata illa magis regularia exercere, quæ morbo competunt.

(*Magna varietas.*) Art. 75. Ratione symptomatum adjunctorum magna est varietas Februm malignarum; dum quædam cum certis & insignibus cutis efflorescentiis, quædam sine iis, vel paucis admodum, quædam aliis symptomatis stipatæ sunt.

(*Vermiculi.*) Art. 76. Nonnulli asserunt (ex observationibus microscopicis) in omnibus Febris malignis & ulceribus gangrænosus talem adesse putredinem sanguinis, ut exinde copiosissimi generentur *vermiculi*, qui, ubique scaturientes, & corpus lancinantes, tam varia inducant symptomata, necesse est: Sed hi vermes non nisi putredine præcedente generari possunt. In Febris malignis sanguis est nimis fluidus, vix aut plane non omnino congrumescit (152.) sed hoc quoque est morbi *productum*. Malignitas aliquando est tanta, ut partes nunc internas, nunc externas *sphacelo* ac *gangræna* correptas observare liceat.

(*Prognosis.*) Art. 77. Audita Febre maligna homines contremiscunt; siquidem omnes Febres malignæ sunt admodum periculosæ, & quoad exitum valde incertæ, unde *Galenus* malignas Febres statuta ad iudicandum non habere tempora asserit. Surditas in principio periculosissima, in statu vero morbi salutem portendit. Narium stillicidium, ut & alvi fluxus, quocunque morbi tempore, sunt pessima signa. Muscarum venatio, aut floccorum collectio est fere semper lethalis. Interdum bubones circa genitalia apparent, quibus die undecimo erumpentibus morbus evanescit. „ Medicus (recte admonente *Waldschmidio*) „ nunquam ab ægro recedat, nisi prius inspexerit *oculos*, quorum in- „ solita mutatio infaustum prædicat eventum; & dum pulsus explo- „ rat, semper attendere debet, an manus ægrotantis sit tremula.

(*Curatio.*) Art. 78. Venæsectio in Febris malignis locum non habet: quo malignior est Febris, eo magis nocet; & quo tardius instituitur, eo deterius. --- *Vomitoria* in primo principio morbi præ cæteris omnibus maxime conducunt, antequam natura molliatur aliquam excretionem per cutim; elapso vero primo principio elapsa est occasio: Et postea cura aggredienda est medicamentis sudorem moventibus; sudores etenim (ipsa natura monstrante viam) causam & morbi fomitem frequenter expellunt: hæc medicamenta *bezoardica* aut *alexipharmaca* appellantur; quo autem major est malignitas, eo copiosius provocandus est sudor, respectu semper habito ad morbi genium, diversitatem, ægroti vires, &c. *ter ad minimum in 24. horis sudorifera sunt propinanda*; interponenda sunt *analeptica* & *blande acida*, inter quæ eminet *spiritus nitri dulcis*, (item *tinctura croci cum spiritu nitri dulcis extracta*) *succus citri*, *cydoniorum*, &c. *Camphora* est nobile alexipharmacum, sed omnes ejus usum ferre non possunt, præsertim mulieres & literati, quorum spiritus animales sunt mobiles & dissipabiles; est mirabile concretum, & si cum cautela usurpetur, vix datur par remedium. *Rob. sambuci* est egregium sudoriferum pro pauperibus. *Cantharidum* & *vesicantium* usus in statu morbi insigniter prodest. *Sal volatile C. C.* & *sal viperinum* sunt sudorifera, & malignitati resistunt; & hic locum habet *mistura simplex* Paracelsi, viz. ʒ℥. *sp. theriacal. camphorat.* ʒx. *sp. vitriol.* ʒij. *sp. tart. rectificat.* ʒvj. digere in phiala hermetice obsigna-

ta ad tres septimanas, ut uniantur exactissime; dos. ʒj. plus minus in Vehiculo appropriato, ciet sudorem. „ Item decoctum sacrum Fulleri, & haust. diaphorat. ejusdem, bezoard. mineral. tintura bezoardica, oleum Heinsii (Art. 192.) &c.

FEBRIS PETECHIALIS.

Ettmülleri Sententia.

(*Febris petechialis symptomata.*) Art. 79. Febris petechialis est Febris maligna, in qua præter symptomata reliquis Febribus malignis communia, adest insensibilis laxitudo totius corporis, dolor universalis contumens & lancinans, maculae raro die quarto, sæpius circa septimum erumpunt, præsertim circa pectus & scapulas; hinc abdomen, crura, brachia (collum) ordinario facies solet esse libera: interdum non maculae solum sed vibices apparent, in declinatione aliquando quasi *ptyalismus* exoritur cum euphoria agri.

(*Prognosis.*) Art. 80. Maculae hæc in morbo salubri efflorentia intense rubent instar pulicum morsuum, (petechiae differunt a puncturis pulicum, quod in puncturis in medio punctum appareat, quod semper manet etiamsi reliquum ruborem comprehensione vel frictione pellas,) hinc pedetentim pallefcunt, flavescent, sicque evanescent, & quo magis rubicundae sunt, eo melioris notæ; e contra, quæ ex rubore livescunt, vel nigrescunt, pessimæ sunt, si retrocedant, ingens periculum imminet.

Contagiosae sunt hæc Febres, & interdum epidemice grassantur, admodum periculosae sunt; plures moriuntur quam evadunt.

(*Curatio.*) Art. 81. Quoad curam Febrium petechialium, eadem indicationes, atque supra circa Febres malignas in genere, hic obtinent; si præmature & nimis cito maculae retrocesserint, applicanda sunt vesicatoria, quæ etiamsi raro aut nunquam denuo apparere solent, earum tamen absentia vesicatoriis quodammodo suppletur, & symptomata nervosi generis ex earum retrocessione interdum felicissime præcaventur. Apparentibus petechiis nihil amplius in primis viis moveri debet, ipsa enemata sunt suspecta.

Donckersii Sententia.

(*Symptomata. Invadendi modus.*) Art. 82. Febris petechialis, sive continua maligna epidemica in civitate agroque Colonienfi circa annum 1673. ad hunc modum se habuit; ex improvise plurimos occupavit anxietas præcordiorum, gravitas circa regionem ventriculi, appetitus dejectio, spontanea artuum laxitudo, nec non vertiginosus capitis dolor, præsertim circa originem nervorum opticorum; quibus omnibus postmodum cum virium subita prostratione accessit Febris, putridæ plurimum referens ideam *synochi*, utpote quæ præmisso brevi horrore vel rigore, universum corpus magno, & quem dicunt, præternaturali præfundeabat calore, sequentiaque secum adducebat symptomata.

(*Symptomata.*) Art. 83. Pulsus in omnibus erat celer, & plerumque parvus ac debilis; sitis, invalescente morbo, cum linguæ siccitate inextinguibilis; urina in morbi principio ordinario quidem apparebat sana, aliquando tamen rubra & obscura, in fine vero augmenti, vel initio status turbata, in declinatione semper cum sedimento, saltem ali-

qua-

quali; alvus in aliis adstricta, in aliis laxa erat; infestabat ut plurimum ægros hypochondriorum præcipue sinistri dolor (quod notandum) per lumbos secundum spinam dorsæ ascendens lancinans ad scapulas extendebatur, & cui non raro se præbebat comitem pleuritis vel angina; multos in principio augmenti defatigabat alvi fluxus, cum quo non raro lumbrici excernebantur; multi quoque alii in medio augmenti in aurium tinnitum, gravedinem auditus, & aliquando oculorum suffusionem, quin nonnunquam omnimodam eorundem sensuum ablationem incidebant; omnes denique affligebantur perpetuis vigiliis & delirio, quod in aliis levius, in aliis gravius fuit, concomitantibus semper rubris vel lividis aut subnigris maculis.

(*Solutio.*) Art. 84. Horum similiumque symptomatum *Syndromen* in omnibus, quorum cura mihi commissa fuit, vel (quatenus ex aliorum relatione potui colligere) quorum natura inversa curandi methodo non fuit plane consternata, septimum circa diem subsecuta fuit *crisis*, vel manifesta vel obscura.

(*Contagium.*) Art. 85. Hic morbus in primo sui ortu aliquandiu apud paucos veluti latebat, pedetentium vero symptomatum malignitate funerumque frequentia longe lateque sæviebat, & ad tertium usque annum plus minus invaluit, & nonnullis in locis tertiam incolarum partem e medio sustulit.

(*Prognosis.*) Art. 86. Si delirium circa diem criticum vel primum accidebat, vel majus evadebat, concomitantibus diarrhœa, obscura voce, & difficillima (citra faucium tumorem) deglutitione, necnon digitorum, manuum labiorumque tremoribus convulsivis, indubia instantis mortis erant indicia; in hac Febre quando alius aliquis morbus se illi conjunxerit, multo periculosior fuit; lethalis fuit frequentius in cacochymicis, plethoricis, & valde obesis; pulsus parvus celer in morbi principio male ominatur; Maculæ parvæ & nigræ aut lividæ male portendebant: quibus vero floridæ tempestive prodierunt, nempe die quarto seu indicatorio, sub *legitima medicatione*, ut plurimum servatos vidi.

(*Signa ut plurimum lethalia.*) Alii autem, in quibus tales maculæ serius vel instante die critica sub cuticula obscure proreperent, septimoque die vel immediate post, magis debilitarentur, ac pejus haberent, non evasere; exitialis quoque ægrò ut plurimum fuit, si præter pulsum a principio insigniter parvum, debilem & celerem, urina quoque semper maneat sani coloris & consistentiæ; si ægrotus mente consternatus se non ægrotare, ast bene habere, & continuo effurire putet; si cum magna faucium linguæque ariditate parum bibat; continuaque adsit oculorum lacrymosa distillatio; hæc enim & similia symptomata, si non certum interitum, saltem extremum vitæ discrimen denotant. Certus denique pronunciatur interitus, si circa criticum seu septimum diem, urina in eadem perseverante bonitate & claritate, delirium majus fiat; si sitis acuta sit cum tanta linguæ fauciumque ariditate, ut æger non nisi inarticulate loqui, neque nisi cum difficultate deglutire queat; si adsint convulsiones; insuper si, exiguis & fuscis sub cuticula obscure emergentibus maculis, alvi fluxus superveniat; mors in propinquo est.

(*Signa salutaria.*) E contra vero si pulsus non sit nimis debilis, & si sit mediocriter magnus, & non præter modum celer, si delirium leve & insomnio quam delirio similis: si lingua non admodum sicca, sitisque tolerabilis sit; si maculæ sint rubræ,

majuscula, rotunda, clara, & distincta, si post tertium diem erumpant; & urina circa idem tempus rubra & obscura, vel cum nubecula spectetur, bonum hinc latumque præfagire oportet eventum, qui sine dubio septimo die insequitur, quando scilicet erupto sudore, quietoque oborto somno symptomata quæque graviora remittunt, & æge periteste judicabitur.

(*Curatio*) Art. 87. Cum ab *alvi purgatione* semper inchoanda est, si nempe nullum aliud urgens symptoma aliter suadeat: sin vero morbus fuerit valde inflammatorius, pleuriticus, vel anginosus, &c. ante omnia præmissis clystere *venesectione* instituenda est, & remedia *antipleuritica* propinanda, & aliquando phlebotomia est iteranda (sed parce & non nisi cum cautela aperienda est vena in febribus malignis.) Cathartica calida sunt vitanda, lenitiva, & quæ sanguinem minus exagitant, sunt eligenda. Factis his juxta indicationes particulares evacuationibus, sanguinis naturalis effervescencia confortanda est convenientibus *Alexipharmacis*, sed non violentis, ac si hostis una vice expellendus esset. Ex innumeris remediis, quæ in hunc scopum apud auctores inveniuntur, eligimus vulgatissima, atque ab omni ævo probatissima, & idcirco tutissima; *mithridatum*, nempe, *theriacam*, *diascordium*, &c. Cavendum est imprimis ne sudorem expellere conemur sola vi medicamenti, antequam ipsa natura eum sponte excitare molliatur.

(*Potus & Cibus* .) Potus debet esse neque nimis calefaciens, neque valde refrigerans, inchoante crisi cum sudore nihil convenientius expertus sum, quam ut ægri *aquam hordei calidissimam* copiose bibant cum vino mixtam, & quandoque cum *flor. papav. errat. & rasur. C. C. incoct.* cibus debet esse tenuissimus vel potius nullus.

Art. 88. *Purgationis* in morbi principio necessitatem & bonos effectus non tantum inculcat ratio manifesta (de qua, si quis velit, videatur auctor) sed & *experientia mihi confirmavit*, adeo frequens, adeo certa, adeo clara, ut si hæc falsa sit, aut esse possit, nulla certa aut sit, aut fuerit, aut futura sit unquam.

(*Cathartica* .) Art. 89. Remedia cathartica mihi usitata fuerunt vel hujusmodi *apozema* vel *electuarium* subsequens; ʒ℥. Fol. sen. mundat. ʒiij sem. fœn. ʒi℥. crem. tartari ʒj. coq. in q. s. aq. font. ad ʒvj. in colatura dissol. pulp. tamarind. ʒij. syr. ros. solutiv. m. ʒj. sumatur partitis vicibus. *Electuarium* sic habet; ʒ℥. Pulv. tamarind. ʒi℥. confect. al-kerm. pulv. jalap. ana ʒ℥. resin. ejusdem gr. vj. diagrid. gr. v. cum q. s. syr. de cichor. cum rheo f. *electuarium*. Mixturem alexiteriam fere semper hujusmodi cochleatim bibendam propinare solebam.

(*Alexipharmaca* .) ʒ℥. Theriac. Andromac. diascord. Fracastor. ana ʒj. sal. absint. ʒ℥. ocul. cancerorum ʒij. aq. card. ben. meliss. ana ʒij. theriacal. syr. papav. errat. ana ʒj. sp. sulph. q. s. ad gratum acorem, f. mixtura.

(*Successus admirandus* .) Ex magno ægrotorum numero, quos sub mea habui cura, licet aliquando quinque, sex, vel septem simul in eadem domo Febre ista laboraverint, nullus, quod meminerim, sit desideratus præter unum virum & unam foeminam. „ Fides sit penes auctorem. „

(*Sed in dubium vocandus* .) Art. 90. „ In calce libelli historias LII. „ hac Febre decumbentium in medium profert, quorum duo tantum „ mortui sunt. Illius methodus est plane singularis; & „ si dictis fides „ adhibenda sit, proculdubio curationes hæc *laudano* potissimum ac- „ ceptas referre (ut mihi visum est) debemus: in omnibus enim fe-

„ re præscriptis *laudanum* larga manu propinavit: exemplo sit bolus
 „ sequens, 2℥ *Diascord.* ʒiſſ. *laudan. opiat.* gr. ij. m. f. bolus pro una
 „ vice, concesso eodem tempore in potu ordinario *Syrupo papaveris*
 „ errat. p. 467. His expendendis haud mihi suppetit tantum otii, sed
 „ ad propositum revertendum est.

Farrago sententiarum.

DE FEBRIBUS IN GENERE.

(*De diebus criticis & indicibus.*) Art. 91. Hippocratis aphorism. 39. §. 4. Sudores febricitantibus boni, qui manare coeperint die tertio, quinto, septimo, nono, undecimo, decimo quarto, decimo septimo, vicesimo primo, vicesimo septimo, tricesimo primo, tricesimo quarto, ii enim sudores morbos judicant: qui secus evenerint, laborem, & morbi longitudinem, & recidivas significant. Aphorism. 24. §. 2. Index septimi quartus: sequentis septimanæ octavus initium; spectandus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimanæ quartus est; rursumque decimus septimus spectandus: is enim a quartodecimo quartus est, & ab undecimo septimus.

(*Doctrina eorum valde obscura.*) Dierum (inquit *Lister*) indicum & contemplabilium ad crises explicandas tota doctrina valde obscura est. Est quidem trium concoctionum quædam mensura, ut ex anatomia & statica medicina plane constat; ita Februm intermittentium periodi statæ sunt; in aliis vero morbis acutis, quales sunt Febres symptomatice, ut pleuritis, angina, variolæ, & Febres continuæ, crises, earumque indicia forte non ita prompte animadvertimus; quod parum naturæ, sed nobismet ipsis (quod tamen veteres non fecerunt) totam fere sanationem vindicamus.

(*Utilitas vomitorii in Februm principio.*) Art. 92. Nullum remedium (inquit D. D. *Freind*) sub initiis Februm est æque salutare ac vomitorium, sæpenumero, & necessarium est, si quando, quod plerumque fit, vel nausea, vel ventriculi gravitas, vel etiam capitis dolor invaserit: hoc medicinæ genus apud vetustissimos *Græcos* haud infrequens fuit, & *Celsi* temporibus *Romæ* perquam familiare.

(*Virtus singularis rad. Ipecacoanhæ.*) Medicamenti, quo vomitus cietur, interior est quædam actio; quæ nusquam alias se manifestius prodit, quam in celebri illa radice *Ipecacoanha*. Hujus sane vis in attenuandis humoribus eximia est; cui & fidem facit summa herbæ amaritudo, & vividus ille, qui apparatu Chymico elicitur, *sal.* Equidem hanc radicem non parca manu adhibitam esse comperi, cum nulla fere vel per os, vel per alvum sequeretur purgatio: Elapsa autem una aut altera hora incalescere coepit ægrotus, ita ut, pulsu excitato, tandem in uberrimum sudorem colliquesceret.

(*Febres vix sine evacuatione curantur.*) Art. 93. Hoc unum spondeo (idem laudatus author) quemquam experiundo comprobaturum, quod scilicet ex Febris multæ evacuantibus solis, etiamsi haud alio fuerit remedio usus, cedere consueſcant; vix ulla autem, quæ paulo vehementius invaluerint, medicina qualicunque si ab hoc evacuandi instituto decesseris, restingui possunt.

(*Methodus Ludovici in curandis Febr.*) Art. 94. „ Hæc est accuratissima *Danielis Ludovici* methodus curandi Febres continuas, nempe,
 „ in principio præmissa vel omisso vomitu, mox volatile aliquod verbi

„ gratia tincturam bezoardicam, mixuram simplicem, spirit. C. C. &
 „ pro circumstantiarum ratione cum opiatis exhibendo; in statu fi-
 „ xiora, terrea, alcalina; in declinatione cancrina, corallina, &c.
 „ hac nempe methodo nec crisin negligit medicus, nec otiose eam
 „ expectat. „

Art. 95. „ Quo mitiora pathemata sunt circa primas vias & regio-
 „ nem stomachalem, eo mitior & salubrior est Febris. „

(Signa prognostica.) Art. 96. „ Facies turgida & subtumida morbi
 „ longitudinem pronunciat. „

Art. 97. „ Quo magis sudant febricitantes, eo minor est sedimen-
 „ ti copia in urinis. Glutinosus sudor est pessimus.

Art. 98. „ Quanto urina rubicundior est in initio, tanto citius ter-
 „ minatur Febris, cum signis bonis ad bonum, cum malis ad ma-
 „ lum. Urina alba aut pallida & admodum cruda in Febribus arden-
 „ tibus periculosa est, & plerumque mortem portendit, præsertim si
 „ adsit delirium; convulsiones enim sunt in propinquo.

Art. 99. „ Surditas in Febribus, urina existente cruda, delirium
 „ grave portendit; sed si cum signis coctionis conjungatur, bene o-
 „ minatur. „

Art. 100. „ In Febribus, si ægri non possunt discernere colores, im-
 „ minent convulsiones. „

(Cautela de usu opii.) Art. 101. „ In omni Febre pulsu existente
 „ languido, inæquali, aut formicante, cane pejus & angue opiata
 „ vitentur.

DE FEBRIUM SYMPTOMATIS GRAVIORIBUS.

Inter legendum & ex observatione.

(Frigus.) Art. 102. Frigus in Februm initiis oritur ex immutata
 cordis contractione liquidis ad extrema fere stagnantibus; unde o-
 riuntur, si diu maneat, polypose in vasis majoribus concretiones, &
 interdum mors subitanea insequitur; ideoque quo majus in initio fri-
 gus, eo periculosior est Febris; in peste incipiente frigus est sum-
 mum. --- Optime curatur potu aquæ calidæ nitrosæ cum paucis vi-
 no, decoct. cocin. frictione blanda, &c. (45.)

(Calor.) Art. 103. Calor intensissimus in Febribus & velut incen-
 dium cum magno & forti pulsu fere semper venesectionem postulat;
 quandoque etiam clysm leniens calorem mitigat. Nimius sanguinis
 fervor & ebullitio, julapiis, emulsionibus & decoctis appropriatis at-
 temperandus est; sed apprime cavendum est, ne ex nimia attempe-
 ratione spiritus elasticitate sua plus justo orbentur, & inde Febris ar-
 dens inopinato in malignam mutetur. (Art. 67.)

(Lypiria.) Art. 104. Febris lypiria dicitur, quando interiora urun-
 tur, exteriora vero frigent; oritur ex inflammatione visceris interio-
 ris valde sensibilis; aliorum autem non est tactu medici judicandus,
 sed ægri judicio, qui se algere dicit, & tegi jubet; tepent enim mem-
 bra; hæc Febris brevi terminum absolvit, plerumque intra triduum
 vel quatrimum, & vix unusevadit, nisi statim ab initio occurritur.

(Sitis.) Art. 105. Ad sitim in Febribus extinguendam melius est
 frequentius & parcius bibere, quam una vice multum ingurgitare;
 sequens est potus gratissimus febricitantibus; 2℥. Aq. font. cum pane
 tost. in coct. ℥ij. vin. Rhenan. ℥ss. gelatin. C. C. ℥ij. syr. cydon. vel e succ.
 citr.

citr. parum misce. Convenit etiam decoct. ad sitim Fuller. vel decoct. coccin. ejusdem. Gargarismata quoque usui esse possunt, ut gargarisma commune Fulleri, decoctum rosarum pro gargarismate, &c. Frequens ablutio oris cum simplici aqua multum confert ad sitim fallendam. Sitis (ut recte monet Helmontius) non oritur a calore sed a defectu salivæ, hinc guttæ aliquot spir. sulphur. plus levant sitim, quam integra mensura aquæ frigidæ, in eundem finem etiam conducunt succi e vegetabilibus & fructibus, ut acetosæ, aurantiorum, limonum, citrorum, ribium, berberum, cydoniorum &c. Præ cæteris commendabiles sunt hi succi per spontaneam residentiam post sulphurationem secundum Helmontium depurati, & in loco frigido asservati; tamarindi quoque optime conveniunt sitim leniendo, & alvum blande laxando: hæc vero acida & refrigerantia non sunt omnibus Febricitantibus indiscriminim porrigenda, sed opus est maturo consilio: si enim præter sitim importunam adsit etiam summa debilitas, tum vinosa & spiritiosa tutius propinanda sunt.

(Jusculum avenaceum.) Art. 106. Ptisana ex hordeo omnibus aliis sorbitionibus præfertur ab Hippocrate in lib. de victus ratione in acutis; & crebrior est ejusdem mentio apud veteres medicos; sed recentiores hordeo vitio vertunt ejusdem cruditatem ac flatulentiam, & jusculum avenaceum substituunt.

(Siccitas linguæ & prunella.) Art. 107. Siccitas & asperitas linguæ corriguntur humectantibus & lenientibus. Febris cum prunella dicitur, quando lingua, crusta nunc albicante nunc nigricante obducta, colore nigricante puniceo apparet tincta; ipsa saliva infecta videtur esse maxima causa. In prunella præter mucilag. cydon. &c. conducit sequens gargarisma, ℥℥. Liqueur. e rapis coct. express. ℥℥. Succ. sedi major. depurat. ℥iij. mellis despumat. ℥i. sp. sal. armoniac. q. s. m. Sequens quoque mixtura commodissima est, Alb. ovi unius, fortiter agitetur cum aqua sperm. ranar. ℥iv. mel. ros. ℥j. m. Ad linguæ etiam ardorem & siccitatem quandoque in usu sunt sequentia, viz. Mucilago sequens ℥℥. Mucilag. cydon. ℥ij. pulv. tamarind. amygd. dulc. excort. ana ℥j. ol. sulph. per campan. gutt. xx. syr. de rub. Idæ q. s. misce decoct. ulmi bat. gargarisma commun. Fuller. lohoc. rub. vel lohoch. vitellin. ejusdem.

(Nausea & vomitus.) Art. 108. Nausea & vomitus in Febris, cum a crapula ortum ducant, leni vomitorio (v. g. liquore posset. cum foliis cardui benedict. incoct. copiose ingesto, addendo inter vomendum bis terve sal. vitriol. ℥℥. vel coch. oxymel. scillit.) tutissime curantur: ubi vero fermentum febrile ventriculum petit, & enormes vomitiones biliosas excitat, ut ægri vix quicquam vel medicamento vel alimenti retinere valeant, imprimis convenit jusculum tenuissimum pulli affatim ingerere, & postea remediis appropriatis tonum ventriculi laxatum firmare; sequens Julapium est valde efficax, ℥℥. Sal. absynth. ℥iv. succ. limon. recens express. ℥ij. misceantur & finita ebullitione add. aq. cinnam. bord. ℥iij. menth. Stephan. ana ℥j. sp. croc. ℥℥. ol. garyoph. g. vi. syr. cydon. ℥j. m. Interdum ad laudanum confugiendum est. Plura de vomitione sistenda videantur alibi (594.)

(Diarrhœa.) Art. 109. in Febris aliquando accidit Diarrhœa colliquativa magno ægrotantium damno, quæ evacuatio non naturæ vi, sed morbi potius impetu & acrimonia turgentis humoris naturam stimulantem fit, adeoque symptomatice est, & sisti debet; convenit decoctum album pro potu ordinario; recte exhibentur pulveres testacei absorbentes diaphoreticis admisti, & postremo ad diascordium, theriacam, &c. deven-

niendum est; enema sequens quandoque singularem præstat opem. 24. *Fol. ros. rub. m. ij. coq. in lact. chalyb. ℥ss. in colatura dissolv. diascord. ʒvj. m. f. enema diutissime retinendum.* Hic etiam plurimum facit, mihi que in frequenti usu fuit, *enema de malicorio Fulleri*. In genere observamus in Februum initiis alvum laxiorem quam adstrictiorem meliorem esse, in progressu vero morbi pejorem. Unicum hic notatu dignum observare liceat, nempe in diarrhœis colliquativis in declinatione Februum accidentibus, & diu, non obstantibus remediis quibuscunque adhibitis, perseverantibus, solam sorbitionem *jusculi pullini* prohibitis omni alio victu & potu quocunque diarrhœam brevi penitus tollere, & ægrum restituere, ut experientia me docuit.

(*Dysuria.*) Art. 110. Interdum Dysuria est symptoma molestissimum. *Emulsiones communes* effervescentiam humorum in Febribus ardentibus plurimum compeſcunt; & hoc vexatissimum symptoma plerumque sublevare solent, ut etiam *oleum amygd. dulc. cum syr. de alth.* Dysuria ex applicatione vesicatoriorum in Febribus *gum. Arab.* commode medetur, *solutum scilicet ad ʒij. in decoct. bord. ℥ij. pro potu communi.* Emplast. epispastic. Fulleri est omnium longe optimum & certissimum. Operæ pretium esset fortasse experiri vires *Camphoræ* intermiscendo ipsam in compositione epispasticorum, num stranguriam vel ardorem urinæ infecuturum præcavere potis esset.

(*Sudor.*) Art. 111. Sudor in Febribus, qui vel morbi initio vel quovis alio tempore ante diem criticum, nec adhuc visis coctionis signis profluit, est *symptomaticus*, & frequenter *colliquativus*, qui ægrum gravat, & morbum exasperat, ideoque si modum excedat, arte, si fieri possit, cohibendus est: prohibetur surgendo ex lecto; corpus a nimis integumentis liberando; aerem frigidiusculum admittendo; a calefacientibus abstinendo: *leniter astringentia & blanda acida* capiendo &c. egregiam vim in sudoribus sistendis habet *Saccharum Saturni*.

(*Dolor capitis, &c.*) Art. 112. Immanis capitis, lumborum vel artuum dolor in Febribus maxime in initio ut plurimum *Venassectionem* postulat; manente nihilominus cum vehementia dolore injiciendum *enema laxans*; fortassis levamen aliquale dolenti capiti conferre potest sequens *epithema 24. Sem. papaver. alb. parum contus. ʒss. placent. rosac. ʒj. vitel. ovi unius, acet. sambucin. q, f. misceantur super ignem, & f. epithema fronti admovendum, & sæpius renovandum.*

(*Vigilia.*) Art. 113. Vigiliæ pertinaces in Febribus succurrendæ sunt, ne dissipatis spiritibus vires frangantur. [Investiganda est causa vigiliarum;] si a fervore & siccitate proveniant; conveniunt refrigerantia & humectantia: si a dolore, propriis remediis leniendus est dolor; non nisi necessitate coacti ad *opiata* confugimus. Obiter monendus est medicus, *ne criticis vigiliis seu ab inquietudine critica suscitatis auxilium hypnoticis præbere sataget.*

(*Coma.*) Art. 114. Prædicto malo contrarius est *sopor nimius* in Febribus, seu *coma*, sive *assidua somnolentia*; quando sopor morbosus evadit, excutiendus est omni arte, ne calor natus opprimatur; injiciendi sunt *clysteres acres*; *epispastica* variis partibus admovenda sunt, & *cataplasma de balcibus* sive de *raphan.* Fulleri plantis pedum applicandum, interne conveniunt *salia volatilia, cephalica, &c.* (Art. 298.)

(*Delirium.*) Art. 115. Pervigilium frequentissime est causa delirii, non ideo delirium *hypnoticis* curari tentandum est; nam id esset temerarium, sed indaganda est causa, & remediis appropriatis

auxilium ferre conandum est. Camphora (inquit Quincy) delirio Februm somnum conciliat opio neutiquam proficiente. Delirii in Febris imminentis signum est, urinarum, quæ antea valde tinctæ erant & flammeæ, in tenues & aquosas mutatio.

(*Spasmi.*) Art. 116. Convulsiones quoque interdum superveniunt, tremores item & affectiones spasmodicæ; in tali rerum statu diligenter expiscanda est causa horum symptomatum, unde medicus intelligat, quibus remediis internis opem ferre valeat, interim plantis pedum applicari possunt *duo columbi pullive recens macerati & per medios secti*, vel toti pedes involvi possunt *calidis pulmonibus agnitis, vitulinis, vel vervecinis*; renovari debent hæ applicationes saltem ter in die.

DE FEBRIBUS ERUPTIVIS IN GENERE.

Inter legendum.

(*Februm eruptivarum Symptoma peculiare.*) Art. 117. Febres *Eruptivæ*, quorum *crises* per eruptiones cutaneas expectandæ sunt (quales sunt variolæ, morbilli, Febris scarlatina, Febris cum rubeolis, crystallis, Febris miliaris, &c.) præter symptomata aliis Febris communia hoc habent peculiare & sibi proprium, nempe, *ingentem pectoris oppressionem*, quæ harum februm est signum fere *pathognomonicum*; nimirum est quidam validus naturæ conatus materiam morbificam a centro ad circumferentiam propellendi; unde certamina gravissima, anxietas præcordiorum, pectoris angustia & oppressiones maximæ: facta autem eruptione, statim hæc dira symptomata evanescent. Ejusmodi *pectoris oppressio* in aliis quoque febris est *crisum præcursor* (unde dictum illud, nox ante crisin est molestissima) in his tamen ferius accidit, scilicet sub morbi finem; in eruptivis vero non procul ab initio, imo frequenter propemodum in primo insultu; quoniam *efflorescentia* in propinquo est.

(*Symptomata quædam insigniora & fere propria.*) Art. 118. „ Præter symptomata aliis febris communia (inquit Mortonus) in febris eruptivis adsunt signa quædam quasi *pathognomonica*, talia sunt pulsus debilis, & celer; respiratio cita & anhelosa, hypochondriorum oppressio & angustia, urina pallida ac tenuis, coma, seu vigiliæ pertinaces, subsultus tendinum, nonnunquam spasmi manifesti, & deliria prorsus efferata, gravativa palpebrarum debilitas, oculorum rubedo, punctura dolorifica, & lacrymæ involuntariæ, in gutture dolor ulcerosus, raucedo clangosa, tussis perpetuo molesta. „ De febre miliari & petechiali alibi. “

Art. 119. In erysipellate, variolis, morbillis, febre scarlatina, &c. (inquit D. Freind. Hist. Med. p. 75.) si symptomata vehementiora fuerint, si caput aut pulmones vehementius urgeant, aliæve partes ingenti dolore supra modum afficiantur; ratio postulat, ut vena incidatur, ac tuto fieri licet. Et teste experientia (nihil enim frequentius expertus sum) audacter affirmo me nunquam observare potuisse eruptiones istiusmodi ex venæsectione retroire.

FEBRIS SCARLATINA.

Sydenhami Sententia.

(*Febris scarlatina.*) Art. 120. *Febris scarlatina* quovis anni tempore, sed ut plurimum sub autumnum, se prodit, infantes præ cæteris infestans; rigent horrentque in initio, ut in aliis Febribus, neque vehementer ægrotant; postea cutis universa maculis parvis rubris interstinguitur, latioribus magisque rubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt in morbillis: ad duos tresve dies perdurat rubedo, & deinde evanescit, cutem relinquens aliquanto asperam & fursuraceam.

(*Curatio.*) Art. 121. Quoad curam naturæ prorsus relinquenda est, vel, si medicatione opus sit, cum morbillis satis convenit.

(*Efflorescentiæ modus.*) Art. 122. „ *Febris scarlatina* (inquit Mor-
„ *tonus*) a morbillis minime distat, nisi *efflorescentiæ* modo; *morbilli*
„ *confluentes* dici potest. Idem postulat regimen, eandemque medendi
„ *methodum*. *Efflorescentia* in morbillorum interstitiis figuram diver-
„ *sam* viz. oblongam, quadratam, vel multangulam obtinet, unde
„ *cutis* variegata est: in Febre autem *scarlatina* una continuata inflam-
„ *matione* & rubedine cuticula perfunditur. „

M O R B I L L I.

Sydenhami Sententia.

(*Historia morbillorum accurata.*) Art. 123. In morbillorum apparatu primo die calor & frigus se mutuo expellunt, die secundo Febris sensibilis adoritur vehementi ægritudine, siti, inappetentia, lingua alba (non vero sicca) tussicula, capitis atque oculorum gravedine, & somnolentia perpetua stipata, plerumque etiam a naribus & oculis stillat humor (*signum certissimum morbillorum ingruentium*) insuper maculæ latæ & rubræ in facie & pectore conspiciuntur; sternutat æger, intumescunt palpebræ (viz. paulo ante eruptionem) vomit, sæpius tamen laborat diarrhœa cum dejectionibus subviridis coloris. Ingravescunt symptomata ad quartum usque diem, vel aliquando ad quintum, quo tempore maculæ pulicum morsibus similes prodeunt, quæ tam numero quam magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris variæ figuræ interstinguunt, quæ quidem maculæ a parvulis quibusdam papulis rubris haud longe ab invicem distitis super cutis superficiem paululum elevatis conflantur, digitorum levi tactu deprehenduntur, oculis remotis fugiunt; a facie sensim ad pectus, ventrem, crura, &c. se diffundunt. Die sexto aut circiter asperescit facies emorientibus pustulis; octavo in facie penitus evanescunt, nono vix ullibi inveniuntur; tunc temporis augetur Febris, & spirandi difficultas, urget tussis, &c. *Morbilli omni vacant periculo, si modo perite tractentur.*

(*Curatio.*) Art. 124. „ *Morbilli* ab *Avicenna variolæ cholericæ* appellati cum ipsis variolis coævi sunt, (Art. 130.) & quoad curam his cum illis satis convenit; „ *Diacodium* quotidie vesperi exhibendum est: *linctus* quoque & *apozemata pectoralia* propinari possunt ad tussim leniendam. Sin vero ex calidiore regimine, vel aliter, Febris, dyspnœa, aliave accidentia post morbillorum decessum supersint, *venesectione* sola curantur, quæ sine metu in tenellis audacter celebranda est.

est. In regimine intenso calido exanthemata allquando livescunt, & nigrescunt, in adultis phlebotomia & temperatiore regimine sublevantur aut pereunt; in peripneumoniam incidunt.

Art. 125. „ Morbilli nonnunquam (inquit Sylvius, & omnes hoc sci-
 „ mus) per aliquot dies distingui non possunt a variolis, *ne quidem*
 „ *a medicis peritissimis*, atque diu in praxi versatis: longe proinde sa-
 „ tius est in re dubia medicum vel suspendere suum iudicium, vel
 „ dubie duntaxat respondere. „

. *Mortoni Sententia.*

(*Curatio in singulis stadiis.*) Art. 126. Quoad curam morbillorum, in primo stadio, scilicet, ante efflorescentiam paucissima remedia sunt adhibenda, nisi gravissima symptomata superveniant, uti spasmi, enormes humorum colliquationes, &c.

(*Spasmi.*) Si spiritus nimis irritentur, & in spasmos rapiantur, remediis appropriatis compescendi sunt, nempe *julapis ex aquis cephalicis cum tinctura castor.*, *pulvere ad Guttetam*, &c. Et si nifus spirituum inde non minuatur, guttæ aliquot *laudani liquidi* propinari debent.

(*Alvi fluxus.*) Ad diarrhœam quod attinet, satius est palliativa curatione ejusdem molestiam, quoties insolito more sæviet, minuere, quam contra naturæ legem eam penitus tollere, atque ita ægrotantem occidere: abstineat æger a cervisia, bibatque decoctum album, & exhibeantur pulveres testacei, non nisi extrema necessitate ad *laudanum* perveniendum est.

(*Tussis.*) Ad tussim ferinam ab acri lymphâ ortam quadantenus cohibendam conveniunt *mucilaginosâ*, *pectoralia*, *oleum amygdalarum dulcium*, &c. (*privatim Syrap. e coral. & tinctura ejusdem.*) „ In
 „ tussi morbillorum pathognomonica, sæpe permolesta, & convulsiva,
 „ & nonnumquam lethali nullum remedium præstantius novi (inquit
 „ *Harris*) quam *gummi tragacanthum* copiosius sumptum in linctu vel
 „ decocto pectorali solutum, & pulveribus testaceis mixtum. Id enim
 „ gummi catarrhum maxime lenire solet, tussimque inde prognatam,
 „ symptoma morbillorum primarium, sistere aut levare aptum na-
 „ tum est longe melius tutiusque narcoticis, quantumcumque hæc lau-
 „ dantur a clarissimo Sydenhamo, &c. „

(*Peripneumonia.*) Art. 127. Efflorescentia jam incepta, imo eruptione plena existente quandoque suboritur *peripneumonia* cum respiratione anhelosa, strangulatione suffocativa, deglutitione læsa, &c. quo in casu, multo usu fretus omnibus auctor sum, ut sanguis copiosius educatur, æque ac si æger morbilloso affectu correptus non fuisset.

(*Ophthalmia.*) Idem in *ophthalmia* molesta ac periculosa faciendum moneo. Ad *alvi fluxum* in hoc stadio compescendum non minus tutus quam necessarius est opiatorum usus.

(*Ultimum stadium.*) Efflorescentia peracta, si febris venenatis symptomatis adjuncta remaneat, actum est de ægro. Contra, si crisis fuit perfecta, cathartica hydragoga ad lymphæ colliquatæ affectus exitiales impediendos: non tamen præpropere massa sanguinis agitur, antequam venenum fuerit omnino subactum.

(*Tussis ferina, superstes.*) Quoties æger post morbillos *tussi ferina*, & *perpetua* vexetur; primo in loco *venæsectio* celebretur, & , si opus fuerit, post unum vel alterum diem iteretur, & una cum *linctibus* & *medicamentis lenientibus* (quemadmodum in catarrho exhibere sole-
 mus

mus) *cortex Peruvianus* copiose exhibeatur, & *opiatum* hora decubitus pro re nata.

(V. S.) Art. 128. „ Ad præcavenda dira symptomata in hoc affe-
 „ tu evenientia, ab autore nostro enumerata, *phlebotomia* mature,
 „ in morbi initio, celebrata, & vomitorium exhibitum feliciter ple-
 „ rumque succedunt. (*vid.* Art. 119.)

Art. 129. „ Qui Variolis laborarunt, non sunt adeo morbillis post-
 „ ea obnoxii, quare ætate grandiores non ita promptè inficiuntur. „

V A R I O L Æ.

Art. 130. „ Nihil de Variolis ante *medicos Arabes* scriptum in-
 „ venit. Hic vero morbus antiquior est, quam vulgo creditur. Au-
 „ thores isti existentiam ejus usque ab initio septimi seculi tempo-
 „ ribus *Mubammedis* investigarunt. (*Vid.* *Freind.* *hist. med.* p. 188.
 „ vol. 2.) Variolæ ita appellantur, quasi parvi vari, quod cutem
 „ varient. Homini omni, soli & semel conveniet Variolis & morbil-
 „ lis affici: „

„ (*Chickeni Pox*;) In hoc autem censu non supputandæ sunt pu-
 „ stulæ variolosis similes, quas vulgo vocant *the Chickeni Pox*; pueris
 „ familiares sunt; Variolis veris quidem similes sunt, quoad magnitu-
 „ dinem & figuram; sed in eo ab iis distinguuntur, quod Variolæ
 „ cum rubore & inflammatione insigniori appareant, hæ vero albi-
 „ diores sunt, & veluti vesiculæ seroso humore repletæ, quæ intra
 „ triduum disrumpuntur, & exsiccantur, nullumque asserre solent pe-
 „ riculum, & plerumque sine Febre erumpunt. *Morbus est adeo beni-*
 „ *gnus, ut nunquam sub curam Medicam cadat.* Variolæ (inquit *Dolæus*)
 „ quoad ortum suum seminarium habent nobiscum connatum, quod ali-
 „ quandiu sepultum jacet, donec nata emergendi occasione, ex lati-
 „ bulo erumpat, & massæ sanguineæ commixtum symptomata terribilia,
 „ & sæpe mortem perducit: inter multas hominum myriadas vix unus
 „ & alter per totam vitam ab his immunis manet. Ex cadaverum sectio-
 „ nibus patet viscera universa in corporis cavitatibus contenta pustu-
 „ lis variolosis confertim affici, æque ac cutis externa. „

Sydenhami sententia.

(*Variolarum discretarum historia.*) Art. 131. Variolæ sunt *distinctæ*
 vel *confluentes*: *Distinctæ* seu *discretæ* cum rigore ac horrore invadunt;
 sequitur calor intensus capitis & dorsi, dolor vehemens, vomituri-
 tio, dolor circa scrobiculum cordis, somnolentia, in infantibus
 præsertim; quandoque etiam paroxysmi epileptici, qui Variolas mox
 prorupturas, easque futuras esse mites ac benigniores plerumque præsa-
 giunt; quarto ut plurimum die ab invasione erumpunt, & symptomata
 febrilia evanescent, nisi quod adulti in sudores sint propensi. In fa-
 cie primo conspiciuntur pustulæ subrubræ, deinde collo, pectore, &
 universo corpore, quæ magis magisque inflammantur, & subalbidæ
 fiunt, cute in interstitiis satis floridum colorem exhibente; die un-
 decimo faciei tumor ac inflammatio recedunt, & pustulæ exarescere
 incipiunt; in hac Variolarum specie (si quando) die 14. vel 15. pe-
 reunt.

(*Confluentium historia.*) Art. 132. Confluentes cum discretis sympto-
 mata communia habent, nisi quod hic atrociora sint omnia; tertio die
 erum-

erumpit hæc species, aliquando citius, raro serius; interdum vero, licet oppido raro, ob gravius aliquod symptoma, lumbaginem doloremve lateris, &c. serius erumpunt, neque periculo vacant. Febris etiamnum durat, crescente morbo pustulæ non in spectabilem molem attolluntur, ut in discretis, sed sibi invicem implicatæ vultum omnem contegunt, & illum in tumorem elevant, dein ad instar pelliculæ albæ in cutis superficie conspiciuntur. Præterlapso die octavo pellicula alba quotidie exasperatur, & ad colorem fuscum vergit, eoque magis Variolæ confluerunt. *Magnitudo morbi a facie maxime æstimanda est, potius quam reliquo corpore.* In hoc genere adest in adultis salivatio, in infantibus diarrhœa; salivatio nonnunquam sub primum eruptionis tempus se prodit, interdum post diem unum vel alterum; die fere undecimo saliva viscidior facta difficulter excreatur, ægro suffocationem tentans, & circa id temporis ut plurimum cessat, & tumor faciei paulatim subsidet, & tunc ejus loco manus intumescere solent, aut debent; diarrhœa non ita mature infantes invadit; sub vesperam exacerbatur morbus. Variolis discretis laborantes octavo, confluentibus vero undecimo die maxime intereunt. Interdum accidit pleuritis, interdum coma, interdum maculæ purpureæ (*totidem quasi sphaçeli*) pustulis interspersæ, (mortis fere semper prænuntiæ,) quandoque mictus sanguineus, & aliæ Hæmorrhagiæ, quæ idem ominantur, nonnunquam urinæ suppressio.

Art. 133. In confluentium genere (ut dixi) maxime periclitatur (a primo insultu computatione facta) die undecimo viz. in maxime vulgari confluentium genere, in crudiori adhuc 14., in crudissimo 17., rarissime 21. Ego Variolosum ab usu lectuli interdum semper arceo usque ad sextum diem a prima morbi invasione, quartum ab eruptione, quo tempore omne pustularum agmen in conspectu est: posthac eundem lectulo committo usque ad morbi finem.

(*Curatio.*) Art. 134. „ In confluentibus (ut recte inquit Dolæus) periculosæ plena res est aleæ, & medicus occasionem habet suas tentandi vires, & ostendendi, quid in arte medica calleat. „ Indicationes curativæ duæ sunt, nempe, 1. ut æquabilis tenor ebullitionis conservetur; 2. ut pustulæ debito modo sustineantur, regimen calidum vitandum est; *gradus caloris earum expulsionem accommodatissimus naturalis omnino est*; non opus est, ut æger ante diem quartum (133.) lectulo addicatur; neque ut ad propellendas Variolas ullum remedium sumat; quarto vero die, si eruptio ex votis haud succedat, exhiberi licet cardiacum aliquod blandius. Discretum genus ex sua natura plerumque omni vacat periculo. In confluentibus æger, a sudore, quantum fieri potest, prohibendus est, & ptyalismus in vigore conservandus; promovetur autem affatim bibendo cerevisiam tenuem vel liquorem alium non nimis calefacientem. Adultis propinare soleo *paregorium cum laudan. liquid. gut. xiv. vel syr. de mecon. ʒj.* hora sexta vel optima vespertina singulis noctibus post plenam eruptionem ad morbi ultimum finem; temporarius autem *hypnoticum* quam pro recepto more præscribo, quoniam exacerbatio caloris quotidie sub vesperam fere reperitur, ex quo non modo incommodi nihil, sed magnum emolumentum, quod frequentius experientia didici. *In hoc genere diarrhœa in infantibus salutaris, & non temere sistenda, contra in discretis.*

(*Nota bene.*) De venæsectione die octavo, & de auræ liberaliori exponendo, si quis velit, authorem consulat, pag. 153. &c. Cum saliva modum viscida evadat, uti soleo gargarismate sequente; ʒ℥. Cort.

ulmi ℥vi. *rad. glycyrrhiz.* ℥℥. *passular. enucleat.* ℞. xx. *ros. rub.* p. ij. *coq. in q. s. ad font. ad* ℥℥. *colatura dissolv. oxymel. simpl. mel. ros. ana* ℥ij. *m. f. gargarisma.* Interdum emeticum propinandum est. In *urinae suppressione* æger e lecto debet eximi. Pustularum depressio & diarrhœa in Variolis discretis medicamenta *cardiaca* postulant. Febris illa, quæ die undecimo, &c. adortur, diversa est ab ista, quæ eruptionem præcedit, nihil enim est aliud, quam *Febris putrida proprie dicta hac Febris secundaria*; ad hanc autem fugandam nihil efficacius præstat, quam copiosa sanguinis educio: non enim tunc cum Variolis res est, sed *Febre putrida*; mittendus est itaque sanguis ad ℥x. vel xij. & *anodynum* bis in die propinandum; ob immensam alvi constipationem præscribere soleo *elect. lenitiv.* ℥i℥. in aqua lactis solut. Nihilominus *anodynum* statim tempore continuandum est; si prima vice votis non respondeat, iteretur die proximo: atque hac ratione tam *venæsectio* quam *catharsis* per intervalla repeti possunt, prout Febris moriæ atque ægri inquietudo postulare videantur, donec tandem res in vado sit. Sched. mon. p. 81. &c. In Variolis confluentibus magna est virtus *spiritus vitrioli* a 5. vel 6. morbi die usque ad finem copiose in cerevisia ten. exhibiti; commoda & incommoda hujus remedii, p. 526 &c. ubertim recensentur.

(*Variolæ anomalæ discretæ.*) Art. 135. Variolæ anomalæ; *Discretæ* hæ a legitimis discriminabantur, quod erumpebant die 3. illæ 4., pustulæ minores fuerant; sæviebant tamen magis, & ante maturationem frequentius nigrescebant, ptyalismus (ut in confluentibus) aderat immediate post eruptionem.

(*Confluentes.*) *Confluentes* hæ ab aliis discrepabant, quod nunc dissecundo, nunc tertio se primum monstrabant tumore subrubro atque uniformi, quibusdam in locis; in femoribus præcipue, vesiculæ, ambustorum ad instar sero limbo distentæ eminebant, quod disrupta pellicula copiose effluebat, subjecta carni nigredine & *sphacelo* quæ affecta; periculo non vacant ante diem septimum, in aliis confluentibus dies undecimus (ut plurimum) est criticus. Postremo hæ calidioris naturæ sunt & magis inflammatoriæ; ideoque temperato regimine indulgendum est. *Hydrogala* ex tertia parte aquæ & lactis una simul coctis ægri palato & votis ut plurimum respondet, & ptyalismum feliciter promovet.

Mortoni sententia.

(*Quatuor stadia Variolarum.*) Art. 136. Variolarum quatuor sunt stadia, viz. apparatus, eruptio, maturatio, & declinatio, in quibus varia occurrunt symptomata, quæ diversam medendi methodum postulant.

(*Primum.*) Primum stadium est a morbi ipsius insultu usque ad eruptionem generalem. In hoc stadio urina tenuis & pallida, præsertim si adsit frequens micturitio, male ominatur; urina rubicunda & contentis saturata contrarium indicat (insolitus aliqualis dolor vehementer præsertim colicum æmulans, est pessimum signum.)

(*Diarrhœa.*) Diarrhœa in hoc stadio non permittenda est, quæ decocto albo & repetitis *laudani* dosibus est cohibenda, vel astringentibus sistenda.

(*Vomitio.*) Vomitio in hoc stadio non statim supprimenda est, sed potius (nisi valde enormis fuerit) cum repetitis haussibus liquoris potestici

etici carduati, vel cum pauco sale vitrioli leniter promovenda est :
 Evacuazione autem hac levi peracta, vel si vomitio ex morbi ipsius
 lenio modum excedat, illico tumultum spirituum compescere oportet,
 orumque vires conservare alexipharmaco aliquo remedio cum opiato
 commixto, & post iusta intervalla repetito; sequens est formula mihi
 familiaris, ʒ℥. Aq. card. lact. alexiter. cinnam. bord. menth. stephan.
 na ʒij. sal. absynth. gr. xii. pulv. rad. serpent. virgin. e chel. cancr.
 omp. lapid. contrayerv. ana ʒ℥. syr. caryoph. vel menth. ʒi℥. m. f.
 ilap. de quo capiat ægrotus coch. ij. iiij. vel iv. quarta quaque hora,
 addendo singulis dosibus laudan. liquid. guttas aliquot pro re nata. „

Sanguis (inquit Lister) in Variolis non proprie mittitur, sed ex
 accidente tantum ut symptomati alicui vehementiori succurratur. „
 (Dolores spasmodici.) In dolore capitis, artuum vel lumborum,
 rem in dolore pleuritico, seu peripneumonico, ut etiam quandoque
 or colico necessaria est venæsectio, ut symptomata ista averruncantur;
 vesicatoria etiam & opiate hic locum habent; præcipue autem in af-
 fectibus comatosis.

(Vigilie.) Ubi vigiliæ in hoc stadio pertinaces fuerint, non raro
 proximo stadio exanthemata confluent, quorum eruptioni de-
 ria, spasmi, cæteraque funesta symptomata superveniunt, quo no-
 mine hoc symptoma venæsectione & opiat, ut spirituum vires inde-
 minuantur, opportune cohibere par est, adhibitis interea vesicatoriis
 alexipharmacis. „ Insolitus aliqualis dolor vehemens ante eruptio-
 nem Variolarum, privatim dolor colicam passionem æmulans, est pes-
 simum signum, & fere semper lethale, ut plus semel observavi,
 præsertim si adfuerit etiam micturitie. „

(Stadium secundum.) Art. 138. in stadio secundo exanthemata par-
 ta instar acupuncturarum primo in facie, collo, pectore, &c. erumpunt
 amore renitente & rotundo; die secundo bases suas ampliant, & tertio
 ultra quem hoc stadium non excurrit) in summitatibus acuminantur;
 non longius est hoc stadium, hoc periculosior est eventus; in hoc sta-
 dio in benigniori saltem genere, ubi nullum adest funestum symptoma,
 aud par est ullo remedio naturam laceßere, utpote quæ propriis vi-
 bus instructa sine artis suppetiis satis valide suo officio fungi potis est.

(Stadium tertium.) Art. 139. Triduo eruptionis elapso Variolæ, sicut
 ia quævis tubercula inflammata, concoqui incipiunt, & lymphæ ve-
 nena per glandulas cutaneas naturæ lege collata acrimonia sua cuti-
 culam a vera cute separat; unde apices exanthematum, paucarum ho-
 rum spatium, primum albescentes quadantenus intumescunt; dein lym-
 pha eadem pro morbi indole & naturæ viribus citius vel serius in pus-
 putata flavescent, aut saltem colorem cinericium vel subfuscum ob-
 tinent, ubi desinit hoc stadium. Durante maturatione variolarum be-
 gnarum nulla exsurgit indicatio, nisi forsan adhiberi possunt laudani
 quidi guttæ aliquot ad dolorem leniendum. Inter maturandas vario-
 les, si tarde procedant, ʒ℥. Lentium crasse contus. ʒj. ficuum ping. par.
 ras. C. C. ʒ℥. coq. in liquore posset. ʒij. bibatur copiose ad libitum,
 si adsit ptyalismus commode usurpatur gargarisma sequens, ʒ℥. Len-
 tum crasse contus. ʒj. rad. alth. ʒ℥. ficuum ping. par. vj. vel viij. bord.
 undat. p. j. glycyrrhiz. ras. ʒij. coq. in q. s. aq. font. ad ʒij. colatur.
 l. mel. ros. ʒi℥. m. vel gargarism. Variolos. Fuller. Vitentur acida
 gargarismatis, nisi in maxima deglutiendi difficultate, deficiente sa-
 vatione, promoveatur urinæ profluvium exhibendo dosin unam vel
 teram pulveris Æthiopici.

(*Stadium ultimum.*) Art. 140. Stadium ultimum variolarum est eorum declinatio, in quo exanthemata pure maturo & laudabili referta primum incrustari, & scabie subflava obduci incipiunt; dein post unum vel alterum diem pure concrefcente exsiccantur, & in arida tubercula ubique mutantur, quæ sensim emollita sponte evanescunt. Raro quispiam hoc morbo interimitur, nisi in declinationis stadio, scilicet in variolis benignis; de his etenim ut plurimum hætenus locuti sumus. Declinatio cum ἀνυπεξίς, & appetitu restituto optime significat. Petechiæ seu vesiculæ miliares in hoc stadio erumpentes funestum eventum denuntiant; deliria, vigiliæ, subsultus tendinum, &c. in hoc stadio pejus ominantur, quam in præcedentibus, paucissimi enim vel nulli hoc modo affecti convalescunt; scabies diu pure scatens, atque inde sæpe decidens, & renascens, meliorem fortitur eventum, quam ea, quæ de repente exarescit; Variolæ, quæ scabie fessili & adhærenti obducuntur, male præfagiunt.

(*Variolæ benignæ.*) Art. 141. Ubi variolæ fuerint figuræ exactissime rotundæ, discretæ, & margine admodum rubro circumcinctæ, neque petechiis, eruptionibus miliaribus, vel quavis alia nota exitiali, inter punctæ, & primo maturationis die in summitate albæ, tumore turgidæ, & die secundo circa basin auctæ, & in summitate acuminatæ, minuspellucidæ, & tertio materia in pus convertatur, eventus felix duodecimo saltem morbi die infecuturus expectandus est.

(*Variolarum malignarum quatuor gradus.*) Art. 142. Quatuor sunt variolarum malignarum gradus, viz. confluentes universaliter, confluentes particulariter, discretæ verum admodum parvæ & cohærentes, maxime confertim ubique erumpentes, & denique discretæ cum petechiis & eruptione miliari conjunctis.

(*Gradus primus.*) Primi gradus sunt, quando cutis universa erysipelatoso tumore (maculis nigris hic illic interspersis) cum æquali superficie quadantenus crassescit; post triduum cutis albescit, & pergamenæ speciem inducit; atque hæ sunt Variolæ maxime exitiales; ægrus ultra secundum maturationis diem nunquam superstitem novi.

(*Secundus.*) Variolæ secundi gradus magis vulgares sunt, quando cutis faciei sola erysipelatosa est, & primo maturationis die pergamenæ speciem refert, dum in artubus & trunco corporis exanthemata fuerint fere discreta, non tamen regularia; vix enim oculo distinguuntur ab efflorescentia morbillosa; vix apices tollunt, sed sæpe livescunt, unde mortem instare certo præfagire licet.

(*Tertius.*) Variolæ malignæ tertii gradus, ubi quasi discretæ verum admodum parvæ & cohærentes, quæ non acuminantur, sed cute solummodo conspiciuntur, ac si ab urticæ plaga exasperatæ, donec sub initium maturationis albescerent confluant, & speciem pergamenæ exhibeant. Rarius quenkum hac specie affectum, nisi ope Ptyalismus diutius protracti, ingentis urinæ profluvii, vel intumescentiæ artuum diuturnæ, ad decimum quartum vel decimum quintum morbi diem superstitem novi.

(*Gradus ultimus.*) Art. 143. Gradus ultimus est, quando variolæ erumpunt quidem discretæ figura & magnitudine regulares, verum vesiculis aqueis, vulgo the *Whith-bives*, petechiis, vel maculis lividis in interstitiis, præsertim in collo, pectore, & artubus distinctæ; atque hæ non minus sunt exitiales quam confluentes.

(*Curatio symptomatum.*) Art. 144. In variolis malignis Febris continua mali moris post eruptionem remanet cum lingua arida, pulsu debili,

bili, &c. Neque prorsus exulat, ut in benignis solet: materia enim mor-
bosa, vel propter malignitatem, vel morbi magnitudinem, per glandulas
cutaneas satis protrudi nequit, unde dira symptomata evenire solent;
nimirum hæmorrhagiæ admodum periculosæ, quæ (ut plurimum.)
maculis purpureis & nigris eodem tempore in conspectu venienti-
bus) funestissimæ sunt, & vix aut ne vix arte cohibendæ, nisi forsam
Vitrioli fræno præpotenti (aq. styptic. reg.) obsignari possint; *nihil*
tamen profecimus, si non una possimus vesicatoriis & alexiteriis genero-
sis vires spirituum pene extinctorum lenius resuscitare; venæsectio
mortem accelerat.

(*Micturitio.*) Micturitio licet non adeo formidabilis, pessime ta-
men ominatur: in hoc symptomate sublevando *cineres bufonum* egre-
gias obtinent vires (ut mihi usu compertum est) dos. ʒi. cum aliis
alexiteriis quarta vel sexta quaque hora.

(*Dolor gutturis.*) Dolor gutturis & deglutitio impedita est sympto-
ma quandoque maxime affligens & molestum; fauces itaque externæ
ab aeris injuriis pannis laneis mollibus duplicatis muniri debent, quæ
plus valent, quam croceata, vel alia quæcunque amuleta; & usurpentur
gargarismata appropriata, &c.

(*Salivatio.*) Salivatio copiosa, & diu protensa cum insigni capi-
tis & faciei intumescencia bene significat; ptyalismus vero brevis &
sæpe repente suppressus, nisi profluvio urinæ, aut intumescencia extre-
mitatum excipiatur, malum omen exhibet; salivatio diarrhœa excepta
pessime significat.

(*Post Variolarum declinationem inappetentia & calor hecticus.*) Art.
145. Morbosi quidam affectus quandoque post Variolas suboriri solent,
inter quos inappetentia primum locum vendicat, quæ frequenter cum
calore hectico conjuncta est, quo in casu ego multo usu doctus *alexi-*
pharmaca (quod cæteros professores serio moneo) ubi calor fuerit
continuus, jugiter ministranda duco; *corticem autem Peruvianum*, ubi
calor statis periodis recurrit, cum felici successu exhibendum impero;
& deinde postea ad alvum subducendam tuto progredior.

(*Parotides, & furunculi &c.*) Parotides nonnunquam sub finem
Variolarum suboriuntur, quæ diu tanquam strumæ sine calore vel ru-
dore permanent; *discutientibus* non sunt tentandæ, sed potius *fortibus*
maturarationem promoventibus tractandæ sunt. Eadem via proceden-
dum est in furunculis, scabie saniosa, ulceribus mali moris, impeti-
gine furfuracea, &c. viz. *alexipharmacis & febrifugis* ab evacuationibus
religiose abstinendo.

(*Gangræna & caries.*) Gangræna & caries ossium post Variolas
nullo medicamento cedunt.

(*Tumores œdematosi.*) Tumores œdematosi *frictionibus, fortibus lixi-*
gialibus, & more hydropicorum curandi sunt. De dolore capitis post
Variolas (*Vide Art. 279.*)

Freindii sententia.

(*Purgationis usus in febre secundaria.*) Art. 146. Sunt nonnullæ
febres, quæ *purgantia* comode recipiunt, sunt etiam quæ omnino desi-
derant (sed de hac re nondum satis accuratæ ab auctoribus tradun-
tur regulæ) ex quibus nullam aliam æque *purgationi* opportunam re-
fero, ac eam, quæ Variolas confluentes, maturitate pustularum aut
igente aut jam inclinata, semper excipit; ea quippe Febris uti
omnium maxime putrida est, & periculi plena, ita præ cæteris cura-
tionem hanc aptius recipit. Atque hanc præ aliis medendi rationem

in putridis hisce Febribus, quæ Variolis superveniunt, suadet Sydenhamus. Mihi quidem sæpius usu venit, ut in Variolarum statu, ubi pustulis exarescentibus Febris nihilo fecius invaluerit, ad *purgantia* confugerem, quæ ita periculo vacare, ita commode adhiberi posse expertus sum, ut multorum vitas ab hac maxime medendi via conservatas esse haud absurde dixerim. „ Doctrina de usu *phlebotomiæ* & „ *catharsis* in Variolis confluentibus post imperfectam crisin in literis „ a peritissimo D. Cade ad eundem datis succincte admodum continetur; en ejusdem summarium. „

(*Quando neque venæsectio neque catharsis conveniunt.*) Art. 147. In Variolis confluentibus, quamdiu faciei tumor & inflammatio manet, & saliva recte fluit, a *venæsectione* & *catharsi* (pari ratione ac furunculo maturante) prorsus abstinendum esse duco. Scilicet, ne istæ evacuationes, materiæ morbidæ a massa sanguinea separationem, & per pustulas, tanquam per tot phlegmonas (cui unico hoc tempore natura incumbit) ejectionem obturbarent. Insuper, procedente morbo; eo tempore, quo facies detumescere, & ptyalismus decrescere incipit (quod die nono vel decimo ab eruptione accidit) si his, inquam, diebus manus debito modo tumeant, & nulla malæ notæ appareant symptomata, haud omnino (me Judice) vel *phlebotomia* vel *catharsi* adhuc indicatur; sed totum negotium recte committitur naturæ. Interim tamen in hoc morbi statu *enema* quotidie injiciendum præscribo, quo alvum facibus exonerare, & Febris furorem coercere curo.

(*Quando utraque evacuationes sunt necessariae.*) Art. 148. Attamen facie diebus prædictis criticis detumescente, quoties (quod nimis frequente evenit) pustulæ corporis non turgent maturo pure, nec manus intumescunt, unde (nempe a materia morbida in sanguinis massa remanente eamque inquinante) ardens Febris nascitur; respiratio brevis & frequens oritur, corporis jactatio, & obstinata (narcoticis incassum exhibitis) vigiliæ urgent; quoties equidem diris his symptomatibus vexatus æger, medico incumbit per *venæsectionem* & *medicamenta leniter purgantia*, sæpiusque debitis intervallis repetita, humorem peccantem detrahere, & eo, quo possit, modo, laboranti subvenire. In Variolis denique confluentibus, licet facies & manus & pustulæ corporis debito modo, ac tempore, intumuerit, & saliva satis copiose statuto tempore fluxerit; si tamen, Ptyalismo desinente & dictis partibus jam subidentibus, Febris utcumque (quod in hac morbi specie ut plurimum accidit) gravior assidue inhæreat, & symptomata, ex hac nata (utpote anhelosa respiratio, vigiliæ, anxietates, cum pallida & diluta urina indefinenter urgeant ægotantem; rebus sic stantibus, necesse habet medicus sanguinis quantitatem *venæsectione* minuere, (nimirum ut exinde pars reliqua magis placide per vasa fluat) & materiam morbidam (quæ per pustulas, jam induratas & crusta obductas amplius transire nequit) *Catharsi* sæpius repetita evacuare: his enim evacuationibus omissis semper evenit, ut vel memorata symptomata in dies augeantur, inter diem duodecimum & vicesimum quartum lethalia evadant; vel humor putridus in pulmonibus extravasetur, eorumque vesiculas corrumpat; unde ægrotus miseram vitam paulisper trahit, & brevi moritur tabidus.

(*In anhelosa respiratione phlebotomiæ est unicum remedium.*) Art. 149. Anhelosa respirationi, crisi superveniente, *phlebotomia* feliciter ac urce occurrit; quæ nisi confestim peragitur, actum erit de ægroto, & que hoc in casu pulsus humilis & angustus me terret; quippe sæpi

observavi vacuato sanguine arteriam fortius vibrasse: unde constat pulsus obscuritatem non infirmitati virium, sed humoris lædenti oneri, deberi.

(*In mictu cruento est nociva.*) Venæsectio tamen mictum cruentum non modo non cohibet, sed auget, & mortem in procinctu stantem accersit; hoc tamen funestum fati impendentis prænuntium (Camphora bis in die exhibita & acidis larga manu propinatis) amovi, ægroque brevi morituro ad tempus succurri: sed ut vera fatear, ne unum quidem Variolis affectum, cui urina cruenta fluxerit, diem decimum sextum ab eruptione supervixisse notavi. De rationibus, quibus innititur hæc praxis, videatur auctor. „ Atque ita *purgationis* methodum in Febre secundaria tanquam unicam salutarem venditat D. Freind, & alii apud illum nonnulli magni nominis medici: Ego vero, qui sum tardioris ingenii, rurique dego, de hac re aliquanto dubius adhuc hæreo. Hi viri, ingentia certe artis nostræ lumina seculique ornamenta, satis ingeniose ratiocinantur, omnesque fere summa eloquentia victos in illorum sententiam facillime descendentes inveniunt, sed sola experientia ducē caute admodum progredi decet. In praxi mea per viginti circiter annos *clysmatum* injectionis utilitatem deprehendi; sed *cathartica* non nisi rarissime propinare ausus sum: Optandum erat, quod viri præfati meritissimi numerosiorem historiarum seriem tam morientium quam viventium protulissent, ut in re adeo ancipiti æquius iudicium ferre potuerimus.

Farrago sententiarum.

(*Variolæ morbus novus.*) Art. 150. Variolas esse morbum novum satis demonstratur, quod in multis mundi partibus nunquam visæ fuerunt, ut apud *Indos occidentales* ubi nunquam apparuerunt, nisi postquam Hispani eo pervenere, siquidem per contagionem *Æthiopis* cuiusdam, illuc delati, magnam Indorum partem sustulerunt, ut testatur R. a *Fonseca*. Helbigius indubitanter affirmat incolas *Indiæ orientalis* Variolas nunquam tentasse ante commercium *Hollandicum*.

(*Regimen frigidum.*) Art. 151. In Variolis *Alsabaravius* omnes infrigidantes medicos nostri sæculi multis parasangis anteivit; maxime in primo Variolarum tempore, nempe, in sanguinis missione ad syncopen, & frigida immensa quantitate, & confertim exhibita, potione; eaque sæpius repetita, paucis horis; at quantum video sine successu; his enim non obstantibus, venenum intra habitum corporis restitabat.

(*Sanguinis textura in Variolis malignis.*) Art. 152. Illud tantum (inquit *Lister*) curiosius animadverti (in Variolato cum maculis purpureis hæmorrhagia narium & mictu sanguineo) sanguinem refrigerium genererrimum fuisse, & ejus crassamentum rubrum vel molliori pennæ columba percussum facile dividi potuerit. In aliis autem multis, quibus urina cruenta, sanguinem e brachio missum adeo aquatum, puridumque esse vidi, ut fluctuaret crassamentum in vase non aliter quam ipsum serum; neque ullum servatum memini in tanta pestilentia, (76.) „ Variolæ præcedente crapula accidentes, ut etiam luxuria & intemperantiæ deditis, plerumque graviores sunt, & pessimi moris, & fere semper lethales.

(*Vires cochinel. in Variolis confluentibus.*) Art. 153. In Variolis confluentibus (inquit idem author) hunc in modum præscripsi; ʒj. *Croc.* ʒj. *cochinel.* ʒj. *Jacchar. tantillum*; m. pro chart. viij. capiebat ægram quaque hora cum *coch.* i. vel ij. aa. *iberiacal.* per triiduum & post-

ea sexta quaque hora; item diacod. ℥j. mane & vespere, & convaluit; & pro alia foemina ad eundem fere modum, 2℥. Croc. 3℔. cochinel. 3℔. sacchar cand. 3j. m. pro chart. vj. cepit unam tertia quaque hora.

(*Rarissime aliquis bis inficitur.*) Art. 154. Ego (inquit idem) neminem bis infectum memini, præter unam foeminam, quæ in hac urbe (*Eboracensi*) me teste, intra annum Variolis bis decubuit, & convaluit.

(*Signum salutare.*) Art. 155. Nihil observatione dignius est (inquit *Etzmullerus*) quam anhelitus & vox in Variolis, ubi enim prompte recteque agitur respiratio, vox facile sequitur, neque raucescit, admodum salutare signum est.

(*Remedia nonnulla singularia.*) *Stercus equinum* in Variolis est sordidum quidem, sed egregium remedium, promovet sudorem, præservat guttur, &c. a quibusdam etiam deprædicatur *Stercus ovinum*, „
„ Nec locum infimum obtinet oleum sem. lini, vel amygdalarum
„ dulcium, ut præsticis quibusdam peritis satis notum est. Quodnam
„ sit istud remedium, cui vires supereminentes *Vvaldschmidius* & *Dol-*
„ *laus* attribuunt, plane nescimus: optandum sane esset, quod tale
„ medicamentum, de quo loquuntur, in morbo tam exitiali, in re-
„ rum natura revera daretur. De hoc remedio hæc habet *Vvaldschmi-*
„ *dus*; utimur alio quodam remedio in forma liquida, quod a primis
„ statim diebus usque ad finem in adultis ad cochleare unum dari
„ potest, quo ipso puto reconvalescentiam, divina adjuvante gratia,
„ certe promitti posse, ut ut gravissima adsint symptomata; præcipue
„ autem hoc remedium est dicatum *inflammationi*, quo & externe u-
„ ti possumus. Et alibi; omnibus commendo *liquorem contra Variolas*
„ a D. D. *Doleo* & me millies expertum, quem & nos una inveni-
„ mus. Multo uberior est *Doleus* in hujusce specifici laudibus, ut &
„ videre licet, p. 574.

Art. 156. „ Variolæ acu perforatæ tardius curantur, & crustas diu-
„ tius retinent, unde cicatrices foediores relinquuntur; ideoque na-
„ turæ satius sunt relinquendæ. “ Maculas a Variolis relictas (obser-
vante *Barbette*) præprimis delet *oleum myrrhæ per deliquium ex albumi-*
nibus ovorum paratum, ut & *oleum vitellorum ovorum*. „ Si quis lini-
„ mentum velit; sequens in usu apud medicos *Londinenses* est elegans
„ præscriptum; 2℥. Ol. amygd. dulc. 3j℔. cer. alb. sperm. cet. ana 3j.
„ Balsam. Gileadens. 3℔. f. s. a liniment.

(*Ulcera corrosiva.*) *Ulcera corrosiva* (inquit *Bonetus*) in facie & alibi optime sanantur cum *spiritu vitrioli melle rosaceo ad sufficientem aciditatem permisto*; semper respondent voto medentis, etsi dimidiam genam ulcus absumpserit.

Art. 157. Remedia in hoc morbo insigniora, præter jam memorata, sunt, quæ sequuntur; *Kermes*, gum. lucca, viperina, cinnabaris *antimonii*, tinctura bezoardica, tinctura corallii, decoctum rubicundum, decoctum variolosum, gargarisma variolosum, loboch rubrum, unguentum de bismuth, ad foveas Bat. &c.

Inoculatio Variolarum.

(*Proœmium.*) Art. 158. Medicorum est morbo s curare, non inferre; dic-
ces tamen medicum peritum ac probum humanarum infirmitatum pro-
vidum, morborum futurorum occasiones præscindere, vel saltem le-
viores reddere, æque ac præsentis sanare omni arte decere: Si hoc
non concedatur, quamobrem venæsectionem imperamus, emetica,
& cathartica adhuc sanis & vegetis prophylaxeos gratia propinamus?

(No-

(*Nova praxis.*) Art. 159. Inoculatio Variolarum est nova praxis a Constantinopoli ad nos nuperis annis translata; & mirum est, quanta expectatione recepta fuit, quanta industria exulta; statim incredibiliter inclaruit: in ipsa domo regia, in multorum procerum & optimatum familiis magna ostentatione celebrata fuit; quo eventu & quali successu eandem exercentes ediderunt. Nihilominus sub tantis auspiciis & tam magnis exemplis inter gentem popularem minus increbuit; nostrorum hominum genio & cogitandi modo vix rite quadrare videtur. Quoad fas, & an cum bona conscientia fieri possit multum varieque litigatur; de certitudine & incertitudine Variolas genuinas producendi, itemque an alii etiamnum morbi, & humorum contaminationes, una cum Variolis, implantari possint, vehementer ac strenue disputatur. Mihi quidem neque otium neque facultates suppetunt tantas componere lites.

(*Operatio.*) Art. 160. Interim inoculationis operatio ad hunc modum facillimo negotio peragitur. Imprimis in promptu comparandum est exiguum pus (guttæ v. vel vj. puta) ab adolescente Variolis discretis decumbente, inter maturandum depromptum, quod parva phiala vel pyxide inclusum loco operationi assignato deportandum est, ubi omnibus præparatis inoculando vulnuscule duo infligenda sunt, unum in brachio, alterum in crure lateris oppositi; & pus prædictum penicillis applicandum, & ligaturis firmandum; non opus est, ne incisiones fiant profundiores quam per cutem, neque grano hordei longiores, penicilli ad finem 24. horarum removendi sunt, & ulcera emplastr. Diachl. vel foliis brassicæ operienda, & in futurum semel vel bis in die pro ratione quantitatis puris ibidem scatentis detegenda & medicanda. Hoc facto morbus sensim producet, & symptomata sequentia plerumque exoriri solent.

(*Symptomata supervenientia.*) Art. 161. Circa diem octavum post operationem erumpere solent pustulæ, iis, quæ in discretarum genere ordinario contingere solent, haud dissimiles, præeunte febricula, & reliquis usitatis symptomatis, sed mitioribus. Quoad loca incisa, 4. die rubescunt, & inflammantur, die 6. ad supurationem vergunt, & pus ichorosum emittunt. Sub eruptione quidem pustularum invadente Febre ulcuscula paulo minus fluunt; post vero eruptionem, usque ad declinationem Variolarum, pus in dies augetur, ex quo tempore iterum sensim diminuitur; ita ut spatio quinque hebdomadarum ulcera plerumque penitus claudantur. Quanto major est evacuatio puris per ulcera hæc artificialia durante morbo, tanto mitior erit morbus. In genere observatum fuit Variolas per inoculationem inductas discretas esse, periculo ut plurimum vacantes, pustulas perpauca, cuti foveas raro relinquentes. Subsequuntur sæpissime in variis corporis partibus tubercula & abscessus, nonnulla quidem levioris momenti; interdum vero mali moris, & difficillimæ curationis.

(*Præparatio & regimen.*) Art. 162. Ad corpus inoculationi præparandum multi multa loquuntur de Venæsectione, de usu emeticorum, & cathartorum, &c. Sed profecto, si inoculandus sit ætatis juvenis, boni habitus, & absolute sanus, nihil horum necessarium videtur. Sufficit temperati regiminis ad tempus ante operationem observatio. Operatione peracta inoculato solito vivendi morem persequi concessum est, nisi quod fortassis carniū nimis liberalem indulgentiam prohibere prudentis erit. Morbo incepto idem regimen ac in Variolis discretis, modo ordinario contractis, observandum est, & si medicatione aliquali opus sit, Variolæ inoculatione inductæ eandem postulant medendi methodum.

FEBRIS PESTILENTIALIS ET PESTIS.

Diemerbroeckii sententia.

(*Pestis definitio.*) Art. 163. Pestis est morbus peracutissimus, perniciosissimus, & maxime contagiosus, ex maligno & occulto spiritibus calorigue nativo tota substantia infestissimo inquinamento ortus, a quo omnium viscerum, & imprimis cordis, functiones læduntur.

(*Diversum quid a Febre.*) Art. 164. Pestis est diversum quid a Febre, & Febris est tantum ejus symptoma, ut multoties observavimus, ac proinde nonnulli Pestem male per Febrem definiunt, cum Febris non sit de ipsius essentia, ut infra probabitur.

(*Signum Pestem præfagiens.*) Art. 165. Inter signa Pestem præcedentia & præfagientia sequens *Noviomagi* observatum fuit, nimirum, maxima & incredibilis insectorum copia, qualis vix unquam visa fuit, ut culicum, papilionum, scarabæorum, crabronum, cicadarum, omniumque maxime muscarum, quarum utroque anno stupenda ubique copia reperiebatur, ut ædium interiorum parietes undique muscis confiti viderentur, & foris ipse aer multis in locis quasi muscarum nubibus obfuscaretur.

(*Causa.*) Art. 166. De causis Pestis maxime ardua inter medicos quæstio movetur. In eo conveniunt omnes, illam excitari a cæca quadam pernicie, & inexplicabili aeris labe; sed unde labes illa emerferit, quomodo aer tantum vitium contraxerit, quid hoc elementum inquinaverit, de eo dubitant, & in eo inveniando laborant omnes. Prima & primaria causa est *justissima summi Dei ira propter hominum peccata*; ab hac causa promanat illud τὸ θεῖον, quod pesti inesse animadvertitur, cujus etiam Hippocrates sæpe mentionem facit: & hoc omni ævo creditum fuit tam apud Gentiles, quam apud Judæos, & Christianos; idem quoque sacræ literæ passim plus satis confirmant. Nos arbitramur Hippocratem per τὸ θεῖον intellexisse causam quandam morbificam præter naturæ ordinem ac potentiam, a Diis e sublimi immissam, vel in & ex aere de novo ab ipsis suscitata, cujus essentia nec in certa elementorum mixture, nec in manifestarum qualitatuum intemperie, nec in magna aliqua putredine consistit, sed in novo quodam veneno, præternaturaliter a Diis in hoc sublunari mundo suscitato.

(*Quomodo incipere solet.*) Art. 167. Cum aer a venenoso inquinamento incipit alterari, pollui, ac ad venenositatem disponi, incipit simul etiam rebus sublunaribus valde infensus & noxius esse, interdum armentorum magnas strages edere, interdum segetes & terræ fructus corrumpere, inter genus humanum Febres malignas & Pestilenciales generare, & mox ipsam Pestem.

(*Contagii communicatio.*) Art. 168. Contagium est communicatio inquinamenti ab uno corpore in aliud, sive illa actio communicationis fiat per immediatum contactum, sive per medium; requiritur autem apta dispositio ad hujusmodi seminarium recipiendum, alias non communicabitur. Pestilens venenum cum vestibus, aliisve rebus ad alias civitates & regiones deferri videmus. *Inexplicabilis quidem est hominum dispositio, quoad contagium recipiendum, vel non*; in aliis talis est, ut a Pestilenti veneno statim afficiantur, in aliis talis, ut difficulter ab eo lædantur, in aliis talis, ut eidem sine ulla noxa resistere possint.

(*Febris pestilens unde.*) Art. 169. Febris Pestilens, Pestis comes, non oritur

oritur a veneno Pestilenti, sed mediante putredine, id est, non generatur propterea quod humores a veneno Pestilenti inquinantur, sed quod cor Pestilenti veneno irretitum, obrutum, plurimumque debilitatum, inquinatos humores debito modo neque coquere, ac dilatare, neque regere, & satis dispellere possit; qui hac de causa putrescunt, caloremque præter naturam concipiunt, sicque Febrem excitant: quæ ob dictam causam ordine posteriorem necessario est diversa ac separabilis a Peste, ejusque symptoma. Hoc ipsum confirmant dogmata & auctoritas tam veterum quam neotericorum, nec minus quotidiana praxis, & obvia exempla.

(*Pestis symptomata.*) Art. 170. Multa symptomata horrenda & gravia Pestem comitantur, quorum nonnulla sunt ei magis propria, ut bubo, anthrax, & exanthemata; alia autem aliis morbis communia, quorum primaria hæc sunt, capitis dolor, phrenitis, sopor, vigiliæ, anxietas, debilitas seu magna virium prostratio, visus turbulentus, cordis palpitatio, linguæ siccitas, vomitus, singultus, lumbrici, fluxus alvi, hæmorrhagia narium, menstruorum profluvium, sanguinis mictus, sputum cruentum, dolores lateris, hepatis, renum, aliarumve partium.

Art. 171. Bubones & carbunculi fiunt a veneno Pestilenti, quod cor ex sese per arterias ad alias partes expellit.

(*Bubo.*) Bubo est tumor dolorosus earum glandularum, quæ sitæ sunt retro aures, & in collo, sub axillis, & in inguinibus.

(*Carbunculus.*) Carbunculus a pustula plerumque ortum ducit, & est partis alicujus gangræna, dum est in fieri, & sphacelus, dum est in facto; nulla vi naturæ aut artis edomari, & in pus converti potest, sed integer a vicinis partibus separatur. Carbunculi non habent certa determinata loca, in quibus exoriantur, sicut bubones, sed in quacunque corporis parte excitari possunt: modo enim conspiciuntur in thorace, vel collo; modo in abdomine, vel dorso; modo in brachiis, vel cruribus; modo in manuum pedumve digitis; modo unus aut alter, modo plures simul, vel in una vel in diversis partibus: imo sæpe etiam in partibus internis oboriuntur, ut in pulmonibus, ventriculo, renibus, &c.

(*Exanthemata.*) Art. 172. Exanthemata Pestilentialia sunt maculæ purpureæ vel rubræ, vel nigræ, vel violaceæ, ut plurimum rotundæ, in summa cute efflorescentes.

(*Signa prognost.*) Art. 173. Acutorum morborum (inquit Hippocrates) incertæ admodum ac fallaces sunt prædictiones. In Peste Noviomagiensi observavimus sextæ diei crises semper certo lethales fuisse. Quicumque circa novilunium aut plenilunium Peste corripiebantur, illi maxime de vita periclitabantur. Prostratio virium in morbi principio, animi deliquia, & cordis palpitationes plerumque lethalia signa erant; pulsus intermittens semper lethalis, sopores, sternutationes, motus tremuli, delirium, dolor in gutture, & raucedo, anhelitus fortens, male ominantur; pleuritides semper lethales; suppressio alvi bonum signum, spem salutis exhibens; alvi fluxus contrarium, cum hoc vix centesimus æger evadebat; sanguinis per sedes vel urinas signum lethale, ut & menstruorum fluxus. Quo citius bubones prodibant, tanto meliores, si sine Febre, vel ante Febrem, prodirent, salutis magnam spem dabant; & contra, si in emunctoriis loco bubonum emergerent carbunculi, gravissimum periculum indicabatur. Si carbunculi tardius prodirent, malum, & si valde multi, pessimum; in locis carnosissimis, me-

liores, in nervosis, periculosiores; maculae purpureae, nigrae, virescentes, violaceae, quocunque tempore apparentes, semper lethales erant; cum rubris nonnulli evadebant, etsi paucissimi.

(*Prophylactica* .) Art. 174. Praestantissimum & certissimum prophylacticum a Peste est *fuga cum timore Domini copulata*: recessus circumstantiae in sequenti versiculo continentur;

*Hæc tria tabificam tollunt adverbia Pestem,
Mox, longe, tarde, cede, recede, redi.*

(*Dieta* .) Nullum melius Pestilentis aeris correctorium in rerum natura datur quam ignis, ut multiplex experientia comprobavit. Hippocrates famosam illam Pestem, quæ ex Æthiopia Græcos invaserat, olim per ignem edomuit, & extinxit: jussit enim per totam civitatem accendi ignes luculentos nocturnis præcipue temporibus, ut aeris inquinamenta purgarentur. Ignis ligno juniperino vel fraxineo nutritus ad venenatas aeris corruptiones emendandas multum valere creditur. Accensio *sulphuris* & *pulveris pyrii* aerem purificat, & ejus corruptionem abigit; idem facit crematio *succini*, *thuris*, *picis navalis*, &c. Item suffumigium *aceti* cum ferro candente vel ignitis lateribus excitatum. Quoad dietam consultum est Pestilenti constitutione temperantiam colere, quæ magnopere ad sanitatis conservationem prodest; omnis vero repentina mutatio periculosa est; quapropter a consueti vitæ ratione subito discedere maxime periculosum esset. Malum est vigente Peste jejuno stomacho in publicum exire. Carnes porcinae maxime damnosæ censentur. Omnia dulcia vitanda sunt. Vinum temperate usurpatum prodest; sed ejusdem abusus est valde periculosus: Mercurialis testatur Patavii & Venetiis se vidisse bibaces plurimos extinctos esse, qui existimabant vinis generosis se propulsaturos esse Pestem. Vestes laneæ & crassiores inquinamentum contrahunt, & conservant; præferendæ sunt itaque vestes ex serico tenuiore vel satino, aliove simili.

(*Venæsectio* .) *Phlebotomiam*, quamvis a multis veteribus & neotericis medicis summe laudatam, nos tanquam valde periculosam, & damnosissimam, plane rejecimus; experientia enim constabat Pestis invasionem brevipost venæsectionem iis, qui præservationis gratia adhibuerunt, insecutam esse, quapropter omnibus prohibuimus.

(*Fonticuli* .) Cauteria seu potius fonticulos plurimi insignes medici summopere commendant, & eorundem insignem utilitatem nos quoque multoties vidimus. Prophylaxeos gratia in corporibus sanis & firmis sat erat, ut alvus servaretur libera, non fluida; in cacoehymicis vero paulatim ac clementer alvum subducere necessarium duximus, & præ reliquis, cum Pil. Ruffi, utpote quæ tot sæculorum experientiis ad Pestilentem malignitatem comprobata sunt. „ Ufu sulphuris communis Hippocrates Pestem istam famosam Græcia abegit: suffitus ejus pro aeris emendatione & pro potus medicatione per quam laudatur, uti quasvis corruptiones & alterationes præcavet. In graviiori malignitate indusium & vestimenta imprægnari possunt cum fumo sulphuris. „ Ettmuller.

(*Antidoti* .) Art. 175. Quoad antidotos; inter simplicia imprimis duo commendavimus; primum erat *tabacum*, nempe illius fumus per tubu-

tubulum seu fistulam ore attractus, & post paucam retentionem inde rursus dimissus; quemadmodum ordinarie a fumi fuctoribus sumi solet, illius usum in hac peste tam in meipso, quam in plurimis aliis, insigniter profuisse observavimus. Alterum erat *radix Helenii*, vel sicca masticata, vel in pulvere sumpta, vel saccharo condita; de antidotis aliis compositis consulatur auctor Cap. x. Pauperibus consulimus, ut quotidie mane duo vel tria cochlearia *aceti vini optimi* biberent, atque illud in hac Peste animadvertimus fuisse unum ex optimis præservativis; quamplurimis etiam spongiam cum *aceto theriacali* ebriam naribus frequenter admovendam dedimus.

(*Authoris vivendi modus.*) Art. 176. Quod ad meipsum attinet, mirabantur quidem multi, quod ego, qui quaslibet ædes infectas indiscriminatin invisebam a tanta contagii violentia non læderer; imprimis, nec terrori, nec iræ, nec mœrori, locum concedebam; si forte meipsum aliquo modo contristatum perciperem, tum tribus quatuorve vini haustibus assumptis cor exhilarabam, atque ita tristitiam fugabam. In victu utebar cibis euehymis; potus mihi erat carevisia communis, ut & vinum album tenue vel mediocre, quod interdum usque ad hilaritatem, nunquam ad ebrietatem, utebar. Mane inter horam quartam & quintam ægros invisurus nihil omnino cibi aut potus aut medicamenti assumere potui, sed *oblatis* Deo *precibus* solummodo aliquot *grana Cardamomi minoris* masticando jejunos primos ægros invisebam usque ad horam sextam; Tum vel *theriacæ* vel *diascordii* pauxillum, vel *corticem aurant. conditum*, vel ut plurimum *radicum helenii* conditarum tria quatuorve frustula comedebam; circa horam septimam vel octavam frustum panis cum butyro & caseo ovillo viridi jentabam, superbibendo haustum cerevisiæ; quandoque haustum *vini absynthii* bibebam; circa decimam, si per otium liceret, fistulam unam *tabaci* exfugebam, & post prandium duas tresve, nec pauciores post cœnam; sæpe etiam intermediis horis post meridiem duas tresve fistulas sumebam: Si autem ab ægrotorum foetore me vel tantillum alteratum sentirem, statim postpositis omnibus negotiis, qualicumque diei hora foret ad *tabaci* usum fugiebam: nam, ut verum fatear, *tabacum* pro primario præservativo semper habui, & revera tale esse, non sola ratione doctus, sed experientia edoctus comperi; neque aliud melius pro ordinario usu hætenus inventum fuisse existimo; sed observatu dignum est, quod non nisi *insuetis auxiliabitur fumisuctio*; quapropter ego solo *tabaco* contentus nullis aliis suffumigiis utebar, & postea ejus usum rursus dereliqui.

(*Curatio.*) Art. 177. Circa Pests curacionem semper plurimum hallucinati fuerunt omnes medici, dubii causarum, dubii remediorum. Causa enim morbi adhuc latet, neque ullum hætenus remedium proprium inventum est par tanto malo. In Peste actu laborantibus a *venæsectione* religiose abstinendum est; *purgantia* quoque & *vomitiva* maxime fugienda sunt; alvi constipatio non est metuenda, etiamsi in longum protrahatur, utpote quam nullis nocuisse animadvertimus. In ipso morbi principio statim ad *antidota* & *sudorifera* confugiendum est: hæc autem remedia *alexipharmaca* dicta multa sunt ac varia, quæ variis modis miscentur, & componuntur pro morbi ipsius genio & reliquis circumstantiis, quarum decisio ex medici judicio dependet, neque certis regulis determinari potest.

(*Simplicia.*) Simplicia primaria sunt quæ sequuntur, *radix petasitidis*, *aristolochiæ*, *helenii*, *bistort.*, *zedoar.*, *gentian.*, *angel.*, *ering.*, *scorzon.*

Zoner. serpent. virg. fol. scordii, rutæ, card. ben. absynth. rorismarin. flores croc. calendul. sambuci, fructus berber. poma cydonia, citrea, aurant., limon. eorumque cortices, acetum simplex, sambucinum & calendalatum; aromata, mirrha, camphora, succinum, vipera, &c. Compositiones sunt fere infinitæ, quamplurimarum formulæ apud authorem videri possunt. Author suspectum habet *crocum*, quoniam cerebrum petere solet; *camphora* a quamplurimis valde laudatur, item *flores sulphuris*, & *sal absynthii*, commendatur etiam *oleum vitrioli* & *oleum sulph. per campan.*

(*Methodus medendi.*) Art. 178. Curationem sequenti methodo instituimus; imprimis cubacula nitida servari, & ter quaterve de die aerem suffumigiis alterari iussimus, & statim ægris (morbi primo, secundo, vel die tertio) *potiunculam sudoriferam* exhibuimus, iisque bene stragulis contextis, sudores copiosos per duas tres pluresve horas (habita semper virium ratione) promovimus; qui, si difficiliter prodirent, arenam calefactam siccam lineis saocis infusam pedibus, axillis, & inguinibus apposuimus. Si a primo sudore non levarentur ægri, post paucas horas sudoriferum de novo repetendum est; si post secundum sudorem Febris cum aliis symptomatibus adhuc incresceret, nec quidquam levarentur ægri, pessimum erat indicium: post decem vel duodecim horas & sequentibus diebus adhuc quater vel quinquies (prout necessitas exigere videbatur) *sudorifera* reiteravimus. Intermediis autem horis varia *antidota* ad veneni violentiam extinguendam, ut & *condita corroborantia*, ac *putredini resistentia*, vel *apozemata convenientia*, aliaque quæ malignitatem a centro ad peripheriam pellebant, nec non cibos quosdam liquidos facilis digestionis, & antidotali condimentorum qualitate alteratos, exhibuimus. Symptomatum quoque morbo conjunctorum diligentem rationem habuimus, de quibus proximo loco dicemus.

(*Curatio symptomatum Febris.*) Art. 179. Inter symptomata, quæ Pestem comitantur, communissimum est Febris maligna pestilens, quæ ut plurimum gravis & periculosa existit. Hinc nos, durante hac constitutione, eodem fere modo, sicut ipsam Pestem, tractavimus, & *sudorifera* atque *antidota* ad illius curationem maxime profuisse observavimus, dummodo abstinere a calidioribus, vel, si iisdem uti placeret, *alia frigida*, ut *acetum*, *succum citri*, &c. admisceremus.

(*Vigiliæ.*) Vigiliæ in Peste non magnopere metuendas esse docuit experientia;

(*Sopor.*) sed sopor in principio maxime damnosus & mali ominis erat; si ad somnum nimis proclives essent (quod admodum familiare erat) illos primo die a somno studiosissime prohibuimus, usque dum alexipharmaco assumpto prius bene sudassent.

(*Anxietas, virium debilitas & vomitus.*) Ad anxietatem, virium debilitatem, & vomitum, miraculose profuerunt remedia pauca sequentia: primum erat hæc mixtura; ʒ℥. *Conserv. rosar. rub.* ʒi ʒ. *diascord.* ʒiij. vel iv. aq. nostr. *theriacal.* (Art. 192.) ʒiv. *succ. limon. recent.* ac. *cinnam. ana* ʒi ʒ. m. stent per horam unam aut alteram; deinde per linteum colentur, colaturæ add. *confect. de hyacinth. sine moscho.* ʒj, m. Secundum erat hoc linimentum; ʒ℥. *Ol. nuc. moscat. express.* ol. *scorpion. vel laurin. theriac. Anarom. ana* ʒj. ol. *junip.* ʒss. *succin.* ʒj. *garyoph. vel cinnam. gut.* iij. m. f. linimentum pro scrobic. cordis, & ventriculi regione inungendis, bis terve de die superponendo hanc partem ad ignem calefactam; ʒ℥. *Rad. calam. anom. nuc. moscat. ana.* ʒj.

garyoph. benzoin. ana ℥℥ fol. menth. ℥ij. pulverizatis add. mic. panis secalin., ℥ij. vel iv. acet. rosac. q. s. f. pasta.

(*Siccitas Lingue.*) Ad linguæ ariditatem post varias alias collusiones tentatas solam aquam simplicem plus profuisse animadvertimus.

(*Hæmorrhagia.*) Nihil periculosius quam hæmorrhagia narium, & menstruorum, & sputa cruenta; quam citissime omni arte sistendæ sunt, aut actum erit de ægris. Illud sæpissime observavimus, si alvi fluxus in principio non sisteretur, postea plane incurabilem in omnibus fuisse.

(*Bubonum curatio.*) Art. 180. Bubonum curationem per suppurationem omnino tentavimus; quamprimum igitur ægri, sive in ipso morbi principio, sive in progressu, duritiem aliquam cum dolore sentirent, pone aures, in collo, sub axillis, vel in inguinibus, huic plerumque ad citiorem tumoris provocationem, & maligni ichoris extractionem, *vesicatorium* in inferiore ejusdem parte applicavimus, ita ut *vesicatorium* ipsam duritiem attingeret, ut hoc modo ulcere facto locus apertus teneatur, & damnosi ichores melius effluent (*cucurbitulas* minus approbamus;) secunda die ut noxia materia ad bubones attrahi, ibique digeri, ac suppurari posset, toti tumori *cataplasmata attrahentia & emollientia*, ac *suppurantia* imposuimus, quibus præter alia etiam *capæ, steracus columbinum, fermentum panis acidum* & similia admista erant; nonnullis etiam *solas capas sub cineribus aliquantum assatas*, & deinde contusas, paucis *theriacæ & butyri insulsi* admixto cataplasmatibus forma biduo vel triduo imposuimus; cum autem tumorem jam satis magnum esse, atque ad maturationem tendere videremus tunc *attrahentia* amplius non addidimus, sed *solis maturantibus* usi sumus, ut tumores citius ad suppurationem perducere possent. Sæpe ab ipso principio usque ad perfectam suppurationem hoc solum emplastrum imposuimus, quod omnibus intentionibus satisfacerebat, eoque solo tumores ad integram sanationem non raro perveniebant; 2℥. Gum. galban. acet. dissolut. ampl. oxy. croc. diachyl. cum gummis ana ℥j. misceantur. Notandum tamen nos quibuslibet tumoribus non imposuisse fortiora *attrahentia*, sed tantummodo iis, qui sub axillis, & in inguinibus oriebantur: tumoribus autem, qui prope aures vel in collo prodibant, talia non conveniebant; nam talium usu eosdem, cum maximo suffocationis periculo, imo cum multorum exitio, sæpe paucis horis enormiter accrevisse observavimus; quapropter *sola emollientia, vel leviter tantum attrahentia* his imponebantur; aliquando necesse fuit, cum tardius procedebant, tumores scalpello incidere, sed hoc antequam fere ad perfectam maturationem pervenissent, non est faciendum: sequenti digestivo usi sumus, 2℥. Scord. subtilissime pulv. ℥ij. vitel. unius ovi terebinth. Venet. mel. unguent. Apostolorum ana ℥℥. m. Caveri debet ne ulcera nimis cito occluderentur. Videatur in annotationibus methodus experientissimi Pauli Barbette de curandis bubonibus per *emplastrum magneticum arsenicale*.

(*Carbunculorum Curatio.*) Art. 181. In carbunculis tractandis sæpe prima & secunda die imposuimus *folia brassicæ rubræ oleo raparum inundata*, quod apud vulgares in frequentissimo usu erat. Postea statim, imo ut plurimum ab ipso principio, frequentem pulticulam applicuimus, qua nihil invenimus, cum quo carbunculorum separatio & curatio citius ac melius perageretur; 2℥. rad. consolid. maj. sicci. herb. scord. ana ℥ij. rad. alth. farin. sem. lini tritic. ana ℥℥. coq. in q. s. aq. font. ad pulticulam, deinde add. mel. terebinth. unguent. Apostolor. ana ℥ij. pic.

pic. liquid. ung. Basil. ana vij. vitel. unius ovi croc. ℥j. m. interdum etiam addebantur *theriac. ℥ij.* Apud vulgus in usu erat *pix navalis cum equali parte picis liquidæ*, cum qua sola sæpius vidimus anthracis citissime separatos, & dolores optime sedatos. Quo mitius tractarentur, eo melius & citius curatos fuisse millies observavimus.

(*Exanthemata.*) Exanthemata mortis instantis præsagia erant, neque curationi tempus dabant, quam si admisissent, *per sudorifera alexipharmaca* curari debuissent.

Sydenhami sententia.

(*Proæmium.*) Art. 182. *Acuti morbi ut plurimum Deum habent authorem; sicut chronici nos ipsos.* Pestis vix Britanniam frequentius quam post annorum circiter quadraginta revolutionem devastat;,, jam,, vero ex peculiari Dei clementia plusquam quinquaginta annos immunes viximus.,,

(*Pestis descriptio.*) Art. 183. Pestis primo insultu rigorem ac horrorem, quemadmodum & Februm intermittentium accessiones, fere perpetuum habet comitem; mox vomitus enormes, dolor circa cordis regionem, (ac si torculari premeretur) Febris ardens ægros indefinenter divexant, donec aut mors ipsa, aut benigna bubonis vel parotidis eruptio, quæ materiam morbificam foras ablegat, eos ab luctuosissimo discrimine liberet. Rarius quidem accidit, ut citra ullam Febris præensionem ingruat, ac homines de improvviso e medio tollat, maculis purpureis præsentanei interitus nuntiis, etiam dum in foro versantur erumpentibus, quod tamen nisi in Pestis admodum funestæ exordio vix contingit; fit etiam nonnumquam, ut tumores prorumpant, nec Febre nec graviore aliquo symptomate prægresso.

(*Aeris diathesis.*) Art. 184. Aeris dispositio quantumvis *λοιμώδης*; Pesti excitandæ per se impar videtur; nec Pestis epidemica erit, nisi accedente idonea aeris diathesi.

(*Curandi methodus.*) Art. 185. Vel per *sanguinis missionem* vel per *sudores* Pestis expugnanda videtur; posterior methodus sæpe funesta fuit; *venæsectio* vero larga manu & repetitis vicibus celebrata, nullo tumore protuberante, nemini adhuc, (quod scimus) unquam funesta; tumore vero conspicuo instituta, semper damnosa; ratio in propatulo est, nempe quoniam motui naturæ adversatur. Plures & gravissimi scriptores *venæsectionem* probant, præcipue Botallus, sed tam largam *venæsectionem* paucissimi admittunt. Alia est itaque methodus therapeutica, nempe, mittatur sanguis in lecto, & statim æger stragulis quamplurimis obruendus est, & caput obtegendum ad sudores ciendos ex tegumentorum pondere, & cum sudor promanare incipiet, alvi profluvium & vomitiones ultro sedabuntur, & tunc fumat æger bolum sequentem com Julap. cardiac. sexta quaque hora, sudorique indulgeat: *℥℥. theriac. Androm. ℥℥℥. elect. de ovo ℥j. pulv. Gascon. gr. xij. cochinel. gr. viij. croc. gr. iv. succ. kerm. q. s. m. f. bolus*; omnique art. continuandus est sudor ad viginti quatuor horas, nec prius indusium mutandum est utcunque madidum; quod si sudatio citius abrumpatur, illico symptomatum sævitia recrudesceat, & omnia in pejus ruunt. In sequenti luce commune *catharticum* exhibere soleo; atque hac medendi ratione, anno a peste proximo quamplurimis Febre pestilentiali correptis sanitatem restitui, adeo ut ne unus quidem ex eo morbo mihi desideratus sit, postquam eandem exercere inceperam. Vinum liberalius ingurgitatum, aliaque fortiora præservativa statis horis dierum assumpta, complures, qui
alias

alias salvi intactique verisimiliter permanissent, in hunc affectum con-
jecerunt. „Temperantem sobriumque Socratem gravissima Pestis Athe-
nienſium non attigit; neque ullo fere ævo eidem ſimiles attin-
git. „

Williſii ſententia.

(*Pestis cauſa primaria.*) Art. 186. Pro caſtigandis hominum ſcleri-
bus Peſtem primitus a Deo immiſſam ipſi agnoverunt ethnici; ideoque
pro extirpatione ejus, precibus & piamentis, æque ac medicamentis
inſiſtebatur.

(*Prophylaxis.*) Art. 187. Ad prophylaxin recordandum eſt Hippo-
cratis præceptum; *labor, cibus, potus, ſomnus, venus, omnia ſint me-
diocriter*. Plures novi, qui (*Helmontii* verbis) vino & confidentia for-
tificando Archeum, nec aliis antidotis uſi inter infectos ſine contagii
noxa verſabantur.

(*Methodus D. Sayer.*) Art. 188. D. Hen. Sayer in praxi medicus
felix, plerisque aliis hanc ſpartam renuentibus, peſte laborantes auda-
citer inviſebat (*Londini anno 1640.*) ut ſeipſum a contagio muniret,
antequam domos infectas adibat, ſolummodo vini generoſi hauſtum
pleniorẽ ingerere, deinde perambulatione ſua peracta, idem antido-
non repetere ſolebat, tandem ad caſtrum *Wallingfordiæ* occubuit cum
luce quodam in eodem lecto diſcumbens. Illius medendi methodus
ſic ſe habuit; ſi, priuſquam exanthemata aut bubones exterius ap-
parerent, vocaretur, ut plurimum vomitoria exhibuit ex *infuſione cro-
ci metallorum cum vitriolo interdum Romano*; vomitione finita, *dia-
boreticis* ſtatim exhibitis in ſudorem conjiciendos præcepit; & deinceps
intervallis quibuſdam pro reſectione virium conceſſis, uſque ad morbi
declinationem *diaphoreſin* continuandam: ſin poſt ſtigmata apparentia
acerſeretur, vomitione poſthabita tantum *ſudorificis* inſiſtebat.

Farrago ſententiarum.

(*Præſervativa varia.*) Art. 189. Si quis, (inquit *Bonetus*) qui cum
gris converſatur, qualicunque morbo affectis, nunquam, quamdiu
tra ſphæram vicinitatiſtalium moratur, ſalivam deglutiat, ſed ſem-
per eandem expuat, ab omni infectione, Deo & natura juvantibus,
ſit immunis. „Obſervatum fuit ſcabioſos & lue venerea laborantes
peſte minus tentari. Fruſtulum myrrhæ in ore detentum in locis
contagioſis verſantibus optimum præſervativum cenſetur. Quidam
medicus, ſæviente peſte, ſibi ipſi & quibuſdam aliis ſetaceum in
utroque inguine comparavit; unde morbo intacti tuto evaſerunt.
Obſervarunt *Foreſtus, Diemerbroeck, Galli, Angli, Germani*, „omnes
Smegmatopolas, Lotrices & omnes qui ex officio ſapone uteban-
tur, immo qui ſaltem induſia ſapone elota gerebant in peſte illico
mori. *Boerhaave.*

(*Vires Limonum.*) Art. 190. Peritiſſimi (inquit *Piſo*) nonnulli In-
ſte medicaſtri plus præſidii in limonibus ponunt, quam in lapide Bezoar.
t *theriaca* contra malignos morbos, & peſtilentẽs Febres, atque ipſa
nena. Ego autem ſine jaſtantia affirmo me ex nullo aliquo remedio ſun-
ci tot felices effectus in tota praxi mea obſervare, quam ex limonibus.
Communis Turcarum praxis (inquit D. Harris in tractatu de mor-
infantum p. 88.) in curanda Peſte fit per ſuccum limonum in omne
culum liberalius inſtillatum, per fruſtra limonum ſaccharata ore fre-
enter maſticata, & per potum apud nos vulgatiſſimum dictum Sher-
t, hoc eſt, per ipſum regimen frigidiffimum; utpote quibus ala-
ciphar

xipharmaca nostra calidissima bonis auspiciis sunt plane incognita, aut in nullo numero saltem habentur.

(*Vires Camphoræ.*) Art. 191. Ex regno vegetabili supereminet *camphora*, quæ ab omnibus præcticis extollitur (inquit *Ettmullerus*) unde nobile & expertissimum oleum pestilentielle *Heinsii*, medici Veronenfis, qui cum hoc mira præstitit, adeo ut ipsi post mortem Veronæ statua fuerit erecta. Compositum est ex *ol. camphoræ succini & cort. citr. ana p. æ.* quæ olea invicem bene juncta constituunt hoc mirabile remedium; pro præservatione dos. *gr. 5.* vel *6.* pro curatione a *gr. vj.* ad *xv.* in vehiculo idoneo expectando sudorem, *Sal viperarum & Rob Sambuc.* laudantur.

Art. 192. In usu etiam sunt quamplurima alia remedia composita ad præcavendum & curandum gravissimum hunc morbum, ut

Aqua prophylactica.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. petasitid. ℥ij. fol. rut. m. iv. meliss. scabios. flor. calend. ana m. ij. nuc. jugland. immatur. concis. ℔ij. succ. pom. citr. (vel aurant. acid.) ℔ij, acet. vin. opt. ℔xij. digere per noctem & distilla lento igne ad siccitatem. Optimum alexiterium habetur.

Acetum Pestilentielle, Bat.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. baccul. junip. ℥ij. rut. m. iij. acet. opt. ℔ij. macera, ac cola. Pro suffitu, & oris collutione grassante Peste

Aqua theriacalis, Diemer.

℞. Rad. ostrutii, petasitid. angel. carlin. valerian. ana ℥iij. encl. campan. cort. aurant. sicc. ana ℥iij. herb. scord. absynth. ana ℥ij. carab. ben. ℥ij. flor. ros. rub. ℥℔. stechad. ℥iij. bacc. junip. ℥iij. cardamom. min. ℥v. cinamm. ℥j. vin. Rhenan. vel Gallic. ten. ℔xxij. aq. ros. ℔ij. vase bene obturato stent in infusione dies x. deinde add. fol. rut. m. v. tanacet. m. iv. rorismarin. pimpenel. ana m. i℔. maneant simul in infusione adhuc per octo vel decem dies, quotidie baculo commovendo, postea affunde succ. citr. ℔ij. stent adhuc per 3. vel 4. dies, postea super ignem leniter ebulliant, & colentur, ac in torculari fortissime exprimantur, colatura distilletur in b. m. & servetur ad usum.

Cataplasma Pestilentielle, Bat.

℞. Stercor. columb. ℥iv. croc. ℥℔. Mithridat. theriac. Lond. sem. sinap. ana ℥j. tereb. q. s. m. Pro bubonibus rumpendis.

Item *Spiritus theriacalis camphoratus, tinctura bezoardica Batean.* & alia innumera apud scriptores medicos.

SUDOR ANGLICUS.

Willisii Sententia.

(*Morbi historia.*) Art. 193. Sudor Anglicus cœpit anno 1585. circ. initium mensis Augusti, duravitque usque ad finem Octobris; & quarevis Sennertus dicat, hoc malum deinceps 40. annos regioni huic familiare & perpetuum fuisse, tamen nostrates, & medici, & historici qui tunc aut prope ea tempora vixerunt, eum perfecta & magna intervalla habuisse observabant; cumque 66. annorum spatio solummodo quater redierit, viz. anno 1506. 1517. 1528. 1551. vix unquam praeter sex menses desavisse, & nonnumquam spatio trimestri terminatum fuisse, eumque tempestatem valde humidam semper præcedere habuisse. At vero singulis quibus increbuit annis, maximas ubique edidit mortalium strages, ut ab unoquoque ejus regno quibusdam locis

locis tertia pars hominum brevi desideraretur. Tanta fuit ejus malignitas, ut quamprimum urbem aliquam invaderet, singulis diebus quingentos aut sexcentos occuparet, & ex ægris primo vix centesimus evaderet.

(*Morbi typus.*) Art. 194. Morbi typum a Sennerto compendiose & methodice descriptum, etiam nostris authoribus consonum, hic inferre visum est. Morbo hoc correpti statim sine bubone, carbunculo, exanthematibus, languore dissolvebantur, & animo deficiebant cum summo virium languore, inquietudine καρδιωγμῶ, capitis dolore, pulsu crebro, celeri, inæquali, cordisque palpitatione maxima; sudore vero diffluebant perpetuo & copioso, qui non finiebatur, antequam morbus solveretur, quod intra 24. horas contingebat; nam qui sudorem non proliciebant, neque cardiacis utebantur, & qui impatientius calorem ferebant, auramque frigidam captabant, ii omnes subito intra 24. horas moriebantur. Postea ubi morbi hujus ratio innotuit, ut ægri sudores elicerent, ac cardiacis se munirent, pauciores moriebantur.

(*Curatio describitur.*) Art. 195. Circa curationem paulo accuratius scribit *Polydorus Vergilius*: post ægrotantium plurima experimenta & observationes, a juvantibus & lædentibus factas, ita usu venit, ut remedium unicuique promptissimum inventum sit, quod hujusmodi est. Si quis interdiu sudore corripitur, cum vestitu protinus cubatum eat; si nocte, tum quiescat, nec se a loco moveat usque ad 24. horas exactas; interim ita se stragulis oneret, quo non provocetur Sudor, sed sua sponte molliter stillet, cibi nihil capiat, si tam diu famem tolerare possit; neque plus potionis consuetæ, ac calefactæ hauriat, quam modice satis sit ad sitim extinguendam; inter hanc curationem imprimis caveat, ne manum quidem aut pedem suum refrigerandi, recreandique causa extra stragula proferat, quod facere lethale est. Addunt alii toto isto nycthemeri spatio a somno prorsus abstinendum fuisse. A sudatione hac Pestilenti recuperati postquam aliquandiu sani perstitissent, quandoque in eam rursus, imo interdum vice tertia, incidebant.

Cajus apud D. Freind. Hist. Med. pag. 333. Vol. II.

(*Sudor Anglicus.*) Art. 196. Sudor Anglicus fuit morbus temporarius, magnæ Britanniae indigena. Cœpit primo anno 1483. in exercitu regis *Henrici Septimi* quum ad portum *Milfordiensem* appulisset; *Londini* sæviebat a 21. Septemb. ad finem Octobris. Et exinde quinque aliis vicibus in insula nostra comparuit, idque semper æstivo tempore primo in 1485. deinde in 1506. & tunc tertia vice in 1517. ubi tanto impetu æstuebat, ut in instanti quasi, tribus nempe horis, mortem inferebat; inter optimates multi, & populares plurimi moriebantur; in quibusdam oppidis incolarum dimidiam partem abstulit. Tum demum in 1528. quarto redibat, quando ægroti intra sex horas perierunt; vita ipsius regis *Henrici octavi* valde periclitabatur; plurimi inter *Aulicos* interibant. Anno sequenti, viz. 1529. semel tantum *Belgiam* & *Germaniam* infestabat, apud quos multi occubuerunt. Postremo anno 1551. *Angliam* ultimo invasit; *Westmonasterii* centum ac viginti in dies moriebantur. *Salopiæ* speciatim, ubi *Cajus* author noster commoratus est, ingenti hominum clade invaluit, & tanquam *Pestis Athenis* tremenda est ejusdem descriptio, hoc oppido per septem menses deflagravit, quo tempore mille hominum trucidavit. Maxima proprietate ab illo vocatur *Febris Pestilentialis contagiosa unius dici*.

(*Symptomata.*) Art. 197. Modus invasionis sic se habuit. Imprimis singularem aliquam partem affecit; symptomata concomitantia fuerunt calor internus & ardor, sitis inextinguibilis, anxietas, ægritudo ventriculi ac præcordiorum (raro tamen vomitus) cephalalgia, delirium, deinde languor & somnolentia gravis, pulsus celer & vehemens, respiratio cita & laboriosa. Infantes, pauperes, & senes cæteris huic morbo minus obnoxii reperti sunt: reliquorum autem pauci a contagione liberi, & inter correptos paucissimi convaluerunt. Exules patriæ in Galliam, aut Flandriam prophylaxeos causa fuga minus hospitali freti pariter eodem fato cum conterraneis suis obierunt. Et insuper, quod dictu adhuc mirabilius est, peregrini tunc temporis in Anglia hospitantes contagio immunes extiterunt, cum Angli peregre existentes morbo correpti sunt.

(*Methodus medendi.*) Art. 198. Medici hujus novi morbi adeo exitialis aspectu terrifico perculsi primo obstupuerunt, nec quid faciendum sit bene norunt: Experientia vero a juvantibus & lædentibus petita paulo maturius docti eundem debito regimini & medicamentis obtemperare didicerunt. Indicatio curativa primaria, ac præcipua fuit sudorem liberum promovere & diutius sustentare: Sudor enim quoquomodo imminutus, abruptus, vel suppressus mortem accelerabat, quocirca ægroti omni opera a frigore muniendi fuerunt, & si sudores sponte sua haud satis copiosi fluxerunt, medicamentis diaphoreticis & stragularum plurimum impositione provocandi fuerunt, & vires cum cardiacis & vino sustentandæ. Morbus hic acutissimus quindecim horis ad agmen exsurgebat, sed non ante hor. 24. res in vado fuit. In quibusdam necesse fuit sudationem repetere, immo in robustioribus quandoque ad duodecimam vicem. Nonnulli, qui sudoribus haud sufficienter indulserunt, in Febres mali moris inciderunt. Primis quinque horis potus omnino prohibendus erat; hora 7. morbus increvit, qua delirium superveniebat; somnus per totum morbi decursum sedulo excutiendus erat, & carnes non concedendæ,

C A P. II.

Sive Fasciculus Morborum secundus.

I N F L A M M A T I O.

(*Inflammati- tio in genere.*) **I**nflammati- tio in genere est tumor renitens ad tactum cum rubore, ardore, dolore urente, tensivo, pulsatili, pun- re.) Art. 199. Tumor & gravativo, quibus semper accidit Febris plus minus acuta. Tumor vel resolvitur, vel suppuratur, vel in scirrham abit, vel gangrænescit, & mortem infert.

A N G I N A.

Cœlii Aureliani Sententia.

(*Anginæ descriptio.*) Art. 200. Inflammati- tio faucium, *synanche* dicta, est difficultas transvorandi (cum suffocationis periculo) ob vehementiam tumoris faucium; in morbo nascenti adest querela sine ratione, atque

atque difficilis motus colli & gutturis, item saliva plurima, & subdolens faucium sensus cum asperitate sensibili, difficultas deglutitionis salivæ, tum spirationis, velut impedimentum tanquam obstantis crassioris humoris; crescente malo partes affectæ rubent & tument, uti tonsillæ, & summitas gutturis fere ad suffocationem; dehinc intumescit collum atque vultus; humores evadunt crassiores, oculi prominentes, sanguinolenti; demum lingua ultra dentes ad exteriora prolabitur, siccescunt fauces, gelidus torpor articulos invadit; pulsus est celer & densus, locutio cum summo dolore, neque articulata; postremo amputata, livor vultus, recursus poti liquoris (per nares) gutturis atque pectoris stridor, & quibusdam quasi sonitus caninus, pulsus defectio, quibusdam oris spumatio; mors.

(Curatio.) Art. 201. Lanis mundis ac mollibus, & non infectis, dulci atque calido oleo infusis protegendum est collum cum thorace; adhibenda est phlebotomia intra diatriton. Aqua calida pro potu ordinario præbenda est.

Boerhaavii Sententia:

(Angina sine tumore fere semper lethalis.) Art. 202. Angina duplex est: Species prima sine ullo tumoris externi internive signo, altera cum tumore aliquo; prior in fine morborum diuturnorum, maxime post ingentes & repetitas evacuationes, contingit; pallorem faucium & siccitatem, & tenuitatem; comites habet; quare nervos & musculos resolutos plerumque habet; fere semper est signum imminentis mortis. „ Anginæ gravissimæ sunt (inquit Hippocrates prognost.) & „ celerrime interimunt, quæ neque in faucibus, neque in cervice quicquam conspicuum faciunt, plurimum vero doloris & orthopnææ „ inducunt. „ Remedia vasa vacua bono succo vitali replentia, calefacientia, & corroborantia indicantur; sed raro curatur. Quandoque etiam oritur subito sine signis manifestis prægressis ullius morbi; vix capit medelam; & fere semper post mortem suppuratum pulmonem demonstrat.

(Angina cum tumore.) Art. 203. Angina cum tumore accidens varias occupat partes, uti linguam, ejusque musculos, palatum, tonsillas, uvulam, pharyngem, laryngemque earumque musculos, ossis hyoïdis musculos, fistulam pulmonalem, œsophagum ejusque musculum, &c. quo plures harum partium inflammantur, eo sævior est morbus & periculosior: decurrit enim consuetum inflammationis generalis iter, easdemque facit ac patitur mutationes in resolutionem, pus, gangrenam, scirrhum.

(Indicationes curativæ.) Art. 204. In specie hac inflammatoria omni arte tentanda est resolutio; 1. Venesectione larga, & si opus fuerit, aliquoties repetita. 2. Purgantibus ore haustis, vel clysmatibus. 3. Victu potuque tenuissimo. 4. Nitrosis subacidisque medicamentis. 5. Vapore tepido assidue hausto: 2℥. Acet. sambuc. rosar. calendul. ana ʒij. q. stillat. sambuc. ʒvj. misce; Vapor calidus hauriatur infundibuli opem fauces. Fomentis, epithematis, epispasticis, &c. His successu caventibus, denuntiata prius acerba prognosi, celebranda erit bronchotomia, de qua operatione consulatur auctor, ut etiam de Angina œdematosa, catarrhosa, scirrhusa, suppuratoria, gangrenosa, singulatim.

(Laryngotomia.) Art. 105. „ In illa Anginæ specie, quæ Cynanche

„ appellatur, ægro suffocanti *Laryngotomia* restitui potest. Morbus
 „ ipse periculosior est, quam hæc operatio, quæ hoc tempore magis
 „ ad praxin est revocanda. Circumspectione nihilominus hic sum-
 „ ma opus est, ne, si aliæ quoque partes, pulmo scilicet, pleura, gu-
 „ la, &c. inflammatae, aut jam pure repletæ sint, irritus sit labor, &
 „ calumniandi ansam præbeat. Omnibus igitur bene consideratis ope-
 „ ratio hoc modo est aggredienda: reclinetur aliquantum caput, quo
 „ in conspectu magis prodeat trachea, annulique ejus cartilaginei a
 „ se invicem magis recedant. Incidatur deinde cutis secundum longitu-
 „ dinem laryngis usque ad foveam. Hæc utrinque ministri digitis dedu-
 „ catur, quo oculis chirurgi occurrant muscoli duo longi sternohyoides,
 „ cultro ligneo vel osseo a se invicem parum removendi, mox, laryn-
 „ ge sese exhibente, sectio in ea fiat ope phlebotomi, loco inter an-
 „ nulum cartilagineum tertium & quartum medio, sedulo cavendo ne
 „ cartilagine ipsæ lædantur. Flatu prodeunte cultellum aufer, vul-
 „ nerique fistulam argenteam infigo, bene prospiciendo, ne, lon-
 „ gior justo, posticam tracheæ partem attingat, unde tussis continua.
 „ Suffocationis periculo cessante, quod die tertio aut quarto plerum-
 „ que contingit, vel saltem contingere oportet, fistula ablata vul-
 „ nus ordinario modo secundum artem curetur, nam ab aliis non dif-
 „ fert. Chirurg. Barbet. p. 498.,

Etmmulleri sententia.

(*Anginae divisio.*) Art. 206. Angina est faucium & colli inflamma-
 tio; dividitur in *synanchen*, quando interni faucium seu pharyngis
 muscoli inflammantur; *parasyanchen*, quando dicti externi afficiuntur;
 in *synanchen*, quando internæ laryngis partes sunt inflammatae; *para-*
synanchen, quando dictæ externæ patiuntur. In *synanche* pulmones
 quoque sæpius afficiuntur, unde insignis respirandi difficultas, tan-
 quam in *peripneumonia*, adeo ut ægri canum more ore hianti respi-
 rent.

(*Tonsillarum Inflammatio.*) Tonsillarum inflammatio ex lymphæ
 vitio Febrem habet conjunctam, sed magis lentam, & omnia sympto-
 mata sunt remissiora, quam in *Angina*; fauces rubent, & tonsillæ tu-
 midæ insigniter prominent. Periculosus est Anginæ in *Pleuritidem*
 transitus. Anginosæ spuma circa os apparens est lethale si-
 gnum.

(*Curatio.*) Art. 207. In cura omnia ea conveniunt, quæ *pleuritide*
 in usu esse solent, speciatim animalium stercora, ut equinum, cani-
 num, &c. morbum in prima herba detruncant; externe conducit ca-
 taplasma ex *nido hirund.* 2℥. *nid. hirund.* N. j. *cæp. sub cineribus as-*
sat. N. iij. *for. sambuc.* p. ij. *coq. in lact.* & *trajice per cribr.* deinde
add. alb. græc. ʒss. *ol. cham. stillat.* ʒss. *lilior. alb. q. s. m.* Venæsectio ali-
 quoties repeti debet pro ratione circumstantiarum; omittenda est
 tamen in *angina maligna* in qua *sudorifera* & *specificæ* sunt usurpan-
 da, & ipse medicus caveat sibi ab halitu ægrotantium: Convenit vomito-
 rium in principio anginæ malignæ, modo mature administretur. Purgan-
 tia locum non habent in angina, sed enemata & vesicatoria: Inter gar-
 garismata *urina propria* valde commendatur, item *succus sedi majoris*
cum spiritu vini & *sal. armoniac.* & *stercore canino*. Præ reliquis conve-
 nit gargarisma ex decocto *raparum* cum paucis *sal. armoniac.* Ad rumpen-
 dum abscessum convenit gargarisma ex *sem. sinap. in hydromel. coct.*

(An-

(*Anginae nothe Curatio.*) Art. 208. In angina notha, alias alba dicta; non opus est *venæsectione* nisi in plethoricis; conducunt potius in principio sudorifera; & post hæc purgantia leniora cum externis res solventibus, gargarisma ex decoct. origani. rad. pyretbri, sem. sinap. cum aceto, &c. & postea succ. sempervivi cum syr. e moris.

Farrago sententiarum.

(*Sydenhami methodus.*) Art. 209. Angina temperamento sanguineo præditos, & rufos, præ reliquis, invadit; *venæsectio* copiosa in brachio celebranda est, mox in ranula; deinde tangantur partes inflammatae melle rosaceo spiritu sulph. ad summum acorem permisto, & *vesicatoriam* nuchæ admoveatur. Si morbus sit diuturnior, *venæsectio* repeti debet & enemata injici, item catharticum propinari, &c. *Sydenham*.

(*Remedia ad salivam movendam.*) Art. 210. 2℥. Ol. amygd. dulc. flor. sulph. ana ℥j. chrystal. tartar. sacchar. cand. ana ℥ij. ol. n. m. g. iv. syr. de alth. ℥iij. m. f. linctus. Atque hunc præ aliis omnibus laudat Dr. Harris in observ. morb. grav. Ad salivam copiosissime educendam nihil pulv. sequent. (inquit author) præstantius efficaciusve novi. 2℥. chrystal. mineral. sacchar. chrystal. ana p. æ. misce; teneatur in ore ℥j. donec saliva abundaverit, tunc expuatur; horæ post quadrantem vel dimidium repetatur; mirum quantum hinc salivæ, &c. *Musgrave*. Succus corticis viridis nucum cum melle depuratus commendatur a *Galeo*.

Remedia varia.) Art. 211., *Venæsectionem* in ranula omnes fere ex- tollunt, quidam in vena jugulari; phlebotomia vero in pede alte- rutris præferri debet ob majorem revulsionem. Angina nulla tuta est, quanto minus tumoris, tanto magis periculi; securissima est, si ru- bor maxime foras vertatur. Interne antepleuritica fere omnia pro- sunt, privatim oleum lini nunquam satis laudandum. Externe gar- garisma anginosum, gargarisma ad pituitatem, cataplasma anginosum, vapor ad anginam, &c. *Fulleri*. Item gargarisma sequens in angina notha. 2℥. auric. judaic. 3℔. rad. pyretbr. ℥ij. herb. byssop. p. ij. ficuum ping. scis. N. iv. coq. in aq. font. q. s. ad ℔j. sub finem addendo mellis ℥iv. colatur add. pulv. subtilissi. alb. grac. ℥ij. sp. vin. rectificat. ℥ij. sp. cochlear. 3℔. misce.

PLEURITIS & PERIPNEUMONIA VERA & NOTHA.

Sydenhami sententia.

(*Pleuritidis descriptio.*) Art. 212. Temperamento sanguineo prædi- tos præ reliquis Pleuritis aggreditur cum rigore, horrore, deinde ca- lore, siti, &c. Elapsis paucis horis (licet aliquando multo serius) æger vehementi dolore punctorio in latere circa costas corripitur, qui nunc versus omoplatas, nunc versus spinam, nunc ex adverso versus antero- ra pectoris se propagat; tussi etiam crebra affligitur: in initio materia pauca & tenuis ejicitur sanguineis intermixta particulis, postea copio- sior & magis concocta sanguine etiam permixta; aliquando ad expe- ctorationem copiosiore non provenit; febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore; & pro ratione liberioris expectoratio- nis sensim imminuitur; alvus nunc nimis astricta, nunc soluta.

(*Medendi methodus.*) Art. 213. Est ubi *Venæsectione* omissa æger ne suffire quidem valeat; sed immani dyspnœa laborans suffocatur; in- terdum

terdum ad apostema res redit, quod *empyema* dicitur; per accidens (viz. ex usu medicamentorum calidorum) aliis febribus Pleuritis interdum supervenit ex præcipitatione materiæ febrilis in Pleuram. *Venæsectio* repetenda est ad tertiam quartamve vicem, si sit indicatio; in adultis vix sanatur minori quam 40. circiter unciarum sanguinis impensa. Æger e lecto quotidie eximatur ad horas aliquot; prout vires suaserint, quod multum confert ad curationem.

(*Peripneumoniæ nothæ descriptio.*) Art. 214. Peripneumoniæ nothæ insultu primo nunc incalēscit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculique, tussis, & inter tussendum admodum dolet caput, ad vomitum proclivis est, urina turbida est, & intense rubet, sanguis pleuriticorum similis, adest anhelatio, & dolor totius thoracis, & pulmonum coarctatio: Ab *asthma sicco* plane distinguitur, quod in isto nusquam comparent febris indicia, in hac manifesto se produnt, licet minora longe & magis obscura, quam in *Peripneumonia vera*.

(*Cura.*) Art. 215. Curatio *venæsectione*, *redemiis pectoralibus* & *diætâ refrigerante* perficitur. „ *Mistura expectorans Fulleri*, vel *syr. c. Petæ*, *Batean.* hic quandoque locum habere potest. „

Cœlii Aureliani sententia.

(*Peripneumoniæ veræ descriptio.*) Art. 216. Peripneumoniā (uti plerisque alios morbos) optime descripsit *Cœlius Aurelianus*. Adest, inquit, febris acuta, gravedo thoracis, & sensus laborantium quadam difficultate laterum atque mediarum mammarum, decubitus supinus atque paulo erectior, supra latus jacendi difficultas, vultus rubor tanquam florens, oculorum splendor; sequitur anhelitus celeritas, tussicula sanguinolenta ac biliosa vel fumosa jactans sputa, pleuriticorum fulviora vel spumosiora, spiratio difficilis, desiderium frigidi atque plurimi aeris hausto rapiendi, frigidi potus appetitio, os siccum, lingua aspera, ac primum subalbida, dehinc rubra, pulsus vehemens & celer, anxietas, jactatio, vigiliæ juges, ingemens atque turbulentus somnus; aucto morbo spiritus difficillime trahitur cum sibilatu; sequitur colli ac vultus inflatio, oculorum immobilitas, visus nubilosus, mentis alienatio, articulorum frigidus torpor cum livore, lingua crassior, sudor superiorum partium, pulsus latens aut formicans; postremo pectoris resonans stridor. (En accurata morbi descriptio, *erubescant moderni.*)

(*Hippocratis descriptio Peripneumoniæ.*) „ In Peripneumonia hæc ad- „ sunt (*inquit Hippocrates de humoribus*) febris vehemens, crebra „ & calida respiratio, anxietudo, virium prostratio & corporis jacta- „ tio, doloresque ad omoplatam, claviculam & mammas, pondusque „ in pectore, atque delirium. „

(*Curatio.*) Art. 217. Adhibenda est *phlebotomia*; potui ordinario danda est *aqua calida*, item cibus sorbilis & tenuis; conducunt eclegmata ex *lini semine*, *fœnugr. nucelis* & *melle decoct.* & *ovorum vitellis* confect.

Boerhaavii sententia.

(*Differentia inter veram & spuriam Pleuritim.*) Art. 218. Pleuritis aggreditur nullam non partem integumentorum interni thoracis, pleuræ scilicet vel mediastini; ideoque dolor punctorius in quamlibet partem thoracis incidere potest, sed frequentius latera obsidere solet,

solet, atque hoc febre conjuncta veram efficit pleuritim; si vero altius intercostales muscoli & his superiora laborant, spuria appellatur.

(*Pleuritidis verae Curatio.*) Art. 219. In Pleuritide vera sanguis mitti debet copiose quam mature per magnum vulnus, repetique debet pro ratione symptomatum urgentium; crusta alba absens sanguinem mittendi finem definit. Externe conveniunt fofus, linimenta, &c. Interne diluentia, resolventia, refrigerantia, dolorem lenientia; omnia calide & magna copia sorbenda sunt. Interdum locus inflammatus ad suppurationem vergit, quod scitur ex pertinacia doloris, febris, &c. ultra quartum diem; abscessum jam fieri coenoscitur ex horrore saepe recurrente, remissione doloris, anhelatione, decubitu in unum tantum (i. e. in affectum) latus tolerabili. Rupto abscessu pus stillat in cava pectoris, & incrementum capit ex ulcere depluente, unde Empyema, de quo postea. Interdum vero locus affectus evadit scirrhusus cum pulmonis & pleurae adhæsione, unde asthma & tussicula sicca, malum immedicabile, nisi quod forsitan aliquid levaminis a labore & equitatione multa possit recipere. Interdum loca inflammata gangrænescent, unde mors cita subsequitur; gangrenam inceptam esse scitur ex delirio, livido thoracis colore, sputo subbilioso, doloris sine ratione remissione, &c.

(*Peripneumoniae typus & cura.*) Art. 220. Peripneumonia est inflammatio pulmonis totius vel unius lobi; prior immedicabilis merito censetur ob magnitudinem morbi, altera medelam quandoque admittit; eodem modo ac iisdem remediis tractanda est ac Pleuritis, eundemque ut plurimum habet eventum. Si non resolvatur, abscessum vomicaeve format intra quatuordecim dies, quod fieri ostenditur ex horripilationibus, doloris remissione, pulsus debilitate, manentibus adhuc dyspnœa, siti, febricula vespertina, &c. Exinde sequitur interdum suffocatio ex subita eruptione puris in asperam arteriam; interdum evacuat in ingenti sputo purulento; vel in thoracis cavitatem delabitur, unde empyema, phthisis, &c. postremo materies purulenta interdum intra pulmonales venulas resorbetur, & cruori miscetur, & in loca quædam alia deponitur, in hepar, lienem, cerebrum, &c. hinc fiunt abscessus peripneumonici ad aures, crura, vel hypochondria, ubi si cito evanescant, redeunte peripneumonia, casus est lethalis.

(*Peripneumoniae nothæ typus.*) Art. 221. Peripneumonia notha oriri solet ex pituita lenta in toto sanguine nata, & sensim pulmones inficiente, donec in hunc morbum eat; senes, pituitosi, frigidi, catarrhoſi, & gravedine laborantes huic morbo sunt obnoxiores: prima fallaci lenitate opprimit inopinantes, quippe levi fatigatione, debilitate, prostrato fere omni animi motu, anhelitu, oppressione pectoris incipiens; adeo leves motus excitat, ut vix caloris, febrisve indicia moneant periculi: mox vagæ horripilationes, leviusculi febris insultus adsunt: unde subito crescente anhelitu, & debilitate, mors, cujus in urina & pulsu vix ullum adfuit præſagium.

(*Curatio.*) Art. 222. Curatur sanguinis missione, clysmatibus, victu tenui, diluentibus, abstergentibus, & lenissime aperientibus assiduo propinatis. „ Breviter & raptim hæc pauca decerpsi, sed de his affectibus præ omnibus quotcunque scriptoribus consulendus est author præclarissimus, & ad illius mentem consequendam unice incumbendum est, & summa impendenda est opera. „

Etmmulleri sententia.

(*Pleuritis.*) Art. 223. Observatum semper fuit in Pleuritide correptis,

ptis, quod non solum Pleura, sed pulmonis medietas simul in isto latere inflammata fuerit. Interdum quoque cum pulmone inflammatur mediastinum, duplicatura nempe Pleuræ sub sternone, quæ nomine caret.

(*Pleuritis notha.*) Art. 224. Pleuritis notha est dolor lateris punctorius, sed sine febre aut tussi; ægri ut plurimum in latus oppositum potius quam morbosum decumbere, queunt; contrarium observatur in *Pleuritide vera*.

(*Prognosis.*) Art. 225. Si statim intra triduum sputum cruentum appareat brevem morbum indicat, sin vero serius longum (ex Hippocrate) Pleuritici intra 14. dies superne non repurgati *Empyeici* fiunt (inquit Hippocrates,) & tales, si in 40. diebus repurgentur a die ruptionis liberantur, alioquin in *tabem* incidunt; in his affectibus sputorum potius habenda est ratio quam urinæ; Pleuritis in principio leviter apparens & usque ad 5. diem sic procedens, 6. vero die exacerbata plerumque est lethalis.

(*Curatio.*) Art. 226. In Pleuritide *benigna venesectio* si non juvet, non nocet, in *maligna* tamen vix locum habet, sed semper erit nociva. Ex omnibus auxiliis *sudorifera* primarium obtinent locum, & præ reliquis *antimonium diaphoret.* „ Antimonium diaphoreticum summe „ commendatur in Pleuritide tum vera, tum spuria: egregie discutit humores congestos, acorem absorbet, dolores demulcet, expectorationem „ promovet, indicationibus fere omnibus satisfacit. *Wedelius.* Antimonium diaphoreticum aeri aliquandiu expositum vim emeticam acquirere nemo non novit; ideoque usus tempore lavari jubeo. „ Nobilissimum pectorale habemus in *liquiritia & passulis*; saccharata non conveniunt; *papaver Rhœas* ejusque flores, seu optimum specificum, in toto morbi decursu locum habent; omnia calide sunt bibenda; *succus taraxici seu dentis leonis vel decoctum ejus*, ut & *eryngii*, laudantur, item *chærefol.* *Succus raphani* recens express. expectorationem mirabiliter promovet. Ad dolorem lateris externe commendatur *stercus gallin. cum ol. cham.* „, ut & sequens cataplasma, *℥℥. alb. porri. in sartagine cum q. s. ol. cham. frixi ℥ij. furfur. frument. mi. fecum vin. alb. ℥ij. vel q. s. m. convenit etiam infus. seq. intus sumptum; ℥℥. Stercor. equi non castrat. ℥vj. vin. alb. ℔℔. aq. flor. spiræ. alb. ℔℔. infund. clause & calide per hor. dimid. deinde coletur cum expressione forti, colatura cum alb. ovor. s. a. clarificetur, & add. aq. theriacal. stillat. ℥v. syr. balsam. ℥ij. m.*

Baglivii sententia.

(*Signum pathognomonicum Pleuritidis.*) Art. 227. Durities pulsus est signum fere infallibile omnium Pleuritidum, quamvis reliqua signa non adsint; durus enim pulsus omnium inflammationum partes nerveas vel membraneas obsidentium est comes indivulsus. „ Pleuritis „ vera (inquit Chesneau) cognoscenda est imprimis a pulsu duro. „ Nonnulli affirmant pulsum esse ferratilem, sed ingenue fateor me „ nunquam ferratilitatem illam deprehendere potuisse; ideoque parvipendo tanquam rem fictitiam & imaginariam, contentus duritie „ pulsus, quæ sufficit ad Pleuritidem dignoscendam.

(*Pleuritides occultæ.*) „ Pleuritides frequenter sunt *occultæ*, quia indolentes, unde quandoque errores in praxi; fac itaque ægrum in dextrum vel sinistrum latus decumbere, decumbenti impera, ut fortiter respiret & tussiat, & tunc pete ab illo, an dolorem aut gravedinem per-

persentiat, quod si affirmet, res manifesta est; hoc modo plures *Pleuritides* deteximus magno ægrotantium commodo.

(*Prognosis.*) Art. 228. Omnis prognosis a bona vel mala respiratio-
ne maxime petenda est. Perperam agitur cum *Pleuriticis*, qui nihil ex-
puunt, nisi copiose effluant urinæ. Omnes *Pleuriticos* sanatos vidimus,
quibus in interiora auris dolor & exinde suppuratio supervenerunt. Cru-
sta alba non apparens in superficie missi sanguinis est pessimum signum.
Pleuritides recidivantes omnes fere sunt lethales (*ex Hippocrate.*)

(*Regulæ de venæ sectione.*) Art. 229. Quando in *Pleuritide* viget in-
dicatio dissolvendi, *camphora* præ reliquis opus absolvit, (præsertim
in *Pleuritide epidemica & maligna.*) Si sputum antea suppressum su-
perveniat, & sit flavorubescens, nunquam imperato *venæsectionem*; nam
post *venæsectionem* sputum denuo supprimetur, & æger morietur. Quo-
cunque die, secundo scilicet aut 4. 5. 7. &c. ante vel post missionem
sanguinis spirandi difficultas, & difficultas pariter excreandi sputi pleu-
ritico superveniant: statim duo *vesicantia* tibiis admovenda sunt, jux-
ta illud *Hippocratis*; in *pulmonicis* quicunque tumores sunt ad crura opti-
mi sunt, &c. Post apposita *vesicantia* observavi expectorationem statim
promoveri, spirandi difficultatem imminui, & alvi fluxum, si adesset,
feliciter sisti, & ægrum sanari.

Willisi sententia.

(*Horum affectuum complicatio.*) Art. 230. Opinari ducor *Peripneumo-
niam*, & *Pleuritidem* affectus esse modo singulares & separatos, modo
connatos & primitus coexistentes, & modo invicem successivos aut suc-
cedaneos esse. *Peripneumonia* non tantum *Pleuritidi*, sed frequenter et-
iam *anginæ*, & aliis interdum affectibus succedit.

(*Pleuritidis eventus.*) Art. 231. De *Pleuritico* expectatur, vel ut
morbus statim solvatur, partim crebra & libera *venæsectione*, & par-
tim sudore critico die 4. vel 8. exorto, vel ut, his non rite succeden-
tibus, diutius protrahatur; & tunc sapissime huic morbo *Peripneumo-
nia* aut *Emphyema* vel utrique affectus superveniunt, periculi pleni, qui
ægrum e medio ut plurimum tollunt, aut in *phthisin* ægre sanabilem
aut exitialem præcipitant.

(*Cucurbitæ.*) Art. 232. *Riverius & Zacutus Lusitanus* exempla no-
tabilia adducunt curationis *Pleuritidis* per *cucurbitas* cum scarificatio-
ne loco dolenti adhibitas. Pro usu externo in linimentis utiliter addatur
album Græcum.

Farrago sententiarum.

(*Ad prognosin pertinentia.*) Art. 233. Densa & exercitationi assueta
corpora (inquit *Hippocrates* in *coac.*) citius ex *Pleuritide & Peripneu-
monia* intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt. *Pleuritides sic-
cæ* (inquit idem) & in quibus nihil sputitur, gravissimæ; metuendæ
quoque in quibus dolores ad superiora tendunt. A *Pleuritide* *Peripneu-
monia* malum; a *Peripneumonia* *Phrenitis* malum. *Hippocr. aphor.* san-
guis missus est remedium magni & recentis doloris; at si leve, vel
vetustior casus est, vel supervacuum vel serum id auxilium est,
confugiendumque est ad *cucurbitulas* cum scarificatione. *Celsus.*

(*Polypi.*) Art. 234. *Pleuritides*, ultra acutam febrem, sunt *polypo-
sa concretiones* in pulmonibus, ut ex cadaveribus, & extracto sangui-
ne patet. *Malpighius.*

(*Polypi.*) Art. 235. Adverti debet *Pleuram* *Pleuriticorum & Pulmo-
nem* *Peripneumonicorum* post mortem fectorum semper exhibuisse spe-
ctandam magnam copiam *polyperum*. *Polypus* autem est sanguis diutius
stagnans

agnans dilapsa parte rubra, & raro pleura sola absque pulmone inflammatur.

(*Linimentum.*) Art. 236. Dolorem externe optime leniunt linimenta ex ol. amygd. dulc. sp. sal. armoniac. & camphora Pitcarn. in MSS.; Item linimentum seq. anodyn. 2℥. balsam. Locatel. ʒij. ol. amygd. dulc. ʒj. ol. mac. per express. ung. e flor. aurant. ana ʒij. m. f. liniment.

(*Prognosticon singulare.*) Art. 237. Quibus plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est, ex Hippocrate, & authoris experientia.

(*Syrupus de Peto.*) Vix datur præstantius remedium in fine morbi, quam syrupus vel decoctum nicotianæ. Barbette.

(*Cineres pro usu externo.*) Art. 238. Lucius monitu Æsculapii a Pleuritide curatus fuit applicatione epithematis ex cineribus ab ara desumptis & vino commistis. Le Clerc.

(*Remedia varia.*) Art. 239. Vires & usus remediorum sequentium artis Apollinæ gnaris fatis innotescunt. Aq. omnium florum, balsam. sulph. anisatum, ens veneris, decoctum coccineum, decoctum pleuriticum, emplastr. pleuriticum, focus lateralis, haustus pleuriticus, loboch. pleuritic. loboch. viride, oxymel astmaticum, pulvis pleuriticus, sacculus lateralis, unguentum pleurit.

E M P Y E M A.

Boerhaavii sententia.

(*Empyema quid.*) Art. 240. Empyema est collectio puris in thoracis cavo, ut plurimum ex rupto Pleuritico vel peripneumonico abscessu; cognoscitur a tempore inceptæ inflammationis xx. dierum sine purgatione, a tussi sicca, gravitate ad diaphragma, decubitu in unum latus, strepitu puris ad motus, Febre lenta, genis rubentibus, oculis cavis, digitis in extremitate calidis, unguibus recurvis, & abdominis tumore.

(*Curatio.*) Art. 241. Ad curationem quod attinet, cognita vomitæ pulmonis, pleuræ, diaphragmatis, mediastini, vel pericardii disruptione, omni ope niteridum, ut pus evacuetur per os, vel per urinas, si natura has monstraverit vias, vel denique per thoracis aperturam ope instrumenti idonei in latere affecto, inter costam 4 & 5, vel 5 & 6 ab inferioribus numero ducto, pus lente & per vices educendo; ex indole puriseducti, & reliquis ægotantis circumstantiis, prognosis de vita vel morte pronuntianda erit; si Empyema fuerit vetus, vires collapsæ, capilli cadentes, alvi fluxus colliquativus, corpus tabidum &c. paracentesis facta mortem accelerare solet.

Willisii sententia.

(*Signa Empyematis.*) Art. 242. Empyema est collectio puris intra cavitatem thoracis qua respirationis organa opprimuntur; illuc vero pus istud confluere solet, vel ex pleuritide, vel peripneumonia (& quandoque forsan ex angina) suppuratis & disruptis; post morbos prædictos Empyematis secuturi major erit suspicio, si post unam vel alteram septimanam sine sputo copioso, rigores, & febris, & spirituum languores, superveniant, & dein post 14, vel 20. dies Empyematis plane facti signa erunt respiratio difficilis, pectoris gravitas, materiæ fluctuatio, & molestiæ sensus e corporis situ mutato, sitis & febricula fere constans, genarum rubor, totius inquietudo & vigiliæ. De pa-

Ettmulleri sententia.

(*Diagnosis.*) Art. 243. Cognoscitur, quando factum sit *Empyema*, quod remittat febris, quin etiam fluctuatio quædam puris hinc inde percipitur; rumpitur autem *vomica* circa diem 20. 30. aut 40. dum vero rumpitur, rigor fit, & febris intensior supervenit, adest tussis continua, quasi ex profundo, quia diaphragma gravatur ex incumbente pure, parum excernitur, febris mitior evadit, & magis lenta, respiratio est difficilis, & sentitur pectoris gravitas, si corpus inclinant pene suffocantur, sentiunt frequentissime *evaporationes* ex pectoris cavo ad os ascendentes instar *aquæ calidæ*; ulteriori progressu percipiunt in ore *saporem tetrium & quasi putridum*, & pulsus intermittit.

(*Curatio per apertionem thoracis & aliter.*) Art. 244. Apertio thoracis fit inter quintam & octavam costam (a supremis numerando;) mature fiat. Vide *Scultetum*. Quoad remedia attinet, exhibenda sunt *grumosum sanguinem dissolventia & absorbentia*, & tunc præstat a *diureticis* incipere, in finem autem aliquod *sudoriferum* subnectere. Si *molliatur* aliquid natura, semper medicus sit ejus minister; Verb. Grat. quando *urina purulenta* redditur, dentur *diuretica*; in *diarrhœa purulenta*, *laxantia*; si ad sputum vergat, *expectorantia*, immo *vomitória*; *nicotiana* est egregia; *fonticuli* etiam a quibusdam inter costas inuruntur, inter *balsamica*, *vulneraria*, decocta e *lignis*, *gelatina C. C. heræ terrestres* valde commendatur. Vide *vomicam pulmonis*. (541. &c.)

• PHRENITIS & PARAPHRENITIS

Willisi sententia.

(*Phrenitis quid.*) Art. 245. Phrenitis est desipientia continua, scilicet principum cerebri facultatum depravatio ab inflammatione meningum orta cum febre synocha. Huic morbo affinis Paraphrenitis dictus est diaphragmatis inflammatio.

(*Phrenitidis causa.*) Art. 246. Phrenesin potius febri succedere, & quia sanguis effervescens recrementa sua adusta capitis transfert, produci, *Hippocrates* olim, & nunc quisquam vel e plebe observat; in quantum, scilicet, febricitantis *urina* a turbida & crassa, in tenuem & aquosam mutata Phrenesin imminuentem indicat; cujus idcirco affectus causa exinde colligitur esse *materiæ febrilis* in cerebrum metastasis.

(*Quales morbi revera sint Phrenitis & Paraphrenitis.*) Art. 247. Ex dissectionibus patet Phrenesin non a meningum inflammatione oriri, neque Paraphrenesin diaphragmatis; sed Phrenitis definiri potest; totius animæ sensitivæ sive spirituum animalium, quoad totam eorum hypostasim, phlogosis sive inflammatio; & prout incendium vel a cerebro tantum, vel ab hoc simul & cerebello, incipit, vulgo in *Phrenitida* & *Paraphrenitida* distinguitur, quod tantundem est ac functiones animales spontaneas fere tantum & potissimam, aut una cum his vitales lædi.

(*Signa diagnostica.*) „ Phrenitis (inquit *Lommius*) his signis innoscitur; febris urget acuta, atque continua, continuusque mentis error, modo his, modo aliis animæ vitalis actionibus; expeditus in omnem audaciam homo est, & vicissim tum vigiliis, tum somno difficili, turbulentoque impeditur, sicut interrupta quiete pro-

„tinus cum impetu e cubili profiliat, vociferetur, ferociat, ac modo ploret, modo cantet, verbaque sine sensu, sine ordine proferrat, interrogatus ab alio omnia aliena respondeat; oculi sunt mobiles, flammei, cruenti, squalidi, quos æger crebro perfricat, modo siccos, modo lachrymis perfusos; lingua aspera & nigra, dentes strident, sæpeque cruor e naribus aliquis fertur, & interdum posteriora capitis dolent; idem manibus tremit, digitisque floccos velut, & festucas e stragulis legit, urina est tenuis flammea, interdum etiam (quod pessimum) tenuis albaque est.

(*Prognosis.*) Art. 248. Phrenitis, aut brevi tempore in salutem, aut mortem, cum febre terminatur; aut diu protracta & post febrem superstes, aut demum vel sanatur, vel in alios morbos, nempe, *lethargum*, aut *maniam*, aut *melancholiam* transit, vel demum in *desipientiam perpetuam*, fracto, scilicet, (quod ajunt) cerebro.

(*Curatio.*) Art. 249. Si Phrenitis in principio febris accidat, *venesectio* locum habet, & *enemata* sunt præcipui usus, cataplasmata pedibus admoventur debent ex fol. rut. cham. verben. rad. brion. flor. papav. errat. cum sapone; vel eorum loco columbæ vel pulli dum calent descisfi; pro siti restinguenda bibat *Palmarii* potum divinum, scilicet *aquam fontan.* cum succo limon. & *sacchar.* vel emulsionem; *hypnotica* sunt caute usurpanda; in hoc affectu *placenta rosacea* vel *flores papaveris cum aceto & nuc. moschat.* capiti & temporibus cum fructu applicari potest.

Boerhaavii sententia.

(*Vera vel symptomatica.*) Art. 250. Phrenitis vel *vera*, ubi cerebrum vel potius illius meninges utræque primario inflammatione afficiuntur cum delirio & febre acuta conjuncta; vel *symptomatica* ex metastasi materiæ febrilis in cerebrum.

(*Eventus.*) Art. 251. Phrenitis *vera* 3. 4. vel 7. die necat, vel abit in *maniam*, *lethargum*, *coma*, *catochen*: A *peripneumonia* & *ileo lethali*, a *variolis* admodum mala.

(*Indicationes curativæ.*) Art. 252. Hæmorrhagiæ quandoque morbum solvunt. „ In Phrenitide vera prodest *venesectio* larga. Immo „ in hoc affectu (inquit *Dolæus*) arteriotomiam in temporibus institutam commendamus. „ Inducantur *diluentia* ex decoctis, *antiphlogisticis* & *nitrosis* affatim exhibitis, *laxantia* & *clysmata*, *capitis rasura*, *epispastica*, *cucurbitæ* in partibus inferioribus.

(*Sectio venæ jugularis.*) Art. 253. „ Certe in Phrenitide (inquit D. Freind) quæ febribus supervenit, sectionem *venæ jugularis* quam maxime efficacem esse expertus sum, cum alia remedia minus commode responderint: neque efficacem tantummodo, sed & adeo tutam, ut valde mirer aliquid de efficiendi difficultate, nedum periculo apud scriptores inveniri; nam hæc vena, uti nullo fere labore secatur, ita & secta facillime omnium sanescit. (Frequentissime etiam in aliis capitis morbis gravioribus in praxi mea *jugularem* secui.)

(*Paraphrenitis quid.*) Art. 254. Paraphrenitis est morbus *Pleuritidæ* similis, ubi diaphragma vel saltem ejusdem margo vere inflammatur, & longe frequentior est, quam vulgo creditur; cognoscitur ex febre continua, dolore inflammatorio in inspiratione maxime urgente; hinc respiratio sublimis, celeris, suffocativa, delirium perpetuum, convulsio, furor, grangræna, (symptomata omnia atrociora quam in *Pleuritide*); & licet totum malum cognitum sit, insuperabile tamen.

Ettmulleri sententia.

(*Phrenitis affectus*. Art. 255. Phrenitis moderno usu vocabuli, est delirium intensissimum ex membranarum cerebri inflammatione ortum cum febre peracuta, veteribus *Sphacelismus* seu *Spacelus cerebri*;

(*Plerumque lethalis*;) est malum ut plurimum lethale, 7. vel 3. 4. die intereunt; Lethalem phrenitidem denuntiant dyspnoea, facies cada-verosa, sudor syncopcticus, lingua & manus tremulae, stridor dentium, stillicidium narium, &c. si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum conquerantur ægri, funestissimum est signum, mox enim *delirium* & *convulsiones* aderunt, quod sæpius observavi; convulsiones superveniunt, quando inflammatio cerebri incipit abire in gangranam.

(*Cura*.) Art. 256. Cura nil habet peculiare præ cura in febre acuta cum delirio; *Tinctura papav. rhæad.* effervescentiam sanguinis compescit, item *camphora* & *nitrum*; quando ab alio morbo pendeat, curato morbo primario delirium cessat; ideoque *sudorifera* & *alexiphar-maca*, sunt propinanda, ut *tinctura bezoardica*, &c. In febre ardente decoctum *tamarind. epithemata* etiam plantis pedum conducunt.

(*Acida*, &c.) Art. 257. „ *Blandiora acida* & *cinnabarina cum emul-sionibus* inter interna remedia omne ferunt punctum in phrenitide „ ex præcepto *Waldschmidii*.

INFLAMMATIO VENTRICULI.

Ettmulleri sententia.

(*Inflammatio Ventriculi*.) Art. 258. Inflammatio stomachi est affectus periculosus, & si quis alius, peracutus; adest febris ardens, & aliquis tumor in præcordiis, circa Ventriculi regionem dolor insignis sub costis nothis, cum gravi æstu ibidem, siti inexplebili, corporis jactatione & vigiliis: superveniunt deliria, vomitus, & non raro convulsiones lethales, raro evadunt; 3, vel 4. die fini solet; interdum, sed raro ad suppurationem tendit, & *abscessus* rumpitur, vel in Ventriculi vel abdominis cavo, malum fere semper incurabile.

(*Differentia inter Ventriculi, & Hepatis inflammationem*.) Art. 259. Distinguendum est inter *Ventriculi inflammationem* & *Hepatis*; in priore ardor & dolor magis in profundo sunt, in hepate inflammatio magis circumscripta est, & mitiora urgent symptomata. (268.)

(*Curatio*.) Art. 260. Curatio eadem est ac in aliis inflammationibus, viz. per *venæsectionem*, &c. *Sudorifera* primatum obtinent. Externe convenit cataplasma ex *stercore columbino*, *fermento*, &c. ad suppurationem promovendam ad imitationem *Sennerti*. Vid. *Boerb.*

INFLAMMATIO INTESTINORUM.

Ettmulleri sententia.

(*Inflammatio intestinorum*.) Art. 261. Accidit in herniis, ileo, & ab aliis causis. In loco inflammato tumor rotundus tactui (quandoque) percipi solet; adest vehemens dolor pulsatorius, fixus, distendens, &c. alvus occlusa, febris, vomitus, languor, &c. frequentius in *ileum lethalem* terminatur. Commendatur *omentum vervecinum*. Vide *Ileum* (666)

(*Boerhaave*.) Art. 262. Consulatur *Boerhaave* instar omnium scriptorum de *Intestinorum inflammatione*.

INFLAMMATIO MESENTERII.

Ettmulleri Sententia.

(*Inflammatio Mesenterii.*) Art. 263. Inflammationes & tumores Mesenterii sæpius sunt fons & origo chronicorum & admodum latentium morborum, & fomes mirabilium turbarum ægros & medicos vexantium. Dolores adfunt nunc circa dorsum & lumbos, nunc in abdomine & circa umbilicum, tormina inferentes, lenti tamen & omnes & diuturni, subinde cum febricula erratica; dolores subinde per intervalla recurrunt.

(*Abscessus.*) Art. 264. Quando apostema suppuratum rumpatur, horror insignis, interdum rigor quatit ægrum, cum superveniente æstu non raro insigni, quem puris præsertim per alvum excretio successive comitatur.

(*Diagnosis.*) Art. 265. Corpus sensim emaciatur; respiratio evadit difficilior; & subinde aliquid molesti, quod ipsi ægri satis explicare nequeunt, in profundo abdominis circa & infra umbilicum persentire affirmant, flatulentia ægros vexare solent. Sæpe multis annis affligunt hujusmodi tumores, in *scirrposos* & *strumosos* abeuntes.

(*Curatio.*) Art. 266. Curantur hæc pathemata Mesenterii, cum diuturniores fiunt: ut alii chronici affectus, *cachectici* & *hypochondriaci*; tractandi sunt tamen caute & sine violentia. Convenit externe *empl. de cicuta cum ammoniaco*, de ranis cum mercurio, &c. Interne *deobstruentia*, *millepedes*, *remedia ad strumas*, &c. Apertio venarum hæmorrhoidalium per *hirudines*; *purgantia* sunt nociva, *enemata* utilissima.

INFLAMMATIO PANCREATIS.

Ettmulleri Sententia.

(*Inflammatio Pancreatis.*) Art. 267. Inflammatio Pancreatis est affectus perquam occultus, vigilias, lipothymias, aliaque gravia symptomata inferens in *abscessu* plerumque terminans. Interdum superveniente salutari *fluxu cruento* curantur hi morbi.

INFLAMMATIO HEPATIS.

Ettmulleri Sententia.

(*Hepatitis.*) Art. 268. Inflammatio Hepatis & ejusdem abscessus vocatur alias Hepatitis. In genere percipitur in omni Hepatis inflammatione dolor obscurus & tensivus ac gravativus in dextro hypochondrio & ejus profundo, qui sub suppuratione punctorius plus minus evadere solet; adest febris lenta, plus minus vero acuta pro ratione gradus inflammationis; ægri fere supini jacent, præsertim si diaphragma afficiatur, & tussis arida affligit. In genere in *pleuritide vera* omnia symptomata sunt acerbiora, in *hepatitide remissiora*. Periculosum est malum, & quod sæpius ad mortem deducit ægros; aut discutitur, aut successive suppuratur, aut in *scirrbum* degenerat; *abscessus* nunc per alvum, nunc per urinam, interdum per tussim expurgatur; *singultus* est pessimum signum. (259.)

(*Curatio.*) Art. 269. Convenit *venæsectio* in pede, profunt *sudorifera*, & *antipleuritica*, *antibædicum Poterii*, *sperma ceti*, *mitrata*, *saturina*, *camphorata* & circa finem *diuretica*, externe *epithemata penetrantia* & *discutientia*, postremo *suppurantia*, rupto abscessu *vulneraria* & *balsamica* interne.

(*Phthisis sequi solet.*) Art. 270. Omnibus inflammationibus internis
sup-

suppuratis & male curatis supervenire solet *phthisis*. De *hepatitide* præ omnibus consulatur *Boerhaave*.

INFLAMMATIO LIENIS.

Etmulleri sententia.

(*Inflammatio Lienis.*) Art. 271. In inflammatione *Lienis* eadem fere sunt symptomata in sinistro hypochondrio, ac in inflammatione *hepatis* in dextro; ideoque diagnosis, prognosis & cura fere eadem sunt.

C A P. III.

Sive Fasciculus Morborum tertius.

DE AFFECTIBUS CAPITIS ET NERVORUM IN GENERE.

Proæmium. **C**larissimus noster Sydenhamus a quodam interrogatus, quamobrem non de morbis Capitis, æque ac de aliis, scripserat, summa modestia ac candore respondere dicitur, *quoniam illos nondum intellexi*. Et equidem agnoscendum est scientiam nostram in hac regione valde mancā ac imperfectā esse; utcunque tamen in hunc oceanum propemodum ignotum descendendum est, & a juvenum & lædentium contemplatione, quoquomodo possumus, cursus natura & experientia ducibus dirigendus est.

Cheynei de natura fibræ epitome.

(*Origo morborum chronicorum.*) Art. 273. Diuturnorum morborum origines in genere sunt tres. 1. *Humorum lentor sive tenacitas*. 2. *Eorumdem acor & acrimonia*. 3. *Deperdita aut saltem imminuta fibrarum tensio sive elasticitas*. Omnes Nervorum morbi ab infimo oscitatione nempe & pandiculatione ad usque summum, nempe apoplecticam dispositionem, varii tantum videntur gradus unius ejusdemque morbi, *debilitatis scilicet, aut relaxationis defectusque elasticæ facultatis partium solidarum*, quorum causæ sunt, eaque comitantur *lentor & acrimonia humorum*.

(*Natura morborum Nervinorum.*) Art. 274. Morborum Nervinorum tria sunt genera. Primum est eorum, quorum symptoma præcipuum est *facultatis sentiendi debilitas temporaria aut perpetua, vel totalis ejusdem cessatio*, quam sequitur motus voluntarii suspensio; hujusmodi morbi ab humorum lentorum & viscosorum copia nimia tanquam causa principali oriri videntur. Multi sunt hujus generis morbi ab usque gravi *apoplexia*, qua omnium simul nervorum origo comprimitur, omniumque vibratio, ne ad animæ sentientis sedem propagetur, intercipitur, ad sensuum ingeniique hebetudinem & stuporem. Huc etiam aliquaenus referenda sunt *hypochondriacorum & hystericarum deliquia & paroxysmi*. Secundum est eorum, quorum præcipuum symptoma est *motus voluntarius aut impeditus aut abolitus*; tales sunt morbi generis paralytici, a paralyfi universali usque ad segnitiam, & inexpeditum inhabilemque artuum motum, membrorumque frigiditatem; atque hi fibrarum & nervorum & præcipue muscularium debilitati, imbecillitati, aut tono amisso deberi videntur. Tertium denique eo-

rum est, quorum præcipua symptomata sunt *spasmi*, *contractiones*, & *convulsiones musculorum*: tales sunt morbi convulsivi dicti ab epilepsia, & convulsione, hypochondriacis & hysteris paroxysmis, usque ad oscitatum & pandiculationem: & hi in universum aciori stimulo debentur, quorum origo est falsa quædam & erodens acrimonia fluidorum, acida præterea & stimulans aura, vapor, aut obstructa perspiratio. Hæc Nervinorum morborum per genera sua distributio maxime naturalis, & latissime patens videtur. Fibrarum infirmitati indivulsus comes adhæret, & pro ejus gradu minor majorve est omnium functionum animalium *languor* & *debilitas*.

(*Indicationes Curativæ.*) Art. 275. Ex prædictis patet tres indicationes sive intentiones curativas oriri; scilicet, prima est *diluvare*, *attenuare*, eorumque *lentorem tollere*, & *canales obstructos aperire* & *meabiles efficere*. Secunda est *humorum acrimoniam tollere*, *molecularum nexus dissolvere* & *spicula frangere*. Ultima denique & præcipua intentio est *solidis partibus tonum suum & vim elasticam reddere*. Huic enim ultimæ intentioni assequendæ minime allaborandum est, antequam duabus prioribus felicem operam tamdiu dederimus quamdiu id postulare videtur morbi indoles. Quamdiu enim humorum lentor aut acrimonia manet, frustra, aut si succedat, magni agri damno fibræ corrugantur, & intenduntur, & profecto hoc monitum est maximi momenti. Præmissis universalibus, primæ intentioni satisfaciunt quæcunque particularum pondere, agilitate, aut quavis proprietate, succis crassis, viscidis, lentis, incidendis, attenuandis & fluidis reddendis idonea inveniuntur. Talia sunt *calomelas*, *æthiops mineralis*, *cinnab. antimonii* & *nativ. antimonium diaphoreticum bezoardicum minerale* & *Joviale*, *sal Jovis*, *succi antiscorbutici*, *vina* & *cerevisiæ medicat. decoct. e lign.* &c. Inter ea primum locum tribuo *cinnab. antimonii*, quæ scilicet ex omnibus una ventriculo minime molesta est, nec ita facile torminibus intestina excruciat, aut catharsin ciet, præcipue recens & arteficiose elaborata. Ipse ego maximas ejus vires sæpe miratus sum, cum, nullo alio medicamento simul adhibito, laudum ejus vel minima pars communis esse posset.

Ad finem secunda intentione propositum assequendum, mirabiles profecto sunt vires medicamentorum *sulphureorum*; eidem etiam proposito conducunt medicamenta *absorbentia* & *alkalina dicta*, *gummosa* et *volatilia*: diligenter interim cavendum est, ne *volatilia* intempestive nimia copia ingerantur; tunc enim humoribus haud satis dilutis, eos nimia vi agitabunt & ardorem febrilem excitabunt. In *gummosis* insignis est incidendi & attenuandi vis, *saponi æmula*, medicamentorum autem *smegmaticorum* vires in obstructionibus reserandis & *istero* speciatim domando satis notæ sunt. Sed cum eximia calefaciendi vi polleant, nunquam adhibenda sunt antequam humores satis diluti fuerint. Ultimæ denique intentioni, quæ est *fibras laxatas constringere*, remissas intendere & corrugare, sequentia accommodata sunt, *cortex Peruvian.* *cortex Eleutherii*, *viscus arboreus*, *cinnam. cassiam.* *arom.* *cort. aurant. amara* quæcunque, *catechu.* *rhabarbarum torrefactum*, *styptica*, & *ferro parata*, *aquæ chalybeatæ*; reliquis vero omnibus præstat *cortex Peruvianus*, ut a multiplici experientia per multos annos didici in omnibus laxæ fibræ morbis. *Tincturam Burgundicam* præscribere soleo.

C E P H A L A L G I A .

Celsi Sententia.

(*Descriptio morbi.*) Art. 276. In Capite interdum acutus & pestifer morbus est, quem *κεφαλαίαν* Græci vocant, cujus notæ sunt horror validus, Nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur; vel sanguinis ex naribus cursus, sicut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis, maxime circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque gravis, neque periculosa, per hominis ætatem est.

(*Curatio.*) Art. 277. In dolore, qui acutus est, & qui supra consuetudinem intenditur, convenit *venesectio*, sed nisi intolerabilis sit, supervacuum erit venam secare; satiusque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam bibere, si postero die dolor remanet, alvum ducere, sternutamenta evocare, nihil assumere, nisi aquam; sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit.

Willisii Sententia.

(*Prognosis.*) Art. 278. Si dolor capitis inveteratus & fere continuus fuerit, ut jure suspicemur eum a tumore *phlegmonode*, *erysipellate*, *scirrho*, *abscessu*, aut *vermibus* oriri, curationis spes exigua aut nulla superest. Si dolor capitis sit immanis, atque vertiginem, vomitionem, aliosque affectus aut convulsivos aut soporosos adjunctos habuerit, frequenter in *apoplexiam* lethalem, aut *epilepsiam*, *paralysin*, *cæcitatem*, *surditatem*, &c. Quum caput parte aliqua (*inquit* Lommius) aut circumcirca dolet, si pus, vel aqua vel sanguis naribus, ore, aut auribus exeat, scire licet malum solvi.

(*Curatio.*) Art. 279. Ad curationem huius morbi detractio sanguinis e venis sedalibus *hirudinum* suctu locum habet, item *aquæ mineralis cathartice*, *cremor tartari* in sero lactis solutus, *vesicatoria*, *opiata*, *infusum Coffeæ*, *fol. salviæ*, *rorismarini*, &c. instar *Theæ* epotum. *Millepedes* quoque curandis Cephalalgis pertinacibus opem sæpe egregiam præstant.

(*Post morbillos, aut variolas.*) Dolor capitis post morbillos aut variolas totidem horis a pastu accedens, præmissis universalibus, *antiscorbuticis* & *chalybeatis* curatur.

Ettmulleri Sententia.

(*Cephalalgia calida, & frigida.*) Art. 280. Cephalalgia est vel calida, prout sanguis magis fervet, tunc sensus caloris præsertim circa frontem percipitur; vel frigida, cum nihil tale occurrit, sed potius frigus sentitur, aut saltem adest gravedo capitis.

(*Per consensum.*) Ex omni Cephalalgia per consensum frequentissima est ista, quæ fit ex stomacho.

(*Habitualis.*) Cephalalgia *habitualis* inveterata est difficilis curatu, terminare solet in *vertigine*, *apoplexia*, *epilepsia*, *paralysi*, *cæcitate*, *surditate*, &c.

(*Scorbutica.*) Ex omnibus dolor capitis *scorbuticus* est contumacissimus.

(*Biliosa & Pituitosa.* Art. 281. „ Cephalalgia (*juxta* Dolæum) re-
„ de dividitur in *biliosam* & *pituitosam*; in priori casu dolor est val-
„ de acutus cum insigni ardore; particulæ biliosæ acres vel salino
„ sulphureæ in sanguine abundant;

(*Curatio.*) Ideoque adhibenda est *venesectio*, leniter *purgantia*, alia-
que

que ad temperiem sanguinis alterandam, temperandamque facientia. In cephalalgia *pituuitosa* materia peccans est crassa ac tenax, inde dolor gravativus, idest stupor mentis, segnities; hæc species *cathartica* fortiora postulat; proficua sunt decocta *lignorum*, *salia volatilia*, *cinnabarina*, *cephalica*, potus herbæ *Theæ*; si malum a stomacho debilitato trahat suum ortum, tunc conveniunt *corroborantia*, *stomachica*, *acidulæ spadenses*, &c. Ad Curam Cephalalgiae in genere apprimè conducit dosis *pil. cathartic. cum mercur. dulc. Æß. & laudan. gr. j. hor. somn. & aliquoties repetita*, item decoctum, *e lignis cum roremarin. salia volatilia, cinnabarina nativ. succinata, camphorata*, potio *Theæ (Coffee.)* In contumaci capitis dolore empl. *pl. de ranis cum mercurio* capiti raso apponi potest.

(*Hemicrania.*) Art. 282. Hemicrania (cum dolet dimidium caput) est gravissima species Cephalalgiae; præmissis universalibus experimentum est singulare cataplasma factum ex *rad. cucumeris asinini vel brion. cum verben. & absynth. &c.* Hemicraniis deploratissimis (inquit *Turner*) laborantes *Arteriotomia*, (vid. Art. 323.) aliis omnibus incassum tentatis, feliciter liberavi, idemque ab aliis præstitum novi, p. 365. vol. 1. Si dolor capitis sit in modum hemicraniæ (inquit *Chesneau*) & parvum locum occupet, etiamsi adsit febris continua, nihil applicatione *ranunculi* præstantius inveni, universalibus præmissis, dolorem ad miraculum tollit, ad hunc modum utor, derasis capillis, si sit locus pilosus, parti dolenti imponatur quodvis emplastr. adhæsivum cum foramine in medio ad amplitudinem denarii, ut in applicatione *Pyrotici* solet fieri; deinde supra foramen applicentur *folia ranunculi contusa*, multo succo *madentia*; in tenero loco & depilato duarum horarum spatio cutem aperit; in capite vero, ubi pili nascuntur, non facile aperit, sed parte in tumorem elevata dolorem sedat. Hoc unum advertendum, ut circa oculos ponatur parva quantitate propter palpebrarum & partium circumjacentium inflationes, quas gignit stupendas, nullius tamen periculi.

Baglivii sententia.

(*Dolor capitis ob nimium fibrarum sensum.*) Art. 283. sunt qui ob nimium sensum, five fibrarum ariditatem, capitis dolore laborant; in quo casu, quoniam dolor solidi vitio potius quam fluidi oritur, ad *narcotica* libenter veniendum; nam tuto applicari possunt, quoniam non aliud debent efficere, quam obtundere nimium fibrarum sensum: ter aut quater observavi dolores capitis pertinacissimos, & fere ad maniam accedentes, irritis aliis, solo *pulv. de Guttet. ad ʒj.* dato feliciter cessisse.

Farrago sententiarum.

(*Euporist.*) Art. 284. Acerrimi dolores capitis, *euporisto* sanari possunt, nempe *strophiole aqua frigida madido* collum circumdante, & cum a nativo calore incalescit linteum pro novo permutandum, unde dolor quasi excantatus desinit, & rediens eodem stratagemate elusus fugatur; (*sed temerarium est experimentum.*)

(*Arteriotomia.*) Art. 385. In hoc malo *Parisiis* nihil frequentius, quam *sectio arteriæ temporalis*; aliquando chirurgus transversim secat; idque felicius quam ubi punctum incidit, sic enim magis coeunt divisa arteriæ partes. *Trophimus, Serrier, M. Homberg.* memorat exemplum *Cephalalgiae pertinacis ac inveteratae per combustionem accidentalem curatae.*

(*Remedia Varia.*) Art. 286. Camphora in spiritu quolibet cephalico, & naribus attracta Cephalalgiam sedat, *Greenfield.*

CAP. III. *Vigiliæ nimie, &c. Morbi Sopor.* 69

Art. 287. Succus *hederæ terrestris* naribus attractus, cephalalgiam penitus aufert, *Raii hist. plant. videatur locus, p. 567.*

(*In Cephalalgia habituali.*) Art. 288. In cephalalgia habituali & pertinaci pulvis *mari syriaci* est fere specificum; dos. ʒʒ. ut ab amico medico accepi.

VIGILIÆ NIMIÆ SEU PERVIGILIUM.

Inter legendum & ex Observatione.

(*Vigiliæ nimie.*) Art. 289. Interdum est morbus solitarius sine aia evidente ægritudine; ita tamen ut nonnulli istud sine molestia singulari ferant: alii vero mox languorem & appetitum prostratum inde percipiunt; ab alio morbo fere semper pendet.

(*Prognosis.*) Art. 290. Quod caret alterna requie, durabile non est.

(*Quibus potissimum accidunt.*) Art. 291. Melancholici maniaci & similes præ aliis, molestissima patiuntur pervigilia, ita ut quidam melancholicus per quatuordecim menses fuerit vigil & insomnis; & tales, utut per longum tempus in continuis sint vigiliis, hoc malum tamen sine insigni virium debilitate perferunt.

(*Senum vigiliæ.*) Art. 292. In senum Vigiliis non *anodyna*, sed *confortantia & aromatica, analeptica ex vino dulci, &c.* sunt optima.

(*Somnus quid & ejus commoda.*) Art. 293. Somnus naturalis est status corporis, in quo imminutus est spirituum influxus, in organa externa, nempe respectu motus eorum in vigiliis, non tamen penitus abolitus est. In somno omnes secretiones excepto sudore vel insensibili perspiratione, minuuntur. Somnus moderatus ad sanitatem plurimum confert, coctiones perficiendo, & vires redintegrando.

MORBI SOPOROSI.

Inter legendum & ex observatione.

(*Morbi soporosi.*) Art. 294. Coma seu cataphora, lethargus & ca- us sunt affectus soporosi secundum magis & minus potius quam essentialiter a se invicem discrepantes; in hoc conveniunt, quod *sudorem morbosum* inducant; fiunt ut plurimum ab una eademque causa, nimirum pituita in cerebro collecta.

(*Coma.*) Art. 295. Coma est somnus profundus, a quo tamen æger excitatur, & oculos aperit, & respondet, iterumque mox profunde obdormit.

(*Lethargus,*) Art. 296. Lethargus comati similis est, sed cum febre & delirio conjunctus; lethargici (*inquit Aurelianus*) leviter sunt excitandi suis nominibus exclamati; etenim jugiter titillatu, vel impressione forti ac punctationibus hoc facere, nihil aliud erit, quam striduram asperare ob inquietudinem vexationis; blando articulorum fricamento utendum est; linguæ asperitatem vel ariditatem *spongia in- cusa aqua calida humedtemus, &c.*

(*Carus.*) Art. 297. Carus est somnus adhuc profundior sine febre, ex quo æger excitatus oculos vix aperit, & non respondet; attamen ellicatus sentit integra manente respiratione; est proximus ad *apoplexiam* gradus.

(*Curatio horum affectuum.*) Art. 298. Ex his affectibus, eorum cura, qui a febre pendent, & sunt ejusdem symptomata, in capite ac febribus recensetur; & reliqui, qui febre carent, tanquam leves

apoplexia gradus spectari possunt. Ubi morbi soporosi aliis morbis, febribus, &c. superveniunt, non temere secanda est *vena*, sed *purgatio* instituenda, & quidem in his casibus medicus magni nominis D. Radcliff. *resin. Jalap.* ℥j. ausus est exhibere successu mirabili. In *caro*, *lethargo*, aliisque soporosis morbis *acetum naribus insufflatum* plus excitat quam spiritus quilibet volatilissimus Alkalinus.

(*Coma vigil.*) Art. 299. Coma vigil est, quando adest quoad externa sensuum organa somnolentia summa, quoad interna perpetuæ vigiliæ; æger clausis oculis permanet, & somnum capere videtur, attamen dormire nequit, variis imaginibus & deliramentis impeditur; raro est morbus *solitarius*, sed potius *symptoma* febricitantium; signum esse solet imminentis *Phrenitidis*.

V E R T I G O.

Willisi sententia.

(*Vertigo.*) Art. 300. Vertigo est affectio, in qua objecta visibilia circumrotari videntur, sentiuntque affecti perturbationem seu confusionem spirituum animalium in cerebro, ut in nervos non rite influant: quare facultates visivæ & locomotivæ sæpe aliquatenus vacillant, ut laborantes corriuant, & non raro a tenebris obfuscentur.

(*Prognosis.*) Art. 301. Quoad morbi hujus sedem notabile discrimen occurrit; frequenter enim *anterius* consistit, & vix omnino *caduca* est, & *therapiam* admittit; quandoque aut *posterius* orta longe periculosior existit, & non raro in *apoplexiam* vel *paralyin*, aut in morbum *convulsivum* transit.

(*Curatio singularis.*) Art. 302. Pro Vertiginoso post alia incassum tentata hunc in modum præscripsi; 2℥. pulv. rad. *peon. mar.* ℥ij. *flor. ejusd.* ℥j. *sterc. pavonis albiss.* ℥ss. *sacchar. albiss.* ℥ij. dos. circiter coch. j. bis in die superbibendo haust. decoct. *salviæ* aut *rorismarini*, *Coffee tinctura* imprægnati; vix credibile est quantum ab hoc remedio juvamen recepit, post mensem sanus evasit.

Ettmulleri sententia.

(*Tres gradus hujus morbi.*) Art. 303. Vertigo a vertendo; omnia enim in hoc affectu circumrotari videntur; attamen non semper adest talis circumgyratio; sufficit enim motus tremulus & undulatorius. Tres sunt gradus, 1. *vertigo simplex*, quando fit saltim circumgyratio subito evanescens. 2. *Vertigo tenebrosa* seu *scotomia*, quando oculi caligine obfcurentur, aut appareant coram oculis varii colores. 3. *Vertigo caduca*, quando æger protinus concidat, atque hæc ad *epilepsiam* quam proxime accedit. (375.)

(*Eventus.*) Art. 304. Dum res externæ gyrari videntur, hoc fit in oculo non in cerebro, non enim in cerebro videmus. (de *Ætiologia* hujus morbi ex tunicae retinæ dimotione videatur *Bellini*) Vertigo gravior & diuturnior ut plurimum in senibus *apoplexiam*, in junioribus *epilepsiam* prænunciat; modo *anteriori* modo *posteriorem* capiti partem affligit; illa est curabilior, hæc periculosior.

(*Curatio.*) Art. 305. Vertigo frequenter fit per *consensum* a vicio stomachi, vel primarum viarum; in hoc casu convenit *vomitiorum* remedia *stomachica specifica*, *antepileptica*, &c. Pro cathartico extra *stom* *bellebori nigri* & *mercurius dulcis*; convenit *venesectio* in plethoricis; *sternutatoria* sunt præcipue vitanda. Præmissis ergo præmittendis ad *stomachica* & *specificis* deveniendum est, *semen snap.* omni mane come-

comestum est egregium, item aromatica, confectio alkerm. cinnab. an-
timon. radix pæon. flores lilior. convul. salvia, rosmarinus, stercus pavo-
nis est specificum nobile; cinnab. nativ. spiritus & salia volat. succi-
nata, &c. laudantur.

Mayernii sententia.

(*Methodus medendi.*) Art. 306. Methodus medendi in vertigine hoc
modo se habet; si adsit plethora, sanguis mittendus est; post *venæ-*
sectionem, (si necessaria sit) præsentibus nausea vel appetitu pro-
strato, vel aliis affecti ventriculi indiciis *emeticum* propinandum est:
deinde *purgatio* per sedem instituenda, & postea *specificæ* exhibenda.
Calamus aromaticus quocunque modo sumptus ad vertiginem valet,
imo pro secreto habetur. Medicus quidam Germanus multos vertigi-
nosos curavit pil. sequent. per plures dies exhibit. (si recte coniectu-
ram faciam vide locum p. 25.) 2℥. sacchar. Saturni q. v. tereb. Cypr.
q. s. f. pil. dosis una gr. iv. vel v. pendens. D. Glisson Cantabrigiensis me-
dicinæ professor, gravi vertigine per tres septimanas conflictatus, irri-
tis aliis remediis, vertici raso apposuit empl. ex flor. sulph. & alb.
ovorum, a quo sanatus est, ut ipse retulit D. Bate. *Pyroticum* vel *se-*
racetum applicetur posteriori collo: *cauterium* bregmati post omnia,
Eleutherium epileptic. Batean. elect. Peruv. epileptic. Fulleri.

A P O P L E X I A.

(*Definitio.*) Art. 307., Apoplexia est repentina suspensio omnis
sensationis, & privatio motus totius corporis excepto cordis & pe-
ctoris, quæ frequentius motu solito fortiori ac violentiori aguntur.,

Cælii Aureliani sententia.

(*Apoplexiæ signa præsagientia.*) Art. 308. Apoplexia ita dicitur,
quod tanquam ex lethali percussu repentinum faciat casum. Signa præ-
sagientia aliquando nulla; interdum vero gravedo, vel dolor capitis,
aut vertigo, aut aurium tinnitus, in solitos usus difficilis motus, vul-
tus inæstus, saltus membrorum, præcipue labrorum, tremula locu-
tio, oblivio mox dictorum, vultus plenitudo, sed hæc symptomata
sunt etiam communia in *epilepsiam* vel *maniam* venturis., Torpo-
res & stupores (inquit Hippocrates coac.) præter consuetudinem
advenientes, futuram *apoplexiam* vel *paralyzin* denuntiant.

(*Paroxysmus.*) Art. 309. In paroxysmo ægri voce privantur, men-
te capti repente cadunt, immoti, respiratione & pulsu tantum super-
stitibus, color plumbeus, atque involuntaria illacrymatio; crescente
morbo, vultus adductio, ita ut longior nota videatur imago, præcor-
diorum prominentia, & totius corporis frigidus torpor, pectoris stridor,
& superiorum partium sudores frigidi.

Boerhaavii sententia.

(*Causæ frequentiores.*) Art. 310. Causæ Apoplexiæ frequentiores
sunt, 1. Polyposæ sanguinis concretionēs. 2. Spissitudo inflammatoria
cruroris. 3. Crassa, glutinosa, pituitosa, iners totius sanguinis natura.
4. Simplex plethora vasorum a quacunque causa. 5. Tumores intra
cranium nati (quibus addi possunt sanguinis vel seri extravasationes
ex contusionibus vel concussionibus vi externa impressis, & innumera
aliæ causæ latentes.)

(*Divisio Apoplexiæ.*) Art. 311. Divisio apoplexiæ in sanguineam &
pituitosam est utilis, sed non perfecta divisio; quum & serosa, & a-
trabiliaria, & polyposa sit, & alia.

(*Prognosis.*) Art. 312. Lenis apoplexia solvitur superveniente sudo-

re multo calido, æquabili, urina multa, crassa; hæmorrhoidum, mensium vel alvi fluxu, vel febre magna. Paulo gravior solet mutari in *paralyfin* alicujus partis musculosæ; totius lateris unius, unde *hemiplegia*, vel omnium partium infra caput; unde *paraplegia*, quæ raro curatur, semperque memoriæ, judicii, motuumque læsiones relinquit. Exquisita apoplexia in mortem cito finitur, raro septimum diem excurrens.

(*Curatio varia.*) Art. 313. Curatio varianda est pro ratione causarum; si a causa frigida, pituitosa oriatur, conandum est statim, ut pressio lentoris glutinosi a capite avertatur per derivationes in alia & opposita loca, & per *evacuationes universales*, in usum veniunt *vesicantia*, *caustica*, *frictiones*, *ligaturæ*, *apophlegmatismi*, *sternutatoria*, acerrimi usurpandi *stimuli* quicunque, *vomitoria*, *purgantia valida*, *clysmata acria*; ut sequens, 2℥. Pulv. colocynth. ʒ℥. fol. tabac. ʒi℥. coq. in aq. font. q. s. ad ʒx. admisce sal. gem. ʒij. f. enema. In usu tamen horum omnium augetur sæpe malum materie magis mota & impacta, viribus tamen mox projiciendis per *evacuantia*: hinc in concilianda dissolutione semper *evacuationi* & *avulsioni* studendum, quantum res pati queat; inde regula (*Hippocratis*) *venæsectio*, ni juvet, occidit (& *Celsi* occidit vel liberat.) Si vero a causa calida oriatur, & morbus inflammatorius videatur, tum illico mittatur sanguis magna copia ex *venis jugularibus*, & repetatur pro re nata, unde, si morbus sit sanabilis, levamen accipiet; diarrhoea omni arte obtinebatur; *diluentia*, *attenuantia*, & *diuretica* ingerantur; detineatur æger, quantum fieri potest, e lecto, saltem a decubitu declivi. De reliquis lector ipse consulat auctorem.

Ettmulleri sententia.

(*Hujus affectus prodromi.*) Art. 314. Signa Apoplexiæ aliquando probabiliter futuræ sunt dolor capitis, vertigo, tumor carotidum, memoriæ debilitas, spontaneæ oculorum illacrymationes; scotomiæ, incubus, vocis tarditas & hæsitantia, oris distortionem, dentium stridores in somno, stupor frequens brachii aut pedis, aut etiam refrigeratio extremarum partium.

(*Paroxysmus.*) Art. 315. In hoc affectu omnes functiones animales subito cessant, homo quasi fulmine perculsus & attonitus in terram jacet, sine motu (hinc dicitur morbus *attonitus* & *sideratus*) respiratione ipsa plus minus imminuta cum vel sine stertore, pulsu adhuc nonnihil vegeto, & per quam duro, in casu admodum periculoso, ubi deficit, color faciei & oculorum ut plurimum rubet, facies tumida; æger profunde dormit, & nequit suscitari; interdum resolvitur vesicæ & ani sphincter; supervenit tandem spuma circa os.

(*Hemiplegia.*) Art. 316. Hemiplegia seu hemiplexia est quando solummodo dimidium capitis & reliqui corporis afficitur (*more Apoplexiæ.*)

(*Apoplexiæ causæ.*) Art. 317. Apoplexiæ causæ proximæ sunt vel impeditus spirituum animalium motus in cerebro, vel impeditus sanguinis circulus per cerebrum; Venus nimia potissimum in senibus ad Apoplexiam multum disponit; ut & animi affectus graviores, ira, &c. Contusiones & concussiones capitis, scabies retropulsa, vapores mercuriales, gas seu halitus carbonum.

(*Est morbus hæreditarius.*) Art. 318. Apoplexia est morbus admodum hæreditarius; omnes, qui Apoplexia moriuntur, suffocati intereunt

tereunt, unde quo *liberior est respiratio*, eo major est spes salutis, & contra; spuma circa os est fere semper signum lethale.

(*Curatio.*) Art. 319. *Barbette* in curanda Apoplexia *inunctionem mercurialem* commendat, metus est de vomitu exhibendo, ne suffocatio acceleretur, quod non paucos medicos deterret. In Apoplexia *sanguinea* venæsectio est necessaria, in *pituitosa* omittenda, quoniam nociva est, sed potius exhibendum est *vomitatorium antimoniale*; æger non debet in lecto decumbere, sed erectus sedere; *enemata acriora* sunt injicienda parata ex *lavend. rut. majoran. nicotian. rad. pyreth. irid. nostr. vin. benedict. sal. gem. pulp. colocynth. in petia ligat. &c.* In ipso paroxysmo non neglectis universalibus conducunt *salia volatilia*, *sudorifera*, speciatim *aurum diaphoret.* Poterii, *cinnabarina*, *species diamb. confect. alkerim. sudorifera ex lignis* declinante paroxysmo aliquandiu continuata sunt maxime proficua.

(*Prophylaxis.*) Art. 320. Pro præservatione, præmissis rite universalibus præ reliquis multum laudatur frequens *salviæ* usus quocunque modo; in *cubebis*, *cardamomo*, *sem. sinap. & erucæ* singulares latent vires maxime in senibus in forma pulv. vel aliter in vehiculo appropriato assumptis. „ Item *fonticuli inter scapulares* hodierno usu comprobantur. „

Colei sententia.

(*Causa Apoplexiæ singularis.*) Art. 321. Auctor putat acerbum frigus & gelu diutinum anno 1683. numerum *apoplecticorum* annis succedentibus adauxisse.

Art. 322. Potio infusionis *rorismarini*, *salviæ beton. lilior. convul. &c.* instar *theæ*, item *Coffee*, & *sumisuctio nicotianæ* ad præcavendam Apoplexiam laudantur; *balsalma odorifera*, *Apoplectica dicta*, & usus *ptarmicorum* inordinatus damnantur.

(*De larga sanguinis missione.*) Sanguinem detrahit manu maxime liberali ad uncias scilicet, 30. 40. 50. imo 60. hancque praxin non modo ex propria experientia stabilire satagit, sed etiam auctoritate celeberrimi D. *Giabons*, neque in junioribus tantum, verum etiam in ætate provectioribus injungit; & instantiam profert cujusdam annum 77. agentis, a quo sanguinis inter 20. & 30. uncias detraxit, & tantundem alia vice intra ejusdem septimanæ spatium ob *vertiginem* aliqualem superstitem.

Catherwoodii sententia.

(*Arteriotomia.*) Art. 323. Auctor pro virili conatur, & nullum non movet lapidem *arteriotomiam* introducere tanquam *phlebotomia* longe præstantiorem in hoc morbo curando; locum designat in arteria temporali, operationemque neque difficilem esse, neque periculosa affert; accurate digitis detinenda est arteria, ne subvolutet, & vulnus infligendum est non punctura, sed per incisionem cum dextra mucronis lanceolæ elevatione; detracta sufficiente sanguinis quantitate, premendum est vulneris orificium in os temporale cum digito maximo, quo *trrhombus*, si accadat, cito dissipabitur, & fere momento temporis fluxus sistetur.

(*Cui commodo adhibeatur ista praxis, dubitatur.*) Art. 334. „ Verum „ enimvero mihi videtur author noster meras umbras consectari, ut „ *Hercules stramineus* appareat, novam crepat methodum; sed quomodo „ stabilitur hæc praxis? Inter paucas, quas adducit hoc affectu „ laborantium, historias, unicam tantum per *arteriotomiam* curati affert; sed de his non libet morari. Utcunque vero res se habeat, minime futurum videtur (ut recte admonet D. *Freind*) ut nostri „ quam homines huic medicinæ generi assuescant.

Farrago sententiarum.

Inter legendum & ex observatione.

(*Varias mortis causas detexit anatomia defunctorum.*) Art. 325. In paroxysmo Apoplectico intumescunt venæ jugulares, necnon pulmonum, quæ non raro rumpuntur in Apoplexia demortuis. In defunctorum cadaveribus sæpissime repertum est *serum viscidum* in cerebri ventriculis, aliquando *sanguinis* ingens copia in sinibus, aliquando *tumores* ad pugni magnitudinem juxta conarium inter cerebrum, & cerebellum; talis (observante Drelincurtio) semestri spatio primo *cæcitatem*, dein *surditatem*, subinde sensuum omnium *abolitionem*, & postremo *necent* intulit. In cerebro Apoplexia mortui (inquit Cheselden) observavi universa vasa sanguifera plurimum distenta, ventriculos ipsamque cerebri substantiam lymphâ supra modum abundantes, & duram meningem magnopere incrassatam, &c. Vomitoria (inquit Doleus) experientia teste, quicquid reclamet Sylvius, divinam afferunt opem. „ Nul-
„ lum est potentius remedium vino emetico in omni soporoso affectu,
„ dos. ℥iſſ. vel ℥ij. per os, ℥iij. vel iv. in enemate. Si injecta ene-
„ mata præter rationem moram faciunt, sollicitanda est dejectio acri-
„ bus suppositoriis, speciatim incidatur frustulum saponis Venet. in
„ formam Glandis. „ Venesectionem in omni Apoplexia, & in omni
„ ætate, & in summa quidem senectute admittimus; timidis, loco hu-
„ jus, hirudines vel cucurbitulas concedimus.

(*Pulsus fortis sæpe decipit inexpertos.*) Art. 326. Rodius observavit, quod in omnibus affectibus comatosi, præcipue lethargo, & Apoplexia, pulsus dum ex parvo fiebat magnus, & sensum in magnitudinem crescebat, ægrotantes brevi moriebantur; pulsus etenim in hoc affectu est ut plurimum fortis & plenus, quod multos decipit.

(*Nota bene.*) Art. 327. Apoplexia demortui ante triduum non sunt sepeliendi, quia omnes humores intra illud spatium moventur, & nonnulli ante illud tempus revixisse observati sunt. Barbette. Lintimentum sequens ut specificum in lethargo & Apoplexia habetur; 2℔. el. succin. spic. castor. ana ℥ij. flor. hyperic. succ. rut. express. ana ℥iij. m. illinatur cervix, &c. Idem summum & fere unicum remedium in Apoplexia sunt cucurbitæ capiti impositæ. Riverius; Zacutus Lusitanus, &c. Cum morbi vis maxima est, admoveatur cauterium actuale inter primam & secundam nuchæ vertebra.

(*Remedia varia.*) Art. 328. Remedia sequentia interdum pro re nata in usum adduci possunt: antimonium diaphoret. antihæcticum Poterii, aurum fulminans, aurum Mosaicum, cataplasma suppedale, cataplasma de hælecibus, elaterium, elect. antiapoplecticum, emplast. cephalicum, elixir præon. Mynsicht. enema acre, enema apoplecticum, ens Veneris, flores salis armoniac. martiati, gargarisma ad pituitam, infusum cephalicum, pil. volat. sternutatoria omnia (flores Benzoin. aliis ptarmicis adjecti illa multo efficaciora reddunt) pulv. ad guttetam, tinctura epileptica, vinum benedictum, &c.

HEMIPLEGIA, PARAPLEGIA, SEU PARAPLEXIA.

Etmulleri sententia.

(*Ratio nominum.*) Art. 329. Paraplegia seu paraplexia, & apoplexia particularis, in altero tantum latere hemiplegia nominantur. Interdum afficitur totum corpus, excepto capite, ex obstructione spinalis medullæ; fre-

CAP. III. Hemiplegia, & Paraplegia, &c. 75

frequentius est morbus *secundarius*, interdum vero *primarius*; sensus vel motus vel alteruterque totaliter abolentur, vel multum imminuuntur.

(*Paraplegia ab apoplexia differt.*) Art. 330. Paraplegia, quæ *apoplexiam*, aliosque morbos immediate sequuntur, vulgo *paralysis* vocantur, sed *paralysis* est longe alius affectus, ut infra manifestum erit. (332.)

(*Curatio.*) Art. 331. Vomitus in omni paraplexia convenit & purgatio ad primarum viarum emundationem; venesectio convenit in plethoricis; proximo loco *sudorifera* valde conducunt, cum specificis interspersis, decoctum *sassafr.* cum *rosmarino* & *bacc. juniperi*; aliquando datur *aurum fulminans* ad gr. iij. vel iv. de reliquis internis medicamentis vide *apoplexiam* & *paralysin*; balnea ex *formicis* revera singulare quid obtinent in *paraplegiis* curandis.

P A R A L Y S I S & P A R E S I S.

Ettmulleri sententia.

(*Paralysis & Paresis.*) Art. 332. Paralysis est gravior, & paresis levior affectus; paralysis est resolutio & relaxatio ligamentorum & membranarum motui inservientium, non ab obstructis nervis proveniens, sed a mera membranacearum & nervearum partium resolutione, & sic a *paraplegia* distinguitur, quæ ab obstructione nervorum exoritur; hæc sequitur *apoplexiam*, *epilepsiam*, *convulsiones*, *vertigines*, &c. qui affectus in se mutuo sunt permutabiles, & plerumque desinunt in *paraplegiam*: Illa vero sequitur alios morbos longe diversos, viz. *scorbutum*, *malum hypochondriacum*, *colicam*, & frequentior est in regionibus ubi vino & spiritibus indulgent; aut oritur etiam subinde a causis externis, ex fumis metallicis, &c.

(*Curatio difficilis.*) Art. 333. Paralysis cæteris paribus facilius curatur quam *paraplegia*, quæ plerumque omnem medici operam eludit; motus saltem amissus, superstiti sensu restituitur; tremor superveniens est bonum signum recuperandi motum. „ Atrophia vero aut „ frigiditas pessime ominatur. „

(*Curatio.*) Art. 334. Purgatio lenis tantum institui debet cum *mercurio dulci* & extracto *bellebore*, specie diaturb. cum *rhabarbore*, *pil. scitid.* &c. & postea *sudorifera*, remedia *apoplectica*, & *epileptica*, *viperina*, *succinata*, *lumbricalia*, ex *milleped.* & *formicis* parata, *antimonialia*, *martialia*, *bezardica*, *aurum diaphoreticum*, *antiscorbutica*, & *specifica* in sero lactis cocta quando a dolore colico ortum ducit; & externe pro abdomine illinendo *galbanetum Paracelsi*. *Galbanetum Sennerii* est præstantius medicamentum. Vid. *Pharm. Batean.* In genere unctionio membri resoluti est maximi usus, expertus loquor. Thermae naturales, balnea ex *formicis* parata, unguentum *martiatum*, *nervinum*, *paralyticum*, &c.

Willisi sententia.

(*Definitio paralyseos.*) Art. 335. Paralysis est partium nervosarum a debita distentione resolutio, sive relaxatio; cujus ratione motus & sensus, nempe aut alter tantum, aut simul uterque, in toto corpore, vel in quibusdam partibus, debito more exerceri nequit.

(*Unde proveniat.*) Art. 336. Mentis hebetudo, oblitio & stupiditas, frequenter in paralysin mutantur. Paralysis aliis affectibus frequentius supervenit; quales præcipui sunt *cæcus*, *apoplexia*, *scorbutus*, *convulsio*, *colica*, *arthritis*, &c.

(Dis-

(*Difficile curatur.*) Art. 337. Paralysis ab apoplexia, caro, convulsione, colica, aliisque cerebri, aut systematis nervosi affectibus superveniens, si non brevi tempore in melius alteretur, aut medicamentis cedat, plerumque insanabilis perstat; hominibus provectæ ætatis, cacochymicis, valde scorbuticis, aut intemperatis accidens, atsi affectus haud immanis fuerit, difficile tamen curatur.

(*Curatio.*) Art. 338. Phlebotomia passim non omnibus convenit; & si hanc vetamus, non tamen ob eandem cum veteribus rationem, supponendo paralyin esse morbum frigidum; præmissis universalibus, viz. vomitorio & catharsi, cerevisia medicata parari potest ex *salvia baton. stæch. ling. sassifr. cortic. Winter. &c.* Quidam paralytici sunt frigidi, alii calidiores ex constitutione, ideoque remedia debent esse diversi generis, ut in ipso scorbuto evenire solet. Remedia in hoc affectu insigniora sunt *viperina, pulv. rad. serpent. virgin. gum. guaiac. tinct. succin. sp. C.C. succinat. pulv. ari comp. chalybeata, antiscorbutica omnia*, præcipue succi antiscorbutici cum aqua raphan. aurantiis, &c. Externe fots, linimenta, cucurbitule, vesicatoria, urticationes, item immissio membri resoluti in grana hordei post cerevisiam subductam, vel intra ventrem vel thoracem bestie recens mactatæ, aut denique balneum artificiale vel naturale. His non succurrentibus proveniendum erit ad remedia magna, viz. diaphoretica, salivantia, vomitoria fortiora, &c. sudorifica usitatoria sunt decoctum guaiac. spiritus & oleum ejusdem, mistura simplex, flores & spiritus salis armoniac. aurum diaphoreticum, sal viper. bezoar. min. tinct. antimon. &c. Nullum datur præstantius remedium quam thermæ nostræ Bathonienses; quosdam tamen deterius reddunt. „ Pro pauperibus & nimis procul a Bathonia „ degentibus Thermæ artificiales ad imitationem naturalium ad hunc „ modum fieri possunt: ℞. calc. viv. ℥iv. sulph. viv. pulv. ℥ij. „ coq. paulisper in aq. commun. cong. xx. vel. xxx. pro semicupio. „ „ Inter legendum & ex Observatione.

(*Causa paralyseos.*) Art. 339. A spirituum inopia fit paralysis, ut in senectute valetudinaria, post immodica sanguinis, liquoris genitalis, &c. dispendia, e sanguine enim effuso pauci spiritus in cerebro procreantur.

(*Papillæ cutaneæ tactus organum.*) Art. 340. Credibile est papillas cutaneas esse tactus organum, ideoque hic ratio reddi potest, cur superstitite motu sensus potest aboleri, viz. quia motus per nervos fit, sensus per papillas hæce.

(*Remedium ex formicis & ex semin. sinap.*) Artic. 341. Ad membra paralytica plurimum valent fomentationes quotidianæ ex formicis & earum cubilibus in aq. font. coct. interdum præsentaneam opem & firmum constansque robur partibus affectis afferunt; eodem tempore usurpetur oleum sequens, ℞. sem. sinap. parum contus. q. v. sp. lavend. q. s. ut madescat; infunde frigide per horas 24. deinde oleum prælo exprimatur, cum quo inunge cervicis vertebrae & spinam dorsi & etiam partes affectas. Nihil potentius est in affectibus paralyticis (inquit Chesneau experientia teste) ad discutiendum humorem aliquem in vertebrae lumborum vel in musculis concretum, quam oleum Philosophorum, & oleum terebinthinæ, quod secundo exit post spiritum aureique est coloris. Si membrum paralyticum extenuetur, vix aut ne vix quidem restituitur.

(*Vires terebinthinæ e Chio.*) Art. 342. D. Harris in observationibus de morbis gravioribus asserit terebinthinam e Chio in hoc affectu vires plane admirandas obtinere; atque hunc in modum præscribit, ℞. tereb. e Chio ℥ij. solve in vitel. ov. immiscendo syr. de stæchad.

℥j. aq. lact. alex. ℥iv. m. f. haust. singulis auroris capiend. ad quartam vicem. Addit præterea se dedisse tereb. venet. ℥vj. vel. ℥j. in haust. similiter dissolut. non modo in *paralyfi*, verum & in *arthritide*, & in *rheumatif.* cum optimo successu.

(*Paralysis.*) Art. 343. Larynx, pharynx, & gula quandoque Paralyfin patiuntur.

(*Laryngis.*) Paralysis *laryngis* prohibet deglutitionem liquidorum, non vero solidorum, quoniam epiglottis non perfecte claudet rimulam laryngis.

(*Pharyngis & gulæ.*) Paralysis *pharyngis* prohibet deglutitionem solidorum, non vero liquidorum. Paralysis *gulæ* omnimodam deglutitionem tollit. Interdum deglutitio læditur ex contractura spasmodica gulæ, quod hypochondriacis & scorbuticis est familiare.

(*Curatio.*) Art. 344. Epispastica sunt applicanda; antispasmodica & antiparalytica interne & externe usurpanda sunt; gargarismata & linctus in loquela amissa convenientia hic locum habent; speciatim succus *salviæ cum nuc. moschat.* castoreo frequenter & diu in ore detentus. „ Cataplasmate sequent. in praxi nostra quandoque usus sum, „ 2℥. pulp. raparum coct. ℥iv. herb. rut. contus. m. ij. sem. sinap. ℥j. „ pulp. alb. Græc. euphorb. ℥ij. sulph. viv. ℥ij. ol. suc. gr. 100. ung. „ nervin. q. s. m. f. cataplasma gulæ applicandum. „

(*Paralysis linguae.*) Art. 345. In paralyfi linguae solus succus *salviæ* obmutescentiam solvit; sequente gargarismate felici cum successu in praxi aliquando usus sum; 2℥. Fol. *salviæ*, rorismarin. ana m. j. hyssop. puleg. ana m. ℔. sem. staphid. agr. sinap. ana. ℥℔. coq. in q. s. aq. font. ad ℔j. Colaturæ add. succ. *salviæ* depurat. ℥ij. oxymel. scilicet. aq. reg. Hungar. ana ℥j. syr. flechad. ℥iij. m. teneat coch. ij. in ore aliquandiu & deinde expuat, idque fiat frequenter in die.

Farrago sententiarum.

(*Celsi observatio.*) Art. 346. Solent, qui per omnia membra resoluti sunt, celeriter rapi; at si correpti non sunt, diutius quidem vivunt, sed raro tamen ad sanitatem perveniunt, & plerumque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa. *Celsus.*

(*Curanda, ut lues venerea.*) Art. 347. Cura hujus mali a curatione *luis Venereæ* non abludit multum, adeoque *mercurialia*, *sudorifera*, *decoct. e lign.* &c. profunt. Externe *inunctiones*, *spirituosa* & *penetrantia* non in parte affecta, sed spina dorsi; ut unguentum *nervinum*, *marriatum*, *ol. tereb. sal. volat.* &c. Item maximo cum emolumento sequens emplastrum spinæ dorsi admovetur; 2℥. Empl. de ranis cum quadruplo mercurio ℥j. camphor. ℥℔. malaxetur cum ol. succin. & fiat emplastr. *Waldschmid.*

(*Tinctura Pitcarnii.*) Art. 348. Tinctura antiepileptica *Pitcarnii* in cap. de epilepsia (385.) tradita purgantibus orba ab authore laudatur.

(*Remedia alia varia.*) Art. 349. Virtutes & usus remediorum sequentium lector ipse expendat. Cataplasma de rapis, cinnabaris antimonii, emplastrum de pyrethro, enema apoplectic. enema terebinth. fofus spirituosus, galbanetum Sennerti, guttæ Goddardianæ, infusum cephalicum, linimentum paralyticum, oleum lumbricorum (per distillationem mira præstat) pulvis ad guttetam, spiritus sanguinis, succi scorbutici, tinctura cantharidum, tinctura epileptica, unguentum ad atrophiam, unguentum salino-volatile.

C A T A L E P S I S.

(*Catalepsis* .) Art. 350. Catalepsis seu catoche, Latinis & Arabibus congelatio dicta, est affectus in quo ægri manent rigidi in eodem statu, quo prehensi fuerunt: interdum tamen nonnihil audiunt, vident, recordantur, & post narrant; si quid ori ingeratur deglutiunt, impulsu incedunt. Milites in obsidione Metensi hastam in manibus tenuerunt, equites turmam sequebantur, non minus quam non congelati.

(*Rare occurrit & rarissime curatur* .) Est morbus raro occurrens, at satis acutus, intra 3. aut. 4. ad summum dies jugulans; quandoque fit metastasis in epilepsiam, apoplexiam, vel melancholiam: in genere paucissimi restituuntur; nemo liberatur, cui secundo catochus supervenit.

Ettmulleri sententia.

(*Morbi descriptio* .) Art. 351. Catalepsis seu catoche, est affectus rarissimus, & summe mirabilis; in quo cessat omnis sensus internus, & externus, & motus, ita ut ægrorum membra rigida sint, & instar statuarum in sua positura: impulsu tamen moventur; sed tamen de novo in ista per motum acquisita figura fixa permanent. Vulgo pro *acstaticis* habentur. „ In hoc affectu (inquit *Doleus*) alvi ac urinæ fit „ suppressio; respiratio tamen integra & illæsa manet, ut & sanguinis circulatio: ægri vero immoti manent istar *Marpesiae caulis*. „

(*Curatio* .) Art. 352. „ Quoad curam, in genere ab omnibus præsticis tam veteribus quam neotericis hunc morbum ejusdem farinae medicamentis, quibus *apoplexiam* curari lectori patebit; unde jure merito *apoplexia inversa* nuncupatur. Remedia omnia profunt, quæ viscidum quodcunque incidere vel attenuare, & pro ratione occasionis evacuare valent; excellunt *salia volatilia*; conveniunt *vomitoria antimonialia, epispastica, antispasmodica, antiparalytica, &c.*

Boerhaavii sententia.

(*Causa proxima* .) Art. 353. Hujus morbi causa proxima est immobilitas sensorii communis, prout primo momento insultus se habebat. Ergo sanguinis cerebrosi, glandularum cerebri, emissariorum ejus absoluta est quies, ut in initio. Omnes quidem in eo morbo functiones cerebri læduntur, & illæ, quæ inde pendent; soli musculi sic manent tensi, ut in initio erant; cæterum respiratio & pulsus superfunt, at plerumque leves. Dissecta cadavera demonstraverunt arterias venasque cerebri valde turgentes fortiter impacto denso cruore; in morte plerumque finitur.

(*Curatio* .) Art. 354. Solvitur interdum *larga narium hæmorrhagia*; ideoque curatio tentatur hæmorrhagiæ ex naribus prolectu, hæmorrhoidalis, menstrui fluxus prolectu; sternutatoriis, vomitivis; vesicatoriis; fonticulis (interscapularibus); setaceis; victu humectante.

STUPOR SEU TORMOR, & OBDORMITIO MEMBRORUM.

(*Stupor seu Torpor* .) Art. 355. „ Stupor vel torpor in genere est „ sensus tactus vel motus, vel utriusque imbecillitas, quæ quidem „ plerumque est aliqualis paralytis scorbutica inchoata; saltem istius morbi plerumque est prodromus. Si plura simul occupet membra *hemiplegiam* aut *apoplexiam* minatur. Stupor in facie *torturam oris* portendit.

(*Obdormitio.*) Art. 356. „ Huc quoque pertinet affectus a quibusdam *obdormitio* membri unius vel plurium vocatur. Hæc *obdormitio* videtur esse affectus ex torpore & dolore aliquali simul mixtus, qualis a causa externa plerumque excitatur; compressione scilicet membri vel nervorum in eo, unde influxus spirituum animalium inhibetur, qui postea laxatis nervis copiose & subito in illud recurrunt, & subitam alterationem faciunt, quam dolor ille vel molestia sequitur. „

(*Historia singularis.*) Art. 357. „ Novi quemdam fere sexagenarium, qui *colica nervosa diuturna* laborasset, nimirum triginta plus minus annos per menses aliquot illum quotannis affligente, in hunc affectum tandem incidisse silente fere colica aut saltem leviter ac impotenter dolente, nempe in *stuporem, torporem & obdormitionem brachiorum & crurum, præcipueque manuum & tarsorum, & musculorum ocularium*. Huic imperavi *rhabarb. ʒj. vel ʒʒ.* alternis vel tertiis diebus hora aliqua antemeridiana masticare; *opobalsami purissim. gr. xx. vel xxx. in sacchar. crystal. instillat.* semel vel bis in die deglutire, *cerevisiam & spiritus ardentis omnimodis* prorsus interdixi. Porro bis tantum in die victum capere consului; jentaculum scilicet & cœnam idque ad intervallum *novem ad minimum horarum* omisso prandio; Aquam Spadensem inter cœnandum ad sitim potare loco *cerevisiæ tenuis*, vel *aq. commun.* atque ex hac methode, dum hæc scribo, melius se habere videtur. *Vires Pisselæi Indici* nondum expertus est. „

T R E M O R.

Ettmulleri sententia.

(*Tremor.*) Art. 358. Tremor est malum morbis *convulsivis* affine, in quo cum motu naturali & voluntario simul aliquid *convulsivi* concurrat; est affectus seipsum oculis prodens. Tremor supervenit animi passionibus gravioribus, speciatim iracundiæ, & crapulæ, sed hic est *accidentalis & transitorius*; metalli fossores & metalli fabri subinde tremunt; nimia Venus ad tremorem disponit; senio confecti fere semper tremore plus minus afficiuntur.

(*Prognosis.*) Art. 359. Tremor interdum periculosus est, quoniam facile degenerat in alios graviores affectus nervinos, in *paralysin, apoplexiam, lethargum, spasmodum, &c.* in senibus est incurabilis. Tremor qui supervenit mulieribus post partum ex retentis quibuscunque in utero est periculosus affectus; subinde enim *epilepsias lethales* intert. Art. 360. Tremori succurrunt omnia ea, quæ in *paralyticis, apoplecticis & convulsivis* morbis conveniunt, & quæ *nervina* dicuntur, præcipue *cerevisia salviata, proximo loco stachas Arabica, rosmarinus, melissa, majorana, radix & semen pæon. bacc. juniperi, rob. ejusdem, decoctum e lignis, aromata, castoreum, stercus pavonis, cinnabarini, &c.* Quoad externa eadem sunt ac in *convulsione tonica*, quibus addi potest usus *thermarum (psychrolusia.)*

C O N V U L S I O.

(*Convulsio ejusque divisio.*) Art. 361. Convulsio sive contractura est nervorum musculorumque versus suam originem, involuntaria & perpetua retractio, & ita distinguitur a *motibus convulsivis*, qui suas habent interpolationes: Estque vel *universalis, tetanus dictus*, qui dividitur in *emprosthotonum & opisthotonum*; vel *particularis*, quæ mem-
brum

drum quoddam vel articulum privatim respicit , hujus speciei est *spasmus cynicus* .

Schmitzii sententia .

(*Spasmus cynicus* .) Art. 362. *Spasmus cynicus* , qui est distortio utrumque latus oris obsidens (sin vero alterutrum tantum latus convellatur , *tortura oris* dicitur . *Ettmuller* .)

(*Tortura oris* .) a rictus canum ira percitorum & ad mordendum sese comparantium similitudine appellatur . Ex se turpe est malum & difficile curatu , exitialium morborum , ut *apoplexiæ* , aut *epilepsiæ* , non raro est prodromus , *Ligatura* , qua , tanquam capistro , facies ad figuram naturalem reducat .

(*Curatio* .) Medicamenta *antiparalytica* & *antispasmodica* sunt usurpanda . , Pro homine quodam octogenario sequens linimentum præscripsi , non neglectis interim appropriatis internis , quorum nunc oblitus sum ; & præter spem omnem curatus est . *℞. sapon. Venet. ℥ij. camphor. ℥ij. ol. mac. per express. aq. regin. Hungar. ana ℥℥. sp. sal. armoniac. gr. xxx. ol. junip. gr. xl. ol. castor. ℥i℥. misce.* ,

Celii Aureliani sententia .

(*Aureliani descriptio* .) Art. 363. Interdum buccas adducit in posteriorem partem tanquam ridentibus ; nunc palpebras & nares , collum etiam atque humeros rapit , & ita patientes facit commoveri tanquam onus humeris bajulantes transferendi ponderis causa (sed hæc species videtur esse *emprosthotonus* .)

Aliunde .

(*Curatio* .) Art. 364. , In hujusmodi spasms particularibus post evacuationes (si indicentur) factas , exhibenda sunt remedia *antiscorbutica* , & *antispasmodica* : Inter hæc eminent expressiones *millepedum* , *castoreum* , *elixir pæoniæ* & decoctum *guaiaci* , & ultimo ad *torpica* deveniendum est ; pars affecta , in artuum contracturis ; si fieri possit , in intima bovis aut vervecis recens cæsi immittatur , & ibi tamdiu detineatur , quamdiu animal calet ; commendantur balnea præcipue *fulphurea* , & *balsamum galbani terebinthinat. a Sennerto* . ,

Ettmulleri sententia .

(*Convulsio tonica* .) Art. 365. *Convulsio tonica* est convulsio proprie dicta , viz. quando pars convulsa rigida manet , ac metus est ne omnino contracta permaneant . In *India orientali* epidemicum malum est varii generis convulsio , de quo eleganter scribit *Bontius* .

(*Curatio* .) Art. 366. Inter universalia , *clysmata* sunt valde proficua ; remedia interna sunt *carminativa* , *cephalica* , *antiepileptica* , in pertinaciori malo decoctum e lignis : Externe *linimenta spiritosa* & *penetrantia* , speciatim *lumbrici vivi* applicati , *ol. & sp. lumbricorum camphorat. ol. succin. cum petrol. galbanetum Paracelsi cum ol. euphorb. ol. terebinth.*

Aliunde .

(*Spasmi sive motus convulsivi* .) Art. 367. *Spasmi sive motus convulsivi* sunt contractiones musculorum non constantes , sed cum interjecta aliqua quiete alternatim cessantes & celeriter redeunte ab involuntario & irregulari spirituum animalium influxu . Tales cernuntur in *epilepsia* in *passionibus hystericis* & *hypocondriacis* , aliquando in *scorbuto* , in *febris malignis* male judicatis , in *capitis vulneribus* & *contusionibus gravioribus* , &c. sed hi affectus seorsim tractantur . *Motus convulsivi sive spasmi* ab *ataxia spirituum* in summitatibus , vel originibus nervorum inordinate descendentium oriuntur . *Tensio convulsiva* solidarum par-

partium est una ex primariis causis, quæ æquilibrium destruunt inter solidas & fluidas. Jour. de Sçav.

(Unde lethales.) Art. 368. Lethalis evadit convulsio ex eo solum, quod suffocationem inducat convulsis musculis respirationi dicatis.

S I N G U L T U S.

Ettmulleri sententia.

(Singultus.) Art. 369. Singultus est motus diaphragmatis convulsivus. Sternutatio singultui superveniens illum solvit, quoniam est motus spasmodicus ei contrarius. Interdum est malum diuturnum per plures dies, menses, annos, affligens; aliquando penitus incurabilis; in quo casu occultum quoddam conformationis vitium, os ventriculi aut diaphragma, aut nervos afficiens, fere subesse solet.

(Cura.) Art. 370. Quoad curam (est morbus primarius vel secundarius, si posterior habenda est ratio morbi a quo pendet, in genere antispasmodica & stomachica sunt adhibenda) Laudanum cum cardiacis, zinzib. condit. stomachica, carminativa, præmissa vomitorio, vel purgatione cum calomel. &c. Externe cataplasma ad singultum Mynsicht. quod componitur ex fermento acri cum pulv. ment. & aliis aromat. cum ol. castor. & malaxat. Quidam cum spongia aut pane calido applicant ventriculo fotum humidum factum ex aceto cum castoreo, pibere & sinapi cocto. Interne pelliculæ internæ ventriculi gallinæ exsiccatæ & pulverisatæ. Ubi pertinacior perdurat (in morbo primario) ad septimanas aliquot in corpore robusto semper provocandus est vomitus.

(Spiritus æruginis.) Art. 371. Virgo hoc morbo laborans per longum tempus post permulta remedia incassum tentata, solo spiritu æruginis ab empirico exhibito curata fuit. Bonetus.

(Remedia varia.) Art. 372. Eruditus medicus usum remediorum sequentium probe calleat, aurum Mosaicum, cataplasma stomach. fotus spirituosus, fotus stomachicus. Et præ reliquis julap. moschatum; quod nondum hætenus novi præstantius remedium (inquit Fuller.) aliquando enim divinitus succurrit, & singultum superat. Hanc veritatem testatur praxis nostra. Diascordium larga dosi ad ℥ij. in febribus, Sydenham. (immo ad ℥iij. dari potest.)

S T E R N U T A T I O.

(Sternutatio.) Art. 373. Sternutatio est motus convulsivus musculorum expirationi inservientium & diaphragmatis; nobis invitis accidit ærumque ex acrimonia humoris e glandulis narium sponte erumpentibus; vel ptarmicis excitatur; immo aliquando ab aere frigido vel radiis solaribus.

(Cura.) Art. 374. Sternutatio nimia est morbus de genere convulsivorum; ideoque in genere eandem curam postulat; lenientia & mucilaginoso naribus attrahenda sunt; eandem fere curam admittit, ac singultus. (370.)

E P I L E P S I A.

Ettmulleri sententia.

(Epilepsia.) Art. 375. Paroxyismi epileptici sunt motus convulsivi, quibus universum corpus, aut plura membra diversimode contrahuntur, vibrantur, aut agitantur.

(*Tres sunt gradus.*) Tres sunt gradus hujus affectus ; primus parum differt a tertio gradu vertiginis (303.) In secundo gradu adsunt agitationes & gesticulationes variæ , sensibus externis ac internis perstantibus , aut in delirium abreptis , saltant , canunt , rident , flent , ridicula narrant , vociferant , pectora percutiunt ; post paroxysmum interdum omnium recordantur , interdum nihil sciunt . In tertio gradu omnis tam sensus quam rationis usus perit , ad humum prosteruntur , dentibus strident , corpus insigniter attollunt , spuma per os ejicitur , labia & linguam mordent , &c. quibus remittentibus æri tanquam sopore oppressi jacent , ad se redeuntés nihil horum sciunt , tantum de torpore , & gravitudine quadam capitis , & artuum lassitudine conqueruntur ; qui secundo gradu laborant , vulgo *pro obsessis a demone* habentur .

(*Prognosis.*) Art. 376. Imprimis *lunæ motibus* auscultat epilepsia , maxime ea quæ est *per essentiam* . Epilepsia *habitualis* interdum sine periculo vitæ ad plures annos durat , utut sæpius recurrens ægros plus minus paralyticos , delirantes , aut stupidos reddat . In junioribus aliquando circa pubertatem terminatur , post 25. annum superveniens ferè usque ad mortem durat , teste Hippocrate , sed hoc non est omnino verum . In junioribus spes est circa pùbertatis tempus .

(*Curatio.*) Art. 377. Cura inchoanda est cum vomitorio , maxime si morbus sit *per consensum* , mercurius dulcis permiscendus est cum purgantibus , quæ etiam debent esse mitiora ; laudantur absorbentia , martialia , acidula , decoct. e lignis , fonticuli ; si venæsectio celebretur , sit in talo . Inter specifica *antiepileptica* numerantur sequentia , Radix pæon. mar. flor. lilior. conval. tilia , sem. rutæ , viscus quercinum , vel potius corvulinum , lignum buxi , sp. ceras. nigr. aq. epileptic. Langii sp. sang. human. secundin. human. cranium humanum , dens hippopotami , castoreum , stercus pavonis , camphora , sal & ol. succini .

(*Quid agendum in paroxysmo.*) Art. 378. Ad excitandum ægrum & paroxysmo inflatur fumus nicotianæ (vel avium pennarum) in faucibus ; suffitus succini etiam multum confert ; conveniunt ligaturæ communicationem spasmodicam inhibentes , si , scilicet , ab extremitatibus convulsiones inchoentur .

Willisii sententia .

(*Paroxysmi descriptio.*) Art. 379. Insultus epilepticus universalis ac immanior tantum convulsio esse videtur , cujus accessio ut plurimum ex improvise aggreditur , ægrosque nihil tale cogitantes opprimit , atque ictu oculi citius , sensu & intellectu orbos , in terram præcipitat ; quippe non tam cadunt , quam cum impetu quodam prosterunt ; prostratis supervenit stridor dentium cum spumæ oris , sæpe etiam capitis concussio ; brachia & crura , necnon cervix & dorsum , aut statim rigida fiunt , aut variis flexionibus distorquentur , plerisque præcordia & hypochondria & venter intumescunt , post aliquod tempus ad se redeunt , superstitute dolore capitis & hebetudine .

(*Curatio.*) Art. 380. Est morbus curationis difficillimæ , aliquando tamen medicamento um ope profligatur , aliquando sua sponte terminatur , viz. circa pubertatis tempus aliter in mortem definit , vel in alium morbum commutatur , scilicet , paralytin , imbecillitatem , aut melancholiam (incurabilia .) Alphonsus Ferrerius plurimos epilepticos simplici guajac. decocto bis in die ad ℥vj. vel viij. præscripto ejusque decocto secundo die vice potus ordinarii (prout in lue venerea assolet) assumpto se curasse affirmat : si tali decocto radix pæon. aliaque specifica addita fuerint , forsitan efficacius esset remedium .

Cbesnearvi sententia.

(*Nota bene.*) Art. 381. Quod palpitatio est cordi, talis omnino est Epilepsia cerebro; nam cum in eisdem usus habeat utrumque principium suam *systolem* & *diastolem*, harum ratione, ambo ab iisdem causis, simili symptomate affici par est. Ideo Epilepsia, sive tanquam morbus sive tanquam symptoma spectetur, dicenda est cerebri, aut alterius cujusque partis alteratio, quæ apta nata sit gignendæ materiæ, ichoris, aut vaporis simili, qualitatibus cerebro proprietate specifica infensis, cujus occursum totum concutitur motu *palpitationis* simili cum læsione functionum, nervosa in consensum trahens, quæ suo modo etiam *palpitant* (quemadmodum *arteriæ palpitante corde*) quousque cerebrum noxia excusserit.

(*Coercitio membrorum.*) Art. 382. Non possum probare, quod omnes fere consulunt, *membra scilicet coercenda esse tempore paroxysmi*, existimantes ex illa convulsivi motus cohibitione levare musculos; sed tantum abest: cum enim cohibitio hæc sit violenta, impediatque musculi contractionem ad terminum suum pervenire: quo longius est ab illo, eo major fit fibrarum musculi contentio.

Barbetti sententia.

(*Ratio habenda est causæ, unde oriatur.*) Art. 383. Si Epilepsia oriatur ex cerebri *idiopathia*, semper adest gravitas, & atrox dolor capitis, item sensuum debilitas, stupor, faciei pallor, & insomnia turbulenta; si ex *sympathia* ventriculi, ii in præcordiis & circa orificium ventriculi dolorem, corrosionem vel distentionem sentiunt, præsertim jejuni, & difficillime inediam tolerant; paroxysmum semper antecedunt nausea, dolor & palpitatio cordis animique deliquium; solvitur autem paroxysmus cum vomitu biliosorum aut pituitosorum acidorumve humorum: Si ex utero, circa lumbos & pubem dolores, & simul capitis acerbis cruciatus percipiuntur.

(*Curatio.*) Art. 384. In hoc morbo curando omnibus fere antecelant flores *salis armoniaci* & *eiusdem spiritus*, qui est valde volatilis & penetrantissimus, item prodest *cinnab. nativ.* præmissis universalibus laustus sequens bis in die exhibitus puellam ab hoc malo liberavit, *2℥. apon. Hispan. albiss. 3℔. coque ex lact. vaccin. 3iij. bibatur tepide.*

Pitcarnii sententia.

(*Pitcarnii tinctura.*) Art. 385. In Epilepsia vel paralyti post vomitum repetitum & vesicantia, detur tinctura antiepileptica sequens (junioribus vero exhiberi debet *mercurius* & jusculum cum *lumbriticis terrestribus*) *2℥. Rad. valerian. sylv. dictam. alb. ana 3vj. castor. sterc. cor. amb. ana 3℔. visc. quercin. 3vj. cinnam. sumit. rorismarin. ana 3℔. sen. 3ij. jalap. turpeth. ana 3℔. Infunde frigide per dies x. in vin. b. Gallic. 3viii. colaturæ add. pulv. cran. humani ungu. alcis ana 3℔. sacchar. 3iv. cui immisce rite ol. succin. 3iv. & spir. castor. 3ij. f. 3iv. Expedit hanc tincturam purgantibus orbam exhibere in paralyticis declinante morbo. Expedit etiam ægros, post membra affecta ignem liberaliter & strenue perfricta, aquis frigidis immergere.*

Harrisii sententia.

(*Pulvis specificus.*) Art. 386. *Lumbric. terrest. preparat. 3j. cran. man. preparat. 3ij. cardamon. min. 3ij. m. f. pulv. in chart. xij. distribuend. sumebat Epileptica unam bis in die in coch. julap. cephalic. sequent. superbibebatque ejusdem coch. iij. 2℥. Aq. ceras. nigror. flor. 3℔. ana 1℔. pæon. comp. 3j. tinctur. castor. 3ij. syr. pæon. comp. 3ij. m. julap. sed quia tantam pulveris nauseabundi quantitatem ventriculus*

fastidiebat, paulo post sing. doses *elix. propriet. dulc. gutt. xxx. sacchar. tantillo instillat. insuper mox deglutiebat*: atque hac methodo curata est puella Epileptica postquam plurima alia incassum tentavit.

Farrago sententiarum.

Art. 387. Epilepticus, remediis aliis minus proficientibus, *super mare naviget ad nauseam & vomitum excitandum*, idque aliquoties repetat; & deinde deambulet, horis tribus quatuorve, quotidie, per integram septimanam, vel diutius, in *sulco immediate post aratrum humum versans, in agello annis aliquot feriato*. Dicit aliquis authorem pro certo insomniis ludificari, quanquam hoc credat, experiri licet, nec fortasse facti poeniteat.

Art. 388. Ultra omnia, ad morbum caducum curandum, & penitus eradicandum valet *dieta lactea* ab aliis quibuscunque obsoniis & potulentis omnino abstinendo; ut ex insigni historia Medici, Noviomagi non multo pridem degentis, isto modo curati docemur. Vid. Cheynei Tractat. de Arthritide, pag. 103, &c.

Art. 389. Causa proxima omnis Epilepsiæ exquisitæ semper est nimia cerebri in nervos motorios, nulla in sentientes actio. Boerhaave. Melancholici fiunt aliquando Epileptici & contra. Epilepsia (inquit Hippocrates) pituitosis quidem contingit, minime vero biliosis.

(Remedia varia.) Crato cinnabarim nativam tanquam Epilepsiæ magnæ commendat, hoc modo exhibitam; ℞. Cinnab. nativ. opt. subtilissime trit. ℥℞. coral. rub. preparat. margar. prepar. ana ℥j. croc. opt. ℥j. fol. auri N. xx. f. pulv. subtilissimus, dos. ℥ij. cum julap. cephalic. Succus rutæ multum laudatur ad epilepsiam; ideoque ejusdem extractum iidem pollet viribus, & commodius sumi potest. Electuarium Peruvianum Epilepticum Fulleri est præstantissimum & certissimum Anti-epilepticum, uti experientia me docuit (inquit Fuller.) Post debitas evacuationes adultis dosis sit ℥j. mane & vespere per 3. vel 4. menses, & postea per triduum vel quatrimum ante novilunium & plenilunium. Morbos Epilepticos, hystericos, & choream sancti Viti penitus eradicat.

(Alia medicamenta.) In morbis hujusmodi convulsivis ægrotis prædictum electuarium frequenter exhibui & (libenter agnosco) raro frustrata fuit spes mea. Eximie vires radicis valerianæ sylvestris a Fabio Columna prædicatæ, & a Riverio memoratæ, experientia M. Marchant denuo confirmatæ sunt. Memoir. de l'Acad. Vol. x. p. 430.

(Viscus Arboreus.) Cortex Peruvianus (inquit Colebatch in Dissertatione de Visco) non certius febri intermittenti, quam viscus arboreus Epilepsiæ, choreæ Sancti Viti, & morbis universis convulsivis, etiam asthmati convulsivo (& si huic, tussi convulsivæ) medetur. Dosis in substantia adultis ad ℥℞. vel ultra forma boli sexta quaque hora superbibendo haust. infus. fortis ejusdem plantæ. Si singulis unciis pulveris visci addatur drachma asæ fetidæ, medicamentum efficacius evadet. „ Opera pretium esset procul dubio, vires humoris mucilaginosi „ baccarum in his affectibus tentare; Valde enim probabile est vim „ eandem, si non superiorem eo inesse; & forsan esset medicamen- „ tum minus nauseabundum. Præter jam dicta medicamenta sequen- „ tia etiam quandoque præscribentis intentioni quadrare possunt, viz. au- „ rum fulminans, aurum Mosaic. pulvis ad guttetam, sp. C. C. succinat. electuar. cephalic. elect. epileptic. tinctur. epileptic. & infusum cephalic. Fulleri, Elect. epileptic. & emulsio pæon. Batean. &c.

CHOREA SANCTI VITI.

(Chorea Sancti Viti.) Art. 390. Chorea sancti Viti a facello san-
cti Viti

Sancti Viti nomen accepit, quo loco verno tempore iuvenes utriusque sexus saltandi gratia convenire solebant, & saltare more enthusiastico; atque ibidem interdum hoc morbo correpti erant.

Sydenhami sententia.

(*Eiusdem descriptio.*) Art. 391. Chorea sancti Viti est convulsionis quædam species; pueros puellasve a decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prædit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateri, vel pectori, vel alii alicui parti applicatam nequit contineri in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: non enim recta linea ori admovet, sed deducta a spasmio manu, huc illic aliquandiu versat, donec tandem forte fortuna labris propius apponens liquorem de repente in os injicit, & avide haurit, dedita tanquam opera, ut spectantibus risum moveret.

(*Cura.*) Art. 392. Ad curam rite instituendam vena est secanda, & postridie exhibe potionem purgativam communem, & vesperi haust. paregoric. postea sanguis iterum extrahatur, & ad catharsin, ut prius, æger revertatur, & ad tertiam, quartamve vicem si vires ferant: diebus purgatione vacuis sequentia exhibeantur; ℞. Conserv. absynth. Rom. flaved. aurant. ana ℥j. anthos ℥ss. theriac. Androm. vet. nuc. moscat. condit. ana ℥iij. zinzib. condit. ℥j. syr. e succo citr. q. s. f. elect. de quo capiat quant. NM. mane & horas 5. pomerid. superbibendo vin. sequent. coch. v. ℞. rad. pæon. enul. campan. imperator. angelic. ana ℥j. fol. rut. salv. beton. chamædr. marrhub. alb. summit. centaur. min. ana m. j. bacc. junip. ℥vj. cort. aurant. ij. infunde frigide in vin. canarini. ℥vj. coletur usus tempore. ℞. Aq. rut. ℥iv. epileptic. Langii, brion. comp. ana ℥j. syr. pæon. ℥vj. m. f. julap. cap. coch. iv. sing. nocte hora decubitus instillando spiritus C. C. gr. viij. applicetur plantis pedum emplast. e caranna.

(*Ad recidivam præcavendam.*) Art. 393. Ob recidivæ metum pertundenda est vena, & purgandus æger aliquoties ea ipsa anni sequentis tempestate (vel paulo ante) qua morbus invasit.

(*Curatio singularis.*) Art. 394. „ Ipse vidi puellas duas hoc morbo affectas diutius saltitantes, tanquam lyra agitata, cum mentis quadam alienatione pro tempore; has curavi cum expressione millepedum & cortice Peruviano, præmissis venesectione & leni cathartico. Exemplum hujus affectus singulare habet Solenander, consil. med. p. 310. Electuarium Peruvian. epileptic. Fullerii vim habet egregiam ad hunc morbum domandum. Pater prædictarum puellarum, qui clericus erat, filias suas incantamentis, vel veneficarum malis artibus reuera affici persuasum habuit, nec ab ista opinione abduci potuit. Rem vero longe aliter se habere ex eventu luculenter patuit; antedicta enim remedia obsessionem istam protinus comminuerunt, quæ precibus & lacrymis respuerat obtemperare.

F A S C I N A T I O,

(*Fascinatio.*) Artic. 395. De Fascinatione in praxi mea nihil experientia didici, quodcumque & quotcumque de ea vulgo perhibentur, neque credo ullos morbos a veneficiis suscitari; ideoque de medicamentis & curatione eorum sollicitum esse non est necessarium.

(*Curatio.*) „ In prodigiosis vero quibusdam morbis, symptomatum inusitatorum caterva stipatis, medicamenta *vermifuga*, item illa, quæ *epilepsie vel suffocationi uteri* medentur, vel *flatus discutientia*, utpote etiam quæ naturaliter repugnant dispositionibus illis in corpore, quibus diabolus ad præstigias suas abuti possit, (uti credunt Theologi) semper locum habent. „

HYPOCHONDRIACA & HYSTERICA AFFECTIO.

Sydenhami Sententia.

(*Hypochondriaca & hysterica affectio.*) Art. 396. Hypochondriaca & hysterica affectio est morbus frequentissimus; paucissimæ quidem foeminae vel viri sedentarii ab illo penitus immunes sunt; symptomata aliorum pene omnium morborum æmulatur; quamcunque enim corporis partem infederit, symptomata qualia ei parti competunt, statim producit. In capite *apoplexiam* facit, quæ similiter hemiplegia solvitur. Spasmos horrendos gignit *epilepsie* similes, paroxysmum hystericum proprie dictum faciens, vulgo *uteri strangulatum*. *Cephalalgiam* intolerabilem excitat, *clavus hystericus* nominatur, dolorem transverso pollice possis contegere. *Palpitationem cordis* præcipue chlorosi laborantibus concitat. Aliquando (sed rarius) pulmones obsidet, & *tussim* excitat fere continuam sine expectoratione. *Dolores colicos & iliacam passionem* nonnunquam æmulatur, & interdum *ictero* paroxysmus solvitur; hoc genus in foeminis laxiori corporis habitu præditis locum habet; de salute plerumque desperant. Paroxysmum *nephriticum* aliquando mentitur. In ventriculo *vomitum*, in intestinis *diarrhoeam* efficit, sine dolore tamen. Partes externas non raro occupat dolore; præcipue in dorso, & aliquando tumore maxime in cruribus & tibiis; tumores ab *Hydropicis* discriminantur, in eo quod majores sint tempore matutino, & vestigium digiti impressi non retineant. *Dentes* etiam interdum afficit. Dolorem in dorso certo certius persentiscunt, quotquot hoc affectu tanguntur. Externarum partium *refrigeratio* his omnibus quasi viam sternit, & plerumque non nisi finito paroxysmo dispellitur. Adsunt in fere omnibus spirituum dejectiones & subsidentia; risus & lacrymæ sine ulla *εποφάται*. Et postremo (quod tristissimum est) magis *animo* agrotant quam *corpore* hoc modo afflictæ. *Urina* limpida & magna quantitate excernitur, quod signum est *pathognomicum*. *Ptyalismus* nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut mercurio delibutos facile crederes. *Flatus nidosos*, nunc *acidos* eruant, atrocissima *animi pathemata* in sinu foveant.

(*Causa.*) Art. 397. Causæ *procatarecticæ* sunt vel vehementiores corporis motus, vel etiam multo sæpius violentæ quædam *animi commotiones* a repentino aliquo sive iræ, sive doloris, & similium passionum insultu. Causa efficiens est *ατοξία* spirituum animalium. „ Secundum mentem quorumdam pathemata, *vapores* vulgo dicta taliter utro, tanquam causa immediata, fundamento niti, viz. *nimis titillante*, vel molestiore quadam ineffabili sensatione præter modum partes illinc irritante, vel hinc vellicante; unde secretionem evadunt valde impares & male comparatæ. „

(*Indicatio curativa.*) Art. 398. Præcipua indicatio curativa sanguinis corroboracionem indigitat; ideoque post debitas *evacuaciones* (ubi indicantur) *chalybeatis, amaris, corroborantibus & volatilibus* cura perficienda.

ficienda est. Chalybeata foeminis quandoque magnas tum animi tum corporis perturbationes inducunt; in hoc casu exhibe *Laudan. liquid.* guttas aliquot sing. nocte in *aq. aliqua hysterica*. *Aque minerales* omnes chalybis præparationes longe superant. *Limatura ferri crude* in robustis corporibus cum majori fructu exhibentur, quam quævis præparatio. Aqua communis imprægnata *ferreis clavibus* & *calceis equinis*, &c. medicamentosa evadit æque ac *aque minerales*. Inter bibendum *aquas ferreas*, si aliquod symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis abstinendum, donec symptoma istud evanuerit: in earum usu ad sex septimanas ad minimum perseverandum est; *zingiber conditum*, & *semina carui saccharata* ad ventriculum calefaciendum sunt subinde sumenda, dum *aquas* bibunt. *Theriaca Andromach.* & *vinum Hispanicum* multum laudantur. *Cortex Peruvianus* in hoc morbo eximias vires obtinet, præsertim foeminis, quæ spasmis afficiuntur, ut & *dieta lactea* in *colica hysterica*. *Equitatio* usus est ex mii. In paroxysmo ad foetida confugiendum est, quæ spiritus in ordines compellunt; quæcunque foetent huic intentioni inserviunt. In doloribus vehementioribus, vomitionibus, & diarrhœis ad laudandum tanquam ad sacram anchoram confugiendum est.

Willisii sententia.

(*Paroxysmi hysterici descriptio.*) Art. 399. Hystericæ affectionis signa sunt motus in imo ventre, ibidemque velut *globi* cujusdam ascensus, dein rugitus, aut vomendi nixus, hypochondriorum distentio & murmur cum flatuum eructatione, respiratio inæqualis ac ut plurimum impedita, præfocatio in gutture, vertigo, oculorum inversio aut rotatio, sæpe risus aut fletus, fabulatio absurda, quandoque *aporia* & *anymia* cum pulsu obscuro aut nullo & aspectu cadaveroso, interdum motus convulsivi in facie & artubus, & nonnunquam in toto corpore.

(*Symptomata in viris.*) Art. 400. Symptomata hujus morbi in viris sunt, quæ sequuntur, cardialgia, flatuum ingens proventus, rugitus ac crebra vomitio, in sinistro hypochondrio distentio, ac subtus *ventriculum* pulsatio immanis sentitur, borborygmi, & murmura. In *thorace* constrictio & angustia, respiratio difficilis, cordis tremor & palpitatio, spirituum deliquia. In *capite* dolores atrocissimi, scotomiæ, vertigines, vigiliæ pertinaces, cogitationum æstus & fluctuatio, animi incertitudo, phantasia perturbata, rei cujusque formido & suspicio, morborum, quibus immunes sunt, possessio imaginaria, melancholia & mania, dolores vagi, spasmi, stupores, sudores nocturni, febres erraticæ, &c. sputatio fere continua. *Higbimorus* supponit præcipuam hujus morbi causam esse in vitiosa ventriculi constitutione.

(*Curatio.*) Art. 401. Ad therapiam quod attinet, quoniam quamplurima symptomata sunt *convulsiva*, ideo constat remedia *antispasmodica* potissimum indicare. In paroxysmo foetida interne atque externe valde profunt; nonnullis convenit in medio paroxysmo *aq. frigide* haustum, in qua *camphora* deflagravit, propinare. Extra paroxysmum *evacuationibus* necessariis factis, medicamenta vulgo *digestiva*, quæ ventriculi tonum ac fermentum spectant, locum habent; talia sunt *tinctura acra*, *elixir propriet.* *pulv. ari comp.* *sal. absynth.* *cremor.* *tartar.* *vitriol.* *vitriolum Martis*, &c., Inter digestiva & chalybeata pro certo eminent virtutes entis *Veneris*; utcunque tamen an sit revera *anodynum*, ut a quibusdam perhibetur, dubius hæreo; nondum enim satis compertum habui., Externe *fotus stomachici*; postremo ex me-

dicamentis *chalybeatis* maximum juvamen sperandum est. Potus affiduus *coffee* aut *theæ* paratus nonnullis emolumento fuit; *acidulæ* fere semper cum fructu sumuntur. *Pil. nostr. hyster.* in paroxysmo & extra; *℞. Facul. brion. asæ foetid. castor. ana ℥j. sal. coral. succin. Jovis ana ℥ss. galban. in aq. brion. comp. solut. q. s. f. massa.*

Purcellii sententia.

(*Hic affectus est morborum legio.*) Art. 402. *Hysterica passio* (inquit *Galenus*) unum quidem est nomen, varia tamen & innumera accidentia sub se comprehendit: Inter alia symptomata hoc morbo occurrentia perquam notabilis est sensus *frigoris*, quem percipiunt ægæ per dorsum assurgentem & mox per universum corpus diffusum, sequitur *cephalalgia*, & nonnunquam cordis palpitatio, & animi deliquium, & deinde brevi sensim ad se redeunt: in aliis præterlapso frigore succedit insignis calor, qui pleraque symptomata antedicta cum aliquot novis accersit; interdum in initio paroxysmi frigus est vix perceptibile, & tunc symptomata graviora non nisi post accessum caloris trageciam agunt. Propter diaphragmatis & musculorum respirationi inservientium violentum ac perpetuum spasmodum foeminae *hystericae* quandoque diutissime procumbunt instar mortuarum sine (sensibili) respiratione, immo interdum per integrum diem & diutius. Probe animadvertendum est hunc morbum ire & redire, & suos habere paroxysmos, etiamsi non certis ac statis periodis recurrentes, sicut febrium intermittentium.

(*Causæ.*) Art. 403. Causa primaria hujus affectus sunt *cruditates & coctiones vitiosæ*, quæ plerumque ante adventum paroxysmi in ventriculo gravedinem ac perturbationem, in intestinis murmura ac borborygmos pariunt, inde producitur spirituum *αταξία*, quæ est causa proxima reliquorum symptomatum; *causæ remotiores* ex errore aliquo circa sex res non naturales suboriuntur.

(*Methodus therapeutica.*) Art. 404. Ad therapiam rite instituendam accurate distinguendum est medico de constitutione patientis, an sit sanguinea & biliosa, vel pituitosa ac melancholica, & etiam de cruditatis peculiari genio, utrum sanguinis crasin nimis viscidam, & glutinosam reddit, aut nimis laxam & ebullitionibus proclivem. Affectuum *Hystericarum* cura huic fundamento maxime innititur: ex his etenim inter se plane discrepantibus oriuntur indicationes longe a se invicem diversæ. Sensatio frigoris in dorso, item pulsus debilis & tardus, sanguinis lentorem arguunt: pulsus celerior, calor ingens frigus excipiens, odor moschi, zibethi, ambræ, paroxysmus accersens, &c. statum sanguinis esse laxiorem & fermentiscibilem indicant.

(*Curatio.*) Art. 405. E paroxysmo excitanda sunt, naribus *volatilia & foetida* admovendo, plantas pedum titillando (experimentum est *Dolæi*) & in graviore casu *apoplectico* scilicet, *punctionibus*; *scarificationibus*, *vesicantibus*, *ustionibus*, *sartagine calefacta*, &c. sunt suscitanda. Iis, quarum sanguis est viscosus & nimis tenax, convenit *venæsectio*, & postmodum vel die sequenti *emeticum*, vel, si minus congruum judicatur, *catharticum*, his ita præmissis, ad *attenuantia & aperitiva* accedendum est; & hic apprime conducunt juscula ovin. vel gallin. cum radicibus & herbis aperitivis, & *rubigine ferri* (in nodulis ligat.) incoct. (vel, si ob ferrum incoctum ventriculus nauseat; forsitan non erit minus efficax, si singulis auroris post medicamentum aliquod *chalybeatum* assumptum superhauriatur catillus istiusmodi jusculi.) Potus quotidianus sit *vinum Gallicum* aqua dilutum cum gut.

xxv. vel xxx. sp. sequent.; ʒ℥. Sal. volat. oleos. ʒiij. sp. lavend. ʒj. m. In hoc affectu nullum remedium efficacius datur quam *radix bel-
lebori* vel ejus *extractum*. Constat ex solo usu elect. *chalybeat.* seq. (ʒ℥. Cort. Peruv. pulverisat. ʒ℥. coral. rub. ocul. cancr. præp. ana ʒiij. ferr. rubiginos. ʒiij. sal. abynth. ʒij. cum q. s. syr. absynth. f. electuarius) Fœminas quamplurimas Hystericas curatas esse. In altera crasi, ubi sanguis est nimis laxus & ebulliens, indicantur remedia calorem temperantia, venesectio, emulsiones, cortex Peruvianus, aq. Tunbrigenses, Bathonienses, jussculum cancrorum fluviatiliū, &c. Accuratam sane horum affectuum historiam, symptomatum ætiologiam nobis dedit laudatus author in tractatu suo eleganti de hysteria, idiomate vernaculo conscripto.

Ettmulleri sententia.

(Mali Hypochondriaci symptomata præcipua.) Art. 406. Malum Hypochondriacum est effectus ex multis symptomatibus diversimode complicatus, a cruditate acida plus minus viscida in primis viis natus; cujus eminentior gradus vocari solet *scorbutus*. Inter signa primaria sequentia sunt eminentiora, viz. cum adsunt pathemata stomachi non rite digerentis cum symptomatibus circa abdomen, cum torminibus & flatibus intestinorum, alvi obstructione, corporis perturbatione, &c. Sed non omnia in omnibus; ordinario motiones, & plus minus dolores, murmuraciones, distentiones, & aliæ abdominis affectiones, cum præcordiorum angustia, & respirationis difficultate, flatibus & scotomatibus, vel vertiginosa affectione rationem formalem constituunt. Est affectus quidem complicatissimus; tres fere gradus paroxysmi statuuntur, viz. primo dum *respiratio est libera*. 2. Quando *hæc impedita*, & *pulsus* fere cessat. 3. Quando etiam *convulsiones* superveniunt.

(Curatio.) Art. 407. Emplastrum e galbano cum aliquot granis *zibethi*, umbilico opponi debet; *zibethum* enim umbilico illitum suffocationes Hystericas insigniter alleviat, modo non nares nimium feriat. *Enemata* conducunt ex *carminantibus cum ol. succini & salibus volatilibus*, item ex *urina sani*; ut & *clysmata terebynthinata*. Misturæ ex *salibus volat. cum castor. & opiatis* optime paroxysmum sedant, conducunt etiam *trochisci de myrrh. stercus equinum maris* est remedium nulli cedens; *succus ejus cum vino*, vel *decoctum* propinatum expectando sudorem est incomparabile in, vel extra paroxysmum; *fuligo furni splendens* est medicamentum pro pauperibus, item *flores sulph. cum N. M. & theriaca* in vino solut. cum additione *castr.* In graviore malo exhibere soleo potionem seq. deterrimi quidem saporis, sed præsentanei effectus; ʒ℥. Aq. menthæ flor. sambuc. matricar. ana ʒj. essent. castor. ʒi℥. ad ʒiij. sal. volat. C. C. gr. xij. succin. gr. viii. laudan. hyster. ʒ℥. syr. e cort. aurant. ʒ℥. m. capiatur expectando sudorem. In specie *scalaræa* (horminum hortense) vel ejus decoctum est experimentum singulare paucis notum in suffocatione uterina.

Loweri sententia.

(Boulimia) Art. 408. Melancholia Hypochondriaca affecti humore salino in ventriculo deposito magna *boulimia* sæpissime tentantur, & quamdiu appetitus iste durat, ab omni dolore corporis immunes sunt, humore vero isto acri & ferino, metastasi quasi facta, in alias corporis partes deposito, cruciatus & spasmi ciuntur, interea etiam ut ventriculi appetitus omnis & digestio propter defectum ejus penitus flaccescat, quod Hypochondriacis fere omnibus solemne est, atque ma-

læ sanguinis diathesi, potius quam lienis vitio, proxime imputari debet. De corde p. (147.)

Farrago sententiarum.

(*Prudentia opus est in medico.*) Art. 409. Morbi longi, teste *Platone* in *Timeo*, blandissime tractari expetunt, non vehementioribus irritari. „ Mens ipsa ægroti frequentissime adeo insigniter afficitur in hoc „ morbo, ut sæpius cogatur medicus aliquid admittere, quod jubent „ consuetudo, opinio vulgi, superstitio præjudiciaria; quod tamen sana „ ratio e contra vetat. „

(*Diagnosticum singulare.*) Art. 410. Mulieres hystericæ sensum quandam frigoris in vertice capitis pati solent, estque hoc præcipuum hystericæ diagnosticum. *Baglivius*.

(*Bezoarticum Joviale.*) Art. 411. *Bezoarticum Joviale* est præstantissimum remedium & infallibile in affectibus hystericis, ut pluries mirati sumus. *Idem*.

(*Emeticorum efficacia.*) Art. 412. In affectionibus hypochondriacis vomitus est ante omnia provocandus; sic enim fomes subtrahitur morbo, & revera est basis curæ. *Pitcairn*. in *M. S.* In hoc consentientem habemus doctissimum *D. Woodward*, mihi amicissimum.

(*Remedia varia.*) Art. 413. Remedia sequentia quamplurimis indicationibus satisfaciunt, si quis cognoverit uti. *Aurum Mosaicum*, cærevifia hysteric. *Fulleri*. *Chalybs sine acid.* *Batean*. *Decoctum nigrum* (Art. 48.) elect. hysteric. elect. *Peruv.* epileptic. & enem. hysteric. *Fulleri*. *Ens Vener.* flor. sal. armoniac. martiat. Infusum amarum sequens 2℥. cort. *Peruv.* crasse pulv. ʒij. tart. alb. ʒij. serpent. virgin. ʒiſſ. infund. frigide in vin. rub. ℥ij. coletur usus tempore. Infus. chalybeat. amar. (Art. 48.) *Mistura ephrasticæ*, julap. camphorat. *mistura hysteric.* spirituos. & pil. hysteric. *Fulleri*. Pulvis ad guttetam, pulv. hysteric. *Bat.* sal. Jovis tinctura ase fætid. tinctur. epileptic. *Fuller.* sp. C. C. succinat. tartarum vitriolatum, vitriolum Martis &c.

MEMORIA LÆSA.

(*Memorie ætiologia.*) Art. 414. Inter omnes animæ humanæ facultates ne una quidem tanta difficultate & molestia philosophorum animos exercuit ac *Memorie ætiologia*. Non pauci sunt, qui opinantur istam facultatem construi ex repositorio variarum idearum sensibilibum oblata occasione primitus collectarum, & in cerebro cum signaturis quibusdam ordinate depositarum, unde ad usus futuros tamquam ex promptuario ad libitum evocantur: sed duæ admodum graves obtrudunt difficultates, nimirum, in tanta rerum accumulatione quomodo fieri potest, ut aliæ aliis minus oblitterentur & confundantur; & quo artificio mens ipsa ex adeo grandi idearum multitudine illas præcise expergefaceret & compellere potest cæteris silentibus, quas singularis usque usus pro varia rerum exigentia exquisitè postulat. Exclamandum sit necesse est *Plasmatio nostra mira est, & mirabile opificium corporis nostri!* Prodigiosa fuerunt in omni ævo quorundam hominum memoriæ, v. g. *Senecæ*, *Portii Latronis*, *Cyri Regis*; nostratium quoque *Reynoldi Episcopi*, *Wallissi* &c.

Sennerti sententia.

(*Memoria læsa.*) Art. 415. Memoriæ læsæ exempla notabilia apud authores passim occurrunt. *Christophorus a Vega* refert *Franciscanum* quendam ex acuta febre ita memoriam amisisse, ut, etsi prius esset theologus,

gus, postea nec literas agnosceret, & neque nomina rerum, quæ sibi assidue in usu erant, memoria teneret.

(*Intemperies cerebri.*) Art. 416. Si intemperies cerebri sit frigida & humida, somnus est longus & profundus; si humida tantum, est longus, sed non profundus; si frigida tantum, moderate somnolenti sunt; si frigida & sicca, non sunt somnolenti. Si absque causa externa memoria subito lædatur, imminentis *apoplexiæ*, *epilepsiæ*, aut *paralyseos* est indicium, si homini alias salvo id accadat. Difficulter curatur, quæ a *malignis morbis*, *venenis*, aut *philitris* ortum habet.

(*Curatio.*) Art. 417. Anacardium tanquam specificum decantatur, & revera interdum egregios edit effectus, sed ejus usus periculo haud vacat. (vid. locum, item *Raii hist. plant.*) Abstinentum est a carne porcina, anatina, anserina, & piscibus, præsertim mollioribus, lacte, caseo, leguminibus, brassica, lactuca, papavere, fructibus horæis, & quæ vaporosa sunt, crassæ substantiæ, & coctu difficilia; vinum moderate sumatur, aer sit tenuis, cerevisia pura, corpus exerceatur moderatis laboribus, somnus non mox a cibus ineatur, vitetur diurnus, noctuque sit moderatus, fugiat mœstitiam & animi solitudinem, & ad lætitiâ disponatur, a Venere abstineat. Hoc in casu in usum revocantur hæc & similia; Rad. *pæon. mar. zedoar. valerian. maj. flores tiliæ, lilior. convul. primul. veris, rad. calam. aromat. sem. sinap. sp. diamb. sine odoratis, sp. lavendul. castor. ambra grisea, col. cinnamomi*, &c.

Ettmulleri sententia.

(*Tantum scimus quantum memoria tenemus.*) Art. 418. Tantum saltem scimus, quantum memoria comprehendimus, & cum judicio ponderamus, & applicamus. Certum est cerebrum esse memoriæ subjectum radicale, quomodo autem fiat, nescio. Venus nimia memoriâ debilitat, maxime in senibus.

(*Curatio.*) Art. 419. *Cubebæ* N. iij. mane jejuno stomacho comestæ insigniter acuunt ingenium & memoriâ; *ambra* est omnium optima medicina in firmandis viribus animalibus, & roboranda memoriâ, omnibusque mentis actionibus, adeo ut nihil æque fulciat senes labascentes; elegantissima est tinctura cephalica ex granis *chermes* & *ambra* cum *Spiritu lilior. convul.* &c. Sed notandum est quod ex crebriori usu, *ambra* plus nocet quam prodest, præmaturam *stupiditatem* inferens; profunt *masticatoria*, & *capitis lotiones*; *thea*, *salvia*, *rosmarinus*, &c.

(*Vires radicis cassumuniar.*) Art. 420. „ In praxi nostra tabellas sequentes, præmissis rite universalibus, hoc affectu laboranti cum fructu maximo, multis abhinc annis exhibui; ℞. Rad. *cassumuniar.* subtilissime pulverisat. ℥j. spec. *diamb. sine odoratis* ℥ij. sacchar. albiss. duplo pondere f. tabellæ frequenter in die maxime vesperi & mane comedend.

ANIMI MORBI.

(*Animi morbi.*) Art. 421. Qui laborant animi pathemate corripitotissimum solent morbis *ventriculi*, ut inter cæteros observare licet in mœrentibus, qui conqueruntur primo de languore ventriculi, mox de *inappetentia*, oris amaritie, & siti circa horas matutinas, cruciatibus acidis & nidorosis, flatibus & tensionibus hypochondriorum, aliisque læsæ chyloseos malis.

(*Morbus durante passione vix curabilis.*) Art. 422. Si quis morbus durante animi passione ægrum corripuerit, solet interdum tamdiu durare quam-

re quamdiu ipsa animi passio, & potius in alienæ speciei morbum mutabitur, quam ægrotantem liberum relinquet.

(*Quomodo tractandi sunt.*) Art. 423. Morbi ab animi pathemate pendentes blande ac leniter tractandi sunt, a nimia remediorum copia & vehementia quam maxime abstinendum.

(*Symptomata anomala ab animi passionibus.*) Art. 424. Quando morbus aliquis remediis debite præscriptis cedere nolit, insolitisque quibusdam modis, atque a sui natura valde remotis progreditur, suspicandum erit de *ocultis animi passionibus*. Inter solatia ægrotorum animo laborantium magnam vim obtinet *musica* (inquit *Baglivius*.)

MANIA & MELANCHOLIA.

(*Mania & melancholia.*) Art. 425. „ Mania cum melancholia talem
„ habet affinitatem, ut non raro mania in melancholiam transeat, &
„ initia melancholiæ frequenter maniacum quid habent, ut observavit
„ *Dodongus*; ideoque in eodem capite tractandi sunt hi duo affectus.

Cælii Aureliani sententia.

(*Melancholiæ descriptio accurata.*) Art. 426. In melancholia adest animi anxietas atque difficultas, mœstitia cum silentio & odio conviventium, nunc vivendi, nunc moriendi cupido cum suspicionibus velut insidiarum sibi paratarum; item inanēs fletus, atque murmura vacua, & rursus hilaritas magis post cibum cum inflatione præcordiorum, capitis gravedo, color luridus cum nigrore, aut sublividus, corporis tenuitas, virium debilitas, indigestio cum ructationibus odoris tetri, intestinorum tormina, vomitus humorum diversicolorum & similibus per podicem egestio. „ Qui gravius laborant, sese vel pecudes
„ esse vel testaceos, vel etiam vita defunctos credunt; quare alii galli
„ gallinacei cantum voce imitantur, alii occurrentibus cedunt, veriti
„ ne (testacei cum sint) diffringantur, alii cibum pertinacissime recusant, amissam esse vitam rati. „

Riverii sententia.

(*Mania & melancholia quomodo distinguitur.*) Art. 427. Melancholia est delirium sine febre cum timore & mœstitia; & sic distinguitur a mania, quæ est cum furore & audacia. Ex varia melancholici humoris dispositione maxima deliriorum varietas emergit; unde alii putant se esse reges, vates, alii grana tritici, alii vitreos, ceram, alii se esse canes, feles, gallos, &c. existimant, indeque voces horum animalium imitantur, &c.

(*Varia sunt deliria pro varietate constitutionum.*) Art. 428. Varia sunt deliria in variis ægrotantibus pro majori vel minori causæ vehementia; alii enim feroci iracundia rapiuntur, & obvios quosque invadunt, & proprias vestes dilacerant, sibi quæque ipsis interdum violentas manus inferunt. Alii vero mitiores & pacatiores sunt, nullamque adstantibus noxam inferunt, sed tantum varios sermones & ridiculos proferunt; interdum cantunt & rident, & symptomata patiuntur, quæ in melancholia & stultitia solent contingere. Melancholia errabunda mense *Februario* homines potissimum infestat: ægri ne horam in uno loco manere possunt, sed continuo vagantur, quo vadant nescientes.

(*Lycanthropia.*) Art. 429. „ Admirandam melancholiæ, vel mania
„ speciem apud *Oribasium* descriptam legimus, quam *Λυκανθρωπία* vocat. Huiusmodi delirio affecti foras noctu vagantur, lupos quodammodo æmulantes, aspectu pallidi, luridi, os oculosque valde sic-

de sicci, crura contusionum ac vulnerum plena; circa defunctorum monumenta ad instar *Demoniaci Evangelici*, plerumque versantur. Vide *Freind, Histor. Medic. p. 18.*

(*Difficile curatur.*) Art. 430. Humor melancholicus *flagellum*, *crux* aut *opprobrium* medicorum appellatur, quoniam vim remediorum eludit, solvitur interdum melancholia per fluxum *hæmorrhoidum*, vel per *scabiem*, aliosque morbos *cutaneos*.

(*Quibus remediis tentanda est.*) Remedia in affectus hypochondriaci curatione proposita hic locum habent; ℞. *Aq. nymph.* ℥j. *sal. prunel.* ℥j. *camphor.* ℥j. misce, & cum lineis complicatis admoveatur tepide incipiti in maniacis; utilissimum quoque est *epithema ex sacchar. Saturn.* & *aq. spermat. ranarum*.

Willisii sententia.

(*Melancholici cogitabundi.*) Art. 431. Melancholici in cogitando fere continuo occupantur, & inter cogitandum res pauciores quam antea solebant, animo comprehendunt; ita quidem ut sæpe dies & noctes eodem objectum animo volutent, de rebus aliis, quæ interdum sunt longe majoris momenti, nihil solliciti; & etiam objecta fere omnia iis deformia, & velut sub larva apparent.

(*Quomodo se habent maniaci.*) Art. 432. Hæc tria fere omnibus maniacis accidunt, viz. 1. eorum *phantasie*, sive *imaginationes* cogitationum impetuolarum æstu perpetuo occupantur, ita ut varia sibi obmurmurarent, aut clamando & ejulando proferant, 2. *Notiones* sive *conceptus*, aut incongrui sunt, aut sub specie falsa sive erronea repræsentantur. 3. Illorum delirio *audacia* & *furor* adjunguntur, contra in melancholicis.

(*Curatio.*) Art. 433. Helleborus ab *Hippocrate* ita crebro præscribitur, quoniam tunc temporis alia *cathartica* saltem in frequenti usu, vix innotuere; jam vero longe præstat *lenioribus* & *mitioribus* humores subducere. Emetica sequentia sunt maxime utilia: ℞. *Sulph. antimon.* gr. viij. ad x. *crem. tart.* ℥ss. m. ℞. *Mercur. vitæ.* gr. vj. vel vij. *tart. vitriolat.* ℥ss. m. ℞. *Extract. hellebor. nigr. calomel. ana* ℥j. f. *pil. cathartic.*

Ettmulleri sententia.

(*Differentia melancholiæ a delirio melancholico.*) Art. 434. Affectus Melancholicus seu Melancholia differt a delirio Melancholico; prior est quando homo est nonnihil moestus & morosus, facile subinde irascitur, ipsi nihil arridet, cogitabundus est; ubi vero taliter affectos supervenit *phantasma*, constituit *delirium Melancholicum*, in quo agri sunt timidi, anxiosi, & quasi in angustiis constituti videntur, adeoque quæcunque vident vel audiunt, sibi pejora & periculosiora persuadent, & licet interdum vident, & læti videntur, quod putant se esse divites, &c. nihilominus non est revera hilaritas, non verum gaudium, sed potius apparens, & cum risu *Sardonico* conjunctum, transitorium, & facile succedit novus moeror, & præcordiorum anxietas, sine causa iterum rident, & parum aut nihil omnino dormiunt, sed cum terrore evigilant.

(*Fundamentum melancholiæ.*) Art. 435. Mores animi sequuntur temperamentum corporis. Fundamentum Melancholiæ semper circa hypochondria consistit, utut remotior causa interna subinde aliunde oritur, in quo puncto lien & uterus incusari solent.

(*Origo mali expiscanda est.*) Art. 436. In Melancholicis imprimis *acidum, vitiosum* in primis viis abundat, hinc frequenter sunt voraces,

ces. Expiscanda est mali origo, an ex tristitia & animi affectibus, vel ex sanguine Melancholico, in priori casu *pulsus* est valde obscurus, inæqualis & pene deficiens & vermicularis.

(*Curatio melancholice.*) Art. 437. In vomitoriis consistit radix curæ Melancholiæ, & *antimonialia vomitoria* exhibenda sunt in larga dosi. Melancholici & Maniaci odio suum habent medicum, etiam curati licet. Alvus servanda est lubrica cum *extracto bellebore* & *mercurio dulci*, quod est *alterativum* æque ac *laxativum*, ut etiam est *lapis lazuli*; in usum revocanda sunt remedia *antiscorbutica*, *martiata*, *acidula*; *saccharum Saturni* specificum habetur; *tinctura coral. confect. alkerm. ambra*, *fumaria*, *anagallis*, *hypericum*, *crocus*, *camphora*, *vinum generosum*, &c. laudantur. Emplast. ex *tucamahac.* capiti raso applicetur. In delirio Melancholico *opium* nullum fortitur effectum; licet dupla aut tripla dosi propinetur, ægri *agrypni* manent, & ferociores fere evadunt.

(*Maniæ definitio &c.*) Art. 438. Mania sive insania est delirium sine febre cum insigni furore & audacia, exuta quasi omni ratione, ægri pertinacissime vigilant, interdum per aliquot menses. Tres circumstantiæ sunt maxime notandæ, nempe, *furor insignis*, *robur stupendum*, & *frigoris tolerantia* plane mirabilis.

(*Curatio maniæ.*) Art. 439. Radix curationis consistit in validis vomitoriis sæpe repetitis, convenit etiam *venesectio*, præ reliquis radix *bellebore albi* est vomitorium maxime proficuum, sequenti modo præparata tuto propinari potest. ʒ℥. rad. *belleb. alb.* a ʒss ad ʒj. coque in vino donec mollescat, tunc abjiciatur vinum istud, & radix in vinum aliud injiciatur, & ita per noctem relinquatur in loco calido sine coctione tamen, postea coletur expressione levi vel forti, prout magis vel minus validum postuletur, vires sunt optimæ, nec unquam satis laudatæ; *nitrum crudum* & omnia *nitrata* summe conveniunt, remedia pro cura *melancholiæ* hic quoque locum habent. Immersio subitanea in *aqua frigida* quandoque prodest.

Farrago sententiarum.

(*Boerhaave.*) Art. 440. De horum affectuum origine, incremento, & ætiologia videatur *Boerhaave*. In sectis cadaveribus Mania demortuis (inquit *D. Shavu*) nihil alienum a sanorum corporibus invenitur, nisi forsitan *induratio meningis cerebri exterioris*, quæ probabiliter ejusdem oscillationes liberas plurimum immutat, & inturbat, unde spirituum animalium distributio valde enormis ac perturbata evadit.

(*Letitia.*) Art. 441. Cum melancholici plus justo latentur, indicium est ac præludium instantis *maniæ*.

(*Remedia varia.*) Art. 442. Succus *bedere terrestris* intus sumptus ad ʒij. vel iij. singulis diebus valde commendatur ad hunc morbum vincendum, item linimentum ex eodem succo confectum pro capite raso inungendo curam promovere creditur. Specifica duo simplicia adeo prædicata sunt *hypericon* (*Fuga Demonum* dictum) & *anagallis*. *Angelus Sala* pro arcano habuit *tincturam hyperici*, & aliquando cum careret *tinctura*, decoxit *summitates* ejusdem in vino Rhenano & cerevisia tenui: atque utiliter propinavit. Decoctum *anagallidis flore purpureo* (dos. ʒiv. ter in die) præmissa prius semel vomitorio tanquam specificum commendatur ab *Ettmullero*, *Hartmanno*, *Williso*, *Sennerio*, *Quercetano*, &c.

(*Alia.*) Art. 443. Sequens emeticum, quod fortissimum est, in hospitio mente captorum frequenter propinatur, ʒ℥. succ. fol. *asari* ʒvj. vel

vel ℥j. aq. card. ben. ℥ij. oxymel. scillitic. ℥℥. m. f. potio Pharm. pauper.
Cerevisia melanagoga.

℥℥. Rad. hellebor. nigr. ℥℥. jalap. ℥vij. hermodact. ℥℥. coq. in
 cerevis. nov. cong. xxiv. ad cong. xvij. addendo sub finem coction.
 sen. alexandr. ℥ij. rad. rhabarb. ℥vj. tart. alb. ℥iv. sem. coriandr.
 ℥vj. rad. liquirit. limatur. chalyb. ana ℥iv. fol. cochlear. hortens. M.
 iv. colaturæ add. fermentum.

Cerevisia ad Melancholiam.

℥℥. Fol. marrhub. alb. M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vj. ad
 cong. iv. cola & in doliolo suspendatur saccul. seq. ℥℥. Rad. chin. no-
 los. pæon. mar. ana ℥ij. polypod. ℥j. lapath. acut. ℥iij. Raphan. sylv.
 ℥x. fol. ling. cervin. M. iij. summit. hyperic. p. vj. cort. fraxin. ℥iv.
 pacc. junip. sem. dauc. ana ℥j. rasur. flanni (in modul.) ℥iv ferri
 rubiginos. ℥j. includ. omnia in saccul. &c. Pil. de lapide lazuli, flo-
 res salis armoniaci martiati, &c. sunt remedia proficua: Nescio an vi-
 res camphoræ, Regiæ societati a Dre. Kennier sesquianno abhinc
 communicatæ, ad hos contumacissimos affectus expugnandos ulterius
 tentatæ fuerint, necne. Dosis in his casibus est ad semidrachmam o-
 mni nocte, præmissis universalibus, & aliis remediis cephalicis & al-
 terantibus non penitus neglecti. Philosoph. transact. N. 400.

DELIRIUM RABIOSUM SIVE HYDROPHOBIA.

Cælii Aureliani sententia.

(*Hydrophobia.*) Art. 444. Ex morfu animalis rabidi homines in de-
 lirium rabiosum sive hydrophobiam incidunt, quidam celerius, qui-
 dam tardius, post annum vel eo amplius, sed frequentius post dies
 quadraginta.

(*Signa hydrophobiæ præscientiæ & præsentia.*) Art. 445. Signa præ-
 scientiæ sunt anxietas quædam, iracundia, somnus suspensus & turbatus,
 stomachi gravedo, oscitatio, & extensio frequens membrorum, insueta
 querela de aere quamvis sereno, parva bibendi voluntas. Signum præsen-
 tiæ mali ad apicem proventi est omnium potulentorum timor & abhor-
 rentia.

Meadii sententia.

(*Morbi progressus.*) Art. 446. Morfus canis rabidi hoc habet in se
 singulare & stupendum, quod interdum malum non prius detegatur,
 quam memoria illius causæ penitus oblitterata sit; *vulnus* enim est *æque*
medicabile ac communes morsus sanorum animalium: Sed quandoque
 longe post dira symptomata exsurgunt, post duos vel sex menses, in-
 terdum post annum integrum vel diutius, vel frequentius post qua-
 draginta dies sentiuntur dolores vagi per universum corpus, maxime
 circa partem læsam; æger evadit anxius ac tristis, & ad iracundiam
 proclivis; pulsus intermittit cum tremore aliquali & tendinum ac
 nervorum spasmis; adest insignis calor internus, & sitis, & postremo
 aquæ timor & abhorrentia (quod *essentiam* morbi constituit) adeo ut
 ne quidem conspectum potulentorum sine maxima consternatione fer-
 re possit, multo minus unam guttulam deglutire valeat; atque hoc
 est signum *pathognomonicum* morbi consummati, quod tamen non ac-
 cidit nisi sub ejus finem & ultimam *catastrophem*, nempe diebus duo-
 bus vel tribus ante obitum, cum morbus sit prorsus insanabilis.

(*Quid faciendum est in recens vulnerato.*) Art. 447. Sicut in aliis mor-
 bus venenatis, ita speciatim hoc in casu *Galenus* prudenter admonuit
 vul-

vulnus amplificare per *incisionem circularem*, *cauterio* inurere, & *ulcus apertum* fervare per dies 40. ad minimum: sin vero hæc methodus nimis dura & inhumana videatur, sufficere licet *cucurbitula* applicata vires extrahere, prægressa prius profunda scarificatione. Sola applicatione *unguenti Ægyptiaci* quam calidissimi recens vulneratum feliciter servatum novi.

(*Cura interna.*) Art. 448. Si quando remedia externa omnino omitantur, vel saltem haud recte vel tempestive adhibeantur, cura internis magna ex parte tentanda est; *alexipharmaca* sunt propinanda, inter quæ præ reliquis omnibus *cineres cancrorum fluviatilium* veteres medici uno ore magnopere extollunt; *Galenus* ait neminem periisse, cui hoc remedium propinavit; sumendi sunt cineres ad quantitatem coch. i. vel ij. singulis diebus ad dies quadraginta, vel soli vel potius cum pulv. rad. gentian. & thur. in vino.

(*Immersio in aquam marinam.*) Art. 449. Frequens immersio demorfi in *aquam salsam marinam* optimum & certissimum omnium prophylacticorum merito perhibetur ad hydrophobiam præcavendam.

Ettmulleri sententia.

(*Delirium rabiosum.*) Art. 450. Delirium rabiosum a morfu rabidorum animalium, in specie canis, oritur, unde hydrophobia; demorfi plane rabiosi redduntur, & omnino in mores brutales transmutari videntur, nihil fere humani apud se retinentes. Præter canes, etiam *feles*, *galli gallinacei*, *equi*, *muli*, *lupi*, *boves* & similia animalia fiunt rabida, & morsus eorum sunt venenati, ut & hominis irati. Notandum est, quod etiam morsus levissimus, immo tantillus salivæ contactus in homine, ab animali rabido receptus, suo tempore rabiem inferre possit, adeo penetrans & malignum est istud seminium. In decursu morbi hydrophobia est symptoma semper conjunctum. Extant exempla quædam, licet rariora hydrophobiæ, nullo morfu animalis rabiosi prægresso, sed dubium est an in talibus præcesserit aliqualis infectio, nec ne: contagium etenim subinde ad biennium, imo ad plures annos absconditum latet, antequam in actum erumpat.

(*Signa rabiei incipientis.*) Art. 451. Signa rabiei incipientis in demorfo sunt anxietas præcordiorum, iracundia sine causa, querelæ de molestia aeris ambientis, de corporis gravitate, & ineptitudine ad motum; æger melancholicus evadit, lucem fugit; a potu abstinet, in parte olim vulnerata morsicationem & titillationem, interdum dolorem sentit.

(*Hydrophobici inter triduum vel quatrimum moriuntur.*) Art. 452. In morbo perfecto ægri sunt anxii, spumant circa os, oculos horridos habent, quidam latrant instar canum, collum & fauces ringunt, liquida omnia abhorrent, insomnes permanent; in his extremis raro curantur, sed ut plurimum moriuntur inter triduum vel quatrimum post inceptam hydrophobiam.

(*Intentiones curativæ.*) Art. 453. Ex vulnere facto, quantocyus fieri potest, *malignum virus* extrahendum est, ideoque sanatio non cito perficienda est, sed vulnus potius ampliandum. Interne conducunt *cardiaca* & *alexipharmaca*, *tingtura bezoardica*, *spiritus theriacalis camphoratus*, &c. sed omnia dupla dosi danda sunt, & diutissime insistendum est his remediis; super locum morsum, *allium*, *ruta*, & *sal contusa* & *mista* apponenda sunt more cataplasmatum. Præ cæteris optima cura fit per improvisam in *aqua frigida* immersionem; convenit purgatio cum *bel-leboro* & *mercurio dulci*; *diuretica* prosunt, vis *cantharidum* est quasi specifica. Post scarificationem vulneris applicetur *cæpa* sub cineribus

bus affata vel sequens; ʒ℥. Capam acrem N. i. alliorum capita. N. 5. theriac. ʒvj. ferment. ʒ℥. f. cataplasma: sunt qui addunt, herb. rut. sem. sinap. ol. scorpion. &c. verum promptissimum remedium est ustio loci affecti cum ferro candente: hæc omnem malignitatem destruit. Si ferro advocatus sit medicus, applicanda est cucurbitula cum multa flamma; conducit etiam foniculus prope locum affectum excitatus.

Listeri sententia.

(Dolor in loco demorso diu post vulnus sanatum signum futuræ hydrophobiæ.) Art. 454. Præter signa ab aliis commemorata futuræ hydrophobiæ unum se (*Salium*), quod præcipuum & infallibile appellat, animadvertisse ait omnibus ignotum, viz. dolor quidam in loco commorso, licet ulcus antea per dies & menses integre fuerit sanatum, accedens, qui intensus esse non consuevit, nisi morsus partem nervosam petierit; hic dolor a loco jam commorso incipiens leviterque patientem affligens, per partem post partem spatio 3. aut 4. dierum plus minus ascendit ad cerebrum, ubi quasi vertiginem causat, & confusionem, indeque statim homo in rabiem deducitur.

(Omnes hydrophobici moriuntur.) Art. 455. Huic prognostico (nempe neminem aquæ metu oppressum servatum esse) consentiunt fere omnes antiqui.

(Virus in saliva maxime consistit.) Art. 456. Ex nostra observatione ipsam salivam præcipue vitari atque in ea unicum esse virus, experimentis credo: etenim hæc fere vulnera inficere solet, & etiam sine vulnere communicari potest malum. „ Huic conjecturæ adstipulatur historia duorum hoc malo affectorum solo salivæ tactu sine recepto vulnere, itemque duorum puerorum in Hibernia sola tractatione vulneris in capite canis ab altero rabioso demorsi pariter infectorum; historiæ prostant Actis philosophicis. Plures canibus rabiosis demorsi curæ meæ commissi fuerunt, sed ne unum quidem Hydrophobia laborantem mihi unquam contigit videre; suppeditamur exemplis in Gallic. Hist. Acad. Scient. quorundam curatorum, etiam ubi aquarum pavores aderant, maxime phlebotomiis usque ad deliquia iteratis vicibus celebratis; immersionibus in aquas salas tantum non mortem inferentibus, & perfusionem earundem usque ad extremas vitæ oras provectis. „ Quidam medicus hydrophobici cujusdam oculis mappam crassam superinjecit, manibusque ligatis, potionem bibere invitum aliquoties cogebat; at prorsus sinistro eventu; nam statim vehementer convulsus obiit. „ Qui plura velit adeat authorem Listerum, qui elegantissimum tractatum de hoc affectu conscripsit. Admiranda profecto est historia Jacobi Corte apud illum ab omnibus lectu dignissima.

Levvthorp. Philos. Transact. Vol. III. pag. 283.

(Remedium singulare.) Art. 456. ʒ℥. Rad. serpent. virgin. flor. hyeric. ana p. æ. f. pulv. dos. ʒ℥. vel ʒij. in julap. cephalic. ʒ℥. Fol. ut. ʒvj. theriac. Ven. allii, rament. Jovis ana ʒiv. infund. in vin. Cariam. vel alb. digere in balneo per horas 4. coletur cum expressione fortis, dosis ʒij. vel. iij. singulis auroris ad dies novem, maneatque æger jejunus per tres horas; manens residuum parti vulneratæ circumligetur & singulis diebus renovetur. Remedium hoc me nunquam fefellit. *Mayerne.*

(Remedium topicum.) Art. 457. Loco vulnerato quamprimum applicetur anus galli veteris plurimis prius divulsis; & si canis rabiosus esset, gallus statim intumescet, & mox morietur, & demorsus sanatur; si vulnus sit exiguum, ampliari debet.

(*Alia methodus.*) Art. 458. Aliter, homo morsus in mare quamprimum novies immergatur, & locus vulneratus cum lixivio e cineribus quercinis & urina eluatur, & applicetur cataplasma ex theriaca Londinensi, alliaria, ruta & sale.

(*Electuarium.*) Art. 459. 2℥. Fol. rut. sic. scord. ana ℥ij. rad. serpent. virgin. ℥i℥. flor. hyperici ℥iij. theriac. Lond. ℥j. syr. e cort. limon. q. s. m. f. elect. pro dos. ix. una singulis auroris sumenda.

(*Lichen cinereus.*) Art. 460. Lichen cinereus terrestris (Raii p. 117.) cum æquali quantitate piperis est remedium infallibile ad rabiem præcavendam in homine ac jumento.

(*Decoctum ad morsum canis rabidi.*) Art. 461. Aliquando expertum, vidimus decoctum ad morsum canis rabidi pharm. Bat. cum felici successu.

(*Signa diagnostica canis rabiosi.*) Postremo quoniam hoc malum a morfu animalis (& ut plurimum canis) rabiosi omnino pendet, operæ pretium esse videtur, ut accurate animadvertamus, quænam sint signa diagnostica canis vere rabidi, ut futurum morbum, si fieri possit, præcaveamus. Sequentia itaque habemus apud Lomnium; canis rabiosus esurit, sitit, nihil tamen cibi vel potionis sumit, oculos flammeos trucesque habet, auriculas demittit, linguam exerit, multum ore spumat, umbræ suæ oblatrat, sæpe sine omni latratu tristis atque anxius discurret, crebro tanquam cursu fatigatus spirat, caudam gestat intortam, nullo discrimine in quosque obvios animantes impetu ac morfu fertur, præcipiti atque incerto oberrans cursu. Integri canes & conspectum & latratum ejus, qui furit, exhorrescunt, ac fugiunt. Primum symptoma rabiei in canibus est *inusitatus tremor seu trepidatio.*

TARANTISMUS.

(*Tarantismus.*) Art. 462. Tarantismus est rabies eorum, qui a tarantulis sunt morfi. In Apulia Italiæ regione frequenter occurrit; apud nos nusquam invenitur. Spiritus animales primario afficiuntur. Cura per musicam peragitur. Clarissimus Baglivius de hoc affectu tractatum emisit; & de eodem etiam scripsit celeberrimus noster D. Mead, quibus remittendus est lector eruditus. Vid. etiam Hist. de l'Acad. Vol. VI. p. 20.

INCUBUS SIVE EPHIALTES.

Willisi sententia.

(*Incubus.*) Art. 463. Incubi paroxysmus fere tantum inter dormiendum ingruit, & plerumque post stomachum cibis dyspeptis aggravatum, & decubitus in lecto supinum excitari solet: eo laborantes potissimum in pectore & circa præcordia noxam sentire videntur; nam respiratione plurimum impedita, se a pondere, thoraci graviter incumbente, opprimi putant; quod pondus nunc hac nunc illa spectra aut larvæ specie ipsorum imaginationes illudit, nec excutere possunt, nec corpus dimovere; verum post diutinam, ac interdum fere ad vitæ deliquium, in præcordiis luctam tandem evigilant, & moles imaginaria evanescit; superstiti vero ut plurimum cordis tremore, & non raro diaphragmatis vibratione celerrima & violenta. Hic affectus raro ex se periculosus est.

(*Curatio.*) Art. 464. Præmissis universalibus cephalicis & antispasmodicis curatur.

Ettmulleri sententia.

(*Quomodo præcaveatur.*) Art. 465. Raro hoc malo afficiuntur, qui laudabili utuntur diæta, aut qui sobriam amant cœnam; si dormiatur in latere, elevato capite, præcavetur incubus. Ab Arabibus appellatur *epilepsia nocturna*, quia incubus habitualis & diuturnus in *epilepsiam* eandem degenerare solet, & est ejusdem prodromus in junioribus, uti in senibus *apoplexie*.

(*Curatio.*) Art. 466. Incubus habitualis curandus est, præmissis præmittendis, *antiepilepticis*, *martialibus*, &c. cum sobrietate conjuncta. *Lapis lazuli* laudatur.

Inter legendum.

(*Elegans morbi descriptio.*) Art. 467. Antonius Menibitius hunc affectum eleganter describit; quod sit nocturna spirandi difficultas absurda superinjectæ molis opinione somniantem eludens. Pueros frequenter exercet; quia voraces plus comedunt, quam digerunt.

(*Quandoque lethalis est.*) Cum vehementior impresserit præfocatio, quosdam interfici testatur Aurelianus; additque ex Silimacho contagiosum quoddam & epidemicum Incubum Romæ grassantem multos pestis instar jugulasse.

C A P. IV.

Sive Fasciculus Morborum quartus.

AFFECTUS CATARRHALES.

(*Affectus Catarrhales*) Art. 468. **A**ffectus Catarrhales, nimirum, Catarrhus, branchus; seu raucedo, & coryza, a se invicem juxta distichon antiquum distinguuntur.

(*Differentia.*) Si fluit ad pectus dicatur rheuma Catarrhus.

Ad fauces Branchus, ad nares esto Coryza.

C A T A R R H U S.

Ettmulleri sententia.

(*Catarrhus.*) Art. 469. Catarrhus proprie dictus est præternaturalis a ferro plus minus vitiato in quacunque parte facta alteratio seu functionum læsio. In genere frequentius præcedunt Catarrhos capitis gravitas, sensuum & actionum torpor, artuum lassitudo; supervenit successive refrigeratio quædam in superficie corporis, horripilatio dorsi levis, in Catarrho graviori febricula lenta. Intensiora sunt omnia symptomata in *calido Catarrho*, adest ardor, dolor, corporis quasi phlogosis, materia excreta est tenuis & corrosiva; remissiora vero sunt omnia in *Catarrho frigido*, ubi lymphæ est mitis, & excernuntur mucosa viscida & crassa.

(*Curatio.*) Art. 470. Conveniunt diuretica, & imprimis sudorifera ex *silibus volatilibus*, decoct. e *lignis*, speciatim *sassafr.* & *juni.* *rosmarinus*, *succinum*, *serpillum*, &c. In *Catarrhis calidis*, ubi lymphæ est tenuis acris aut falsa, prosunt opiata cum aromaticis & volatilibus. In *Catarrhis diuturnis* conveniunt vesicatoria & fonticuli. In affectibus catarrhalibus vix habetur par remedium fumo tabaci; omnibus enim satisfacit scopis. In frequenti usu sunt decoct. catechu & suffitus ad Catarrhum Fulleri.

(*Ventus Borealis.*) Art. 471. Ventum Borealem producendis Catarrhis aptissimum esse, præter Hippocratis testimonium, experientia communis suffragatur, Willis.

R A U C E D O.

Ettmulleri sententia.

(*Raucedinis sedes & causa.*) Art. 472. Raucedo seu raucitas est vocis diminutio; pars affecta est aspera arteria ejusque larynx; larynx enim primario format vocem; causa proxima est nimia effusio lymphæ tenuis. Est affectus *catarrhalis* a lymphâ acriori, saliori, aut acidiori.

(*Curatio.*) Art. 473. In Raucedine contumacissima *sperm. ceti* est expertum remedium, item decoctum *raparum*, *rob. passularum*. In Raucedine inveterata ubi mucus viscidus aut lymphâ crassa peccat, *incidentia* & *expectorantia* conveniunt, & præ cæteris *syrupus de erysimo*, & *oxymel scilliticum*, & *bals. sulph. venæsectio* vitanda, nam morbum diuturnum reddit.

(*Vermes.*) Art. 474. „ Interdum *vermes in intestinis* (683.) sunt causæ *Aphonie* vel Raucedinis, ut in praxi vidimus. „

(*Remedia varia.*) *Extractum pectorale loboch.* ad raucedinem. *Loboch. vitellinum*. *Lac ebutyratum*, &c.

C O R Y Z A.

Ettmulleri sententia.

(*Coryzæ descriptio & causæ.*) Art. 475. Coryza, five narium catarrhus, est quando copiosa lymphâ tenuis & acris in principio per nares defluit, & postea materia crassa, tenax, varie colorata cum dolore capitis gravativo, ab aere inclementiore ut plurimum ducens originem, rarissime a causa interna. Frequentissime recurrens periculum est, ne *ozænam* vel *polypum* producat.

(*Curatio.*) Art. 476. Coryzam inchoantem curant *naribus applicanda*, in ore *masticanda*, *suffitus*, *odora*menta, *illinitio narium cum ol. anisi* ante excoarationem, item *oleum succin.* vertici illitum, *ol. garyophyl.* cum bombyce naribus intrusum; *balsam. apoplecticum*, &c. quandoque in ulum veniunt. Ad Coryzam præcavendam *suffitus ex fumo succini*, *masticb. oliban. gum. animi*, &c. multum juvant, sed hæc in principio, si morbus ulterius progrediatur, conducunt *sternutatoria cum ol. chym. cinnamom. vel caryoph. vel ol. majoranæ*.

(*Remedia varia.*) Art. 477. Decoct. *catechu compositum* (in catarrho tenui præ aliis fere omnibus) decoct. *rosar. loboch. japonicum*, *loboch. vitellinum*, *suffitus ad catarrhum* (fumus, pallio similive tegumento capite prius tecto, naribus attrahatur,) *tabellæ domesticæ*, &c. sunt remedia in Coryza usitata.

AFFECTUS CATARRHALES IN GENERE.

(*Dieta sudorifica.*) Art. 478.) „ Cum fluxiones sunt pertinaces, aliis „ auxiliis haud cedentes, ad *diætam sudorificam*, tanquam ad summum præsidium & raro fallax accedendum est, eandemque 15. 20. „ vel 40. dierum spatium imperandam, vivendo toto hoc tempore pane „ biscocto, amygdalis torrefactis, & carnibus assatis cum decocto „ guajaci in frigidis & pituitosis, rustice viventibus; *Sarsaparillæ* & „ *Chinæ* in mollioribus & delicatulis. *Cbesneau*.

CATARRHUS SUFFOCATIVUS.

Ettmulleri sententia.

(*Catarrhus suffocativus.*) Art. 479. Catarrhus suffocativus est affectus laryngis, in quo hæc & caput asperæ arteriæ, in specie epiglottis, afficiuntur primario ab irritatione ibidem excitata arcturam & quasi stricturam efficiente; certum est sedem mali esse in isto loco; respirationem subito difficillimam reddit, & suffocationem minatur; incipit cum raucedine subitanea, deinde irritatur larynx, stringitur epiglottis, unde metus suffocationis; est quasi complicatio *tussis ferinæ & raucedinis* gravioris: oritur a lymphæ acore vel falsedine.

(*Curatio.*) Art. 580. „ Catarrhus suffocativus est morbus, si quis alius, plerumque revera peracutissimus hominem fere dicto citius jugulans; propterea omni arte properanda est cura, festinanter instituyendo multiplicem humorum divaricationem, per venæsectionem, cucurbitulas cum scarificatione, enematum acrium injectionem, vesicantium applicationem, artuum fortem deligationem, quam magni facio, & sequens cataplasma plantis pedum apponendum suaderem; ʒ℥. Herb. ranunculi flammæ minoris contus. p. iij. fmi columbin. p. j. pulv. euphorb. p. ʒ. Japon. nigr. q.s. acet. parum contundantur, &c. Author noster Ettmullerus vomitoria & opiate proponit, sed in paroxysmi articulo ambo suspecta habeo. Usui interno conducunt medicamenta volatilia & nervina dicta, item oleosa & mucilaginosas, privatim albumen ovorum cum syrup. de althea conquassatum & cum tantilla aqua nephrit. dilutum. Extra paroxysmum remediis antiasthmaticis, & ad catarrhum proprie dictum usitatis recidivatio præcavenda est.

(*Historia.*) Art. 481. „ Medicus quidam juvenis, athleticus, oppido vicino degens, præeunte per biennium raucedine, in hunc modum subito lapsus intra spatium 24. horarum mortuus est. Ipse & adstantes angina laborasse existimabant, etiamsi nullus tumor gutturis aderat, intus aut extrorsum, deglutitio neutiquam impedita, &c. Hora extrema implorabat meum auxilium, morbum fuisse catharum suffocativum admonui; statim ac locutus fueram, ægrotus ipse, qui adhuc mente constabat, agnovit morbum. Cucurbitulas illico affigendas imperavi; sed priusquam chirurgus officium inchoare poterat intra horæ quadrantem animam efflavit. Quatuor alios hoc morbo exitiali tentatos novi, quorum duos tantum servatos vidi.

(*Alia species.*) Art. 482. Est etiam illa species catarrhi suffocativi, ubi sanguis in pulmonibus stagnat, & moriuntur ægri ex syncope (est forsitan polypus cordis vel in vasis sanguineis majoribus) ejicitur spuma ex ore; Catarrhus hic suffocativus cognoscitur ex dolore pectoris gravativo, difficultate respirationis, & suffocationis metu, voce fere intercepta, anxietate ægri, interdum tussi, non semper; scretu non multum emittitur; appellatur etiam *syncope cardiaca.* (575.)

(*Curatio.*) Art. 583. Convenit venesectio quam ocissime, sperm. cet. ʒ℥. ad ʒj. in appropriato vehiculo insigne levamen adfert, sal. succini, antimon. diaphoret. & alia sudorifera, item gum. ammoniac. croc. est summarum virium in hoc casu.

T U S S I S.

Ettmulleri sententia.

(*Tussis.*) Distinguendum est an sit a pectore vel ventriculo &c.) Art. 484. Probe distinguendum est, an tussis humida sit ex pectore, an ex stomacho.

stomacho, an a *nervis*. Percunctandum est, ubi ægri percipiunt tussendi stimulum; an in larynge seu aspera arteria, vel pectore, vel inferius circa scrobiculum cordis; nam posterior locus *tussim stomachalem*, priores *pectoralem* innuunt; jubeatur æger profundius respirare; sic enim tussire incipiet, si vitium sit in pulmonibus; secus si in stomacho. Sonus in tussiendo ex profundo quasi raucus pulmones affectos indicat, superficialis asperam arteriam.

(*Tussis stomachalis.*) Art. 485. Nullus practicum aliquid habet de *Tussi stomachali* præter *Lindanum*; mihi (inquit) est compertum pluribus observationibus plerumque *Tussim* esse ex ventriculo: ubi autem materia latitet, & unde procedat, ex sono dicere possum, qui variatur pro materiæ & loci conditionibus; si materia sit tenuis, & in ventriculo delitescit, furibunda *Tussis* est, in qua vix aliquid egeritur, licet cum summo conatu tussiant (omnis *Tussis* in principio *sicca* progressu temporis evadit *humida*.)

(*Curatio.*) Art. 486. Ad expectorationem promovendam convenit succus *raphan.* recens expressus cum *pauco sacchar.* temperatus; *Tussis* humida *stomachalis* cum vomitoriis & *stomachicis* curatur; sancte testor, quod ex usu vomitoriorum ne minimum noxæ observaverim; purgantia non conducunt; *mercurius dulcis* vero primum obtinet. *Elixir proprietatis* & *bals. Peruv.* laudantur. *Tussis* sicca, nocturna, pectoralis, catarrhalis dicta, ex lymphæ vitio, & exinde irritatione, optime curatur per *volatilia sudorifera* & *opiata*, etiamsi febris conjuncta fuerit. *Flores benzoës*, *sperma ceti*, decoctum *raparum*, succus *glycyrrhiz.* &c. laudantur. In *Tussi* sicca chronica *phthisin* minitante, ubi peccat lymphæ, egregium est decoctum e lignis cum *passulis*, &c. Decoctum *raparum* in omni *Tussi* sicca, vel catarrhali, vel pectorali vel *stomachali* est nobile remedium, quod aliis irritis vidi optimum.

Sydenhami sententia.

(*Tussis epidemica.*) Art. 487. *Tusses* aliquando sunt *epidemice* nemini fere parcentes: Hæ pendent plerumque a febre aliqua constitutionis prægressæ, tamquam a morbo primario; ideoque quando cum febre implicentur; respiciendum est ad istius morbi genium; cum vero *tusses* sine febre contingant, curandæ sunt sola a carnibus abstinentia, moderato exercitio, & *ptisana pectorali refrigerante*: quandoque vero *tusses epidemice* ad *tussim* puerorum convulsivam quam proxime accedere videntur, & tunc eandem fere postulant medelam, viz. *venesectionem* & *catharsin*.

(*Curatio.*) Art. 488. *Tussis* recens (*phthisi* nondum confirmata) sola abstinentia a *Vino* & *carnibus*, & usu *loboch. ex ol. amygd. dulc.* &c. & *tab. domestic. seq.* ordinario subigitur; ℞. *Sacchar. cand.* ℞ss. coq. in q.s. aq. font. usque dum adhærescat extremis digitorum, tum add. pulv. *glycyrrhiz. enul. campan. sem. anis. angel. ana* ℞ss. pulv. *irid. florent. sulph. ana* ℞ij. ol. *anis. crym.* ℞ij. f.s. a. *tabellæ*. Sin vero, his tentatis, superstes maneat (præcipue si febrem comitem habeat, vel a *peripneumonia* vel *pleuritide* originem ducat) ineptum fuerit *pectorali* fidere; sed *venesectione* & *catharsi* debellanda est; si autem denique huic methodo non cesserit, tum capiat æger *bals. Peruv. gut. x. in coch. j. syr. heder. terrest. ter in die superbibendo* ℞ijj. decoct. *amar. sine purgantibus*; sed in *tussi* diuturna vel *phthisi* omnibus aliis præstidiis equitatio (492.) palmam facile præripit.

Farrago sententiarum.

(*Terra catechu*, & alia remedia.) Art. 489. Si *Tussis* a catarrho oriatur,

tur, curatur ut *catarrhus*, ℥℥. *Terr. catechu* ℥iv. *sacchar. penid.* in *aq. ros. solut.* (℥vi.) *mucilag. gum. tragacanth.* q. s. f. *trochisc.* si sub linguam teneantur, tussim curant, (inquit *Bonetus*) viscidam & tenacem pituitam bene solvunt, eamque commode expectorari reddunt, quare in his affectibus pulmoniacis mihi in frequenti est usu, semperque meo desiderio respondet hoc remedium.

Remedia nonnulla alia melioris notæ sunt, quæ sequuntur, viz.

Syrupus ex allio sequens;

℥℥. *Rad. enul. campan. incis.* ℥iv. *zinzib.* ℥vj. *rad. liquirit.* ℥vj. *coq.* in *aq. font.* ℔vj. ad ℔iv. sub finem add. *lobul. allii tenuiter incis.* ℥iv. *sem. anis. contus.* ℥i℔. colatur. add. *sacchar.* q. s. ut f. s. a *syr. Pharm. paup.*

Throchisci balsamic.

℥℥. *Balsam. Tolutan.* ℥℔. *pulv. rad. irid. enul. campan. ana* ℥ij. *gum. Arab. trag. ana* ℥j. *ster. benzoin.* ℥ij. *sacchar. cand.* ℔℔. omnibus in *pulv. subtil. redactis cum q. s. mucilag. gum. tragacanth. f. s. a. trochisci.*

Item. *Balsam. sulphuris anisat. & extractum pectorale, Loboch. rub. & Loboch. myrrhisat. præcipue Fulleri in recenti Tussi conveniunt.*

(*Admonitio.*) Art. 490. Discant ægroti Tussi laborantes, tempore idoneo, & cum morbus altas nondum egit radices, validisque adhuc viribus, remedia adhibere.

Principiis obsta, sero medicina paratur,

Cum mala per longas invaluere moras.

PHTHISIS PULMONARIS.

Sydenhami sententia.

(*Phthisis Pulmonaris.*) Art. 491. Phthisis pulmonaris a frigore hyemali plerumque ortum ducit, & gradatim crescit, viz. ab humore in pulmones delapso, unde *catarrhi* ritu eos ita jugiter irritat, ut tussis inde excitetur tantum non continua; & progressu temporis symptomata reliqua succedunt, & morbus frequenter evadit incurabilis.

(*Curatio.*) Art. 492. Tentandum est tamen defluxionem in pulmones minuere *venesectione & catharsi leni*, tum *pectoralibus* ad varios morbi status accommodatis, scilicet *incrassantibus*, vel *attenuantibus*, & *febrem hecticam temperantibus cum emulsionibus, lacte asinino, &c.* & postremo *ulcus sanantibus cum balsamicis, opobals. dos. gr. xx.* sed hoc non est sumendum nisi prægressis *evacuationibus* debitis.

(*Equitationis beneficium.*) Sed palmarium hujusce morbi præsidium est, ut æger quotidie equo vehatur; & qui se huic corporis exercitio sanandum tradit, nullis jam diætæ legibus adstrictus, nullo cibi potusve genere privandus est; cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur: hoc solummodo observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quam si puer aut juvenis esset, & sane haud multo certius *cortex Peruvianus* feбри intermittenti, quam in hac ætate *equitatio* phthisi medetur.

(*Tumor in collo.*) Quibusdam eorum, qui ex hac methodo convalescere, tumor in collo exortus est non multum a *scrophulis* abluens.

(*Prognosis.*) Art. 493. In Phthisi materia purulenta per tussim excreta in ignem coniecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aqua repletum fundum petit. Sudores nocturni, genæ livescentes, faciei pallor, nares exacutæ, temporum collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequaturam denuntiant. Inter chronicos Phthisis duos fere trientes jugulat.

lat : „ Nasus acutus, oculi concavi, collapsa tempora, aures frigidæ & contractæ, cutis circa frontem dura, intenta & resiccata, „ totiusque faciei color subviridis, niger aut lividus, lethale.

(*Facies Hippocratica.*) „ Hæc est illa *facies Hippocratica* vulgo dicta, ob traditam ab *Hippocrate* descriptionem, quæ humidi calidique nativi consumptionem, adeoque mox futuram mortem indicat.

Mortoni sententia.

(*Phthiseos causæ & diagnosi.*) Art. 494. Phthisis pulmonaris pendet aliquando à mala conformatione pectoris, estque illa vel *naturalis*, quando pectus sit nimis angustum, cervix longior quam par est, omoplatæ tanquam alæ videntur; vel *accidentalis*, ubi curvitas vel pectoris distortio. Signum Phthiseos appropinquantis primum est *tussis arida*, quæ per menses aliquot durat; catarrhus vero simplex est, humorosus & brevis. Vomitus vel vomendi dispositio post pastum tussi prædicta concitata est signum Phthiseos certissimum. Signum secundum est *febris hectica* cum calore in volis manuum, & rubore genarum præcipue post pastum. Tertium *extenuatio* partium solidarum in extremis digitorum maxime conspicua, unde incurvatio unguium; & postremo *febris putrida hectica* superveniens.

(*Phthiseos signa pathognomonica.*) Art. 495. Inter signa *pathognomonica* phthiseos confirmatæ, primum est *febris inflammatoria*, inflammationis pulmonum tuberculis, quæ febris tanquam febres aliæ inflammatoriæ tractanda est, viz. *visu tenui*, medicamentis *pectoralibus*, & *expectorantibus*, *linimentis*, & præcipue *venæsectione*, utcunque emaciatus sit æger (est enim *peripneumonia* cum pulsu serrato) *ol. lini* est remedium in hoc casu nunquam satis laudandum. Febrem hanc inflammatoriam sequitur *putrida intermittens*, quæ fit a suppuratione tuberculorum ob venæsectionem omissam, vel nimis parce celebratam, vel aliter; hoc autem est signum pulmonum corruptorum certissimum. *Cortice Peruviano* non profligatur, neque *antihectic.* *Poterii*, aut ullo alio remedio, nisi ulcere prius curato: hanc autem comitantur insignes aliquot evacuationes, seu corporis colliquationes (& hoc est signum *pathognomonicum secundum*), expectoratio materiæ purulentæ (*pus phthiseos confirmatæ* est graveolens, & etiamsi sit spissum, non tamen glutinosum seu tenax, sed fluidum, variorum colorum, viz. flavi, viridis, sed frequentius cinerei). Sudores colliquativi, quos si arte obstruuntur, insequuntur tumores hydropici in pectore vel cruribus, sive dysenteria vel diarrhœa. Signum ultimum est *salivatio*, unde calor gutturis præternaturalis, & aphthæ pertinaces, incurabiles, (mortem non procul abesse plerumque nunciantes.)

(*Curatio.*) Art. 496. Ad therapiam quod attinet, in principio *venæsectio*, *lenis purgatio* cum *pil. stomach.* *Russi tinctura sacr.* (*calomel.*) &c. conveniunt *diuretica*, *millepedes viv.* & *preparat. bal. sulph. terebinth. acidulæ.* *Diaphoretica*, *antimon. diaphoret.* *ceruss. antimon. privatim decoctum lignorum* (*in aq. calc.*) si adsit catarrhus & calor *hæcticus catharticus opiatu* sunt admiscenda, reliquis antecellit *pil. cynogloss.* seu *styrac.* Radatur caput & aperiuntur *fonticuli*. (Atque hæc est summa curæ rationalis & radicalis *phthiseos pulmonaris*. In confesso est *phthisicos confirmatos* rarissime curari; non tamen idcirco plane sunt deferendi; cum *palliativa cura* debeatur illis, qui non possunt curari perfecte.)

(*Diarrhœa.*) Art. 497. In diarrhœa *decoctum album* pro potu communi;

muni; sed opium est unicum præsidium, elect. ad diarrhœam. seq. in in praxi nostra maxime efficax expertus sum. ℥℥. coral. rub. præpar. matr. perlar. ana ℥ij. margar. præp. 3℥. spec. confect. de hyacinth. ℥j. ol. cinnam. chym. gr. iv. miv. cydon. 3i. laudan. Lond. sp. croc. solut. gr. vj. syr. balsamic. q. s. m. f. elect. Ad acrimoniam humorum obtundendam injiciatur quandoque enema ex jussulo ovin. cum diascord. 3℥. opiata bene ferunt hoc in casu ob metathesin materię morificæ a pulmonibus ad intestina: diarrhœa tamen non est temere aut nimis cito sistenda, ne gravius malum accideret, quod optime præcavetur expectorantia & lubricantia certis intervallis propinando, & diarrhœam moderando potius quam penitus vincendo.

(Tussis.) Art. 498. Ad tussim importunam & vigilias pertinaces levamen vix procurandum est, nisi ab opio; cum cautela tamen exhibendum est, parce, & non sine maxima necessitate; languores, dyspnœam, extremorum frigus, &c. inferat, & mortem properet, & medico dedecus pariat. Hic in usum veniunt linctus, trochisci, &c.

(Sudores colliquativi.) Art. 499. Sudores colliquativi, nisi sunt valde immodici, sunt tolerandi; sin vero sint maxime profusi, ita ut languores usque ad deliquium fere inducant, astringentibus & aliis propriis adminiculis moderari debent. Sequentes julap. uti soleo; ℥℥. Aq. tormentil. germ. querc. plantag. ana 3iij. cinnam. ten. 3iv. mirab. 3i. margar. præparat. coral. rub. præp. ana ℥ij. bol. ver. sang. dracon. ana 3℥. ter. japon. ℥j. syr. myrt. 3i℥. sp. vitriol. (dulc.) q. s. ad gratam aciditatem. m. f. julap. sumat 3ij. vel iij. omni bihorio vel trihorio phiala bene agitata.

Baynardi sententia.

(Ad febrem hæticam.) Art. 500. „ Si calor hæticus sit insignis, & „ & phthisis celeri cursu progrediatur, convenit diæta lactea, & lac „ asininum (si comparari possit) eligendum est; quoniam est minus „ crassum: huic vero succedaneum adinvenit, quod etiam valde com- „ mendat clarissimus Baynard in appendice ad psychrolusiam, nimirum „ serum sive lac butyraceum; quamplurimis (inquit) indicationibus „ satisfacit; refrigerat, humectat, nutrit, &c. & deinde inferius pergit „ laudatus author fidenter affirmans, & expertus loquens se compertum „ habuisse, quod plures ex continuato usu hujusce lactis a caloribus præ- „ ternaturalibus & etiam hæticis liberati fuissent; iisque, quibus calor „ est ingens & sitis importuna leviter acidulum præberi debuisset, re- „ cens vero & dulce magis nutriat. „ Et revera hæc omnia merito di- „ cta esse arbitror: Ego etenim plus semel raucedinem pertinacem & „ catarrhum mediante hoc remedio, utcunque vulgari, feliciter sustu- „ li; & in febre hætica magno fuisse commodo pro certo deprehendi. „

Ettmulleri sententia.

(Phthises variæ.) Art. 501. Phthisici dicuntur πνεύματι ἑξοχῇ ii, qui ulcere pulmonum laborant, & habent febrem hæticam conjunctam; eandem etiam habent ii, qui phthisi renari, jecorali, a vitio mesenterii, &c. laborant, tabidi evadunt. Tabes a glandularum mesenterii vitio solet habere abdomen inflatum ac tumidum cum dolore in ejus profundo obtuso, ac plus minus gravativo, itemque cum renitente hinc inde sparsa durtie circa umbilicum observabili.

Art. 502. Tussis phthisicorum non statim est pulmonalis, sed stomachalis, (485.) cui tandem acrioris lymphæ occasione per glandulas asperæ arteriæ, aut pulmonum excreta tussis pulmonalis supervenit. Ma-
teria

teria viscida in aquam exspuita supernatat, pus vero fundum petit. Materia pinguis phthysicorum urinæ innatat.

(Curatio.) Art. 503. Vomitoria sunt optima in omni phthysi incipiente, maxime si malum sit a vitio stomachi; purgantia sunt omnino vitanda; syrapi & saccharata omnia plus nocent, quam prosunt. Lindanus refert se curasse quendam domesticum atrophia laborantem solo decocto ex radice helenii cum passulis & glycyrrhiza, adjecta 10. parte vini Hispanici, nam & hoc nutrit egregie; laudatur rob. passularum.

Art. 504. Febris hecticæ hæc tria sunt quasi signa pathognomonica, 1. calor ipsi ægro fere occultus vix sensibilis, ab omni pastu post aliquot horas acutus. 2. Adest absumptio & extenuatio corporis successiva, 3. Pulsus celer, parvus, frequens, debilis & subinde durus, efflorescit plerumque facies colore plus minus rubicundo, & sudores nocturni infestant; accidit etiam frequenter capillorum defluvium, totius corporis lassitudo, frequens lipothymia; somnus horis matutinis est rarus; ægri conqueruntur de æstu interno. Hæctica incipiens difficillime cognoscitur, facillime curatur; confirmata e contra. In statu morbi urina in summitate pellem habet quasi oleaginosam, aranearum telis similes viscerum exulcerationes & corruptelas. Laudantur antimon. diaphor. & antihæctic. Poterii; & decoct. e lignis præ reliquis in lymphæ acrimonia, ut & sperma ceti. Ad ulcus pulmonum abstergendum, & sordes quæ præter vim expectorandi, vulnerariam quoque possident. Potus ordinarius phthysicorum hecticorum commodissime conditus sit fumo sulphuris ad imitationem Helmontii. Immo & fumus sulphuris cum aliis per os attractus singulare est experimentum cujusdam medici Hiberni, quo aliquot desperatos phthysicos curavit, ut refert Boyle.

Willisii sententia.

(De virtutibus cespitis cremati & aliorum remediorum.) Art. 505. Communis observatio est, regiones istas, sive in Anglia, sive in Belgia, ubi cespites ignes nutriuntur, & odorem valde sulphureum spirant, tabem rarius infestare; quinimo loca ista phthysi obnoxia, aut ea laborantibus maxime salubria, & non raro sanativa existere; cui accidit quod suffumigium ex sulphure & arsenico (quod sulphure copioso refertum est) pro curandis pulmonum ulceribus pene deploratis præstantius remedium in tussi quacunque, modo febris absit, quam rinct. sulphur. (sine empyreumate) dos. a gr. vi. ad x mane & vespere in coch. syr. idonei.

Sylvii sententia.

(Laus balsami sulphuris anisati.) Art. 506. Nullum hætenus reperi medicamentum, quod vel externe vel interne usurpatum citius tutiusve non tantum mundaverit, sed insuper consolidaverit recentia ulcera, atque sulphuris balsamum; cæteris vero omnibus imprimis præfero istud cum oleo anisi paratum, modo lente paretur, ita enim existit. Insuper pus ipsum tenuius fluidiusque reddit; adeoque ipsius excretionem promovet, ac faciliat. Ad mundati ulceris consolidationem quoque multum laudari solent rosæ rubræ, conservæ, & aliis præparationibus præfero decoctum rosarum rub. cum forti expressione paucis saccharo edulcoratum.

Farrago sententiarum.

(*Quibus potissimum tabes accidere solet.*) Art. 507. Tabes maxime fit ætatibus ab anno 18. usque ad 35. Hippocr. aphor. in aliis ætatibus evenire potest, at in isto vitæ stadio multo periculosior existit.

(*Phthisis est morbus contagiosus*, per indusia, per vestes, per lintea, per lectos, phthisin communicatam fuisse mille docent exempla (inquit Bonetus). „ Extant quidem huiusce contagii nonnulla exempla, „ sed, pace viri, non sunt adeo frequentia.

(*Usus mercurii dulcis.*) Art. 509. Quamdiu tabes est in primo gradu, & probabile est sanguinem non esse extravasatum, ulcusve nondum factum, debet ante usum decoct. ex lignis, & dum purgantibus utimur, adhiberi mercurius dul. non quidem cum purgantibus simul eodem die, sed sine purgantibus post aliquot dies. Pitcarn. in MS.

(*Acida in phthisi.*) Art. 510. Hoc constanter affirmo me contra omnium fere scriptorum practitorum sententiam acidis temperatis felicissime usum in curatione phthiseos (in hoc convenit author cum Colebatch.) Barbette.

(*Coagulum vitulinum.*) „ Atque hic liceat mihi obiter tantum mentionem facere coaguli vitulini, quo utuntur caseo conficiendo, tanquam fere unici acidia animalis, non solum in hoc morbo, (maxime in Hæmoptisi); sed in nonnullis aliis, de quibus hic non est dicendi locus, opem ferentis. „

(*Elaterium.*) Art. 511. Quæro cum in hydropo tussis vehemens moveri soleat, & elaterio sedari, annon eadem phthisis etiam elaterio, parce dato, tollatur? Lister de hydropo, pag. 20. Dubitatur.

(*Remedia varia.*) Art. 512. Remediorum sequentium vires & usus lector ipse expendat. Antihæcticum Poterii. Bals. sulph. anisat. nitrum saturat. Syrup. de peto. Sacchar. saturni. Aqua balsamica. Aqua limac. scorbut. aq. limac. pectoral. decoct. phthisic. express. milleped. simplex. Jusculum galli. Jusculum cancerorum fluviat. Jusculum consummatum. Lixivium de calce. Loboc. myrrhisatum. (Phthyisicis primo adhuc stadio optatissimum est, præstantissimumque profecto remedium. Fuller.) Tinctura antiphthisica. Decoctum flor. bellidis maj. Specificum habetur. Decoct. phthisicum, linimentum anodynum.

P H T H I S I S N E R V O S A.

Mortoni sententia.

(*Phthisis.*) Art. 513. Phthisis nervosa est absumptio corporis tabida sine febre, tussi, vel anhelatione insigni, appetitu tamen dejecto, & concoctione depravata, languent vires exhaustis carnibus & robore; aliquando indigenis accidit (immo nuperis annis sæpissime, ratio in propatulo est, scilicet, ex nimia spirituosorum liquorum indulgentia;) sed frequentius huc revertentibus ab insulis nostris in India occidentali. In principio habitus corporis oedematosus apparet, & quasi chylo spiritibus destituto distentus turget, facies pallet, ventriculus fastidit omnia exceptis liquidis; urina est pauca, & plerumque rubicunda, aliquando tamen, ut in aliis nervosis affectibus, pallida & copiosa; nulla adest febris aut dispnoea, nisi in ultimo morbi stadio. Constat luculenter genus nervosum affici (& primario ventriculum.)

(*Causæ procathartice.*) Art. 514. Causæ procathartice ut plurimum sunt graviores animi affectus, liquorum spirituosorum nimis libera ingurgitatio, aer insalubris, &c. (omnia etiam quæ cruditates, affectus hypochondriacos & scorbutum parere solent.)

(Cura-

(*Curatu difficilis.*) Art. 515. Est morbus revera *chronicus*, & nisi in ipso principio, curatu difficillimus; terminare solet in tumore *hydro-pico* incurabili.

(*Curatio.*) Art. 516. Quod ad therapiam attinet, in usum revocanda sunt medicamenta *stomachica* interna & externa, *chalybeata*, *antiscurbutica*, *cephalica* & *amara*. Instituat^r purgatio cum *spec. hier. in aq. rut. cerus. nigr. & pœon. comp.* externe *empl. stomach. magistral. cum gr. aliquot cinam. & absynth.* ventriculo applicetur. In æstate *aq. minerales chalyb. dictæ*; inter *chalybis præparationes extractum mynseht.* anteponendum est.

(*Atrophia scorbutica.*) „ Art. 517. Huic malo quoque affinis est iste, „ qui a Willisio *atrophia scorbutica* appellatur. p. 116. „

(*Animi affectus sæpissime hujus mali causa.*) Art. 518. „ Mæror qui „ est animi dolor, & lucubratio nimia, quæ est ejusdem labor, ambo „ Phthisi plerumque viam sternunt, ast omnium quæ mihi hætenus „ nota sunt, nihil corpus adeo velociter absumit, ac *insanus amor*, „ quando *ambit & non exambit*.

Tabes reliquæ ab aliis morbis ortum ducentes, aut ab iis quodammodo pendentes.

Mortoni sententia.

(*Phthisis ab hæmorrhagia.*) Art. 519. In phthisi ab hæmorrhagia suppressa, vescatur æger juscula & gelatinas, & alios cibos bonum nutrimentum præbentes. Convenit *dieta lactea*; incidit plerumque æger in febrem hæcticam, quæ *cort. Peruv.* profliganda est, ne in Phthisi pulmonari incurabili desinat.

(*Phthisis a gonorrhœa vel fluore albo.*) Art. 520. Phthisis a gonorrhœa vel fluore albo exorsa, confirmata cum sit, est prorsus immedicabilis; si recens fuerit, fluxus est sistendus, & æger cum *euchymis* nutriendus, & calor hæcticus, modo adsit, *dieta lactea*, aut *aq. chalybeata* extinguendus.

(*Phthisis ab apostematibus & ulceribus.*) Art. 521. In Phthisi ab apostematibus & ulceribus, ulcus tempestive sanandum est ope externorum & internorum, *aq. calcis seq. sit pro potu ordinario*; 2℥. *Rad. sarsaparil. incis. 3vj. uvar. Corinb. 1℔ss. infund. in aq. font. 1℔xij. coq. ad dimid. in colatura extingue calcis viv. 1℔ss. per residentiam depurat. sit pro usu.* Nisi habitus sit jamjam hæcticus *cathartica mercurialia* sunt usurpanda ad accelerandam ulceris curationem; immo excitare licet levem *ptyalismum* cum fructu; in usum veniunt *balsamica*, ut *syr. balsam. bals. Locatelli, Tolutan. &c.* suprema cura adhibenda est, ne Phthisis Pulmonaris sequatur; quarnobrem a curato ulcere fiant *fontanellæ*, continuetur usus *balsamicorum, dietæ lact. acidularum, &c.*

(*Phthisis a lactatu.*) Art. 522. Phthiseos a lactatu signa præfagientia sunt 1. Appetitus diminutio; 2. Spirituum languor & imbecillitas corporis; 3. Oppressio hypochondriorum. Tempestive ablaetandus est infantulus, & nutrix *diætæ lact. committenda*.

(*Phthisis a diarrhœa &c.*) Art. 523. „ Phthises a diarrhœa vel dysenteria, a diabete, a salivatione, ab hydrope, & a sudore nimio nihil „ habent peculiare a morbis primariis & Phthisi in genere dicendum. „

(*Phthisis scrophularis.*) Art. 524. Phthiseos scrophularis signa diagnostica sunt plerumque tumores scrophulares & crudi in externo corporis habitu, accomitantes vel præcedentes, *ophthalmiæ*, aut *scabies*, & similes affectus scrophulares. (1277.)

(*Curatio.*) Art. 525. Vitanda est *dieta lactea*, utpote obstructions pariens. *Radices scrophulariæ, filipendulæ, millepedes, &c.* cum *ingred. pulmonar. & balsamicis* conveniunt. *Opium* rarissime usurpandum est. („ Animadversum est a *Sculteto* mesenterium hoc malo semper primo esse affectum, & frequenter tumoribus strumaticis obsideri, sanis adhuc partibus externis; & in hoc casu difficile est quidem, nisi conjectura sola, morbum invenire, priusquam ægrum pene interfecerit. „ Convenit *emplast. de sapone* toti abdomini, &c.

(*Decoct. tussilag.*) Art. 526. „ Est aliquid singulare in decocto *fol. tussilaginis* ad hunc morbum curandum, etiam in ægris maxime deploratis, & fere desperatis. *Fulleri medicina gymnastica.* (v. locum p. 92. &c.)

(*Phthisis scorbutica.*) Art. 527. Phthiseos scorbuticæ signa diagnostica præcipua sunt eruptio macularum hinc inde sparsarum per universam cutem, screatio fere perpetua puris viscidissimi a glandulis jugularibus præcipue tempore matutino, exulceratio & extenuatio maxillarum.

(*Curatio.*) Art. 528. Conveniunt *pectoralia incidentia* cum *antiscorbuticis*, ut *summit. pini, rad. oxylapath. authoris pil. balsamic. chalybeata, acidulæ, &c.* *opium* omnino vitandum est, ut & *dieta lactea*, & immodica *fumifuctio*.

(*Phthisis asthmatica.*) Art. 529. Phthiseos asthmaticæ signa diagnostica sunt anhelatio, & spirandi difficultas; hæc autem phthisis est valde chronica, & est phthisis senectutis.

(*Curatio.*) Art. 530. Omnia incrassantia sunt vitanda; profunt medicamenta *expectorantia, incidentia, &c.* ut *syrupus de erysimo, e 5. rad. millepedes, pil. balsam. nostr. &c.* *venæsectio* in paroxysmo, *oxymel. scillit. & aq. cinnam. fort. ana p. æ.*

(*Phthisis hypochondriaca.*) Art. 531. Phthisis ab affectu hypochondriaco vel hysterico a cæteris distinguitur symptomatis his affectibus peculiaribus.

Art. 532. Curatio est fere ejusmodi cum aliis (præcipue cum phthisi scorbutica) conducunt *volatilia, chalybeata, &c.*

Harvei sententia.

(*Phthisis ab hæmoptoe.*) Art. 533. In phthisi ab hæmoptysi sanguis a pulmonibus ejectus sine dolore per tussim exantlatur; & si rupta fuerit vena, ut plurimum prima eruptione magna copia egeritur, & postea minori quantitate: in principio apparet tenuis sincerus & floridus cum spuma flavescente; progressu temporis pallidior & aquosior evadit cum bullulis; postremo cum pure commistus excernitur. Quia per *diapedesin* expectoratur, dilutior est, & minus copiosus cum humore seroso vel purulento confusus.

Etmulleri sententia.

(*Hæmoptysis.*) Art. 534. Hæmoptysis est quando sanguis ex pulmonibus per os tussiendo ejicitur, aliquando, sed rarius, sine tussi; sanguis rejicitur vel floridus vel semigrumofus, facile vel difficulter, cum vel sine dolore, spumofus vel non. Si ex pulmonibus provenit, sæpius *vomicam, empyema, aut peripneumoniam*, & hinc *Phthisin* post se trahit.

(*Curatio.*) Art. 535. Convenit *venæsectio, purgatio* vitetur; *diuretica & diaphoretica* locum habent; *opiata* sunt perquam proficua, in specie semen *hyosciami* est nobile specificum tam veteribus quam modernis commendatum; cavendum est tamen in ejus usu ob vim narcoticam

ticam ne exhibeatur in nimia dosi, sed tutius est propinari repetitis vicibus; maniam etenim inducit nimis larga dosis. Respiciendum est ad acrimoniam sanguinis in hujus mali cura hoc facto, quæ in capite de hæmorrhagia tradita sunt, hic locum habent. *Hedera terrestris* est plane mirabilis, item succus *urticæ*, *catechu*, *trôchisc. de carabe*, *oleum lini cochleatim* sumptum mira præstat, *ol. vitriol. succ. cydon. decoct. bord. cum passul. min.*

(*Accidentalis vel habitualis.*) Art. 536., Hæmoptysis est vel *accidentalis vel habitualis*; posterior est Phthiseos signum: *cortice Peruv.* optime & tutissime curatur, astringentibus sistitur, ut *bol. Armen. sang. dracon. lapid. hæmatit. &c. Morton.*

(*Remedia varia.*) Art. 537. Mantissa. *Elect. Boylean. elect. Peruv. astring. elect. styptic. emulsio styptic. haust. japon. loboch. japon. pulv. hæmopticus, stypticum regis. Syrupus Boylean. succus urtic. menth. sed præ reliquis heder. terrest. In hæmoptoe accidentali desperata, cæteris incassum tentatis, (sicut in aliis omnibus hæmorrhagiis) medici expectationem rarissime frustratur sequens remedium; ℞. Aq. plantag. vin. rub. astring. ana ℞℞. Syr. papav. errat. ℥ij. ol. vitriol. quantum lingua ferre potest; f. julap. suffitus ex calce viv. & acet. in extremis eximie confert.*

Mortoni sententia.

(*Phthisis a chlorosi vel mensibus obstructis.*) Art. 538. In Phthisi a chlorosi vel mensium obstructione non nisi in principio *chalybeata* tentanda sunt; calorem enim hecticum adaugent, & sanguinem exagitant; sed potius *pulmonaria*, &c. sunt usurpanda.

(*Phthisis a pleuritide, &c.*) Art. 539. Phthisis a pleuritide vel peripneumonia male tractata, julepis contemperantibus, expectorantibus, venæsectione, acidulis, &c. tractanda est, vel si sit empyema, *paracentesi. Millepedes*, decoct. *sars. sal. succin. diuretica*, &c. Historia prima hoc morbo laborantis est insignis & notatu dignissima: vide locum.

(*Phthisis ab ictero.*) Art. 540. Phthisis ab ictero non curatur nisi sublato morbo primario; ideoque remediis *antiictericis* oppugnanda est.

V O M I C A P U L M O N I S.

Willisii sententia.

(*Vomica pulmonis.*) Art. 541. Rara est mentio hujus affectus apud authores. Vomica Pulmonis plerumque accidit sine febre aut phlegmone, immo sine tussi immani, aut sputo, tacite ac velut improvise in pulmone generatur, & non raro non prius se prodit, quam patientem interimit. Latet (inquit *Tulpius*) inter initia ita clanculum, ut vix ulla sui proferat indicia præter tussiculam, primo siccam, mox humidam, qua aliquandiu continuante, trahitur difficulter spiritus, deficit anima, & emarcescit paulatim corpus, licet interim nec sanguinem præ se ferunt sputa; sed si rumpatur nec opinanti vomica, occiditur (dictum ac factum) homo. Ita interdum solet contingere; verum novi plures, qui ex Pulmonis Vomica sensim orta, maturata, & demum rupta, pus copiosum & foetidum expuissent; cumque tale sputum per multas hebdomadas, immo menses quotidie excernentes debiles adeo & velut tabidi evaserint, tandem medicamentorum ope, cum ulcus detergeretur & siccaretur, integre convaluisse. Ab abscessu in Pulmone exoritur, & pus sæpissime insigniter foetet, eoque differt a sputo, quod in peripneumonia & Phthisi ejicitur. Causæ remotiores latent, neque per signa ulla *pathognomonica* dignosci valet hicce morbus,

bus, neque prognosis institui potest; antequam icu ferali se prodit. (Curatio.) Art. 542. Post Vomica disruptam medendi methodus fere eadem est ac post sectionem *empyematis*, aut in *phthisi* incipiente; in hoc casu *lac asininum* sæpe prodest; observavi quoque *fontanellam* in latere excitatam non raro insigniter profuisse. Historias quasdam adducit author, de quibus consulendus est. p. 205.

Baglivii sententia.

(*Baglivius vomicam accurate describit.*) Art. 543. Tuberculo pulmonum laborantes de cætero bene se habentes, difficulter spirare incipiunt, inter spirandum non stertunt, & nihil expuunt, dolorem quoque in pectore sentiunt continuum, & dolentem in locum decumbere non possunt, sicca tussi laborant, tandem genæ rubent, febricula supervenit; & negotio ad suppurationem vergente alia suppurationis symptomata accedunt. Duo tamen tanquam *pathognomonica* crudi & adhuc incipientis tuberculi signa sunt, *tussis sicca*, & *dolor lenis* in alterutro pectoris loco; & quamdiu quidem tuberculum adhuc crudius fuerit, dolorem exilem & tussim siccam inducit. Qui tuberculo pulmonum laborant, sæpissime derepente moriuntur; nam suppurato tuberculo pus erumpit in trachæam, & suffocat; hinc quo longius a trachæa, & pulmonum centro distat, eo minus periclitantur de suffocatione; pus enim in cavitatem pectoris erumpet, aut per urinas eliminabitur.

Ettmulleri sententia.

(*Differentia inter vomicam & phthisin.*) Art. 544. Vomica Pulmonum & phthisis in eo saltem differunt, quod Vomica sit *ulcus Pulmonum clausum* seu *abscessus*, phthisis *ulcus sordidum ex abscessu jam aperto*: nam in Vomica interdum pus est laudabile, quod suis membranis inclusum citra excretionem in Pulmonibus hæret, & etiam sine tussi aliquando existere queat. A tumoris intus ruptione exsolutio, vomitus, & animi deliquium fit. *Hippocratis Aphorismi.*

A S T H M A.

Floyeri sententia.

(*Asthmatis definitio.*) Art. 545. Asthma est respiratio difficilis & laboriosa cum scapularum elevatione & sibilo, a compressione, coarctatione, vel obstructione vasorum pulmonalium. Estque vel *continuum* vel *periodicum*.

(*Asthmatis continui cause.*) Asthma continuum pendet a compressione venarum & vasorum bronchialium & vesicularum pulmonalium vel nervorum. 1. Propter pectoris hydropem. 2. Empyema, phlegmonam, abscessum vel tuberculum. 3. Polypum in vasis sanguiferis, sanguinis ipsius coagulationem, varicem, plethoram, obstructions catameniorum, hæmorrhoidum, fonticulorum, ulcerum, pforæ, &c. 4. Lapides in trachæa generatos. 5. Obesitatem nimiam, vel intumesceniam thymi. 6. Gibbam. 7. Pulmonum adhæSIONem. 8. Nimiam pulmonum intensionem a cursu (vociferatione,) &c. 9. Hydropes, tumores visceris alicujus insignioris. 10. Coli vel ventriculi inflationem. 11. Paroxysmos apoplexiæ, vertiginis, lethargi, serum extravasatum nervos opprimens. 12. Tumores pulmonum flatuosos, quemadmodum accidit in equis illa ducentibus, vulgo *broken-winded Horses*.

(*Periodici cause.*) Art. 546. Asthma periodicum pendet a compressione vasorum & vesicularum bronchialium mediante halitu flatulento, & morbis sequentibus plerumque succedit; 1. Febribus intermittenti-

tibus

tibus, variolis, peripneumoniis, 2. Catarrho. 3. Affectionibus hysteri-
cis. 4. Ephemeræ, a sex non naturalibus, maxime aeris mutationibus
subitaneis, pendent, 5. Cacochymia glutinosæ, flatulentæ, in ven-
triculo prognatæ, ibique inflationes excitanti, & denique inflationem
in pulmonum vesiculis producenti. Atque hoc est *verum Asthma fla-
tulentum periodicum*.

(*Asthmatis periodici paroxysmi plerumque sunt regulares; continui non
ita.*) Art. 547. Observandum est Asthmatis *continui* paroxysmos frequen-
tes esse, a nimio corporis motu, vel errore in diætâ inductos, vel
noctu recurrentes; sed hi recursus non sunt adeo regulares ac in Asth-
mate *periodico*, ubi decimo quoque die redeunt paroxysmi. Circa ho-
ram 2. vel 3. pomeridianam a prandio asthmatici sentire solent coar-
ctationem vel inflammationem circa scrobiculum cordis vel os ventri-
culi, quod tunc temporis flatibus distenditur, & ructus insipidos co-
piose emittit; atque hæc ventriculi inflatio est primum signum appro-
pinquntis paroxysmi, hanc sequitur sanguinis effervescencia, & huic
proxima spirituum in pulmonum nervis & membranis expansio seu ra-
refactio, quippe rigidi & inflati sentiuntur.

(*Paroxysmi descriptio.*) Art. 548. Hora prima vel secunda matutina
paroxysmus sensim obrepit; respiratio evadit lenta, & mox angusta:
si paroxysmus futurus sit brevis, nempe duarum vel trium horarum,
& æger e lecto surgat, dyspnœa brevi faceffit, & expuit *crudum* quen-
dam & *glutinosum* scretum, instar *albuminis ovi* vel solutionis *gum-
tragacanth.* tam in Asthmate *humido* quam in *hysterico* (sicco vel *con-
vulsivo*;) hæc autem materies lineis nigris seu filamentis discrimina-
tur: si vero diuturnior futurus sit paroxysmus, viz. duarum, trium
vel quatuor dierum, primis diebus parum aut nihil expectoratur, sed
3. vel 4. die materia purulenta, magis cocta, & non adeo glutino-
sa, coloris albicantis, viridescantis, vel flavescentis, & in morbo in-
veterato saporis dulcis, instar sanguinis aut glycyrrhizæ, vel etiam
saporis putridi, falsi, aut acidi, & frequenter cum filamentis sangui-
neis. Intra spatium 3. 4. aut 5. dierum paroxysmus prorsus finitur,
& exinde parum, aut nihil expuitur ante novi paroxysmi exorsum.

(*De paroxysmis observationes variae.*) Art. 549. Plures & diuturnio-
res occurrunt paroxysmi in *æstate* quam in *hyeme*; ego ipse viginti in
æstate, & tantum sexdecim in hyeme sustinui; in *Augusto* severiores
semper; quando diuturniores paroxysmi, tanto majora intervalla, &
vice versa: Intervalla breviora mecum fuerunt 2. 3. 4. 5. 6. vel 7.
dierum; longiora 8. 9. 10. vel 14. dierum; calor lecti morbum exa-
sperat; extremum frigus est tolerabile sine injuria. Magna pallidæ
urinæ copia in paroxysmo excernitur, sed sub finem rubicundior eva-
dit cum sedimento crassiore, Quanto parcius & tenuior sit victus in
paroxysmo, maxime in principio, tanto melius; minor erit quantitas
chyli ad pulmones missi, & materia purulenta citius coquetur & eva-
cuabitur, carnes itaque sunt omnino prohibendæ. De victu convenien-
ti & improprio *vide locum p. 90.*

(*Indicatio curativa generalis.*) Art. 550. Ad unum scopum potis-
simum dirigenda est cura, nempe ad *temperandam effervescenciam*; ma-
lum etenim ipsum est quasi *catarrhus*, ideoque propinanda sunt reme-
dia *incidentia minus calida*. *Venæsectio* quotiescunque repetita solum-
modo levamen præsentaneum affert, senibus asthmaticis maxime per-
niciosa est: ad *cachexiam* enim & *leucophlegmatiam* viam munit.

(*Remedia varia ab authore comprobata.*) Art. 551. *Acetum scilliticum*

ad omnes flatulentias a Galeno valde commendatur; sensus acuit, respirationem facilem reddit, coctionem juvat, alvum laxat, urinam movet, flatus dissipat; & præ omnibus contra asthma egregia præstat. Sequens est syrupus asthmaticus declinante paroxysmo sumendus, dos. coch. j. mane & vesperi, 2℥. Syr. de erysim. præss. balsam. ana ℥ij. oxymel. scillit. aq. brion. ana ℥j. bals. Peruv. 3℔. m. Cortex Peruvianus ad avertendum paroxysmum multum laudatur. Aqua simplex cum pane cocto, additis paucis nitro & sal. ammoniaco, copiose epota, & hor. decubitus acet. scillit. ℥ij. mecum frequentissime adventum paroxysmi eluserunt. Et oxymel nost. cum rad. zedoar. &c. vid. Pharm. Fulleri. Eundem ad plures menses protelavit. Hypnotica ad compescendam inflationem multum valent (in asthma convulsivo) testibus Riverio & modernis plerisque, inter quos clarissimus Gibbons. Mihi in frequenti usu fuit haustus seq. 2℥. Aq. papav. ℥ij. sal. prunel. 3℔. Syr. papav. 3vj. m. In paroxysmo omnia calida sunt maxime perniciofa, acida blanda sunt magis proficua, ut mala aurantia, limonia, citria, fructus berber. acetum ol. sulphuris per campan. &c. 2℥. Conserv. acetos. cynosbat. rob. berber. ana ℥j. crem. tartari ℥ij. Syr. limon. q. s. m. f. elect. pro pauperibus posca, gas sulph. (i.e. aqua fumo sulph. saturata), quod remedium est maxime efficax. Semel atque iterum exhibui medicamenta mercurialia in hoc morbo cum felici eventu, sed hoc fuit in leprosis. De virtutibus acetii vide locum p. 123.

Willisi sententia.

(*Asthma convulsivum.*) Art. 552. Observare licet graves asthmatis paroxysmos sine quavis notabili pulmonum labe accidisse, revera ut putaverim hunc morbum aliquando esse mere convulsivum: paroxysmo etenim finito, quin etiam priusquam incipitur, respiratio libera & æqualis satis recte ducitur, nullaue tussis, aut valetudinariæ pulmonum dispositionis signa apparent. Hujusce morbi varias adducit historias. Ad hujus generis asthma curandum medicamenta antispasmodica, potius quam bechica vel pneumonica adhibenda sunt. p. 92. Millepedes in hoc affectu egregia præstant.

(*Prognosis & curatio.*) Art. 553. Asthma inveteratum difficillime aut vix unquam curatur, magnum tamen a medicamentis juvamen accipit, in deterius vergens, aut phthisin aut hydropem, aut affectum quendam soporosum vel convulsivum minatur. Extra paroxysmum peccoralia cum antispasmodicis conjungantur. Laudantur spiritus gum. ammoniac. cum sal. ammoniac. distillat. dos. a gr. xv. ad xx. tinctur. sulph. &c. sed maxime sp. gum. ammoniac. vires extolluntur. p. 213. „ De viribus visci arbor. vid. (Art. 389.

Ettmulleri sententia.

(*Asthma humidum & siccum.*) Art. 554. Adest in omni Asthmate respiratio frequens laboriosa & difficilis cum anxietate circa præcordia; adest sæpe tussis, interdum crebra & molesta, interdum non, interdum adest stertor; interdum sine stertore orthopnoea laborant. Asthma dividitur in humidum & siccum; sive in manifestum & occultum; prius expectorationem materiæ purulentæ conjunctam habet, alterum est mere convulsivum: verum interdum hi asthmatici, in fine paroxysmi, aliquid licet parum muci emittunt, quod non causa peccans est, sed ex conatu respirationis circa laryngem & fauces aliquid colligitur, quod evacuatur: causa materialis asthmatis humidi aut in pulmonibus est mucus viscidus, vel pus in vomica, empyema, phthisis, &c. vel serum

pulmones copiosius inundans, vel sanguis in motu impeditus: aut in stomacho & primis viis ex cruditatibus, cachexia, &c.

(Curatio) Art. 555. Probe observandum est an Asthma sit morbus primarius vel secundarius; si posterior, respiciendum est ad morbum a quo pendet. In paroxysmo Asthmatis humidi optima omnium sunt vomitoria, nec est quod exinde metuatur suffocatio, dyspnœam insigniter tollunt; in Asthmate sicco quoque extra paroxysmum cum fructu propinantur cathartica, in paroxysmo neutiquam conveniunt; malum etenim exasperant. Venæsectio locum habet solummodo in Asthmate ex vitio sanguinis orto. Opiata in Asthmate sicco multum conferunt, in humido suspecta sunt. In Asthmate humido, præsertim in senibus laudatur syr. nicotianæ. Succus raphani est potentissimum expectorans. Gum. ammoniacum est optimum remedium. Sperm. ceti a ʒss. ad ʒj. in paroxysmo multum levamen adfert. Denique millepedes in utroque Asthmate est remedium omnem laudem exsuperans. Pro curando Asthmate sicco sive convulsivo conducunt in genere antiepileptica, antihysterica, antispasmodica, & opiata, cinnabarina, sal. succin. cast. &c.

Farrago sententiarum.

(Coffee.) Art. 556. Potio coffee omnium maxime certissimeque inflationem mirum in modum curat & compescit in ipso paroxysmo. Musgrave.

(Epispastica.) Art. 557. „ In paroxysmo diuturniori & periculoso „ conveniunt vesicatoria præcipue tibiis applicata, ex Hippocratis præcepto. „

(Remedia varia.) Art. 558. Remedia sequentia judicio prudentis medici permittuntur. Flor. benzoin. dos. a gr. v. ad xij. nitrum saturatissimum. Serum sinapium. Sp. nitr. dulc. decoct. expectorans. Emulsio asthmatica. Emulsio Brunneri. Expressio asthmatic. expressio milleped. hydromel. Joelis (in Asthmate humido) loboch. virid. (in moribundis) mistura expectorans. Oxymel. asthmatic. Floyeri.

C A P. V.

Sive Fasciculus Morborum quintus.

MORBI CORDIS.

Cordis morbi.

COR variis Morbis gravioribus obnoxium esse, & revera affici ex defunctorum sectione satis patet. In Historia Medica occurrunt exempla vermium in ipsis ventriculis latitantium; item calculorum ibidem reperorum. Tumores schirrosi & id genus alii Cor occuparunt; apostemata, abscessus, & exinde sordida ulcera ipsam Cordis substantiam & auriculas obsederunt. Omnes Cordis Morbos absolute lethales non statim existimandum est; contrarium etenim ex Bartholomæi Cabrollii observatione constat. Ipse ego (inquit) præsentè Rondeletio duo mirabilia satis in duobus cadaveribus exhibui, in uno in basi Cordis ad coronariam cicatricem duos latos digitos longam detexi; in altero ulcus in Corde latitudine folii myrtini sat profundum. Observ. Anatom. 26. In adolescentis cadavere (inquit Cheselden. Anat. p. 169.) magnam vim puris in pericardio; & Cor ipsum exulceratum inveni. Et in homine tabide mor-

tuo pericardium undequaque Cordi adhærens, & portio ipsius Cordis ossificata, fere unius digiti lata, reperta sunt.

(*Inflammatio Cordis.*) Art. 560. Verisimillimum est medicos interdum hallucinari inflammationem cordis cum peripneumonia confundentes: æquum est enim, ut supponamus, cor inflammatione tentari, secus vix credibile est suppurationes & ulcera ibidem existere nisi præeunte inflammatione. Dies melius docebit.

Art. 561. Quo circa quoties propria Cordis substantia constitutione aliqua præternaturali afficitur, æque solliciti debent esse medici ac in morbis hepatis cerebrive, neque negligenda sunt media, quæ aliarum partium Morbis similibus subvenire solent.

(*Remedia ad Vermes.*) Art. 562. Vermiculos & in corde & in capsulis ejus gigni extra dubium est. Noscitur ex puncturis & doloribus Cordis, & convulsio plerumque est signum diagnosticum. *Remedia mercurialia* hic præ cæteris profunt, immo *argentum vivum* in substantia exhibitum est maxime efficax, *Hartman.*

PALPITATIO CORDIS.

Willis.

(*Palpitatio cordis est Morbus convulsivus.*) Art. 563. Palpitatio Cordis est motus ejus (*convulsivus*) adeo vehemens & immanis, ut non solum tactu manifestius percipi, verum & oculis conspici, immo interdum ad distans quoddam audiri possit. Porro ab authoribus fide dignis narratur ipsas costas interdum effringi, aut in junioribus foras propelli, p. 102. &c. de hoc morbo egregie scripsit *Willisius*.

Ettmulleri sententia.

(*Causæ sunt variæ.*) Art. 564. Causæ sunt variæ, aliquando excrementiæ verrucalæ Cordi adnatæ, ossificatio arteriæ magnæ prope cor, vermes in ipso corde, aut pericardio, abscessus in Corde, status sanguinis præternaturales, polyposæ concrescientiæ, calculi, flatus, ataxia spirituum animalium affectum spasmodicum faciens, (*chlorosis seu pallidi virginum morbi, catameniorum obstructio.*)

(*Curatio est difficilis.*) Art. 565. Quæ a scorbuto aut affectione hysterica ortum ducit, est curabilis; quæ a reliquis causis ut plurimum incurabilis. Cavendum est ab opio; *venesectione* in dubium vocatur, (*Galenus vero, de locis affect. capitis, instat urgente paroxysmo venesectionem omnibus remediis præferendam esse.*) Cura aggredienda est *martialibus, coralliatis, cinnabarinis, volatilibus, & succinatis.* Ol. *cinnam.* laudatur a *Lindano.* *Rosmarinus, crocus, camphora, ambra, moscus, sal. volat. viperin.* (& alia *viperina*) *castoreum*, verbo uno *antispasmodica.* „ Si diutius protrahatur, periculum ostendit *repentinæ* „ *mortis.* Qui hoc morbo in juventute tentantur, nunquam senescunt „ ex observatione *Galen.* „

(*Remedia varia.*) Art. 566. Medicus peritus de usu sequentium „ quomodo & quando bene novit; „ *aurum mosaic. cataplasma stomach. emplast. stomach. fons spirituosus, julap. moschat. mistur. hyst. spirituos. saccul. stomach. tinctur. epileptica, hæc ex Pharm. Fulleri.* Item, *Pulv. ad gutt. sp. C. C. succinat. sp. lavand. comp. &c.* Vide etiam remedia ad singultum (372.)

TREMOR CORDIS.

Willisi sententia.

(*Tremoris Cordis descriptio.*) Art. 567. Tremor cordis est *carnium*

ejus convulsio spasmodica, seu potius *trepidatio*, qua fibræ motrices celerime, ac tantum semicontractæ vices ocissimas, verum abruptas & quasi dim. iatas efficiunt.

(*Curatio.*) Art. 568. Ad curam quod attinet, tria remediorum genera maxime proficua esse solent, viz. *testacea*, *chalybeata*, & *sale volatili* prædita.

Ettmulleri sententia.

(*Cum palpitatione Cordis frequenter confunditur.*) Art. 569. In tremore Cordis pulsus inæqualis est, & languidus, subinde virium ingens prostratio & imbecillitas juncta esse solet, & cor tremulo motu vibratur, adeo ut Tremor Cordis pertineat quodammodo ad *lipothymias*: pulsus aliquando est vermicularis, pauca apud authores prostant de hoc affectu seorsim, quoniam ordinario cum *palpitatione cordis* confunditur.

(*Plerumque est morbus secundarius.*) Art. 570. „ Est potius plerumque *symptoma* alterius morbi, quam morbus *primarius*; ideoque „ causa exquirenda est diligenter, & morbus *primarius* inveniendus, „ & cura pariter instituenda. „

L I P O T H Y M I A, S Y N C O P E,
E T A S P H I X I A.

Ettmulleri sententia.

(*Horum affectuum differentia.*) Art. 571. Hi affectus differunt saltem gradualiter, non essentialiter. *Lipothymia* est (gravis languor) cum insigni spirituum defectione. *Syncope* est gravius animi deliquium, non multum ab *apoplexia* distans; atrociora adsunt symptomata, ægri inopinato concidunt, sensus & motus abolentur, respiratio vix ulla, aut pulsus, partes corporis frigent & pallent cum sudore frigido. In *asphixia* omnia hæc sunt adhuc graviora, ita ut cum pulsu plane abolito, & aliquandiu ad sensum cessante, ægri instar mortuorum jaceant.

(*Causæ.*) Art. 572. Horum affectuum causæ reliquæ, præter evidentes, quales sunt evacuationes nimix, balneationes nimis longæ, potus frigidus post corporis incalescentiam, animi pathemata, &c. sunt ut plurimum obscurissimæ, ut sunt *cordis abscessus*, *polypi*, *vermes*, &c.

(*Indicationes curativæ.*) Art. 573. Indicantur *spirituosa*, *volatilia*, & *aromatica*, ol. *cinnam.* *ambra*, præ omnibus *sal. volat.* *viperarum*, aq. *cordial.* *citr.* *croc.* *castor.* (*spir. carmin.* *sylv.*) externe *sp. sal. ammoniac.* ol. *succini*, *fumus succini*; aliquando confert *venæsectio*.

(*Syncope.*) Art. 574. „ In syncope facies in colorem cadaverosum „ mutatur, dentes, os, atque manus tam arcte clauduntur, ut vix „ recludi possint, pulsus fere nullus & vix ulla manifesta respiratio, „ sudor frigidus erumpit, & externa frigent; atque his signis diagno- „ sticis ab *apoplexia* facile distinguitur, „

(*Causæ.*) Art. 575. Frequenter ex *polypo* Cordis ortum ducit. *Wepferus* crurum fibroforum ramos ulnæ longitudinem superantes ex- „ traxit a foemina cardiaca *syncope* interempta: talem in juvene ca- „ vitatem venæ cavæ fere implentem reperit, & in aliis quamplurimis. „

(*Quid agendum est.*) Art. 576. „ *Sternutatoria* naribus immittenda „ sunt, *cardiacis* & *volatilibus* imprimis incumbendum est, *cucurbitu- „ læ* sunt affigendæ. „

POLYPUS CORDIS.

Malpighii Sententia.

(*Polypus Cordis.*) Art. 577. Polypi nomen a substantiæ *piscis* similitudine ortum, peculiari cuidam tumori in naribus excitato adaptari cœpit, donec observata quadam in præcordiis luxuriante materia, novus hic Cordis & vasorum morbus jam nunc audit.

(*Ejusdem accurata descriptio.*) Figuram sortitur loci in quo generatur. Moles Polypi major est ut plurimum in dextro Cordis ventriculo, quam in sinistro; in dextro autem color est subalbidus, laridi instar, seu excreti succi, quem vulgo pituitam appellamus, & interdum rubra quædam vel subnigra stigmata conspersa habet: in sinistro autem colorem plerumque atrum, & densiorem obtinet substantiam. Morbosa hæc excrementa suam structuram habere videtur; etenim præ se fert congeriem superpositarum extensarumque pellicularum, quæ substantiæ modo nervosum corpus cum aliquali tamen mucositate referunt, & si eadem laceretur, solvi videtur in oblonga & solida filamenta; hæc manifestiora redduntur in ejus appendicibus, quæ fasciculi instar in fibras quasi nerveas resolvuntur. Ex tota concreti sanguinis mole, grumosa pars appellata, affusa licet purpura; multiplicibus lotionibus cum aq. factis rubicundæ illæ particulæ detergentur, & sanguis concretus tractu temporis albescit; & ejus contexturam plane fibrosam & reticularem oculis certe armatis videre licet; & hæc est materia procul omni dubio, ex qua generantur Polypi. *Malpighius de polypo Cordis*, p. 158. &c. consulendus est author, qui hujus morbi ætiologiam & descriptionem longe optimam litteris mandavit. „ De Polypis in auriculis & ventriculis Cordis hydropicorum „ repertis (vid. Art. 823.)

(*Causa est frequenter mortis repentinæ.*) Art. 578. „ Concreſcentiæ „ polyposæ in *apoplexia* demortuis frequenter inveniuntur; & procul „ omni dubio plerumque sunt causæ plurimorum *symptomatum* atrocissimorum, necnon *mortis inopinatæ*; raroprehenduntur antequam ægrum jugulent. „

C A P. V I.

Sive Fasciculus Morborum sextus.

CRUDITAS ACIDA ET NIDOROSA.

Ettmulleri Sententia.

(*Chylificatio læsa.*) **M** Orbi plerique, præcipue chronici, a depravata coctione originem ducunt; *chylificationis læsæ* duo sunt vitia insigniora, cruditates in coctione, viz. Art. 579. *cruditas acida & nidorosa.*

(*Cruditas acida.*) Art. 580. *Cruditas acida* est; quando alimenta abeunt in liquamen acidum fixum plus minus viscidum; nec sufficienter attenuatum, & volatilifatum, fundamentum & origo morborum chronicorum.

(*Signa cruditatis acida.*) Art. 581. *Cruditas acida* cognoscitur ex fœda, ructibus acidis & copiosioribus; quæ rejiciuntur per vomitum vel natura vel arte, sunt admodum crassa, viscida, ac pituitosa; alvus plerumque adstricta est.

(*Curatio.*) Art. 582. Cruditās acidā corrigitur per absorbentia & acidum destruentia, ac aromatica volatilia, nucem moschatam, zinziber, sp. C.C. &c. Destructo in hunc modum acido purgantia demum adhibenda sunt: nisi enim hæc methodus observetur, nihil per purgantia evacuetur sed tormina & motus convulsivi excitabuntur. Usus ~~cancrorum~~ *fluviatiliū* mire proficius est, ut & Gelatina, C. C. &c.

(*Cruditās nidorosa.*) Art. 583. Cruditās Nidorosa est, quando alimenta corrumpuntur ita ut abeant in liquamen putrilaginosum horridi saporis & odoris, & omnino nutritioni ineptum, quod vocatur Nidor; exhalant ructus graveolentes Nidrosi. Appetitus est index, qui loquitur; & monstrat quasi, quæ sunt assumenda; hinc nobis inculcat Hippocrates in aphorism. quod appetita facilius longe digerantur, quam non appetita. Verum est proverbium; quod sapit, nutrit.

(*Diagnosī cruditatis nidorosæ.*) Art. 584. Ingestio variorum alimentorum ad Cruditatem Nidorosam disponit. Masticationem qui negligit, Arabibus animam suam odisse dicitur. Conqueruntur ægri de dolore gravativo stomachi duabus horis post pastum, item de ructibus s. vel 6. hor. post alimentorum assumptionem, iisque non acidis, sed nunc insipidis, nunc putridis, nunc sulphureis, nunc genuinum saporem & odorem assumptorum representantibus; mox post pastum adest rubor faciei, quasi essent ebrii. (585.)

(*Signa cruditatis nidorosæ.*) Art. 585. Cruditās Nidorosa ructus habet fetidos, aut saltem horridos instar ovorum frixorum, aut piscium putridorum: percipiunt imprimis mane saporem peregrinum & abominabilem, quasi cinereum, seu ligni putridi, quem sufficienter exprimere nequeunt. Subinde amaror cum *cardialgia* & aliquali *nausea* percipitur, ex ore & stomacho: quæ vomitu rejiciuntur, sunt liquida, flava, & omnino insipida, aut quodammodo amaricantia, aut insipida dulcia, aut ex amarore dulcescentia; Præterea habent alvum sæpius plus solito apertam.

(*Intemperies ventriculi calida.*) „ Cruditās Nidorosa juxta veterum principia est *intemperies ventriculi calida*, in qua omnia assumpta mutantur in bilem; signum hujus est sapor tetricus in ore, incipiente vel perfecta chylicatione. „

(*Curatio.*) Art. 586. Quoad curam convenit vomitus, aut saltem evacuatio per *rhabarbarum* & *tamarindum*; post horum exhibitionem mire conducunt *julapia acidulata*, *succus aurantiorum*, *citrorum*, *elixir proprietatis acid.* sp. *salis dulcis*, *vitriolata*, &c.

(*Nota bene.*) Art. 587. „ Probe notandum est (ut therapia rite instituat) ægroto incumbere non modo remediorum sibi præscriptorum usui, ut decet, insistere, sed quoque cane & angue pejus fugere alimenta sibi noxia, fomitem causis morbificis, & mala exacerbantia. Qualis erit diætā petendum præcipue ex nocentibus & juvantibus, in quæ itaque diligenter diligere oportet medicum. „

(*Flatus.*) Art. 588. Flatus in stomacho & intestinis fiunt per fermentationem vitiosam ab acido præternaturali in subiecto viscido excitatam. „ In curatione omnem paginam absolvunt *digestiva* & *evacuantia* cum victu regulari. „

(*Apepsia.*) Art. 589. „ Ventriculus corporis *culina* appellari potest; ejus officium est alimenta recipere tanquam in promptuarium, eademque concoquere est ejusdem actio primaria; unde *apepsia*, sive *indigestio* est totius œconomix ruituræ indubitata denuntiatio. „

(*Digestio.*) Art. 590. Digestio est opus simpliciter naturæ nec arte pro-

promoveri potest; opus naturæ saltem adjuvare possumus, & fermentum ventriculi corrigere ita ut in statum naturalem reducat. Propinanda sunt vomitoria, cathartica, &c. postea stomachicis & corroborantibus insistendum est. „ Mirum videatur in quibusdam somnum, in aliis exercitium, coctionem promptiorem ac faciliorem reddere, quod tamen monet quotidiana experientia. „

(*Remedia stomachica.*) Art. 591. Remedia stomachica, & ventriculum roborantia insigniora sunt, quæ sequuntur. *Mentha*, *absynth.* utrumque, *romata*, *zedoaria*, *grana piperis integra deglutita* (ad cruditates acidas) *rad. belenii*, *calami aromat.* *raphani rusticani*, *ari*, *plebeia* quidem, sed optima stomachica, *succus cydon.* (cum fumo *sulphuris* servatus,) *tinctura ex amaris & aromaticis* (cum ol. *sulphuris* per campan. extractæ) *pulvis pepticus ex pelle interiore ventriculi gallinæ*, & *tinctura ejusdem*, *chalybeata*, *cortex Peruvianus*, *cortex aurant. citr. conditus*, item *zinziber*, & *allium conditum*, *tartarum vitriolatum*, *tinctura sacra*, *elixir proprietatis*, *aqua gentian. comp.* *absynth. comp.* *spiritu menth.* *syrupus cydoniorum*, *rob.* & *miva eorundem*, *species diambra*, *crusta panis vino generoso ebria* & cum pulv. *N. M. caryoph.* &c. *consersa*, & ita instar scuti stomacho tepide applicata, &c. Stomachica alia celebriora & in praxi Londinensi usitatoria sunt *Elixir magnum vitrioli*, *tinctura stomach. amar.* *Quincii ad imitationem Stoughtoni*; vel sequens, quæ præstantior videtur. „

„ ʒ℥. Cort. aurant. sic. ʒj. rad. gent. ʒij. sem. cardamom. min. zedoar. ana ʒj. caryoph. croc. ana ʒj. cochinel. ʒss. sp. vin. Gallic. ʒj. f. tinctura s. a. vel infusum sequens. „
 „ ʒ℥. Rad. gent. ʒij. summit. absynth. Rom. p. ij. calam. arom. ʒiʒ. ubeb. ʒj. cort. aurant. ʒiij. infund. in aq. bullient. ʒxxx. colatur. „
 „ add. aq. absynth. magis comp. ʒiij. misce; vel. „

„ ʒ℥. Rad. gent. zedoar. cassumunur. sem. cardamom. min. ana ʒj. cort. flav. aurant. sic. ʒij. infund. in aq. bullient. ʒij. colatur. add. aq. gent. magis comp. ʒij. sp. lavend. comp. ʒss. misce. „

„ In omnibus fere imbecillitatibus & morbis ventriculi masticatio rhabarbari conducit, præcipue in alvum habentibus adstrictiorem „
 „ Item Electuarium e zinzib. mistura stomach. & julap. stomach. Et pro usu externo Fodus stomach. epithema, sputum, sacculus emplastr. roborans, ex Pharm. Fulleri, quandoque usurpari possunt. „

Art. 593. „ Stomachica debent esse temperata, ut recte annotavit *Waldschmidtus*) ne fortioribus remediis calorem nimium vel augeamus vel extinguamus, & ne fermentum reddamus acrius vel debilius: hinc præstat pauca dosi & per intervalla remedia stomachica exhibere, quam uno impetu ventriculum remediorum mole obstruere. „

(*Nausea & vomitus.*) Art. 594. Nausea & vomitus. In genere vomitus omnis, qui non est nimis, ut plurimum est salutaris.

(*Curatio.*) Art. 595. In omni vomitu unice observetur, ut alvus, quantum fieri potest, teneatur aperta. Ad vomitum sistendum conferunt *cydoniata*, *syr.* & *tinctur. coral.* præ reliquis *succus cydon.* *sp. menth. sal absynth.* cum succ. *limon.* &c. Externe decoct. *absynthii*, *menth. cor. granator. flor. ros. rub.* &c. in vino rub. coct. sacculus croci ventriculo admotus egregie vomitum sistit, ut & cataplasma ex fermento & pulv. aromaticis. In genere præmissis rite universalibus stomachica (59.) sunt usurpanda; Decoct. *Fracastor. elect.* *zinzib. julap. stomachicam*, *coral. mistur. stomach.* „ In vomitionibus ab emetico fortiori

„ excitatis (teste Waldschmidio, si detur coch. j. spiritus vini, vomitum in momento compescet. “

(*Vomitus cruentus* .) Art. 596. Vomitus cruentus frequenter a pancreate oritur, quando, scilicet, vasculum ejus a succo acriore corroditur, ex irritatione duodeni partim sursum in ventriculum propellitur, partim inferius defertur, dolor gravativus & obtusus in superiori lumborum regione, ubi situm est pancreas, præcedere solet. Non raro decipiuntur medici, qui vomitum materiæ nigricantis habent pro cruento. In vomitu cruento Hæmorrhoidum fluxus est salutaris, est enim evacuatio quasi vicaria.

(*Periculosum malum* .) Art. 597. „ Ipse ventriculus quandoque gravissimis Hæmorrhagiis obnoxius est. Et revera vomitus sanguinis a quacunque causa oriatur, periculo haud vacat. Nimia sanguinis ejusmodi effusio intra ventriculi parietes, vel extra corpus eestio mortem subitanæ interdum infert; vel si sanguis in ventriculo extravasatus restat, ibidem grumescere solet & corrumpi; inde graves *Lipothymie* & *suffocationes* creantur. „

(*Remedia ad vomitum cruentum* .) Art. 598. Remedia in hoc affectu sunt succus urticæ, sem. hyosciami, catechu, lap. hæmatit. cum blandis acidis, aut succ. cydon. Aliquando etiam pus excernitur, & per vomitum rejicitur. Convenit antimon. diaphoret. antihect. Poterii, sacchar. saturni, haustus japonicus Fulleri, tinctura antipthibifica, &c.

(*Anxietas præcordiorum* .) Art. 599. Anxietas præcordiorum est insignis dolor circa scrobiculum cordis. Malum hoc oritur semper ab affecto plus minus orificio ventriculi sinistro.

(*Cardialgia* .) Art. 600. Cardialgia est ventriculi orificii superioris dolor admodum molestus & intensissimus; oritur ex effervescentia ucorum heterogeneorum, maxime bilis, unde percipiuntur phlogoses, & insignis ardor. Causæ hujus mali sunt variæ, bilis vel succi pancreatici vitia, lumbrici, ulcus orificii ventriculi, &c.

(*Curatio* .) Art. 604. Dosis theriac. Andromach. egregium est anti-cardialgicum. Cura ut plurimum inchoanda est cum vomitorio, & postea opiata cum purgantibus admiscenda sunt. Tinctur. sal. tartari a püt. xl. ad l. item pulv. testac. cum castor. oleum amygd. dulc. est maxime efficax; laudatur decoct. fasssafr. externe linimenta, empl. e tacamahab. caran. & balsam. Peruv. „ Pulvis interioris pelliculæ ventriculi muscali gallinæ ad ℥j. in vehiculo appropriato est efficacissimum remedium huic malo (inquit Shaw.

(*Anorexia* .) Art. 602. Anorexia sive inappetentia est, quando ægri destituuntur desiderio ad alimenta. Ratio habenda est morbi al-cujus tanquam causæ, unde indicationes curativæ petendæ sunt, & postea stomachica (592.) sunt usurpanda, &c.

(*Malacia & pica* .) Art. 603. Malacia est appetitus nimius, unde interdum plus, quam conducit, comeditur. Pica est appetitus insatorum, ut crudæ animalium carnis, carbonum, calcis vivæ, &c. „ In Virginibus chlorosis Picam, vicissimque Pica chlorosin fovere solet. „ Pica est affectus chronicus, & non infrequenter ad hydropem, ascixiam, vel marasmm viam sternit. Non solum virginibus accidere solet, sed plerumque gravidis quoque; iis vero non adeo perniciofa est. “ Hi affectus oriuntur ex depravato stomachi fermento; ideoque evacuationibus & stomachicis sunt curandi.

(*Bulimus* .) Art. 604. Bulimus seu appetentia canina, est voracitas nimia: ægri copiose deglutiunt alimenta, sed non comminunt;

est affectus plerumque ab extremo ambientis aeris algore progenitus, in cibi fastidium brevi desinens. *Appetentia canina* est semper cum vomitu vel diarrhoea. „ Præcipua cura in diæta est quærenda. Omnia „ pingua & dulcia temperata illis profunt, & leniter purgantia. “

A Surfeit.

(*Crapula* .) Art. 605. „ Crapula, per quam intelligo id, quod nostro idiomate vocamus a *Surfeit*, est mala corporis habitudo cum „ sensu gravitatis ad ventriculum, & ægitudine; supervenire solent „ plerumque *Eruptiones cutaneæ & febricula*. Causa usitatior hujus affectus est edilium vel potulentorum nimia voracitas; ingesta autem „ non minus qualitate quam quantitate peccabili lædencia esse possunt; aliæ quandoque etiam sunt causæ, uti potio nimis lar- „ ga frigida vel cerevisiæ tenuis æstivo tempore, exercitium nimis „ violentum, fervida ac sulphurea aeris constitutio, & similia. *Eruptiones cutaneæ* sunt de genere *Erysipelatoso*, quod ordinario appellamus a *Rash*. “

(*Curatio* .) Art. 606. „ In omnibus hisce affectibus, & præcipue „ a Crapula proprie dicta originem ducentibus vomitorium quam primum est propinandum, & si febris nondum invaserit, dosis tincturæ hier. die proximo exhibenda est. Si eruptiones in conspectu veniant, sustentandæ sunt cardiacis, & lenibus diaphoreticis; potus „ sit serum lact. vino Canariensi alteratum; & alias infusum salviæ. „ In habitu plethorico, ubi febris intensior fuerit, *phlebotomia* locum „ habere potest. „

CHOLERA MORBUS.

Sydenhami Sententia.

(*Cholera morbi descriptio* .) Art. 607. Malum ex se cognoscitur; adsunt enim vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio, cardialgia, sitis, pulsus celer cum æstu & anxietate, nausea, artuum contractura, extremorum frigiditas, animi deliquium, &c. „ Bilis supra infraque magno impetu „ prorumpit, primum liquidior, pallida, & subflava; dein crassior, „ majoremque colorem exhibens, flavum scilicet, prasinum, coeruleum aut etiam nigrum. “

(*Methodus medendi* .) Art. 608. Pullus tenerior elixetur in aq. font. cong. circiter iij. *hujus decocti* cyathos plenos exhauriat æger, eodemque tempore injiciatur *enema* ejusdem liquoris semel atque iterum, vel ad 3. 4. vicem; his addi possunt *syr. portulac. lactuc. violar.* &c. Exantlato hoc eluvionis penso detur *paregoricum*. Si vires ægri exhaustæ fuerint, & valde debilitatæ ante adventum medici, ita ut extrema frigescant, rapto cursu ad *laudanum* confugiendum est. Vix ultra *Augusti* limites evagatur.

Ettmulleri Sententia.

(*Prognosis* .) Art. 609. In genere qualiacunque symptomata fortem ac deleteriam antimoniam purgationem, aut helleborum album sequuntur, aliudve catharticum, ea similiter obvia sunt in cholera. Cholera, quæ sponte sua sine causa manifesta externa corripit ægros, ut plurimum est funesta. Est malum peracutum intra 24. horas, biduum, vel triduum, jugulans; periodum fere observat tertianarum, ita nempe ut de 3. in 3. diem moveatur, seu plus minus exasperetur; quo magis

magis excrementa a *statu naturali* recedunt, eo periculosior. Cholera aliquando est *epidemica & valde maligna & lethalis*.

(*Remedia qualia* .) Art. 610. „ Remedia petenda sunt ab *Art. de vomitu*, de *diarrhœa*, &c. causa morbi, si inveniri possit, bene pensitata. „ Vires decocti *rad. ipecacoan.* tentari merentur. Vid. *dysenteriam*. “

ALVI RETENTIO.

Ettmulleri sententia.

(*Alvi retentio causa mille malorum* .) Art. 611. Alvi retentio cum sit *pertinacior*, frequentius est causa mille malorum, dolorum abdominis variorum; interdum *nausea & vomitus*, affectuum capitis, cephalalgia, *vigilia, vertiginis*, &c. „ Familiaris est *spleneticis, nephriticis, hystericis, arthriticis, literatis, scorbuticis, &c.* “

(*Curatio* .) Art. 612. Convenit *oleum amygd. dulc.* vel per se vel in *jusculo* ad *℥ij.* vel *ij.* decoct. *tamarind.* in *sero lactis*; *gum. ammoniacum*. *Aurum fulminans* cum extracto *bellebor. nigr. sal. gem.* in *clysteribus* ad *℥i℥.* vel *℥ij.* multum laudatur ad *fæces induratas flexibiles reddendas*; item *clysmata oleosa* ex *ol. lini, ol. raparum, ol. oliv. &c.* In alvo *perstinaciter obstructa* conducit *balneum ex emollientibus & linimenta*.

Boerhaavii sententia.

(*Tartarus crudus* .) Art. 613. Vires tartari crudi in medicina *optimæ* sunt, cremoremque & *crystallos* superat viribus ad *abstersionem* *primarum viarum*; vix sua *indole secundas vias* ingreditur, ob *crassitiem & indissolubilitatem*, nec invenit tantum *liquidi* in illis, quantum ad *sui solutionem* requirit. Si autem humoribus *alcalinis* occurrit, solvitur penitus, non a *liquido*, sed a solo *alcali* occurrente, qui duo *sales* faciunt tunc *optimum salem dissolventem*; si vero dissolvitur ab *aqua*, est adeo *crassus* ut per *pannum* non transeat quid, quod transeat per *lacteæ*; & si forte solvitur a *bile*, aliove forsan *liquore*, non agit ut *Tartarus*, sed ut *sal neuter*, vel *sapo*: hinc multos morbos ex *vitio pituitæ*, & *vitio primorum viscerum* egregie tollit, debet vero dari ad *drachmas sex* ex *jusculo recenti*. *Angelus Sala, chymicus candidissimus*, qui *integrum tractatum*, ubi sua *arcana*, cunctis medicis *desiderata*, revelat, de viribus tartari scripsit; laudat illum in *colicis doloribus*, *diuturnis obstructionibus primarum viarum*, *hystericis*, *podagra*, &c. Sed dabat ad *unciam unam*, unde purgabantur per *duos aut tres dies*; hoc continuabat *optimo cum successu*, nam non *intrat sanguinem*, sed *pondere & stimulo optime agit*; ergo reliquam *massam sanguinis* non turbat, sed *saltem alvus diluitur, & emollitur* *fæx*, cum *alia purgantia* post *operationes suas* relinquunt *semper alvum adstrictam*.

(*Quomodo præcavenda est* .) Art. 614. „ Novi plures ventris *constipationi* obnoxios curatos fuisse *diluculo*, & *hora prius assueta citius lecto* assurgendo: quantum enim a *perspiratione solita* *adimitur*, tantum ad *alvum lubricandam* additur. “ *Willis*. „ Qui *alvum* habent *sicciores* (inquit *Waldschmidtus*) nunquam se mane *studiis* applicare debent, vel *foras procedere*, nisi *alvum prius deposuerint*; vult enim *sæpius moveri alvus* *segnior*. “

(*Aphorismus* .) Art. 615. „ Quibus, dum sunt *juvenes*, (inquit *Hippocrates*) *alvi* sunt *humidæ*, iis *senescentibus* *siccantur*: quibus *vero*, dum sunt *juvenes*, *alvi* sunt *siccæ*, his *senescentibus* *humectantur*. *Melior est autem in juventute alvus fusior, in senectute adstri-*

„ *ctior*.

„ Etior. Obstructo inferiore ventre (inquit *idem de flat.*) in universum
 „ corpus flatus discurrent.
 (*Historia.*) Art. 616. „ In act. philosoph. N. instantiam singularem
 „ habemus cujusdam hominis nomine *Phelips*, qui per plures annos
 „ non nisi semel in 19. vel 20. diebus alvum exonerabat, nihilominus,
 „ quoad cætera bene se habuit: obiit tamen vigesimum tertium æ-
 „ gens annum. “

ALVI FLUXUS.

(*Alvi Fluxus in genere.*) Art. 617. „ In genere quod ad alvi fluxum
 „ attinet, aliquando cibi nondum concocti aut imperfecte cocti per al-
 „ vum dejiçiuntur, & appellatur *lienteria* vel fluxus *lientericus*; aliquan-
 „ do chylus excernitur & dicitur *cæliaca*, aliquando humores excre-
 „ mentitii, bilis, pituita, &c. excernuntur, & vocatur simpliciter
 „ *diarrhœa*; postremo quandoque dejectiones sunt sanguinolentæ cum
 „ vel sine intestinorum exulceratione, & appellatur *dysenteria*.

DIARRHŒA.

(*Definitio.*) Art. 618. „ Diarrhœa est frequens & copiosa per al-
 „ vum materiæ tenuis, aquosæ, mucosæ, pituitosæ, spumosæ, adi-
 „ posæ, biliosæ, nigricantis &c. excretio, ab intestinis provenienti-
 „ tis, aliquando cum, aliquando sine excrementis, frequenter sed
 „ non semper torminibus stipatur. “

Ettmulleri sententia.

(*Ventriculus præ omnibus est corroborandus.*) Art. 619. In cura Diar-
 rhœæ ex quacunque causa *stomachus* est corroborandus, & *sudorifera* cum
acida absorbentibus sunt admiscenda. Diarrhœa oleosa & pinguis, (si non
 ex assumptis) ex colliquesactione pinguedinis corporis oritur.

(*Curatio.*) Art. 620. In omni diarrhœa potus debet esse parvus.
 Ad ventriculum restituendum convenit *vinum ustum cum aromatibus*,
vinum absynthii, & maxime *cydoniata*, & externe fots. Sistendus est
 effervescentium humorum impetus; hoc facto, cessat diarrhœa. De-
 coctum *rad. tormentil.* egregium est in omni diarrhœa & dysenteria,
 tam *benigna* quam *maligna* & omnibus aliis medicamentis præcellit.
Fructus cydon. & speciatim *mespillorum eorumque miva* maxime lau-
 dantur; *gelatina C. C.* in potu ordinario soluta est admodum speci-
 fica in diarrhœis *epidemice* grassantibus, ut & *gum. Arab.* (in decoct.
 alb. solut.); si adsint tormina vehementiora & *tenesmus* convenit ene-
 ma ex lacte tepida & *theriac. Androm.*

(*Diarrhœa habitualis.*) In diarrhœis *habitualibus* per longum tempus
 durantibus conveniunt interne imprimis *martialia* & *aromatica* stomacho
 grata, imo *thermæ*. Diarrhœa pertinax & diu durans *radice Ipecacoo-*
næ, quemadmodum *Dysenteria*, debitis intervallis aliquoties repetita
 curanda est; non neglectis interim aliis appropriatis remediis.

Baglivii sententia.

Art. 621. Mæror nihil aliud frequentius producit quam Diarrhœas,
 quæ, diu persistente mæroris causa, evadunt incurabiles; iisque de-
 mum superveniente febre erratica & atrophia, ærotantes e medio
 tollunt. Ad iram pariter diarrhœa supervenit, & si hæc non supervē-
 niat, febris superveniat, dummodo ingens fuerit ira. p. 129.

Farrago sententiarum.

Art. 622. Indusium laneum magnopere conducit ad curandam diar-
 rhœam *habitualement*. *Wainwright*. Ut & equitatio seu vectio in rheda.
 Ful-

Fulleri med. gymnast. Observandum est, appetitu & concoctione salvis, vix unquam nocere diarrhœam.

Art. 623. Narrat D. Walker in osidione *Derriæ Londinensium* nupera milites eo redactos fuisse, ut compositionem quandam ex *sebo & amylo* liberaliter sumpserint, unde non modo nutrimentum, sed & medicamentum egregium habuerunt, nempe diarrhœæ curationem in his, *prophylacticum* in illis, idque miraculose & infallibiliter.

Art. 624. Opium (sagaciter observante Cockburn) parum aut nihil facit in cura *Diarrhœæ ferossæ*; & revera res, si propius illam inspiciamus, & ad calculum accurate vocemus, ita se habere videtur. Opium plerumque dolorem sedat, & somnum conciliat, & dejectiones rariores reddit, sed tamen copiosiores sunt & æque tenues ac liquidæ, ut ante, &, quod probe notandum est, magis foetentes.

(*Remedia varia.*) Art. 625. Remedia sequentia quandoque prodesse possunt *laudan. liquid. cydoniat. cataplasim. stomach. epithem. stomach. fatus astring. saccul. stomach. decoct. catechu. comp. decoct. Fracastor. decoct. sistens, elect. corinth. enema de malicorio, expressio rosar. mistur. coral. elect. ad diarrhœam.*

LIENTERIA & CÆLIACA.

(*Lienteria & Cœliaca.*) Art. 626. Lienteria & Cœliaca videntur esse diarrhœa cum insigni aepsia seu coctione ventriculi depravata conjunctæ; ideoque earum cura partim cum diarrhœa convenit, præcipue quoad evacuantia in principio propinanda: hic etenim super alia quotcunque radix ipecacuan. & rhabarb. locum habent, nec omitti debent.

Ettmulleri sententia.

(*Lienteria quid.*) Art. 627. Lienteria est alvi fluxus, in quo assumpta prout fuere ingesta, aut parum immutata per alvum egeruntur. „ Dolor ventriculi est Lienteriæ comes indivulsus, & ægrotum post „ *pastum* semper magis excruciat, donec alvum exoneraverit. Urina „ est pauca & valde colorata. “ Lienteria *scorbutica* est malum periculosum curatu difficile, & facile recidivans; ad *cachexiam & tabem* disponit.

(*Curatio.*) Art. 628. Imprimis stomachus præ omnibus est roborandus. Rhabarbarum propinari debet; *coralliata & cydoniata* valde laudantur; in genere omnia in vomitu usurpata hic conducunt. „ Stomachica simpliciora & paratu facilia (inquit *Waldschmidius*) sæpius plus præstat, quam composita: v. g. *nux moschata condita, zinziber conditum, vitellus ovi cum aceto coctus, vinum absynth. ex mastiche parata, &c.*

(*Cœliaca quid.*) Art. 629. Cœliaca est alvi *chylosa* excretio, quando assumpta digeruntur quidem in stomacho, sed digesta sub forma *chylosa* cum excrementis excernuntur; ventriculus ut plurimum est salvus, & appetitus, sed hoc non semper; per alvum excreta sunt albicantia vel grisea, aut saltem pallida. Est malum satis grave & periculosum.

(*Curatio.*) Art. 630. *Aromatica blandiora & amara* apprime conveniunt; *astringentia* malum exasperant. Deobstruentia procul omni dubio indicantur & *martialia* cum *amaris*. Præmissa *tinct. rhabarb.* dosi una vel altera, elegantem puellam ab hoc malo diutius laborantem liberavi eum *tinctur. mart. & vino amaro* sequenti; 2℥. Rad. zedoar. ʒj. gentian. ʒiij. cort. aurant. ʒiij. winteran. ʒij. myrrh. pulv. ʒj flor. cham. p. ij. centaur. min. p. j. N. M. mac. ana. ʒj. Infund. frigide in vin. alb. Hispan. ʒvi. coletur usus tempore. „

Forestus valde commendat pulverem *pelliculæ interioris ventriculi galinæ* in Coeliaca passione; ut etiam pulverem *integræ moschatae* in vitello unius ovi exhibitum in Lienteria.

D Y S E N T E R I A.

Sydenhami sententia.

(*Dysenteria* . Art. 631. Dysenteria cum rigore & horrore aggreditur, calor sequitur, & deinde ventris tormina cum dejectionibus mucosis, quibus progressu temporis intertexuntur sanguinis lineamenta quædam cum dolore insigni; sanguine aliquando destituuntur, & nihilominus (modo frequentes sint dejectiones cum ventris torminibus & colluvie mucosa) recte vocabitur Dysenteria . Si sanguis sincerus evacuetur, vita ægri periclitatur.

(*Methodus medendi* .) Art. 632. *Venæsectio* quamprimum celebretur, & exhibeatur haustus *paregor.* eadem nocte, deinde *catharticum* lene bis repetitum, & *paregor.* hor. 4. vel 5. post sing. purgationes; potus ordinarius sit *lac coctum cum aq. tripl. vel decoct. alb.* Si morbus præfractior sit, detur *laudanum* 8. quaque hora etiam in maiore dosi, & injiciatur enem. ex *lacte vacin. & theriac. Androm.* ℥℥. ubi vires *venæsectionem* non patiuntur, detur singulis matutinis bolus ex *rhabarb.* ℥℥. cum q. s. *diascordii & paregoricum* hora somni.

Infantes eodem modo tractandi sunt diminuta dosium quantitate. Methodus in *cholera morbo* (608.) in hoc quoque laudatur, ut & *dieta lactea*.

Willisii sententia.

(*Dysenteria incruenta* .) Art. 633. Quamvis dysenteria vocabulum communi acceptatione alvi fluxum cruentum, sicut diarrhœa humoralem denotat; tamen morbus *Londinensis* anno 1670. Dysenteria appellabatur, incruenta licet. Fuit affectus ille subitaneus & frequenter absque manifesta occasione invadens; laborantes cum vomitu immani & sedibus crebris & aquosis cito in maximam debilitatem inque spirituum horrenda deliquia & virium omnium prostrationes redigebat. Novi plures pridie satis sanos, & valde robustos, intra xij. horas morbi hujus tyrannide adeo dejectos, ut cum pulsu debili & exili, sudore frigido, &c. jam moribundi viderentur, & quidem non pauci ab eo cito interibant.

(*Curatio* .) Art. 634. Pro curatione hujus morbi nulla *evacuatio* juvabat; verum remedia tantum *cardiaca*, eaque calidissima commoda fuerunt, in tantum, ut *sp. vini* cum *sacchar.* parum deflagratus remedium popolare & quasi *epidemicum* fuerit, atque in tali Dysenteria fere semper proficuum: etsi in altera cruenta indifferenter usurpatum sæpe noxium deprehenderetur. Ego exhibui satis feliciter *theriac. Androm.* ℥℥. cum *julap. cardiac.* & ventriculo placentam ex *pane tosto & theriac.* illinito vinoque generoso immersam applicari jussi, aut loco *theriac. Androm.* pulv. seq. 2℥. Pul. e *chel. cancr. comp. e contrayeru. serpent. virg. ana* ℥j. *cinnam. rad. tormentil. ana* ℥℥. *croc. cochinel. ana* ℥j. dos. ℥ij.

(*Dysenteria cruenta* .) Art. 635. De descriptione dysenteria vere cruenta *Londinensis* vide authorem, pag. 49. laborantes haud cito interibant, quin plures septimanas, immo interdum menses sanguinem quotidie in magna copia excernebant, &c. In his dejectiones fuerunt liquidæ, & sanguine diluto tinctæ, instar loturæ carniū, in aliis crassiores cruore saturatæ, ac insuper muco albicante, & non raro membrana-

rum frustis refertæ, &c. de remediorum formulis consulendus est author. p. 50. & 52.

Ettmulleri sententia.

(*Tres differentia.*) Art. 636. Dysenteria est diarrhœa cruenta. Huius morbi tres sunt differentia. 1. Quando sine intestinorum vitio merito motu & impetu naturæ ex plethora sanguis bonus excernitur tamquam in fluxu hæmorrhoidali, scorbuticis familiaris est. 2. Quando sanguis tenuis & aquosus loturæ carniū similis excernitur, fluxus hæpaticus dicitur; sed revera a vasis hæmorrhoid. internis provenit. Tertia species dysenteria est, quando ob vitium intestinorum spasmodicum cum insignibus torminibus, & cum mucō albescente, hinc cum purulenta materia sanguis ejicitur, atque hæc κατ' ἐξοχὴν dysenteria appellatur, diarrhœa cruenta tormentosa, reliquæ species fere semper sunt absque torminibus. Et vel benigna sine febre & contagio, vel maligna cum febre & maxime contagiosa.

(*Caruncula cum materia purulenta.*) In gradu acerbissimo caruncula, (signum ut plurimum lethale) quæ excernuntur cum materia purulenta, quid sint explicatu obscurum est; non enim nisi in Dysenteria diuturniori fit intestinorum excoꝛiatio; & forsan exulceratio aliqualis; adsunt aliquando aphthæ, & intestina ipsa gangræna afficiuntur, ex qua fere omnes, qui Dysenteria laborant, moriuntur. „ Omnes qui Dysenteria moriuntur, (teste Waldschmidio) sphacelo pereunt, ipsis intestinis sphacelatis; quod observatur triduo ante mortem, ubi sitis non magis urget, & extrema frigent. „

(*Curatio.*) Art. 637. Cura inchoanda est cum opiatīs & sudoriferis & absorbentibus, præmissa tamen dosi rhabarbari semper in Dysenteria benigna, in maligna vero eadem methodus observanda est, ac in aliis febribus continuis malignis; tinctura bezoardica laudatur. Astringentia in principio malum exasperant, in declinatione locum habent cum cautela. Venæsectio & clysteres non conveniunt. Summa habenda est ratio stomachi externis & internis, uti in quibusvis alvi fluxibus. Priapum cervi tanquam specificum extollitur. Semper propinetur gelatina C. C. pulv. cran. human. & usnea. Album græc. pro pauperibus est insignie remedium, item succus heder. terrest. & cydoniata, lac chalybeatum, in quo rad. symphit. maj. coctum fuerit. gum. Arab. trag. &c. sed præ omnibus sacchar. saturni, & viperina (in Dysenteria maligna.) Balsam. Peruv. aut terebin. in clysteribus aliquando est proficuum. Oleum lini præsentaneam præstat operam. Accurate distinguendum est inter flux. dysenter. & hæmorrhoid. (1263.)

(*Remedia varia.*) Art. 638. „ De viribus rad. ipecacoan. est res nota; sed præstat ejus decoctum propinare, quam radicem in substantia. In Dysenteria serum lactis fere specificum; Bagliv. 142. & alibi. Radix ipecacoan. præter vim vomitoriam, quam obtinet, sudores copiosos excitare solet. Atque in hoc (inquit D. D. Freind.) quantum ego conjectura assequi possum, præcipue consistit egregia illa in Dysentericis affectibus virtus, quam sibi præ aliis vomendi instrumentis vendicat. Grassante Dysenteria (inquit Doleus) hoc unico medicamento plus centum feliciter curavimus, oleo, scilicet, amygdalar. dulc. cum succo citri commixto, sæpius de die assumpto, præmissa tamen rhabarbaro tosto, diaphoretica semper interponi debent in hoc morbo curando, inter quæ eminent tinctura bezoardica & mistura simplex. Nux moschata est egregium antidysentericum; profunt gelatin. C. C. gl. rhabarbari, cydoniata, &c. Fungosa „ sub-

„ substantia nuclei lobos intercedens & separans exsiccata & pulveri-
 „ sata in vino exhibita modica quantitate exercitum *Anglicanum in*
 „ *Hibernia* gravissima Dysenteria medicorum omnium solertiam elu-
 „ dente laborante feliciter liberavit. Raii Hist. plant. J. Aubery com-
 „ municavit. Repetitis experientiis (inquit Towne in Tractatu de
 „ Morbis *Barbade*) sequens electuarium in Dysenteria successu feli-
 „ cissimo exhibui, ʒi. Conserv. ros. rub. ʒiʒ. sperm. cer. ʒi. cer. flav.
 „ ʒiij. ol. amygd. dulc. ʒʒ. syr. e cort. citr. q. s. m. f. elect. „
 „ (*Alia nonnulla*) Art. 639. Sequentia quandoque locum habent,
 „ cataplasma stomach. decoct. Fracastor. enema balsamicum (expetitis-
 „ simum plane remedium) enema de malicorio; enema ad terminā; e-
 „ pithema stomach. fctus ad cholericam, fctus stomach. tint. rhabarb. Sen-
 „ nertus de hoc morbo copiose & pulchre scripsit.

(*Tenesmus.*) Art. 640. Tenesmus in genere est assidua cupiditas
 per alvum egerendi; parum mucosum; aut viscosum; aut purulen-
 tum; aut nihil omnino excernitur; pars affecta est intestinum rectum
 aut sphincter musculus. Tenesmus producitur a Dysenteria; hamor-
 rhoid. verm. ascarid. calculo in vesica, &c. Fctus lactis tepid. (cum
 flor. sambuci incoct.) tenesimum lenit. Enem. emol. cum lumbric. ter-
 rest. &c. incoct. (est exoptatissimum remedium) item enema ex jure
 carn. vervecin. &c.

(*Fluxus hepaticus.*) Art. 641. Fluxus hepaticus veterum est merum
 non ens; est enim fluxus hamorrhoidalis e venis hamorrhoid. vide
 Dysenteriam.

(*Remedia.*) Art. 642. conveniunt remedia hamorrhagias supprimen-
 tia, imprimis martialia. Decoct. e lignis (cum aq. calcis) gelatina
 C. C. item passula majores, &c.

COLICA BILIOSA.

Sydenhami sententia.

(*Colica biliosa.*) Art. 643. Colica Biliosa est intestinorum dolor a-
 trocissimus præ cæteris omnibus; intestina nonnunquam quasi injecta
 fascia constringit; nunc in punctum contractus quasi terebello perfo-
 rat: subinde remittitur dolor, mox recrudescit paroxysmus, quem æ-
 ger præsentens vultu miserabili atque ejulatu ceu præsentem exhorret
 & averfatur. Sub initio hujus morbi non ita certo ad unum aliquod
 punctum determinatur dolor, atque in ejusdem progressu, neque tam
 crebra est vomituritio, neque alvus ita pertinaciter catharticorum
 vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatius in pun-
 cto figitur, vomituritio succedit frequentior, & major alvi adstrictio,
 donec tandem ab ineluctabili horum symptomatum vi totalis peristal-
 tici intestinorum motus inversio (nisi maturius quis tulerit suppetias)
 atque iliaca passio procuratur. Quæ hoc morbo excernitur materia,
 incera si fuerit atque *purpurea*, viridis aliquando, aliquando etiam fla-
 va aut insoliti cujusdam coloris spectatur.

(*Quomodo a nephritide distinguitur.*) Art. 644. A Nephritide sic di-
 stinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem
 exporrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus vero vagus est
 & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu Colicus dolor
 augetur, nephriticus potius imminuitur. 3. In Colico dolore ab ex-
 cretione per alvum & vomitum majus levamen emergit, quam in ne-
 phritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, post-

ea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur; in Colica urinæ initio crassiores existunt.

(*Methodus medendi.*) Art. 645. Ad curam rite instituendam sanguis e brachio paulo liberius quamprimum educatur, & post horas iij. vel iv. anodynum exhibeatur: postero die catharticum lenitivum & interposito die uno ad tertiam vicem propinetur. Aq. epidem. mirab. vel quæcunque alia cardiaca; postquam longo morbo vires plurimum exhaustæ fuerint, aliquando mirum in modum juvant. Equitatio, quemadmodum in pluribus morbis chronicis quod maximum est præstat, hic quoque cæteris non proficientibus curationem nonnumquam absolvit. Aliud exercitii genus in hoc affectu equitatione longe efficacius in Barbada habemus (inquit Towne) viz. navigatio circa insulam. Vidi quosdam in deploratissimo infirmitatis statu, cum aliam qualemcumque gestationem ferre non potuerint, hac ratione, ultra quam quod credibile est, restitutos.

Purcellii sententia.

(*Morbi descriptio.*) Art. 646. Colica est dolor ventris atrocissimus, quandoque totum abdomen occupans, aliquando ad unum punctum determinatum cum cruciatu quasi terebrante, interdum de loco in locum immutatur, nonnumquam videtur sensatio tanquam viscerum cum funibus simul correptorum; intumescit aliquando totus venter ita, ut quasi disruptus esset; alvus ut plurimum clausa est, urina pauca redditur; atque hæc sunt symptomata usitatiora; accidunt etiam aliquando graviora, febris, in ore sapor acidus vel amarus, vomitus, ructus, urinæ ardor aut suppressio, icterus, pulsatio magna in abdomine, sensus frigoris in eodem, umbilici intus retractio, vel protrusio ejusdem extrinsecus, materia flava vel viridis per alvum ejecta sine levamine, excrementa alvina levissima & ventosa, instar stercoris bovini, urinæ supernatantia. Colica frequenter, in paralysi, epilepsia, arthritide, hydrope, rheumatismo, aut tabe terminantur. Dolores Colici sunt aliquando in peritoneo, qui frequenter lethales evadunt, ut etiam in pancreate; vide locum p. 27. & 30. Spigelius affirmat se nullum unquam disseccuisse ex Colica mortuum sine intestinorum inflammatione.

(*Cause variæ.*) Art. 647. Causæ colicæ frequentiores sunt cruditates, flatus, alvi adstrictio, humores acidi in sanguine, bilis acrimonia, herniæ, abscessus interni & latentes, ulcera, cancri, &c. concretiones lapidosæ in pancreate, hepate, liene, intestinis vel ventriculo, insertio ductus cholidochi in ipsum ventriculum (vel pilorum,) luxatio cartilaginis xiphoidis, constitutio aeris maligna, unde Colica epidemica, affectiones nephriticæ, & postremo obstructions & tumores strumosi in glandulis intestinorum (& mesenterii) Colicam producant; hi dolores sunt magis fixi, diuturni, necladeo acuti, cathartica & enemata minus prosunt. De structura & situ coli vide locum p. 66.

(*Curatio.*) Art. 648. Curatio inchoanda est cum venæsectione, si adsit calor insignis vel inflammatio, vel febris vel ingens humorum affluxus. 2℥. Decoct. capit. ovin. vel pedum vitulin. vel intestin. vervecin. ʒx. ol. oliv. ʒiij. m. f. enema. In frigidioribus enema ex ol. oliv. vel lini & vino Canarin. item cum ol. rut. cham. junip. &c. cum fructu injiciuntur. Si hæc alvum non subducunt, ad fortiora deveniendum est.

(*Nota bene.*) N. B. Sed notatu dignum est, experientia abunde testante, quod immediate post venæsectionem clysmata vel lenissima promptius operabuntur, quam fortissima ante sanguinis missionem. In acerbis-

acerbissimis torminibus cum vomitu, &c. *Laudan.* gr. iv. vel v. in *clystere* dolorem in instanti leniunt, quum idem remedium per os nullum omnino afferat auxilium.

(*Colica habitualis.*) In *Colica habituali* pannus laneus mollis & subtilis immediate supra cutem ventris continuo gestandus a *Galeno* & aliis multum laudatur, tanquam formentatio perpetua. „ Virtutes „ *aquarum sulph. Bathoniens.* (extra paroxysmum) *equitationis*, &c. „ sunt satis notæ. Commendatur jusculum *cancrorum fluviatilium*: & „ *radix allii* pro pauperibus. Interdum exhibeo *oleum seminum anisi* „ larga quantitate viz. a gr. 40. ad 100. in pauco saccharo vel aliter „ cum magno levamine, præcipue in *Colica* a causa frigida oriunda. „ Semen *anisi* vocatur ab *Helmontio* *solamen intestinorum*. „

Baglivii sententia.

(*De aphonia & paralyfi ex colica.*) Art. 649. In *Colica Biliosa* succedit frequenter *aphonia* & vox rauca, & per totum fere morbi decursum durat. In *Colica* pertinaci si sudor copiosus & universalis superveniat labefactis & resolutis viribus, brev. *paralyfin* expectato; cave igitur, ne *opiata* copiosius in ea exhibeas.

(*Remedia nonnulla.*) Art. 650. Antidotum *Colicæ* est *chamæmelum*, a quacunque causa oriatur. Quando *opiat* uteris, semper adde *castoreum*, nam & *opii* narcosin corrigit & doloribus medetur. In pertinaci malo conducit iter aliquod, ut corpus plurimum dierum *equitatione* excitetur, fibræque *mesenterii* longo dolore laxatæ pristinas resumant oscillationes ad morbosas impuritates e *mesenterii* sinu eradicandas expellendasque. Valde prodest *semicupium* in graviore casu, & in ipso ileo.

Willisii sententia.

(*In colica mesenterium primario afficitur.*) Art. 651. Pars primario affecta in *Colica* videtur esse *mesenterium*, quod est valde sensile, & humorum nervosi generis affluxionibus plurimum obnoxium, & hinc dolores lumbares atrocissimi, in quantum scilicet nervi quidam insignes lumbares *mesenterii* plexum nerveum maximum ingrediuntur. Transitus a *Colica* ad *paralyfin* indicio est materiam morbificam non per arterias sed nervos deferri, ejusque sedem non esse intestinorum tunicas, sed *mesenterii* plexus nerveos.

(*Curatio.*) Art. 652. 2℥. Fol. *malv. utriusque mercurial. parietar. ana m. iv.* flor. *sambuc. cham. melilot. ana m. ij.* caput *vervecin. discissum*; coquantur in q. s. aq. font. colatura usurpetur pro fotu cum stuphis laneis calidissime intinctis & expressis atque vicissim applicatis repetendo quoties dolores intensius urgebunt. Omentum agninum aliave brutorum viscera calentia abdomini imposita & subinde mutata dolores interdum mire sedant. Præ aliis quibuscunque remediis aquæ acidulæ minerales ferratæ, æstivo tempore per mensem epotæ, juvamen maximum conferre solent, & reliqua alterantia longe superant. *Tinct. an. timon.* & *succini* locum habent.

COLICA HYSTERICA.

Sydenhami sententia.

(*Colica Hysterica. Morbi descriptio.*) Art. 653. „ De *Colica Hysterica* „ ea apud nullum authorem uspiam legimus audivimusve ante accuratissimum *Sydenhamum*. „ Imprimis cavendum est, ne symptomata foeminae hystericis familiaria ab aliis, quos sæpe æmulantur, morbis diagnosi errante putentur oriri. *Colica hystERICA* biliosam nonnunquam mentitur, comitem habet dolorem circa cordis scrobiculum, regionem

ventriculi & paulo inferiorem; sequuntur humorum viridi aut flavo colore per vomitum ejectiones & animi dejectiones maximæ; post diem unum vel alterum faceffit dolor, a levissima vero animi commotione revocatur.

(*Curatio longe diversa quam colicæ biliosæ.*) Art. 654. Cura radicalis a cap. de *hysterica passione* petenda est. Nec *venæsectio*, nec *catharsis* locum habent; nam malum exasperant, immo nociva sunt ipsa *enemata lenissima*; quippe hic morbus a spirituum *ataxia* potius quam vitio humorum nasci videtur: Ideoque præmissis aliquot haustibus *liquoris possetici*, illque per vomitum rejectis, statim ad *laudanum* confugiendum est, & in usu ejus persistendum. Aliquando tamen in foeminis sanguineis humorumque copia oppressis vel phlebotomia vel catharsi vel utraque, *anodyno* via aperienda est. In *icterum* interdum transit, qui plerumque sponte sua sensim faceffit; sin longas moras neſtat, remediis *ictericis* fugandus est, observandum solummodo occurrit, quod e catharticis *rhubarbaro* solo utendum.

COLICA PICTONUM.

(*Colica Pictonum.*) Art. 655. Colica Pictonum est species quædam, quæ degenerare solet in *Paralyſin*, & motus omnimodam manuum ac pedum depravationem, quam hoc nomine *Riverius* in cap. de Colica indigitat; & apud *insulas Caribum* notissima est, utpote quæ magnam vim hominum inſeſtat.

(*Balsamum Peruvianum.*) Hunc dolorem atrocissimum sanat *balsamum Peruvianum* frequenter ac magna doſi exhibitum, viz. gr. xx. xxx. vel xl. facchar. albo inſtillatum bis vel ter in die: at *paralyſis* huic remedio haud cedit. *Galbanetum* pro usu externo.

Townei ſententia.

(*Colica nervosa.*) Art. 656. Colica nervosa seu convulsiva est affectus adeo frequens in *Insulis Caribienſibus*, ut in numero morborum *Endemicorum* jure merito habenda ſit. In medicorum scriptis Colica Pictonum nuncupatur, quia *Pictavii* est frequentissima; in insula vero *Barbadæ* vulgo audit *the dry Bellyach*. Inter universas calamitates humanum genus affligentes, ne una quidem tanta acerbitate homines excruciat, ac hæc Colica. Frequenter malum inchoare solet in uno puncto ventris, indeque latius diffunditur, ita tamen, ut omnia viscera, a pyloro ad anum usque, ad istum locum, tanquam ad *miseriarum commune centrum* mirò cruciamine contrahi videantur. Omni-modi sentiuntur dolores, urentes, lancinantes, mordentes, purgantes, &c. Multifariæ hujusmodi torturæ ægrum exercent, ad dies fortasse 8. 10. vel 14. alvus interim pertinaciter constipata est, urina pauca, vires fere exhaustæ, extrema frigida; adsunt etiam sudores gelidi, præcordiorum anxietates, animi deliquia, angores, desperationes, & similia, donec tandem dolorum atque ægritudinum oneri succumbit.

(*Causa.*) Art. 657. Causa præcipua hunc morbum atrocem producentes sunt acerborum ac immaturorum fructuum comestatio, nimia liquoris perniciosissimi inſurreptatio, quem vocant *Rum-Punch*, ex spiritu sacchari ardentissimo & succo limonum sylvestrium, &c. compositum (vid. Tractat. de Venenis Art. 1633. & inclementia aeris nocturni itinerantibus, si ante crapulam edormiverint, &c. Cessante aliquanto doloris vehementia ægrotus perturbationem quandam per spinalem medullam sentit, qua brachiorum ac crurum nervis propagata imbecillitate statim sensim afficiuntur, indies crescente, donec brevi in *paralyſin confirmatam* desinit. „ Unde *Willisius* conjecturam fecit „ transitum a Colica ad paralyſin indicio esse materiam morbificam

„ non

„ non per arterias, sed nervos deferri, ejusque sedem non esse intesti-
 „ norum tunicas, sed mesenterii plexus nerveos. (651.)

(Curatio.) Art. 658. Methodus medendi hunc morbum gravissimum
 & paralyfin præcavendi a catharsi primario incipienda est ad pertina-
 cem alvi adstrictionem subigendam. In hunc finem cathartica leniora
 forma liquida frequenter repetita optime conducunt, fortiora spasmos
 adaugere solent, & Ileï periculum intentare. Verum propter affectio-
 nes intestinorum spasmodicas consultum erit imprimis *Paregoricum*
 propinare. Opiata paralyfin accelerare nonnulli opinantur, sed longe
 errant; indubitata experientia doctus larga manu illa non modo in-
 nocue, sed semper cum fausto successu exhibui. Sequenti methodo cum
 prospero eventu frequentissime processi: ʒʒ. *Pil. Matth.* gr. viiij. vel x.
castor. gr. iv. *opobalsam.* q. s. f. *pil.* statim capiend. deinde elapsa se-
 mihora, ʒʒ. *Mannæ opt.* ʒʒ. *crem. tart.* ʒij. *syr. rosar. solutiv.* ʒj. f.
mistura in haustul. tepid. juicul. avenac. sumenda & 3. horis repeten-
 da; donec alvus soluta fuerit; in intervallis *pil. Matth.* gr. iv. exhibe-
 re soleo, vel si vomitus vehementius urgeat, sequentem haustum ʒʒ.
sal. absynth. ʒj. *opij purissim.* g. i. vel gr. iʒ. *aq. menth. fort.* ʒj. *syr.*
limon. ʒʒ. m. Enema quoque cum balsamicis 4. quaque hora injicien-
 dum est; sequens etiam totus abdomini usui esse potest. ʒʒ. *Fol. cham.*
ʒiiij. bacch. junip. laur. ana ʒj. coq. in aq. font. ʒv. ad ʒiiij. sub finem
 addendo sem. carui, fœnic. anis. ana ʒʒ. colatur. add. opii ʒj. sp. sacchar.
 ʒj. m. *Semicupium* doloribus mitigandis quandoque nonnihil prodesse
 observatum fuit. Morbi vehementia in hunc modum subacta ad purgan-
 tia efficaciora, *mercurialia* scilicet, adveniendum est; ʒʒ. *Colomel. pil.*
coch. min. ana ʒj. *opobals.* q. s. f. *pil.* mane sumend. & quotidie repetend.
 donec dolor penitus remiserit, & alvus satis solubilis evadat. Deinceps
balsamum Peruvianum ad ʒij. vel ultra 6. quaque hora sacchar. cry-
 stal. instillatum vel aliter exhibeo, & rarissime spem meam refellit.

(*Pisselaum Indicum.*) Est & aliud insigne medicamentum apud nos
 divini numinis favore in hac insula sponte productum, nempe *Pissae-
 leum Indicum*, huic malo valde proficuum, prædicto balsamo adhuc
 efficacius, nisi quod quibusdam stomacho non adeo gratum sit; dosis
 ʒij. ter in die per longum tempus, donec morbus penitus subigatur.
 Nec datur præstantius remedium pro usu externo quam dictum *Pissae-
 leum*, cum æquali vel dupla quantitate sp. sacchari committum, pro
 vertebrais dorsi & artubus illinendis, quandocunque paralyseos sit levif-
 sima suspicio: hæc vero cum formata sit & confirmata, nulli reme-
 dio, quod scio, cedit, nisi forsan aquæ Bathonienses in Anglia tanto
 malo succurrere valeant. „ Immo in hoc ipse casu valere novi.

Ettmuller. sententia.

(*Colica biliosa, &c.*) Art. 659. Dolor punctorius & terebrans acerbis-
 simus sentitur in hypochondrio sinistro, aliquando sed rarius in dex-
 tro; in utroque colon facit augulum satis acutum in curvatura; dolor
 contorsionis, lacerationis, & vagæ lancinationis oritur ex spasmodi-
 ca intestinorum contractione, & plerumque adest in Colica nephriti-
 ca, dolor rodens & vellicans vermes indicat, dolor pulsans intesti-
 norum inflammationem. Mulieres interdum sub difficili mensium fluxu
 patiuntur tormina gravia abdominis, quædam post partum (& ante
 etiam aliquandiu) dolore Colico laborant, in utroque casu plerum-
 que ex abdominis & intestinorum convulsione.

(*Ad causam antecedentem respiciendum est.*) Art. 660. In omnibus
 intestinorum torminibus tam humorosis quam convulsivis habitua-
 libus,

libus, quoad causam antecedentem, respiciendum est imprimis ad *acidum* plus minus *austum*; plus minus *viscidum*, vel ex stomacho ad intestina delatum, adeoque ab assumptis vel vitiosis, vel vitiose digestis eo distributum, vel in plexibus nerveis mesenterii vicinisque locis membranosis pertinaciter hærens, & a quacunque causa externa excitatum.

(*Semper attendendum est ad speciem Colicæ.*) Art. 661. In Colica hystérica sensus globi, in abdomine moti, quem mulierculæ & medici ignorantes pro uteri habent motu, est *plexus centralis mesenterii maxime convulsus*, in viris quandoque accidens. Attendendum est præ omnibus, an colica sit *humorosa*, an *convulsiva*, an sit *accidentalis* vel *alia*. Clysmata terebinthinata in Colica *convulsiva* sunt optima.

(*Curatio.*) Art. 662. In Colica *humorosa*, ubi pertinaciter hærent stercora, convenit enema ex *ol. sem. lini & raparum & sal. gemmæ* ad ℥i. vel ij. alias enema emolliens & carmin. ex *urina pueri* in affectibus intestinorum *flatulentis* etiam cum *terebinth.* aliquando. Si dolor Colicus sit nimis acerbus, prius est mitigandus, quam *purgantibus* proritetur alvus. *Ol. amygd. dulc. & sperma ceti* in Colica *convulsiva* est remedium proficuum, & *gum. ammoniacum* in *humorosa*. Succus expressus *stercoris equini* est præsentaneum remedium contra Colicam, p. 1061. (vide locum) speciatim in Colica *convulsiva*. Decoctum *fl. cham.* in quacunque Colica maxime laudatur, tanquam specificum, & pene infallibile remedium; *sacchar. saturni* est remedium singulare. Pro usu externo *ol. cham. succini junip. ol. petrae, galbanum, empl. fofus, &c.* vid. locum p. 181.

(*Diagnos. ex urina, &c.*) Art. 663. In colica, si urina sit tenuis & aquosa, morbus est ut plurimum *nephriticus* (aliquando *hystericus*;) si valde colorata, *scorbuticus*; si respiratio sit difficilis & præcordia perturbentur, *hystericus*. In graviore casu clyisma ex *fumo nicotianæ* est remedium dolorem mitigans & alvum laxans.

Foresti sententia.

(*Vires sal. gemmæ.*) Art. 664. In Colica stercoracea a pituita viscidiorē nunquam obliviscatur medicus *sal. gemmæ*: nam hoc est experitissimum ad resolvenda stercora & mucilagines crassas; *Forest. l. xxj.* vid. etiam *Mess. med. spargyr. sub tit. sal. gem.*

(*Remedia varia.*) Art. 665. Consulendus est *Boerhaave* in his affectibus (uti in fere omnibus) tanquam oraculum. ℥i. *Flor. cham. miss. coq. paulisper in aq. brion. comp. ℥iv. in colatura dissolv. ol. mac. per express. ℥ss. Syr. de mecon. ℥ss. m. f. haustus calide sumend. ad dolores leniendos* in praxi nostra frequentissime. Decoct. *fol. mal. v. pro pauperibus præcipue in colica nephritic. Waldschmidii* experientia constat *avenas calidas* in sacculo regioni ventriculi impositas vim habere dissolvendi ac discutiendi. *Allium condit. zinzib. condit. (in frigidioribus) empl. e bucc. laur. e Cymin. &c. Pharm. Lond. Enema colic. fofus spirituosus, mistura hyst. spirituos.* sunt remedia usu comprobata.

ILIACA PASSIO.

Ettmulleri sententia.

(*Iliaca Passio.*) Art. 666. Ileus sive Iliaca Passio est motus peristalticus intestinorum inersus cum dolore circa umbilicum intensissimo; excrementa alvina motu retrogrado per os ejiciuntur ex obstructione alvi contumaciori. Appellatur *Convulsivus & Chordapson*. Quoties in sequiori sexu morbum Iliacum observare contigit, *Herniam* adesse tuto

tuto fere prædicare possumus, quamvis ob exilitatem ipsæ patientes non observare soleant. Opinio de convoluzione intestinorum est falsa; ingressus vero superioris intestini in inferius, & contra, est satis frequens. Dubium est an inflammatio intestini sit causa obstructionis ejusdem vel contra. Morbus gradatim progreditur, in principio nil descendit per inferiora, abdomen sensim durefcit & tumet; ægri nauseant & vomunt primo ingesta, deindecrementa flavescentia (& pituitosa) & tandem excrementa alvina. Adsunt lipothymia & anxietates inexplicabiles, sudores frigidi (extremorum frigus) urinæ suppressio; vires languescunt, singultus supervenit, qui prodromus est convulsionis, & epilepsiæ, & ipsius mortis. Plures intereunt, quam convalescunt. Si dolor sit acutissimus, & subito sine causa manifesta deficiat, signum est gangrænæ.

(Curatio.) Art. 667. *Venæsectio* celebranda est in initio, si adsit febris vel insignis calor. *Cathartica* sunt fugienda, quoniam vomitoria evadunt; non prius securitas promittenda est, quam sequitur alvi profluvium sponte vel arte provocatum. *Ægri analeptici & cardiaci* sunt sustentandi. *Ol. amygd. dulc.* cum jusculo pingui, item *Sperma Ceti* in decocto *raparum*. Deglutitio *globulorum* aut *argenti vivi* nil prodest, sed potius malum exasperat, ubi adest intestini inflammatio, gangræna, vel ingressus intestini superioris in inferius. *Dos. argenti viv.* est ℥iij. vel iv. ad ℥ss. & amplius, & exitus ejus per clysteres omni studio promovendus est; aliquando non ante aliquot dies redditur, interdum *salivationem* movet. „ Exemplum affert alicujus mercurii ℥iij. per ostidium in corpore habentis, sed non sine salivatione excitata. Mulieri in sectione de *Lumbricis* memoratæ (Art. 691.) gravissima passione iliaca correptæ enema lacteum statim injiciendum præscripsi, & elapsis duabus horis haustum hypnoticum capiendum; & deinceps post duas alias horas largam dosin pil. ex duobus cum calomel. ℥ss. hæc nihil proficiebant; die proximo excrementa alvina per vomitum ejecta sunt; largam quantitatem olei amygd. dulc. in brodio tenui potandum jussi, & linimentum ventre illiniendo usurpandum, & sub noctem enema cum vin. benedict. ℥iv. injiciendum; nihilominus nihil per inferiora descenderat, sed jugiter fursum omnia. Die 4. sudores frigidi superveniebant; viribus fere exhaustis; itaque argenti vivi ℥iij. propinavi & trihorio post tres alias uncias; elapsa deinde hora una vel altera *ingentem lumbricum* evomebat & bis per inferiora purgata est, & in futurum alvus satis soluta manebat; argentum vero vivum (quod mirum videatur) non ante finem 7. vel 8. dierum redditum est; nihil tamen mali mulieri exinde obveniebat: hæc enim etiam nunc post quatuordecim annos vegeta vivit. „ Omentum ovis recens matatæ calide in abdomen impositum mirum in modum dolorem lenit; laudatur etiam cataplasma ex pomis putridis *Borsdorffianis* cum tantillo croco vel ex stercore ovillo cum lacte cocto; p. 120.

Sennerti sententia.

(*Miserere mei.*) Art. 668. Barbari superioribus sæculis Iliacam Passionem *miserere mei* vocabant, quoniam malum est commiseratione dignum: in hoc morbo clysteres, imo & glandes vomitu rejiciuntur ob motum intestinorum inversum; ideoque aliquando intestinorum viæ in ileo non penitus præcluduntur. Signum hujus morbi proprium est, quod nihil descendit per inferiora; accidit plerumque vomitus bilis & pituitæ, frigiditas totius corporis, dolor plurimus, spirandi difficultas, &c. & morituris sudor frigidus

Omnis Ileus periculofus; rarissime convalescunt, qui stercus per os ejiciunt.

(*Curatio.*) Art. 669. Venter foveri debet decoct. emol. & linimentis inungi. Oleum amygd. dulc. & inscula pingua ore fumenda sunt, & quamvis semel atque iterum talia vomitu rejiciantur, continuandus tamen est eorum usus ad fibras relaxandas.

(*De causis consultatur author.*) A tribus potissimum causis exoritur, ab inflammatione, ab aliis tumoribus & exulceratione, & denique a facibus induratis, de quibus singulatim consulendus est author p. 429.

Barbetti sententia.

(*Causa proxima.*) Art. 670. Fabricius Hildanus observavit principium & originem hujus affectus fuisse circa Intestinum Cecum; ego vero existimo valvulam in principio coli primum ex intestini cæci inflammatione adeo contrahi & stringi, ut plane nihil permanere possit. In omnibus fere hoc affectu extinctis dissectis accuratiores invenerunt, vel intestini gangranam, vel tenuis intestini coarctati ingressum in partem proximam flatu prius turgidulam. Si gangraena jam aderit, cognoscitur ex eo quod dolor statim cesset: Omentum & etiam ipsa intestina ex vivo animali quam calidissime abdomini applicari possunt multo cum levamine. Convenit venesectio in initio, si malum ab inflammatione oriatur; Immo in corporibus robustis nunquam omit-
ti debet.

(*Gangraena mortis causa.*) Art. 671. Plures ab ileo defunctos aperui, & intestini cujusdam inflammationem & sphacelum fere in omnibus, & morbi & mortis causam fuisse deprehendi. Willis. Sæpius in hoc morbo defunctis (inquit Dolæus) intestina plane vacua invenimus; unde manifestum est sæpius spiritus animales peccare.

Sydenhami sententia.

(*Methodus medendi.*) Art. 672. Ventriculus primo loco præ omnibus corroborandus est, & vomitus, si fieri possit, sistendus; ideoque sal absynth. cum succo limon. præscribo (subinde) fumend. intermediis vero temporibus exhibeo coch. aliquot aq. menth. stillat. sine alio quovis additamento. Dum hæc fiunt catulum viventem nudo ventri indefinenter accumbere jubeo, dolore hoc modo profligato, exhibeo Pil. coch. maj. ʒj. in aquam menth. dissolut. quam etiam aquam (quo certius vomitus recursum prævertam) toto cathartico tempore injungo. Victus sit tenuis per totum morbi decursum, & decumbat æger in lecto, donec convalescat. Usus argenti vivi & globulorum author minus probat.

(*Curatio.*) Art. 673. In hoc affectu quotcunque cathartica propinaveris, ea statim emetica fiunt; ideoque vena brachii tundenda est & fumus nicotianæ (de hoc vid. Fullerii enema oleos. amar.) in intestina inflandus est quæ validissime (omnium enematum, quæ mihi innotescunt, hætenus efficacissimum esse duco) idem quoque post moram aliquam reiterari potest. Hoc successu carente, necesse est catharticum fortissimum exhiberi, sed præstat hora una aut altera paregoricum propinare, ut sub laudandi tutela catharticum retineatur, & suo munere defungatur. Sched. mon. p. 48. De usu follis, &c. vide enema oleosum amarum Fullerii. Fetus ad colicam, fetus spirituosus, mistura corallata, omnia ad colicam quandoque in usum veniunt. Demulcendis doloribus convenit semicupium. In ileo stercore vacæ quam recentissimo universa ventris regio emplastretrur; hoc etenim remedio, aliis nihil proficientibus, viam intestinorum aperui (inquit Zacutus Lusitan. in praxi admiranda.)

(*Histo-*

(*Historia.*) Art. 674. „ Infans vix semestris a nativitate perfecte va-
 „ lens & vegetus subito in gravissima ventris tormina lapsus est; sub-
 „ secutæ sunt vomitiones enormes, nihil omnino per inferiora descen-
 „ dente, præter exiguum sanguinem. Ad infantulum succurrendum o-
 „ mnem operam ac studium navavi, sed frustra; nam triduo expira-
 „ vit. Abdomine aperto intestina omnia usque ad inferiorem Ilei par-
 „ tem flatibus valde distenta invenimus, & jejunum leviter inflamma-
 „ tum; jamque paulo inferius morbi sedes in conspectum venit; por-
 „ tio etenim Ilei, *sex digitos longa*, (quod prodigiosum erat in sub-
 „ jecto tam parvulo) in *coli cavum, cum mesenterio adjuncto*, colla-
 „ pta est; pars affecta in tumorem attollitur tunicis intestinorum in-
 „ crassatis, nigricantibus, gangrenosis, & quibusdam in locis sphace-
 „ latis per totius involutionis tractum, unde intestinorum *oppilatio*
 „ *insuperabilis*, quæ instar Polypi visa est. En luculentum exemplar
 „ *Passionis Iliacæ* perfectissimam morbi ideam complectens in infante
 „ nondum semianniculo, quod rarissimum esse credo. „

L U M B R I C I.

Sennerti sententia.

(*Vermium species variae.*) Art. 675. Lumbricorum tres sunt species fre-
 quentiores. viz. *teretes* sive *rotundi*, *lati*, & *ascarides* (ex ovis insectorum
 oriuntur); aliquando sed rarius vermes anomali ejiciuntur, cornuti
 scilicet, hirsuti, quadrupedes, multipedes, bicipites, tricipites, cau-
 da bifurcata præditi &c.

(*Vermes in variis corporis partibus.*) „ Præter vermes intestinales,
 „ sunt & alii, omnes fere corporis partes incolentes, uti vermes den-
 „ tales, gingivales, rhinarii, pulmonarii, cardiaci, sanguinarii, urina-
 „ rii, cutanei, umbilicales, elcophagi, vermes in hepate, in saliva,
 „ &c. Sed hi omnes non nisi in statu morbido inveniuntur.

(*Teretes.*) Art. 676. „ Lumbrici teretes sunt frequentissimi & satis
 „ noti, Lumbricis terrestribus similes, nisi aliquanto albidiores sint.

(*Lumbrici lati descriptio.*) Art. 677. „ Lumbricus latus, tænia a
 „ Plinio, Platero, &c. appellatus, est instar fasciæ duarum vel trium
 „ ulnarum aliquando longior, geniculis transversis per totum divisus.
 „ Nicolaus Andry affirmat unum esse tantum in corpore, unde *solum*
 „ appellatur. Ast M. Hageunot tæniam in ventriculo felis aliamque in
 „ duodeno reperit. Memoir. de l' Acad. Vol. xvij. p. 484. Et Mr. Geoff-
 „ froy tæniam in tinca pisce duos pedes & amplius longam observavit.
 „ Hist. de l' Acad. Vol. xiv. p. 50. hunc Lumbricum in cane ipse vi-
 „ di tres circiter pedes longum; ideoque in aliis animantibus præter
 „ hominibus generantur.

(*Latus Lumbricus.*) Art. 678. Latos Lumbricos qui habent, appe-
 tentia cibi nimia laborant, ac nisi cibus offeratur, dolor & morsus in
 ventre percipiuntur, &c. Certissimum vero signum est, quod cum al-
 vi excrementis corpuscula quædam *cucurbitæ* seminibus similia excer-
 nuntur. Hi difficulter necantur; commendantur *rad. flicis* ad ℥ij. &
 decoctum *corticis rad. mori*.

(*Remedia ad Lumbricum latum.*) Art. 679. „ Ad latos Lumbricos
 „ educendos adhiberi debet *vomitus ex oleo*, non ex *radicibus*, & alia
 „ die *clystere* utendum admixta *nitri* parte vel *salis*; danda etiam *aqua*
 „ *salsa* potui, aut *glycyrrhizæ rad.* decoctio aut similiter incocta
 „ *glycyrrhiza*.

(*Ascarides* .) Art. 680. „ Ascarides sunt tenues Lumbrici , filorum
 „ particulas referentes , qui in parte inferiori crassorum intestinorum ,
 „ & juxta sphincterem musculum residere solent .

(*Remedium singulare* .) Art. 681. „ Signum pathognomonicum *asca-*
 „ *ridum* est pruritus in ano vix tolerabilis ; ægrotantes aliquando *syn-*
 „ *copen* patiuntur , & frequentissime *tenesmus* . Ad *ascarides* facit ex-
 „ perimentum Aetii , suppositorium scilicet formatum e carne veteri *sa-*
 „ *lita* , pinguedinē defasa .

Fulleri Sententia .

(*Ascaridum Cûratiô* .) Art. 682. Ascarides sunt quidem gens pusilla , sed expugnata difficillima ; namque licet omnes ad unum enematis vi exterminarentur , nova tamen & numerosa proles ab ovulis in recto depositis mox nascetur . Ideoque non tanti erit parentes solos proscripisse ; nisi insuper & nati , & semina etiam ipsa radicitus extirpentur , & ejiciantur . Hocque optime fiet , si postquam ascarides jam disparuerunt , non statim a remediis abistamus ; sed tertiis quartisve diebus per aliquot vices , ac deinde semel in hebdomade hujusmodi deturbantia enemata repetamus ; quod nemo authorum hætenus notavit .

(*Enema amarum* .) Ideo minime dubitandum est *enema amarum* seq. 2℥. Rad. serpent. virg. contus. ʒj. pulp. colocynth. (in nodulo ligat.) ʒj. herb. tanacet. summit. sabin. ana M℥. coqu. in aq. font. q. s. ad ʒvj. colatur. add. ol. hyperic. ʒ℥. ol. absynth. chym. ʒ℥. spec. hier. picr. ʒj. m. singulis noviluniis injectum , & per aliquot menses repetitum , ascarides interempturum , exterminaturum , & funditus deleturum esse .

(*Symptomata a lumbricis* .) Art. 683. „ A Lumbricis vomitus , car-
 „ dialgia , syncope , singultus , vocis privatio , tormina intestinorum ,
 „ capitis dolores , sopor gravis , deliria , mœror , tristitia , febres , an-
 „ gina , pleuritis , & alia innumera gravia symptomata .

(*Remedia vermifuga varia* .) Art. 684. „ In genere amara fere o-
 „ mnia sunt vermifuga . Privatim pulv. cort. aurant. mercurialia , Æthiop.
 „ min. mercur. dulc. &c. muscus corallin. ens Veneris , semen Sanctonici
 „ in vino clareto est anthelminthicum insigne . Floyer. Decrescent.
 „ luna vermes sunt aggrediendi . Pulv. colocynthid. cum felle bovin.
 „ subact. cum gut. aliquot ol. absynthii umbilico applicatus , Lumbrici-
 „ cos pellit . Ad ascarides necandos enemata cum colocynthid. incoct.
 „ mercurialia , &c.

Baglivii Sententia .

(*Vermes anomala & insolita symptomata sæpe pariunt* .) Art. 685. Quod ut plurimum homines ex improvise , & sine ulla causa manifesta , & signis alios morbos comitantibus , in subitum vitæ discrimen incidunt , & cadunt veluti apoplectici cum extremitatibus frigidis , pulsu exilissimo (qui fere semper signum est vermium latentium uti & singultus) aponia , quandoque improvise mania , tunc de vermibus dubitandum , in tali casu nil potentius est , quam statim dare cum brodio pr. xij. merc. dulc. & gr. v. scammon. sulphurat. in adultis . In pueris vero minoretur dosis , vel potius detur mercurius crudus ad magnitudinem pisi cum brodio , nam erit ad miraculum . Chesneau .

(*Nota bene* .) Art. 686. „ Probe notandum est , quod nullum tam
 „ peregrinum sit symptoma , tamque *Δυσχευία* , quod vermes exci-
 „ tare non possint . Horrenda quidem symptomata quandoque a ver-
 „ mibus exoriuntur , ut non raro ex incantatione produci vulgo cre-
 „ dantur . Periti medici multa adstantium admiratione cacodæmona
 „ non raro ejiciunt .

(*Ex vermibus epilepsia, mania, moria.*) Art. 687. „ In praxi quotidiana horrenda hujusmodi symptomata a vermibus excitata vidimus. „ Homo quinquagenarius subito in gravissimam *Epilepsiam* lapsus est, „ & intra decem dies sex vel octo violentissimos insultus cum horrendis spasmis passus est; deinde in *maniam* incidit per diem unam „ aut alteram, & postremo in *moriam* & fere omnium rerum *oblivionem*. Die 16. Lumbricum mortuum excrevit, & sensim pristinam „ sanitatem nactus est, nisi quod *memoriam* nunc biennio post nondum integre recuperavit.

(*Cæcitas.*) Art. 688. „ Adolescentula quædam febre verminosa laborans stupendis motibus convulsivis correpta est, unde *visum* penitus „ amisit, & luce orbata ad quatrimum mansit, interim a spasmis fere libera; die 5. alius paroxysmus convulsivus supervenit, & acies „ oculorum restituitur. Exhibita erant medicamenta antispasmodica, „ & præcipue anthelminthica, *Æthiop. mineral.* & *calomel.* &c. Vermes comminuti & contriti excreti fuerunt & puella convalescebat.

(*Obmutescencia.*) Art. 689. „ Alia puella ex Lumbricis intestina „ incolentibus primo raucescit, & febre acutissima laborabat; post „ paucos dies vocem penitus amisit, & ad dies aliquot muta remansit; „ & cum omnia symptomata mortem in propinquo esse monstrabant, aliis vermifugis minus succurrentibus, exhibui *decoctum foliorum hellebori nigri* fere in ipso articulo mortis; vermes quamplurimos excrevit, & convaluit. Ejusdem remedii ope plures qui in „ extremo vitæ discrimine fuerunt versati, restitutos vidi; & longa „ experientia didici helleborum nigrum *optimum esse & certissimum vermifugium in tota pharmacorum familia.*

(*Lumbricus umbilicalis.*) Art. 690. Ex Historia Medica abunde constat Lumbricos nonnunquam ventriculum, intestina, hypochondria atque „ inguina perforare & foras prorepere. Plusquam viginti abhinc annis ex „ umbilico pueri octennis exulcerato *Lumbricum teretem 6. vel 7. digitos longum propriis manibus avulsi*; post Lumbricum *cochl. j. vel. ij. puris flavi* effluerunt, quod excrementa alvina non olebat. Ulcus non temere sanandum esse judicavi; ideoque foramini turundam adaptari „ jussi, ut materia purulenta quotidie evacuaretur; per septimanam & diutius pus ubertim effluebat, sed in dies minori quantitate; deinde „ post triginta dies sine ullo incommodo ulcus exsiccatum est; & puer integre restitutus, utcumque tamen proximo anno in *ascitem* lapsus est, „ a qua causa nescio; ex hoc etiam morbo remediis appropriatis illum feliciter liberavi, & etiamnum sanus ac vegetus vivit.

(*Lumbrici ex inguine prodeuntes.*) Art. 691. Fœmina quadraginta „ quinque annos nata, robusta, & laboribus assueta, dolore colico quandoque obnoxia, alias sana, circa quatuordecim abhinc annis tumorem „ habuit in *inguine sinistro*, ovum gallinæ æquantem, quem *berniam* esse ipsa credebat; durabat enim integrum annum ante disruptionem. Interea „ circa dictam periodum fœmina ileo correpta est, de quo alibi (Art. 667.) a „ cujus morbi cruciatibus ac immani vomitione, &c. ruptus est tumor in *inguine*, „ & effluxit tenuis humor flavescens, turpethi mineralis colorem æmulans: advocatus est chirurgus, qui stylo immisso largam „ cavitatem detexit; foramen sensim spongia præparata dilatatum est, & magna vis prædicti humoris in dies evacuatur; die 10. „ in foramine apparuit *Lumbricus vivus*, quem chirurgus coram astantibus detraxit, „ figura, colore, & magnitudine Lumbricis intestinalibus omnino similem. Post duas vel tres septimanas eductus est *alius*

Lumbricus priori non dissimilis, nisi quod aliquando rubicundior esset. Vermifuga interne propinabantur, & decocta anthelmintica ex fol. *bellebor. nigr. aloë, sem. sanctonic.* &c. in ulcus sinuosum injecta fuerunt. Tribus circiter mensibus sanatum ulcus, & mulier, adhuc viva, ex illo tempore bene se habuit.

Art. 692. Si quis de *Lumbricis umbilicalibus* & *inguinalibus* plura velit, *Schenchium* adeat, *Observ. p. 408. 409.* item *Bonetum*, p. 631. *Inguinalium* recentiora exempla habemus apud *D. Morton. Hist. Natural. Northamptoniae*, p. 467.

C A P. VII.

Sive Fasciculus Morborum Septimus.

D I A B E T E S.

Listeri sententia.

(*Diabetis historia.*) **D**iturna est hujus morbi creatio, & longo tempore parturitur. In principio os humore privatur, saliva albida est ac spumans, paulo plus lotii, quam moris erat, effunditur; sitis adest, sed nondum vehemens, calefactio parva quidem, sed mordax, visceribus inhærens exoritur; habitus corporis gracilis evadit, & homo anxius & animi dubius existit; progressu temporis sitis insigniter augetur, & velox est carniū & membrorum in urinam colliquatio; neque enim cum intermissione lotium reddit, sed, perinde atque canales laxati sint, indefinens est profusio; sitis intolerabilis est, potus copiosus, multitudini tamen lotii non respondens; si parvum tempus a meiando abstinerit, intumescunt lumbi, testes & ilia, postremo cum dolore mei t & festina mors adventura est. Urinæ quidem gustus lenis, & minime, quantum memini, dulcis, paulatim tamen dulcescere in confesso est, quod primum aquosior feri pars effunditur, & postea ipsa feri pars chylosior: huic autem rei fidem facit, nempe *phthisicorum* plurimorum ultimis mensibus insignis sputi dulcedo, ad nauseam usque molesta (lac etiam muliebri, a chylo paululum discrepans, dulcescit.)

(*Curatio.*) Art. 694. Conveniunt *amygdalata* & *lacticia*. Affert exemplum cujusdam ex hoc affectu suo consilio curati bibendo vinum cum *zinzibere* coctum quantum & quoties pro viribus potuit, concesso interim haustulo ex aq. lactis ad sitim leniter temperandam. *Ettmulleri sententia.*

(*Morbi descriptio.*) Art. 695. In Diabete urina quantitate nimis copiosa excernitur, cum siti intensa, debilitate virium, macie, febre continua lenta, ardore circa regionem lumbarem, verbo, symptomatis *hæticæ confirmatæ*; interdum cum urina pingue aliquid excernitur, & tandem ut plurimum mors sublequi solet. Sed hæc est *Diabetes notha*.

(*Diabetes vera.*) Art. 696. *Diabetes vera* est immutata ingestorum potulentorum per urinam excretio, *cæacæ* & *lentericæ* similis: in hac specie potulentia redduntur parum mutata quoad colorem, odorem, saporem, &c. sic vinum rubrum mingitur, &c. Exempla hujus sunt rariora.

(*Alia species.*) Art. 697. Est & alia species Diabetis, quæ *cæliaca* urinæ appellari potest, nempe quando *chylus* cum urina aut loco urinæ prodit.

(*Prognosis.*) Art. 698. Urina vulgo Diabete laborantium admodum dulcescit; est periculosum malum, & sæpe lethale; post immodicum laborem, nimiam venerem, chronicas febres, plerumque incurabile; „ ut etiam quando a prava & diuturna consuetudine liquorum spiri- „ tuosorum ingurgitationis originem duxerit. “

(*Curatio.*) Art. 699. Quoad curam temperanda est sanguinis acrimonia; in plurimis convenit cum cura febris *hectica*; inchoanda est cura cum vomitorio, deinde exhiberi potest *antihectic.* Poterii, *lapis-hæmatit. sacchar. saturn. croc. mart. aluminata, trochisc. de carabe, terr. sigillat. opiatum* hor. somni; præ reliquis *aq. calc. lac chalybeatum, emulsiões, &c.* Ad Diabetem *veram astringentia, martialia, privatim decoctum cort. aurant.*

Willisi sententia.

(*Morbus apud antiquos rarissimus.*) Art. 700. Diabetes apud antiquos fuit morbus rarissimus, at nunc dierum magis familiaris; habet sitim continuam, atque febrem lentam & quasi *hecticam* semper conjunctam. Novi quendam vino Rhenano pro potu ordinario per viginti dies usum Diabetem incurabilem contraxisse.

(*Curatio.*) Art. 701. Pauci aut nulli ab *astringentibus* curantur. Sæpius in hoc morbo *tincturam antimonii* cum bono successu præscripsi, atque *aq. solutionis calcis viv. cum sassaf. sem. anisi, passulis, liquirit. &c.* Ego, & D. *Micheltwait & Witherly* pro quodam Comite sic præscripsimus; ℞. *Summit. arboris cypress. M. viij. alb. ovor. ℞ij. cinnam. ℞℞. lact. ℞viij. distillantur &c. bibat æger ℞vj. ter in die. ℞. Gum. Arab. tragacanth. ana ℞vj. sacchar. penid. ℞j. f. pulv. dos. ℞j. vel ℞℞. bis in die cum aqua distillat. haustum paregoricum omni nocte; dietam fere tantum ex lacte. Horum usu indies melius habuit, & intra mensem sanatus est.*

(*Diabetes & salivatio.*) Art. 702. „ Fœmina quinquagenaria plenioris temperamenti Diabete & salivatione, nunc hac, nunc illa, utroque morbo alternatim invadente, tamdiu laborabat, donec vires fere exhaustæ fuerunt. Infusum rhabarbari in vino Canariensi quotidie capiendum iussi, & post paucos dies dosis decoct. catechu composit, *Fulleri*, omni nocte propinata fuit, & pro potu ordinario vinum Florentinum cum aqua Bristolensi dilutum potavit, atque ita duobus vel tribus septimanis ab utroque malo penitus liberata est, & plures annos incolumis vixit.

Sydenhami sententia.

(*Morbus adumbratur.*) Art. 703. Succus sanguini illati per vias urinarias crudi & incocti exitum sibi quærunt; unde sensim labefactantur vires, colliquescit corpus & quasi substantia ejus per hanc cloacam exinanitur, cum siti, ardore viscerum, lumborum coxarumque intumescencia, & salivæ spumosa exspuitione crebra.

(*Curatio.*) Art. 704. Eadem præscribenda sunt, quæ in *fluore albo*, omissis solummodo *venesectione & catharsi*; nam utrobique *indicationes curativæ* sunt eadem, quantumcunque inter se hi duo morbi diffidere videantur.

Harrisii sententia.

(*Curatio singularis.*) Art. 705. Cogitationi clarissimi authoris subiit diarrhæam esse quasi *diabetem alvi*, & *diabetem renum diarrhæam*; ideoque felici cum successu pro diabete laboranti hunc in modum præscripsit. ℞. *Rhei elect. ℞℞. santal. alb. citr. ana ℞j. cardamom. minor. ℞℞. infunde lento igne vase clauso in vin. Canarin. ℞j. sumpsit æger hujus vini colati coch. vj. hora 6. matutin. atque tantundem repetebat*

bat hora 10. ante merid. ab illo meridie usque ad 10. vespertinam. Diabetes penitus sistebatur, sitis desit, &c. (sed hujus rei hoc unicum habet exemplum.)

Farrago sententiarum.

(*Græcis incognita fuit.*) Art. 706. Rara est mentio hujus morbi apud veteres scriptores; *Græcis* fere incognitus fuit; *Galenus* proficitur se bis tantummodo ipsum vidisse; *de locis affectis* lib. vi. cap. 3.

(*Remedia varia.*) Art. 707. Præter jam dicta interdum ad curam aliquid faciunt remedia sequentia, *decoct. catechu comp. decoctum incrassans, ichthyocolla, gelatina C. C. oryza, tinct. coralli, trochisci Gordonii, & præ omnibus juxta praxin modernam aquæ calidæ Bristolenses*. Sequens decoctum cum maximo fructu propinari potest; ʒi Cort. Peruv. ʒj. *tinctur. rosar. ʒiʒ. coq. ad ʒij. lento igne, colatur. add. vin. rub. auster. ʒiʒ. syr. Cydon. ʒij. misce; dos. ʒiij. bis vel ter in die.*

N E P H R I T I S.

Boerhaavii sententia.

(*Inflammatio renum.*) Art. 708. Certum est renes vera inflammatione tentari ex dolore ardente, pungente, magno; ex febre acuta, continua comitante; ex urina pauca, admodum rubra, & flammea, vel in summo malo aquosa; stupore cruris vicini; dolore inguinis, testisque vicini: dolore iliaco; vomitu bilis: ructu affiduo.

(*Causæ.*) Art. 709. Hanc inflammationem producere possunt omnes causæ generales inflammationem parientes, privatim quicquid urinæ transcolationem & transitum in meatibus urinariis impedit. Si summa inflammatio hæc vascula occupat, ita sæpe stringuntur, ut nihil reddatur lotii; aliquando ut valde parvum, tenue, aquosum, quod pessimum. Infinitæ sunt Nephritidis species, causæque; & inter eas una a calculo; omnium tamen est ferme eadem curatio.

(*Curatio.*) Art. 710. Sanatur per remedia generalia omni inflammationi sanandæ propria, viz. *venesectionem, avulsionem, dilutionem; per decocta lenia, emollientia, antiphlogistica magna copia ingesta per clysmata, fomenta, balnea ex iisdem constantia; victu humido, leni, quiete, vitatio- ne lecti calidi, & decubitus in dorso*. Si nimia symptomata doloris, vel convulsionis urgent, *opiata* profunt, vomitum autem nimium sæpe ingestu tepidæ mellitæ juvare prodest. Atque hac sola methodo tuto curatur ipsa Nephritis a calculo renibus, ureteribusve impacto orta.

(*Abscessus.*) Art. 711. Si causæ Nephritidis magnæ, nec dum resolvitur, nec sanatur, sed excurrit ultra septimum diem, *abscessus* metuendus; quem fieri docet, remissio doloris, ejus in pulsationem mutatio, horror sæpe recurrens, gravitas stuporque partis, jam factum esse docet prægressus priorum, tum pulsus, ardor, tensio in loco, urina purulenta, foetida, instar urinæ falsæ putrefactæ: simulac abscessus ille factus scitur, utendum valde *maturantibus* primo & *emollientibus*, dein purulenta apparente urina, *diureticis puris ex aquis medicatis, sero lactis, similibusque, usurpatis simul balsamicis*.

(*Effectus suppurationis & prognosis.*) Art. 712. Si vero suppuratio dicta diu durat, totus ren exesus sacculum format nulli usui servientem: tumque frequenter *tabes renalis* insequitur. Si scirrhum hic format, *paralysis vel claudicatio* cruris suppositi oritur, immedicabile malum; unde sæpe lenta *tabes, hydrops, &c.* Si autem parva copia materiæ inflammatae coagulata in folliculo urinæ minimo hæserit, basin for-

mat,

mat, cui apposita fabuli in urina materies crustatim accrescens caculum renalem creat, sicque eundem auget, de quo alibi. Quinetiam aliquando in gangranam transit, quod docet vehementia causæ & symptomatum, & subita doloris remissio sine causa manifesta, cum sudore frigido, pulsu debili intermittente, singultu, urina vel nulla, vel livida, nigra capillosa, foetente, carunculis fuscis, nigrisve foeda, defætu virium subito, ubi nihil juvat, immo nec ipsa medicina.

INFLAMMATIO & EXULCERATIO VESICÆ.

Ettmulleri sententia.

(*Signa inflammationis renum, & quomodo differt a calculo.*) Art. 713. Renum inflammatio & exulceratio, *nephritis* quandoque dicitur. Signa sunt ardor urinæ, stranguria, urinæ interdum suppressio, corporis inflexibilitas, febris, stupor cruris, vomitus biliosus, alvi suppressio, &c. Ut rite distinguatur a calculo, observandum est quod hic semper adest febris continua, in calculo non ita; dolor etiam est magis continuus & pulsatilis, in calculo interpolatus & periodicus; ischuria in hac, raro in calculo. „ In inflammatione renum urina in „ principio valde rubescit, morbo autem ad summum provecto aquosa „ sa & limpida evadit: in affectu calculoso contrarium prorsus accidit.

(*Curatio.*) Art. 714. Quoad curam cum reliquis inflammationibus convenit, cum externis secundum curam *anginae* procedendum est, cum internis secundum *pleuritidis*; *hirudines* venis hæmorrhoidalibus applicatæ profunt. *Diuretica* in principio sunt nociva; conducunt *nitrata*, *saturnina*, *papaverina*, *succus cancerorum fluviatilium*, & externe *camphora*.

(*Suppuratio, inde ulcus renum.*) Art. 715. Suppuratio aliquando expectanda est; rupto abscessu miætus fit purulentus, hinc *ulcus renum*; dolor morficans & rodens in lumbis sentitur a sero acri, quod in transitu irritat & rodit cum caloris sensu; periculosum est malum, & sæpius lethale.

(*Ejusdem curatio.*) Art. 716. Quod curam *mundificantia* & hinc *consolidantia* utramque faciunt paginam; vomitus a pluribus laudatur, *mercurius dulcis* cum *terebinthina* & *balsamicis*; præmissis *mundificantibus* decoctum *hederæ terrestris*, & *e lignis*, *succus cancerorum fluviatilium*, *trochisci alkekengi* (*trochisci Gordonii*, *lac asininum*) *acidula*, *aq. spadan.* &c.

(*Inflammatio & exulceratio vesicæ.*) Art. 717. In inflammatione & exulceratione *vesicæ* pathemata sunt tensio, durities, ardor, tumor, ac dolor in regione pubis, febris plus minus acuta; ægri ut plurimum moriuntur quarto vel septimo die, vel sequitur *ulcus* curatu difficillimum; interne quoad curam cum aliis inflammationibus convenit; externe danda est opera ut inflammatio *discutiatur*; aliter expectanda est *exulceratio*.

ULCUS RENUM & VESICÆ.

(*Ulceris Vesicæ signa.*) Art. 718. In ulcere *vesicæ* adest dolor gravis in pectine & pube, quoties ægri mingunt, urinæ difficultas accidit, sæpius & tenesmus, & membri virilis erectio. Si in pene vitium sit, inter meendum dolor percipitur, quod in *vesicæ ulceribus* non accidit, nisi juxta ejus collum ulcus consistat. Malum ut plurimum est incurabi-

rabile. Quomodo distinguantur ulcera renum & vesicæ. „ Inter renum & vesicæ ulcera sic distinguitur (inquit Lommius) renibus exulceratis non æque difficulter urina redditur ; & quod ex his detèritur , rubet ; seu tènues trahuntur carunculæ ; seu filamenta capillis similia ; minor etiam incidit dolor ; sæpiusque cruor urinæ permixtus . At vero *exulcerata vesica* , major est urinæ tum cupiditas tum difficultas ; quicquid decedit , album est ; dolores magis urgent , mixtus sanguinis excernitur ; si meatus urinarius sive *urethra exulceratur* ; urina subcrassa est ; particeps modici cruoris vel certe puris . *Ulcera renum* promptius quam *vesicæ* sanescunt . „

(*Curatio .*) Art. 719. Eadem sunt indicationes curativæ ac in ulcere Renum ; *trochisci Gordonii* specificè laudantur ; *theriacæ* . Pro injectione convenit *aq. calcis cum trochis. alb. rhâsis (sacchar. Saturni .)*

Riverii sententia :

(*Causa & signa , &c .*) Art. 720. Ulcus Renum vel Vesicæ a tribus excitatur causis ; abscessu rupto post inflammationem , humorum acrimonia , (qualis est ea , quæ mictum cruentum efficit) ; aut a calculo aspero dictas partes erodente ; postrema hæc frequentior est , ac fere ordinaria . Mictio purulenta est signum diagnosticum . In ulcere Vesicæ , aut illius cervicis perpetua adest dysuria & continuus dolor partem istam infestans , in ulcere Renum non ita ; raro curantur in junioribus ; in senibus nunquam .

(*Curatio :*) Art. 721. *Purgantia* debent esse *leniora* ; ut *cassia* ; *rhabbarbarum* ; &c. *mercurius* eximiam habet vim omnia ulcera interna & externa *mundificandi & consolidandi* ; ut etiam *terebinthina* cum pulv. *liquiritiæ* exhibit. ad ʒʒ . Post debitas *evacuationes & revulsiones* ad *detergentia* progrediendum est ; inter illa *serum lactis* ; *hydromel tenue* ; *lac asininum* , &c. post horum usum , ubi ulcus satis *mundificatum* fuerit (quod cognoscitur quando pus minore quantitate excernitur , idque album æquale ac minime foetidum) *glutinantia & consolidantia* exhibenda sunt , inter quæ *trochisci Gordonii* instar omnium habentur , qui dolorem leniunt & ardorem urinæ contemperant ; dos. ʒij. vel iij. in *hydromellite* , vel dec. hord. præ cæteris *lac vaccinum* cum *bol. Armen.* ʒʒ . haustum singulis matutinis testatur *Forestus* maxime conferre ad ulcus expurgandum & consolidandum ; *lac tepens* recens multum frequenter injectum præstantissimum est *anodynum* , in quo si *trochisci Gordonii* dissolvantur omnes scopi tum doloris sedandi , tum ulceris curandi adimpleri possunt .

Farrago sententiarum :

(*Prognosis .*) Art. 722. Renum affectiones (inquit *Hippocrates*) non vidi sanatas supra quinquagesimum annum . Si quis sanguinem & pus mingat , & squamas , & odor gravis sit , vesicæ exulcerationem significat . *Hippocr. aphorism.*

(*Remedium singulare .*) Art. 723. *Rhabbarbarum* in parva dosi & diu exhibitum est remedium singulare ad ulcera renum & vesicæ curanda . *Hamilton.*

(*Pereira Brava .*) Art. 724. Nescio an virtutes *Pereiræ Bravæ* i. e. *radicis vitis sylvestris Brasiliensium* satis tentatæ fuerint , necne ; de qua *M. Geoffroy* hæc habet : exhibui felici cum successu hanc radicem *Ulcerebus Renum & Vesicæ laborantibus* ; quorum urinæ tanto pure refertæ erant , ut meiendi impedimento fuerit ; ex usu hujus remedii statim urinam libere reddebant pure propemodum immunem , & progressu temporis adhibito paulo balsam. *Capaib.* ad ulcera detergenda , ex his deploratissimis affectibus omnino sani evaserunt . In dolore etiam

colico & nephritico mira præstat. Dosis in substantia a gr. xij. ad xvij. in decoct. ad ℥ij. Hist. de l' Acad. Vol. xiv. p. 75. De virtutibus etiam hujus radice vid. *Transact. Philos. N. 365.*

(*Æthiops mineral.*) Ex propria experientia D. Cheyne in tractatu suo de Arthritide p. 50. testatur *Æthiopem* mineralem larga dosi bis in die sumptum, diuque continuatum remedium esse certum ad ulcus Vesicæ curandum.

(*Prognosis.*) Art. 725. Ulcus Vesicæ, quod a calculo fit, non curatur, nisi prius extrahatur calculus. Ulcera Vesicæ sunt fere semper incurabilia; Ulcera Renum non sunt adeo periculosa.

(*Remedia varia.*) Art. 726. Remedia sequentia quandoque suo loco utilia; aqua calcis, decoctum balsamicum, decoctum incrassans, enema cerebinth. mistura balsamica nephritica, tinctura antiphthetica, tinctura cantharidum.

CALCULUS RENUM & VESICÆ.

(*Calculi definitio.*) Art. 727., Calculus definiri potest corpus durum, ex materia lenta aut terrestri, vi insita lapidescente, concretionem generatum, loco, quo detinetur, dolorem, obstructionem, aliaque symptomata ut plurimum pariens.

Greenfieldi sententia.

(*Calculi renum signa diagnostica.*) Art. 728. Signa præcipua diagnostica Calculi Renum sunt quæ sequuntur: 1. in regione lumborum dolor fixus, continuus, gravativus, instar ponderis in renis substantia cum sensu obtuso; lapillo vero e pelvi in ureterem exeunte incipit dolor dilacerans, & omnium acerbissimus. 2. inflexibilitas spinæ dorsalis extensione & compressione nervorum. 3. lumborum ardor. 4. stupor cruris ejusdem lateris ex pathemate nervorum. 5. retractio testiculi ex eadem causa. 6. urina vel cruenta vel tenuis & limpida & paucæ quantitate; at vero post calculi in vesicam delapsum urina statim redditur admodum crassa, turbida, subnigra, & copiosa.

Art. 729. „ Ut accurate distinguatur hic morbus a colica vid. Art. 644.)

(*Differentia a colica: Calculi vesicæ signa diagnostica.*) Art. 730. Signa diagnostica. Calculi in Vesica sunt sensus gravitatis in perinæo & regione inguinali, perpetuum mejendi desiderium insequente dolore atroci præcipue in penis summitate cum egerendi conatu molestissimo & frequentissimo, unde prolapsus ani; „ Pruritus „ molestissimus ad caput penis, ejusdem frequens ac involuntaria erectio; urina post motum vehementiorem cruenta, nullum levamen „ ex remediis ad stranguriam adhibitis, &c. sunt etiam signa Calculi „ in Vesica; sed signum omnium maxime indubitatum est, quod certissime tactu deprehenditur a digito in anum indito; vel cathetere, de quibus consulatur auctor.

(*Excrescentiæ carnosæ.*) Art. 731. Interdum in Vesica inveniuntur excrescentiæ scirrhosæ vel fungosæ calculi symptomata ad amissum mentientes, exempla duo aut tria adducuntur.

(*Calculus mentientes.*) „ Ejusmodi scirrhum bis in cadaveribus vidimus; inquit Baglivius. Ex testimonio Lithotomorum constat Calculum in Vesica semper esse liberum, parietibus ejusdem nunquam adhærentem, neque membrana unquam involutum, prout a quibusdam falso perhibetur. Vide Lithot. Douglas. p. 6. Utcunque tamen „ verissimum est Calculum quandoque inter descendendum a renibus in-

ter tunicas ipsius Vesicæ in transitu hære, ibique hospitari, & in molem grandiore accrescere, capsaque inter ipsas tunicas formata, tandem aliquando ulcus deploratissimum ibidem creare. „ *Vid. Hist. de l'Acad. des Sci. Vol. vi. p. 29. & Memoir. p. 34.*

(*Calculus grandis in rene.*) Art. 732. Calculus grandior in Rene una cum ejusdem ulcere est casus desperatus; aliquando vero natura, dictu mirabile, ultra spem omnem abscessum efficiens per ipsos spinales musculos viam patefecit ad Calculum ejiciendum, & tandem Ulcus solidatum fuit. „ Atque hinc quasi charta provocatoria, natura monstrante viam, ad aliquid tentandum ars nostra lacescit. Audax omnia perpeti gens humana. Operationem *Lithotomiæ Vesicæ* lis omni ævo chirurgi exercitarunt; sed de *Lithotomia Renali*, quod scio, nusquam omnino audivimus ante celebrem *Dominicum Marchetti Patavensem*, qui e rene *Consulis Hobson* calculum sectione eduxit, ægrumque ad integram sanitatem restituit. *Transact. Philos. N. 223.* Unam adhuc aliam *nephrotomiæ* instantiam pari successu ex historia Gallicana assert *D. Freind. Hist. med. Vol. 2. p. 185.* Sed, ut cum sagaci *D. Ruty* loquamur (in eleganti suo tractatu de *ductibus urinariis*) ex consideratione partium secundarum est saltem pura puta *possibilitas*, ut hæc operatio feliciter succedat, *pro-babilitas* vero vix aut ne vix quidem.

(*Nullum lithontripticum.*) Art. 733. „ Quod ad *lithiasin* attinet, *Galenus* scribit nullum remedium suo tempore fuisse inventum præstidii Calculum Vesicæ frangentis, sed sola chirurgia seu incisione curari posse. Idem alii recentiores, & præstantissimi medici libere fatentur. De *lithotomiæ* operatione, item de extractione Calculorum in sexu sequiori videatur auctor, qui egregie scripsit; item consulantur *Celsus, Hildanus, Douglass, Cheselden, &c.*

(*Plura tamen vulgo credita.*) Art. 734. Sunt tamen remedia nonnulla plurimum decantata, *lithontriptica* appellata (quamvis in rerum natura talia non dari admodum probabile sit) inter quæ nuper aliquando celebriora fuerunt *elixir Dasseanum*, nunc satis vulgatum, *pulvis Rogeri*, nihil aliud, quam *teste mytulorum calcinatae*, *liquor Tippingi*, (apud authorem, p. 234. descriptus;) cum his & aliis quam plurimis ejusdem commatis; si mundus vult decipi, decipiatur: interim nulla est de specificis *lithontripticis* hætenus vera fides.

(*Curatio.*) Art. 735. Homo sexaginta annos natus solo usu *ol. amygdal. dulc.* cum gr. aliquot *bals. Peruv.* intra dies decem 65. calculos excrevit; mihi in frequenti usu est *enema emolliens* seq. ʒ℥. *Rad. alth. ʒj. herb. malv. parietar. mercurial. ana Mj. sem. lin. ʒ℥. coq. in q. s. aq. font. ad ʒviii. colatur. add. tereb. vitel. ov. solut. ʒ℥. ol. lin. ʒij. elect. linitiv. ʒj. m. f. enema & fots sequens.*

ʒ℥. *Rad. alth. ʒiv. malv. parietar. chærefol. flor. cham. melilot. ana Miv. sem. lin. ʒj. malv. petroselin. ana ʒiiij. coq. in q. s. aq. font. ad ʒbiij. pro fots.* Quando diuretica indicantur, pulvis sequens diureticus cum apozemate subsequente vel cum sero lactis vel vin. alb. vel *Rhenan.* exhibitus multum valet.

ʒ℥. *Sal. prunel. ʒ℥ cochinel. ocul. canceror. test. ovor. calcinat. sal. sambucin. vel sal. stipit. fabar. ana ʒj. croc. opt. gr. xv. ol. junip. gr. vj. m. f. pulv. pro chart. iiij.*

ʒ℥. *Rad. anonid. fœnic. petroselin. liquirit. ana ʒ℥. sem. alth. malv. cicer. rub. ana ʒi℥. sem. q. frigid. maj. ʒj. ficuum ping. N. v. sebesten. N. iiij. bord. mund. ʒj. gr. alkekeng. N. vij. coq. in aq. pluvial. q. s. ʒbiij.*

Ex observatione liquet *diuretica* multo melius operari cum illis, qui seipsos aeri frigido exponunt, & leviter se exercent.

(*Lithontriptica alia decantata.*) Inter *lithontriprica* dicta *virga aurea* multum laudatur a *Matthiolo*, *Dodonæo*, &c. item *tinctura pil. Matth. pulv. milleped. lignum nephriticum*, *sanguis hirci*, *sp. nitri*; &c. Hæc sunt remedia in suo genere valde proficua, sed si quis existimet illa revera esse *calculus frangentia*, sciat illa esse mere nugamenta, & res nullius pretii. „ Desperandum non est (*inquit Boerhaave*) de inveniendò aliquo „ *menstruo* contra *calculus vesicæ*, quod tamen tam blandum & molle „ sit, ut non lædat *vesicam*, & solvat tamen *calculus* in *vesica*. Habui „ *menstruum*, quod solvebat omnia saxa durissima in manu, manu inter „ rim illæsa; conficitur autem hoc ex *pane Secalino*. Sic illud *men-* „ *struum* quod distillatur ex ovo nullum in oculo dolorem jacit, & „ tamen dissolvit *myrrham*, quæ per magnum & validum ignem dis- „ solvi nequit; ideo procul dubio tale quid per industriam humanam „ inveniri potest contra *calculus*.

Lysteri sententia.

(*Calculi in omnibus fere corporis partibus.*) Art. 736. *Calculi* inveniuntur sub lingua (1245.) in palpebris, (1001.) in ductibus pituitariis, in cerebro, in hepate, in pulmone, in *Vesiculis seminalibus*, in utero, in ventriculo, in intestinis, in articulis, tum manuum tum pedum, at multo frequentius in *Renibus & Vesica*.

(*Cause.*) *Calculus* est quid vere lapideum a sale lapideque *Calcario*, & interdum a ferro, metallo humoribusque quibuslibet corporis concretum. *Calculi* materiam ab esculentis & potulentis, quæ hujusmodi salibus lapideisque particulis abundant, provenire constat: si corpus bene se habeat, foras ejiciuntur, neque in *Renibus* aut *Vesica* retinentur; si *Renes* imbecilli fuerint & *Vesica* labefactetur, in lapidem coire apta sunt. Profecto robur inæquale partium est *Calculorum* præcipua ratio: ita *Renum* alter *Calculos* parit altero sano. Nisi vi-
tiantur tonus & vigor *Renis* expulsivus, *Calculi* vix nascuntur, nec supra modum arenularum concrescit materia lapidea.

(*Curatio difficilis.*) Art. 737. *Calculus hæreditarius* est incurabilis: facilius est enim uterum a pariendo prohibere, quam *Calculosos Renes* *Calculis* vacare. *Trochisci alkekengi* somnum conciliant & *Calculus* pellunt. Dos. ʒj. „ *Fœminæ* rarius quam *masculi* *Vesicæ* *Cal-* „ *culo* laborant propter *viæ patentiam ac brevitatem*. *Calculi vesicæ* „ dolores licet intolerabiles, in longum tamen trahunt, per multos „ scilicet annos: fractis demum viribus & *Vesica* magnitudine & as- „ peritate lapidis attrita, mors sequitur, ni *urinæ* facta suppressione „ maturius tollantur ægrotantes.

Ettmulleri sententia.

Art. 738. *Calculus* in se non est morbus, sed productum morbosum; morbus proprie dicitur *lithiasis*, quæ est dispositio *Renum* vel *Vesicæ* ad *Calculus* generandum.

(*Calculorum diversitas.*) Triplex ut plurimum est diversitas *Calculorum*, alborum, rubrorum, vel flavorum, qui ultimi sunt frequentiores. *Calculi* insigniores interdum in *Renibus* latent quieti sine ullo præternaturali symptomate; cum vero in motu sint, varia & gravia symptomata producant, & paroxysmum *nephriticum* faciunt.

(*Merbi historia.*) Art. 739. In principio ejus motus oritur dolor auctus, modo intensior, modo remissior in regione lumbari, minus tamen pungens, dolor est gravativus & obtusus; ubi vero *Calculus* movetur ex pelvi

in ureteres, tunc dolor lancinans, pungens, & tensivus excitatur, nec ante cessat, quam Calculus ad *Vesicam* descenderit, aut in *Renem* remeaverit. Paroxysmo ingruente urinæ sunt paucae, aquosae, acres tamen & stimulant. In paroxysmo aëri non possunt se erigere, nec corpus incurvare; stupor adest cruris frequenter in primo paroxysmo, sed non ita in assuetis & hoc morbo fractis; testiculus etiam aliquando aliter sursum dolorose spasmō retrahitur, interdum adest tenesmus, & præterea nausea & vomitus, & non raro difficilis respiratio, quasi cinctulo constringuntur costæ inferiores, item tormina colica acerbissima spasmodica ex consensu nervorum. Omnia hæc symptomata in omnibus promiscue haud reperiuntur.

(*Curatio.*) Art. 740. Quoad curam *diuretica* imprimis fortiora in principio fugiantur, dum urgent dolores & spasmi, quoniam mala exasperant, *mitiora* sunt exhibenda cum *opiat*, ut & *alvum laxantia*, & *emulsion*es, *clysteres emollientes*; aut cum *terebinthina*, minori quantitate injiciendi, & diu retinendi; *balnea* usurpari possunt & *unctiones emollientes* ex *ol. cham. scorpion. junip. petrol. camphor. sem. hyoscyam. opio*, unguent: *dialth. nervin. &c.* Decoctum florum *cham.* singulariter excellit in paroxysmo *nephritico*, item *sal. volat. succin. persicaria* & *semen dauci lithontriptica* audiunt, item *millepedes*, & *finis columbinus* bene præparatus; & quod præstat *sal ejus volatile*.

(*Calculi vesicæ historia & signa.*) Art. 741. Inest plerumque *nucleus lapideus* in Calculo Vesicæ; qui in initio ex Renibus descendit, & exinde augmentum lamellatim acquires. Sentiunt imprimis aëri obstaculum, quod se opponit meatui urinario inter meendum ita ut interdum *urina* in medio sui cursus supprimatur, unde assiduum meendi desiderium, summa difficultas, & urinæ stillicidium, anus quoque in consensum trahitur, & tenesmo affligitur, quod est unum ex potissimis signis; obtusus est dolor in Vesicæ collo, &, si grandior sit Calculus, pondus in perinæo, dolor & pruritus in glande penis, & frequens erectio. Calculus aliquando *Vesicæ adnascitur*, & tanquam in capsula continetur, quo in casu difficillimus est cognitu. In malo diuturno materia mucilaginosa, necnon lutosa ac argillosa cum urina excernitur, quæ tanquam productum morbi agnoscenda est ex nutrimento læsæ Vesicæ.

(*Curationis difficultas.*) Art. 742. Cura eadem fere est, ac calculi renum; prodest *aq. vel decoctum persicarie, betule, dauci, &c. urina hirci & tauri, millepedes in vino Rhenan.* longo usu mirabilia præstant: pro usu externo *petroleum, ol. scorpion. &c.* ut & *enema* sequens, 2℥. *Ol. lin. amygd. dulc. ana ℥iv. scorpion, ℥j tereb. ℥ss. m. f. enema.* (Si calculus sit prægrandior curam non recipit nisi ex sectione.)

Baglivii sententia.

(*Signum pathognomonicum.*) Art. 743. in Calculo vesicæ adest dolor in glande penis, pruritus, & irritatio continua, quod inter pathognomonica ac certissima calculi vesicæ signa est.

(*Calculi in rene interdum diu sunt sine dolore.*) Sectione defunctorum plane constat calculos interdum per longum tempus filere sine insigni dolore; immo quandoque per annos aliquot non est dubitandum. Heurnius refert se reperiisse in una rene defuncti calculos 80. & in altero 70. nihilominus homo dum vixit dolores *nephriticos* neutrquam sentiebat. Antonius Pozzis de calculis occultis in renibus, ait se invenisse in hominis alterutro rene calculum non minus quam sex uncias pendentem sine ullo tamen calculoso affectu.

„ Et in quotidiana praxi observamus calculos ingenti mole excerni
 „ diutius in renibus prius commoratos, quam ad istud incrementum
 „ affurgere potuissent; excretos tamen *nullo præeunte dolore, excepto*
 „ *in exclusionis paroxysmo*, vidimus.

(*Cura rationalis.*) Art. 744. Existente calculo in renibus, motu, quem facit descendendo per ureteres, irritatis, crispatisque vicinarum partium fibris, sæcum & urinæ secretiones sistuntur: tota igitur curatio dirigenda est ac impendenda in tollenda morbosa irritatione & crispatura renum per *balnea, oleosa, anodyna, & laxantia remedia*; nam ea ablata impeditæ tolluntur liquidorum secretiones. Quin imo sæpe observavimus, quod si calculus post x. vel xv. dies non descenderit ad vesicam, imprudenti *diureticorum* usu & nimia remediorum præscriptione, ut vulgo faciunt medici, aucta in dolente renum loco majori oscillatione magis magisque figitur ibidem calculus, & multo difficilius educitur, quo in casu, crede mihi, lector, unicū remedium est *abstinere a remediis*, nam sola quiete calculus tandem profiliet.

Decker'sii sententia.

(*Nitrum neque spiritus illius calculum frangit.*) Art. 745. Nitrum pulverizatum & calculo affusum ignique moderato impositum ipsum consumit, primo quidem in viscidam mutat materiam, dein aquosam; ast, proh dolor! ab externis ad interna non valet consequentia; saltem expectationi non satisfacit *verus nitri spiritus*.

(*Alia remedia.*) In omnimoda urinæ suppressione *testæ ovorum calcinatae* ad ℥ij. vel ℥j. assumptæ omnia reliqua medicamenta præcedunt. *Cochinel.* in *vino Rhenano* ad ℥j. assumpt. est mite & suave medicamentum, sed magnæ efficaciz. Omnibus commendamus *spir. sal. ammoniaci* tanquam specificum *cum vino Rhenan. spirituque diuretico* ad præservationem, ut & curationem ipsam.

(*Nota bene.*) „ Curationis scopus primarius est *dolorem lenire*, al-
 „ *ter vias reddere patulas* tum urinæ tum sæcum. Optabilius est, ut
 „ *natura expellat calculum*, quam *medicus*.

Farrago sententiarum.

(*Arenulæ sine calculo.*) Art. 746. Arenas multi mingunt, & tamen non sunt calculosi; quoniam illæ non coguntur in lapidem, nisi viscido aliquo & crudo humore superveniente, ad quod itidem tempore opus est. *Hollerius*. Symptoma illud scorbuticum mendaci specie calculum præ se ferens (de quo *Draviscius*) non solum scorbuticis, sed hypochondriacis familiare est. Tartarus sub specie sabuli rutilantis ut plurimum in urinæ subsidentia se prodit, quandoque in atomis adeo subtiliter divisus, ut visum fere effugiat, lateribus vero matulæ firmiter adhærere solet; tormina *nephriticis* æmula concitat, & his comitem se adjungit stranguria fere continua. Param levaminis a calidioribus diureticis expectandum est, malum enim exasperant. *Spiritus salis communis* strenuum hic se præstat averruncum, ut & *spiritus lumbricorum terrestrium*, *essentia item nephritica e ligno nephritico cum spiritu salis extracta*. Vide Art. 906.

(*Observatio D. Cypriani.*) Art. 747. D. *Cyprianus* lithotomus celeberrimus inter 1400. quibus operationem celebravit, oinopotas quamplures, sed ne unum quidem *zythopotam* calculosum invenit. *Cervisiam blandam ac mitem*, & quo recentiore eo meliorem, omnibus calculosis in potum ordinarium commendavit. *Catherwood*.

(*Virtus ol. lini, &c.*) Art. 748. *Oleum seminum lini* intus sumptum

per aliquot septimanas calculus fere indolenter ejicit. *Hamilton.* (Mulum etiam laudatur infusum *seminum lini* more *Theæ* diutius epotum.) *Oleum sem. sinap.* per expressionem (inquit *Boerhaave*) ut maximum remedium commendatur in *nephritide*, & calculo *vesicæ* & *renum*.

(*Aqua persicaria.*) Art. 749. *Aq. persicaria* valde commendatur a *D. Boyle*. *Julap.* sequente quandoque in praxi usus sum; 2℥. *Aq. persicar. vin.* *Rbenan. ana* 3vj. *sp. carmin.* s℥v. 3ij. test. over. preparat. 3ij. *Syr. de alth.* 3i℥. m. f. fots five baneum tepidum, emolliens & laxans ad calculum ureteribus hærentem movendum & expediendum maximum adjumentum præstat; usum ejus pro calculo ipse *Hippocrates* comprobavit, lib. de affect. intern. sect. 15.

(*Semicupium.*) Experientia enim evincitur a blando ac leni medicamento in *semicupio* sedenti exhibito plus auxilii provenire quam ex mille lithontripticis vana ostentatione propinatis.

(*Aquæ Bristolenses.*) Vires supereminentes *Aquarum Bristolensium* circa medium superioris sæculi innotuisse ex memorabilibus *D. Maplet M. D.* litteris *Decano Wellensi* anno 1665. datis satis liquet., Ad *Rupem Vincen-*
,, *tianam* tibi confugiendum esse arbitror, e qua profiliunt aquæ reni-
,, bus & *vesicæ* calculosis sive exulceratis succurrere, nec non sangui-
,, nis massam contemperare, & ab illa segregandam urinam lenire &
,, edulcorare aptæ natæ., *Aq. flor. Spin. alb.* in frequenti usu fuit
apud *D. Radcliff*, unde forsan aqua *nephritica Pharm. Londinens.* Vires hujusce remedii a multitudine insectorum verno tempore istos flores incolentium oriri videntur.

(*Prophylaxis.*) Art. 750. Ad prophylaxim hujus affectus magna habenda est ratio ventriculi; quoniam ex illius cruditatibus materia generalis calculis suppeditatur: ideoque post debitas evacuationes remedii appropriatis roborandus est ventriculus; & frequenter potandæ sunt aquæ minerales acidulæ ac sulphuræ; potus ordinarius sit vinum tenue cum decocto rad. *eringii marini*, quod commendatur a *Cratone*.

(*Remedia varia.*) Art. 751. Præter jam dicta, sunt & alia nonnulla remedia, quæ pro symptomatum horum affectuum diversitate saltem opem aliqualem agris asserre possunt. *Aqua omnium florum*, *cerevisia de dauco*, *decoctum nephriticum*, *emulsio cum infus. vel decoct. fol. theæ* facta, *enema e quatuor oleis*, *enema terebinth.* *mistura balsamita nephritica*, *nitrum saturnisatum*, *pil. Matth. pil. testac. sp. juniperi*, *sp. nitri dulcis*, *semicupium Hildani*, &c.

ISCHURIA RENALIS ET VESICALIS.

Ettmulleri sententia.

(*Ischuria quid.*) Art. 752. *Ischuria* & urinæ suppressio totalis differunt saltem gradu; quandoque in ipso sanguine hæret causa, sed frequentius accidit ob *renum* vel *vesicæ* vitium: ob prius, quando nulla urina sit in *vesica*, nullus tumor circa regionem pubis, nulla gravitas perinæi, ubi immisso cathetere urina nulla extrahi possit.

(*Causæ & symptomata.*) Causæ sunt vel calculi vel *renum ætioria*, symptomata sunt angustia præcordiorum, & anxietates, aliquando sudor foetidus & urinosus, torpor sensuum, vomitus, &c. Fere ad 10. vel 11. diem supprimi potest ante mortem, aliquando die 14. moriuntur, raro ad 20. vivunt; si tamen adsit sudor copiosus, interdum diutius supervivunt; quæ ab ætioria, vel resolutione *renum* fit, fere semper lethalis evadit.

(*Curatio.*) Art. 753. In hoc affectu laudantur succus rad. *raphan.* & suc-

& succus limonum (sp. cochlear. vel succ. ejusdem) item succus parietarie in antiquis parietibus nascentis, præ omnibus sal. succini; si malum sit spasmodicum cinnab. antimon. millepedes, cantharides in substantia & tinctura, infusum fimi equini in vin. Rhenan. egregium remedium, ut etiam stercoreis columbini. Pro usu externo linimentum sequens, ʒss. Uaguent. dialth. ol. scorpion. ana ʒʒ. petrol. ʒij. tereb. (junip. ana) gr. xxx. m. f. liniment. pro regione lumborum.

(*Ischuria vesicalis.*) Art. 754. *Ischuria vesicalis* a vitio vesicæ provenit, & a variis causis pendet, ut plurimum die 11. necat; pessimum est signum, quando nullum sentiant dolorem.

(*Curatio.*) Art. 755. Si adsint causæ impediētes transitum urinæ, hæ sunt imprimis removendæ; si casus sit paralyticus, usurpanda sunt nervina interne, & externe, laudatur oleum succini, clysteres terebinth. cataplasma ex parietaria cepis sub cineribus coct. & ol. scorpion. convenit etiam semicupium ex emollientibus & nervinis exhibendo paulo ante incessum blanda diuretica. Immersio subitanea pedum ægri in aqua frigida urinam provocat.

Fulleri sententia.

(*Ischuria ex sanguinis discrasia.*) Art. 756. Suppressio urinæ totalis, quæ fit, non a renibus, ductibusve urinariis lapide, sabulo mucove obstructis; sed a sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeo obse-rato, ut laticem aquosum intimius permixtum e sinu suo ægre demittat: cujusmodi casus retulerunt Riperius, Willisius, Sylvius, atque inter medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observavi; exindeque eum agnovi, quod nullus dolor vel lumborum vel pubis præcesserat; & vesica (teste cathetere) urinæ omnino vacua fuisset.

(*Ejusdem curatio*) Hæcce inquam notabilis & (nisi tempestive & rite tractetur) lethalis urinæ suppressio curatur (D. Baynard. monstrante viam) per spiritum vitrioli nitrive in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo certius, ut opinor, si venesectio præmittatur. Hujusce instantias apud Philos. Transact. N. 315. lectu & observatu dignissimas videre licet. „ Sæpius in praxi experimur (inquit Waldschmidius), quod senes urinæ suppressione corripiantur, „ quandoque cum alio graviore morbo, quandoque sine eo, & talis „ urinæ suppressio plerumque solet esse lethalis; oritur enim a defi- „ ciente secretionem tum spirituum in cerebro, tum fermentorum in „ visceribus, ut & feri in renibus, ut recte totalem viscerum obstru- „ ctionem & lymphæ coagulationem hic accusamus; si enim esset a „ calculo, tum dolor lumborum adesset, & reliqua calculi sympto- „ mata. „

Farrago sententiarum.

(*Diem xvij. non supervivunt.*) Art. 757. Nullus hoc morbo laborans supervixit diem xvij. uti hoc in mea praxi observavi. Greenfield.

(*Remedium singulare.*) Art. 758. In ancipiti casu & moribundo ex ischuria plurium dierum, aliis medicis dimissis, hominem sic restitui, ʒss. Succ. limon. recens express. ʒvi. succ. cochlear. hortens. ʒiv. hepatic. plantag. ana ʒij. syr. violar. ʒij. m. hujus ʒiv. tertiis quibusque horis siccavit, & postridie urinam copiose reddidit. Lister.

(*Pulvis apum.*) Art. 759. Apes siccatae in pulverem redactæ propinentur vino albo, urinam paulo post provocant, N. iij. sufficiunt ut plurimum. In seipso Ischuria laborante sæpius expertus est Hibernie primarius Armaghanus. Mayerne.

(*Remedia alia.*) Art. 760. Bals. copav. ad ʒj. vel ultra, decoct. in-
K 3 crassans,

150 *Dysuria, Urinæ Incontinentia.* CAP. VIII.

Stassans, baust. diuretic. acid. & pil. diuret. Fulleri usui esse possunt, item expressio diuretic. seq. Willisi. 2℥. Milleped. viv. tint. sal. tart. ana ℥ii. contunde & fortiter exprime Dos. gr. xl. vel l.

S T R A N G U R I A.

Ettmulleri sententia.

(*Stranguria quid.*) Art. 761. Stranguria, Latinis urinæ fillicidium, est quando urina guttatim excernitur cum acerbo dolore & continua stimulatione ex acore urinæ; ulcus vesicæ interdum pedetentim sequitur.

(*Curatio.*) Art. 762. Exhibendum est emeticum cujus vires magnæ sunt in affectibus urinariis, item laxantia cum mercurio dulci, rad. liquiritiæ cum fol. malv. in jure pulli, decoctum cort. aurant. opiat. Pro euporisto decoctum raparum remedium sine pari, decoctum sem. cannab. ol. amygd. dulc. syr. de alth. succus cancrorum fluviat. decoctum bacc. alkekengi cum passulis. Conveniunt clysteres emollientes, injectiones in vesicam ex lacte cum ol. amygd. dulc. &c. Thermae etiam profunt.

D Y S U R I A.

Ettmulleri sententia.

(*Dysuria quid.*) Art. 763. Dysuria est excretio urinæ cum conatu & dolore, & ardoris sensu; ut plurimum fit, ab abrasione mucinæ naturalis ductuum urinariorum, quos isto munimine orbatos urinæ acrimonia irritat, & vehementer lædit; quandoque causatur ab excoriatione vel exulceratione vesicæ colli vel urethræ; excernitur materia crassa vel mucilaginosa, nutrimentum partium læsarum; malum est perquam molestum, non tamen per se lethale, interdum diuturnum, unde periculum est, ne exulceretur tandem vesica, aut urinæ incontinentia superveniat.

(*Remedia nonnulla.*) Art. 764. Remedia ad stranguriam hic conveniunt, ut ol. amygd. dulc. decoct. malvæ, terebinthinata & balsamica; antimon. diaphor. cum tereb. in forma pil. clysteres emollientes, injectiones, de quibus vide locum, p. 738. „ Sequens mucilago valde „ commendatur, 2℥. Gum. Arabic. ℥ij. tragacanth. ℥ij. aq. cinnam. „ ten. ℥x. syr. de alth. ℥ij. f. Mucilago cochleatim sumenda. „

U R I N Æ I N C O N T I N E N T I A.

Ettmulleri sententia.

(*Incontinentiæ urinæ causæ.*) Art. 765. Involuntarii urinæ profluvii causa est deficiens sphincteris vesicæ contractio a paralyfi, contusione, diuturniori mora in aqua frigida, partu difficili quandoque in ultimis gestationis mensibus.

(*Lectimigi plerumque sunt vel infantes vel senes sub cura medica haud cadentes.*) Affectus est difficilis curatu, qui vigilantibus contingit; in senibus immedicabilis, nisi interdum iis thermæ succurrant, in morbis acutis male ominatur.

(*Curatio difficilis.*) Art. 766. Pro scopo curativo in genere conveniunt astringentia, nervina & antiparalytica; speciatim decoctum e lignis sudoriferis, calamintha & mentha, pulv. mastich. thus, gum. Arab. castor. &c. laudantur; specificum audit guttur galli tostum ad ℥j. in vino rub. propinatum, item pulv. tunic. stomach. gallin. pudendum seu vulva suis quocunque modo præparat. in vigilantium ac dormientium affectibus singulare experimentum, mures exsiccati vel in butyro elixati.

M I C T U S C R U E N T U S.

Ettmulleri sententia.

(*Mictus cruenti causæ variæ.*) Art. 767. Sanguis, qui tingit urinam,

nam, frequenter a renibus effluit, interdum ex ureteribus, interdum ex vesica, aut ex arteriis penis; est hæmorrhagiæ species, præcedere solet dolor gravativus & tensivus in loco affecto; aliquando est *crinitus*; a diureticis interdum causatur, item a nimia Venere, a contusione, vel casu ab alto, equitatione, saltatione, &c. urina sanguinolenta semper est opaca, turbida, & crassiuscula plus minus, prout plus minus sanguinis est permixtum; ex opaco nigrescit, ita ut lintum immersum suo rubore sanguineo inficiat; si aliquandiu steterit, crassamentum deponere solet nigrescens sanguinem grumofum exacte referens.

(*Indicationes curativæ.*) Art. 768. In genere tollenda est sanguinis acrimonia: remedia ad hæmoptysin dicata conducunt; *venesectio* interdum locum habet; *cathartica* non conveniunt excepto *rhubarbaro*; semen *hyoscyami*, sicut in aliis hæmorrhagiis vim singularem obtinet.

Mayerni sententia.

(*Intentiones.*) Art. 769. In mictu cruento intentiones sunt, ut humorum acrimonia, si adsit, obtundatur, aut impetus minuatur; inflammatio si adsit, tollatur, & vasa consolidentur & constringantur.

(*Curatio singularis.*) Art. 770. Vidi quendam, annorum circiter 40. qui a retentricis renum imbecillitate & vasorum laxitate tantum cruoris fundebat cum urina, ut corpus macilentum, exangue & pene tabidum evaserit, pulsum habens languidum ac febrilem. Eo usque res devenerat, ut refrigerata urina, inconcoctus sanguis in ea concreveret albicans, & gelatinæ potius quam sanguinis affinis. Vano labore assumptis & adhibitis omnibus remediis, tandem intra tres quatuorve dies convaleuit, hausto quotidie mane lacte vaccin. recens multo supra ramum menthæ rubræ, eoque calente ex animali dulcorato satis *syrupo cydon.* & *cinnamon.* plures annos supervixit.

Farrago sententiarum.

(*Quandoque accidit nullo existente calculo.*) Art. 771. Interdum aucto corporis motu cruentum lotium absque labe renis, vel calculi præsentis suspitione potest accidere. *Boerhaave.*

(*Lac ovillum.*) Art. 772. *Lac ovillum* maxime laudatur a *Feresto*; sæpe inquit, sanguinis mictum solo lacte ovillo, nempe sumendo *lactis* ℥iv. & *bol. Armen.* ver. ℥j. curavi. Idem etiam laudant *Hollerius* & *Duretus* ex *Hippocr.* & *Avicenna.*

(*Sanis quandoque accidit.*) Art. 773. Constat mictionem cruentam statim periodis recurrentem ob hæmorrhoides suppressas quibusdam sine sanitatis detrimento accidere: hinc verum est illud *Hippocr.* quando ait, quod sanguinem mingere raro quidem, & sine febre ac dolore nihil mali significet, sed lassitudinum solutio fiat.

(*Remedia varia.*) Art. 774. Remedia ad hunc affectum curandum a capite de hæmorrhagia petenda sunt. *Stercus porcinum* apud rusticos est remedium certissimum pro jumentis sanguinem mingentibus. *Radix symphyt.* in lacte calyceato coct. quibusdam profuit. *Electuarium Boyleanum*, decoct. catechu, decoct. inersans, haustus japonicus, nitrum saturnisatum, trochisci Gordonii, &c.

D E U R I N I S.

Inter legendum & ex observatione.

(*Urinarum compositio & diversitas.*) Art. 775. Urina præcipue ex aqua, sale, & terra conflatur; & quo plus salis respectu aquæ in se continet, eo rubicundior est; & quo minus, eo pallidior; & quo plus terræ, eo magis contentis saturatur, & contra; si itaque terra & sa-

le multo abundet, dicitur urina crassa, si parvo, tenuis; atque hinc quidem oriuntur maxime urinarum diversitates, ex quibus deducuntur judicia, scilicet, a *consistentia*, *colore*, & *contentis*; adeo ut quicquid de urina aliqua particulari pronunciari potest, huc tantum redeat; scilicet hanc urinam plurimum salis continere & terræ parum; secundam multo salis & terræ abundare, tertiam ex modico sale & terra & plurima aqua conflari, & sic de reliquis.

(*Colores varii.*) Art. 776. Colores urinarum sunt albus, fulvus, flavus, rubeus & niger.

(*Urina alba.*) *Albus* est vel *tenuis limpida & aquosa*, vel *crassior & subalbicans*, quæ juri carniū semicoctarum assimilatur; & hujusmodi lotium plerumque reddunt pueri, dum febricitant, & etiam ii, quorum viscera lumbricis scatent, & non solum hi, sed etiam pueri sæpissime, qui optima valetudine fruuntur, adulti quoque nonnunquam, ut taceamus fluore albo vel gonorrhœa laborantes, in apparatu variolarum, ut ipse sæpissime observavi, excernunt *albicantem* urinam. *Alba remissior*, ut *lactea* & *glauca*, incipientibus, & incrementibus febribus reddita, copiam materiæ putridæ, naturæque laborem demonstrat; quod si autem diutius fertur, longi frigidique indicium morbi præbet.

(*Tenuis & aquosa.*) Art. 777. *Urina tenuis & aquosa* in plurimis morbis occurrit; talis redditur in affectibus ventriculi, & indigestiones ac cruditates plerumque denotat; item in chlorosi, cachexia, hypochondriacis & hysteriis affectibus; hujusmodi urina tenuis & aquosa copiosa quantitate non raro est signum animi perturbationum, & sæpissime paroxysmorum hysteriæ vel affectuum quorundam spasmodicorum prodromus, unde conjicere licet hos affectus a salibus urinosis provenire, vel saltem iisdem foveri. *Tenuis* urina quoque conspicitur in diabete, hydrope, aliquando in apparatu variolarum, & frequentius in declinatione. In nephriticis paulo ante paroxysmum, denique a computatione aquarum mineralium aliorumque liquorum tenuium, spirituosorum, diureticorum &c. In febribus male ominatur; a turbida & crassa in tenuem & aquosam mutata est signum imminæntis phrenitidis, scilicet, per materiæ febrilis in cerebrum metathesin.

(*Citrina.*) Art. 778. *Fulvus* sive *citrinus color* in urina statum naturalem ut plurimum denotat. Et quoad quantitatem urina debet esse in proportionē aliquanto minori (forsā subtripla) liquidorum assumptorum; ab hac norma vero non raro deflectit, nunc superabundans, nunc deficiens.

(*Flava sive aurea.*) Art. 779. *Urinæ flavæ sive aureæ* duo sunt gradus, viz. *flammea*, quæ in febribus tertianis, ut etiam in variolosis, & non raro in benevalentibus cernitur: Et *crocea*, quæ ictericis, scorbuticis, hypochondriacis, ut etiam iis, qui rhabarb. crocum, folia fennæ, &c. comederunt, plerumque cernitur.

(*Rubicunda.*) Art. 780. *Urina rubicunda* est signum febricitantium, sed non proprium, nam in scorbuto diuturno urina tam intense rubescit, ut non magis in febre ardente; in arthritide quoque urinæ intensa rubedine saturantur.

(*Viridis ac nigricans.*) Art. 781. *Urina viridis ac nigricans* est signum plerumque morbi cujusdam virulenti aut venenati, aliquando in febribus quartanis conspicitur, ut etiam in puerperis, & iis, quæ menses habent obstructos (teste Galeno), in calculosis etiam post cal-

calculus foras eliminatum, in melancholicis purgatio non operans urinam facit nigram; cassia & alia quædam pharmaca intus sumpta lotium atrum reddunt.

(*Urinarum contenta.*) Art. 782. Contenta urinarum respectu locorum in matula tria nomina sortiuntur, viz. in summitate *nubeculam*, in media *enæorema* in ima parte *hypostasim* vocamus.

Art. 783. Nubecula in urina in morbis tam chronicis quam acutis est signum redeuntis in stomachum fermenti, & recuperatæ plus minus digestionis.

(*Bullæ & spuma.*) Art. 784. In summitate urinae interdum conspiciuntur *bullæ* & *spuma*: talem urinam vidi in mania laborante, in qua spuma & bullæ per integram nycthemeram manserunt, & eadem urina hypostasim valde nigricantem deponebat. *Cremor innatus* in urina phthysicorum plerumque cernitur, sed frequentius in hypochondriacorum. Urina in summitate *caudam* pavonis repræsentans ut plurimum est signum scorbuti. *Pinguedo* aliqualis & *guttulæ* quædam *oleosæ* frequenter apparent in urinis febre ardente, colliquativa, aut etiam hæctica, ulceribus renum, & similibus afflictorum.

(*Enæorema.*) Artic. 785. *Enæorema* in praxi quandoque occurrit, sed nihil peculiare, quod scio, indicat; nisi quod in febribus plenioris concoctionis appropinquantis indicium sit.

(*Sedimenta varia.*) Art. 786. *Hypostasies* sive *sedimenta* in Urinis sunt vel alba, vel nigra, vel rubra, aut saltem his vicina: *album sedimentum* in benevalentibus occurrit, *nigrum* in urinis nigris, de quibus antea. *Rubrum & crassum* sedimentum ad instar pulveris laterum in febribus intermittentibus, & remittentibus, & etiam in scorbuto, & colica frequentissime occurrit. Quibus febricitantibus, in Urinis subsidentia fiunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significant (inquit Hippocrates in Aphorif.)

(*Contenta præternaturalia.*) Art. 787. Sunt & alia in Urinis contenta, quæ præternaturalia & quasi accidentaliter dicta sunt, talia sunt arenæ, calculi, pus, sedimenta furfuracea, sanguis, &c. *Arenæ* in scorbuticis; *carunculae* & sedimenta *furfuracea* in Urinis calculo laborantium, necnon in vesica & renum ulceribus excernuntur *furfuracea*; sedimenta aliquando etiam in morbis cutaneis, ut pruritu, scabie, &c. occurrunt. Materia *purulenta* non tantum a renibus, verum aliquando a vesica & meatu Urinario ulcere affectis in lotio deponitur; quandoque a vasis & locis genitalibus sanies, semen corruptum, & fluor albus Urinis suffunduntur, & subsidentias purulentas efformant; postremo sedimenta purulenta in Urinis peripneumonia aut empyemate laborantium reperiuntur, quæ etiam morbum solvunt. Urina *cruenta* non tantum in calculosis occurrit, sed etiam in plerisque scorbuticis multo cum levamine, modo limites non excedat; nec defuerunt quædam foeminae, quæ sua catamenia per vias urinarias inter lotium per multos annos innocue emisserunt, hujusmodi historiam habemus apud Hollerum, &c.

(*Corollarium.*) Art. 788. Post omnia vero quotquot dicta fuerunt (ut proverbiali utar dicto), *urina est meretrix & mendax*; nihilo minus urinarum inspectio in praxi medica est usus eximii, modo cum reliquis symptomatibus diligenter pensatis jungatur, tum ad iudicandum ægrotudines earumque statum, tum etiam ad curandos morbos. Ideoque periti, & fidelis est medici operam dare, ut, quod artis est de Urinis, haud temere negligat, neque artis suæ limites transiliat.

C A P. VIII.

Sive Fasciculus Morborum octavus.

CORPULENTIA NIMIA.

Etmulleri sententia.

(*Corpulentia sive obesitas.*) **C**orpulentia nimia sive obesitas nimia, est, quando corpus totum tam venter quam artus in tantum augmentur, ut actiones, imprimis motus ac respiratio, aut omnino impediuntur, aut insigniter vitientur. *Sennertus* refert mulierem 450 lb. item virum 600 lb. pendentem. Prostant exempla apud *Schenckium* corpulentorum obesitate suffocatorum. „ Obesitas nimia corpus reddit variis morbis obnoxium, speciatim „ apoplexiæ, asthmæ, hæmorrhoidibus, calculo, ulceribus crurum, „ hydropi, &c. „

(*Difficile tollitur.*) Art. 790. Ad obesitatem tollendam non datur præstantius remedium quam *acetum scilliticum* jejuno stomacho haustum. Semen *fraxini* seu *linguæ avis* ad ʒj. mane in haust. vini propinatum insigniter commendatur ad evacuandam urinam, ratione cujus & hydropicos curat & crassos emaciat.

(*Valde obesi quandoque subito moriuntur.*) Art. 791. „ *Borellus* commendat masticationem *fol. tabaci*, sed in omnibus minus convenit, „ ne ad *tabem* disponat. Qui natura sunt valde crassi magis subito „ moriuntur, quam graciles; „ *Hippocratis Apboris*.

C A C H E X I A.

(*Cachexiæ causa.*) „ Art. 792 Cachexia ita dicitur a corporis malo habitu; nascitur plerumque ex intemperantia ægrotantis, vel alicujus „ morbi prægressi mala curatione; a tumore scirrhuso jecoris vel lienis, „ vel a fluxu hæmorrhoidum nimis longo & profuso, vel aliis hæ- „ morrhagiis; ex febribus continuis diuturnis, vel intermittentibus „ male curatis; ex crapula, vel nimia spirituosorum liquorum ingur- „ gitatione; ex chlorosi, catameniorum obstructione vel fluxu nimio; „ & ex innumeris aliis causis.

(*Signa diagnostica.*) Art. 793. Signa diagnostica sunt pallor subal- „ bidus, aliquando etiam plumbeus color, debilitas ac piger corporis „ motus cum inflatione aliquali, in quibusdam ventris fluor cum fe- „ bricula vesperi recurrente, pulsus creber ac densus, cibi fastidium, „ & vini magis appetentia, urina biliosa, interdum vero rubicundis- „ sima, frequenter autem cruda & pallida.

Etmulleri sententia.

(*Cachexiæ descriptio.*) Art. 794. Cachexia est affectus in quo nati- „ vus & floridus cutis color, ac imprimis faciei nitor perit, mutatur- „ que in pallidum, lividum, luteum, virescentem, intense rubicun- „ dum, &c. frequenter cum corporis habitu subtumido, lassitudine, &c. „ adest sæpe febris lenta, ægro vix sensibilis.

(*Curationis methodus.*) Art. 795. Principium curæ a vomitu facien- „ dum est: attamen ante vomitorium consultum erit, ut *digestiva sali-* „ *na* præmittantur cruditates solventia, ut *crem. tartar. tartarum vitrio-* „ *latum, sal digestivum hypochondriacum*, dos. ʒ ad ʒss. bis in die; „ *sal.*

sal. absynth. tinctura sal. tart. &c. item pulveres absorbentes dicti, antimen. diaphoret. antihætic. Poterii; & tunc propinandum est vomitorium, vel, si minus conveniat, catharticum; deinde his ita præmissis fit accessus ad *martialia*.

(*Remedium singulare.*) Art. 796. „ In tota republica medica vix datur præstantius remedium quam *mistura ecphrastica Fulleri*.

LEUCOPHLEGMATIA & ANASARCA.

Ettmulleri sententia.

(*Leucophlegmatia unde.*) Art. 797. „ Quoties in toto habitu, pinguedinis subcutaneæ lymphæ stagnat, vel effunditur, hydrops oritur ἀνὰ σάρκα, ὑπὸ σάρκα, λευκοφλεγματία, qui circa abdomen & circa scrotum. „ *Boerhaave.*

(*Ejusdem signa.*) Signa *Leucophlegmatia* sunt totius corporis tumor albus mollis, laxis, revera œdematosus in pedibus ac cruribus potissimum & manibus, bibendi desiderium, urinæ tenues, albæ, &c. „ Incipiente cachexia (inquit *Lommius*) vitatur cibi coctio, incolumi etiam appetentia; progressu vero temporis hæc quoque offenditur; spiratio debilis ac rara, alvus varia ac inæqualis est; atque hujusmodi *cachexia cruda* seu *pituitosa* nominatur, quæ hydropis speciem antecedit, venturamque prænunciat, quam λευκοφλεγματία, *Græci* nominaverunt.

(*Curatio.*) Art. 798. Præter purgantia, & *martialia*, &c. in cura *cachexiæ* superius laudata, hic conveniunt sudorifera & diuretica, speciatim decoctum ligni guaiac. &c. Lixivium ex ciner. absynth. genist. &c. post *martialia*, amara (& stomachica) utramque faciunt paginam. In *Anasarca* conveniunt folia virid. bardanæ plantis pedum & juncturis applicata: nam mirum est quantam fuliginem extrahant cum ægrorum levamine.

Willisi sententia.

(*Anasarca.*) Art. 799. *Anasarca* est totius corporis exterioris, aut quorundam ejus partium, tumor albus, mollis, tactui cedens, & foveam a compressionem relinquens.

(*Curatio.*) Art. 800. In curanda *anasarca lixivialia* cæteris diureticis longe præstant. ℥℥. Ciner. genist. ad albedinem calcinat. & cribrat. ℥iv. ponatur in lagena vitrea cum vin. alb. ℔ij. digerantur clausæ, & calide per hor. iij. vel iv. dein coletur vinum dos. cochl. vj. vel viij. bis in die. ℥℥. Ciner. genist. alb. & mundat. ℔ij. rasur. lign. sassafr. ℥iij. rad. galang. ℥j. bacc. junip. sem. dauc. ana ℥℔. f. saccul. pro cong. iv. cerevis. post 7. vel 8. dies hauriri incipiatur. Chalybeata in hoc morbo sæpenumero egregie profunt, & aliis præstant præparata, quæ sulphure non spoliuntur; ℥℥. Rasur. lign. sancti sassafr. ana ℥v. rad. irid. florent. calam. aromat. galang. minor. enul. campan. ana ℥℔. bacc. junip. laur. ana ℥ij. sem. anis. carui, fœnic. dulc. coriandr. anath. ana ℥iss. piper. long. cubeb. ana ℥iss. fol. sicc. jalv. scordon. calamenth. agrimon. ana mj. liquirit. ℥iij. incis. & contus. coq. in aq. fort. cong. iv. ad mediet. colatura servetur in lagenis vitreis ad usum: hujus potu constanti plures *Anasarca* fere deplorata laborantes convalescere novi, p. 254. „ Medicamentum sequens fuit præscriptum Rad. clifseanum; ℥℥. Cort. interior. sambuci mij. summit. absynth. Ro. man. m℔. rad. gentian. ℥℔. sem. sinap. dauc. sylv. ana ℥iij. infund. in vin. alb. Gallic. ℔ij. Bibat haustul. ter in die. „

HYDROPS.

H Y D R O P S.

Sydenhami sententia.

(*Hydropis historia.*) Art. 801. Foveæ a digitorum impressione insurarum parte inferiori, sub noctem imprimis conspicuæ & mane evanescentes, primum hujusce morbi indicium præbent, maxime si adsit dyspnœa. Paulatim crescit morbus, & abdomen quoque intumescit, & reliquæ corporis partes emaciantur. Tria hunc morbum stipant symptomata, *dyspnœa*, *urinæ paucitas*, & *stis intensa*. Causa hujus mali in genere est debilitas sanguinis.

(*Indicationes curativæ.*) Art. 802. Indicationes curativæ sunt tantum duæ, viz. *aquæ evacuatio* & *sanguinei roboris instauratio*. Magni interest, an æger facile vel difficulter purgetur. *Cathartica fortiora*, & quæ celeriter operantur mitioribus & segnioribus sunt præferenda & repetenda sunt, quoties ægri vires ferre queant. Duo sunt medicamenta palmaria, nempe *elaterium*, & *infusio croci metallorum*. Quinam sint meatus isti, per quos aquæ ex abdominis cavitate in intestina deducuntur, incertum est; experientia vero constat a dicto emetico sursum ac deorsum potenter evacuari, & quasi ruptis repagulis pleno alveo effundi. Est etiam aliud medicamentum, quod hunc morbum expugnat, vomitionem ac catharsin ciens pariter ac crocus metallorum; viz. *℞. Cort. interior. sambuc. miiij. coq. in aq. & lact. ana ℥j. ad dimid.* Colaturam capiat ægrotus dimidiam vesperi & reliquam mane, repetatque quotidie, donec convalescat.

(*Sanguis ac viscera corroboranda sunt.*) Art. 803. Fatendum est tamen quod in quibusdam casibus *emetica* & *cathartica* malum non tollant, sed potius augeant; rebus itaque sic se habentibus totus curationis cardo in sanguine ac visceribus omni ope *corroborandis firmandisque* omnino vertitur; ad hoc autem magnopere conducunt *aeris mutatio* atque *exercitium*.

(*Diuretica usurpanda.*) Ii quorum crases sunt debiliores, quam ut purgantibus ferendis pares sint, *diureticis* evacuandi sunt; illa optima sunt, quæ e salibus *lixivialibus* fiunt, nec quicquam refert e quorum vegetabilium genere cineres petantur: sequente infusione uti soleo; *℞. Ciner. genist. ℥j. fol. absynth. mj. vel ij. vin. Rhenan. ℔iv. infunde frigide; dos. ℥iv. mane hor. 4. pomerid. & sero*

(*Stomachica & amara.*) Art. 804. Aquis his modis eductis ad *corroborantia* deveniendum est; in hunc finem ægrotus bibat vinum & liquores generosiores, item capiat *invigorantia*, *stomachica* & *amara*; primum locum obtinet *calybs*, *allium* quoque multum confert. Semper recordandum est, quum sanguinis corroborationi navatur opera, quod tota res in eo solum cardine vertatur, & æger nullo modo expurgandus sit. Morbus ad supremum gradum proventus artis subsidia spernit.

Ettmulleri sententia.

(*Methodus medendi.*) Art. 805. Hydrops *primarius* per se incipiens plerumque vitio læsæ in primis viis digestionis ortum debet; *secundarius* ex variis causis oriri potest, ut hæmorrhagia, febre intermittente, &c. Hydrops superveniens morbis chronicis, & ætate gravescentibus rarius curatur. Sudor in *ascite* plus nocet quam prodest; evacuationes per alvum & urinam sunt magis proficuæ. In initio Hydrops tanquam *cachexia* curatur. Recte dicit *Liudanus*, qui vult curare Hydropem, raro debet purgare, dare tamen tunc debet ea quæ certo

certo ac vehementur purgant, sed raro; intermedio tempore appropriatis & apparentibus, ac massæ sanguineæ vitia ex cruditatibus orta, ac reliquorum humorum corrigentibus, & in naturalem crasin reducentibus, debet insistere. Instituantur purgationes decrescente Luna.

„ Qui cachexia laborant inveterata (inquit *Dolæus*) & qui sunt quasi eviscerati, iis non conducunt *cathartica* nec *diaphoretica*, aut alia ulla remediorum genera aquis exhauriendis accommodata, sed solis *corroborantibus* utendum. Hujusmodi itaque in casibus sero nimis accersito medico aliud nil quicquam restat faciendum, nisi ut prudenter præmissio permagni illius, in quo agroti versantur, discriminis prognostico, experimentum faciat, quantum auxilii sit sperandum ex usu *cardiacorum martialium*. Et si scorbuti labes simul adsit, cum *antiscorbuticis* commixtis res peragenda est.

(*Diuretica & purgantia.*) Art. 806. In Hydrope curando *diuretica* sunt omnium optima, sed semper præmitti debent universalia *attenuantia*, *aperientia* & *laxantia*, alias non tuto ad *diuretica* acceditur. *Purgantia* sunt cort. *sambuci*, *ebuli*, *rad. irid. resin. jalap. gum. gutt.* præ omnibus *elaterium* teste etiam *Lindano*, denique *colocynthis*; inter mineralia, *pil. lunares*, *mercurialia*, &c. cæterum his purgantibus semper interponenda sunt *stomachica*, inter quæ eminent *absinthium*, *marrubium*, &c. proximo loco *diuretica* in usum revocanda sunt, *radix allii* multum laudatur (in quibusdam vero intolerabilem capitis dolorem excitat) item *bacc. juniperi*; sed præ reliquis omnibus succus *herbæ Kali* ad ℥ss. bis in die in haustul. vin. tribus tantum diebus singulis septimanis usurpetur, alias urinam pellit; item eodem modo cineres *husonum* ad ℥j. vel ultra. „ Hoc remedio *Romæ* sanatus fuit *Hydropicus* diu decumbens, cui ejus uxor, sumptuum pertæsa, de eo dederat, veneno tollere cogitans, unde copiosum reddidit lotium; iterumque dato pulvere, ut mortem præcipitaret, sed multo uberius reddita urina præter spem sanatus est vir ejus, ut habetur in lib. *Wieri de Lamiis*. *Helleborus niger* (monente *Avicenna*) urinam potenter movet. Hujusce remedii (inquit *D. Freind. Hist. Med. p. 105. vol. 2.*) vires frequenter expertus sum, & in Hydrope, confiteor, affectus admirandos observavi, quam ex alio qualicumque diuretico.

Willisii sententia.

(*Ascites.*) Art. 807. *Ascites anasarcae* superveniens est facilioris curationis, quam morbus iste *solitarius* propter tumores circa viscera, vel propter vasa lymphatica, aut lactea disrupta eveniens. Si quando in *Ascite*, a cathartico exhibito, aqua copiosa cum *ευφορία* per sedem evacuatur, indeque abdominis intumescencia quidpiam minuitur, de curatione non desperandum erit, si vero venter plus intumescat, & velut *tympanitis* evadat, morbi eventum non nisi funestum expectare licet.

(*Curatio.*) Art. 808. *Fœmina ascite gravissima*, ac, uti mihi videbatur, deplorata laborans, medicamine seq. per vj. dies continuos assumpto, multo melius se habuit, & brevi postea integre convaluit; 2℥. *Gum. gutt. Gamb. gr. xij. ol. cinnam. gr. j. conserv. ros. rub. q. s. f. bolus*; dosis indies augeatur ad gr. xx. *jalapium* & *elaterium* potentissima *hydragoga* habentur. *Diuretica* quoque in hoc morbo conveniunt; & si cum *tympanite* complicatur, applicari potest *empl. diasporis*, & injici enema ex urina sani, &c. infra descript. (829.)

Boerhaavi sententia.

(*Causæ hydropis in genere.*) Art. 809. Hydrops in genere produci-
tur ab omni causa, quæ valet 1. liquidum ferofum ita coercere, ut
stagnare faciat in vasis, vel 2. ipsa vasa rumpat ita, ut intra membra-
nulas effundatur, vel 3. vasa reducentia a cavitatibus ita obstruat; ut
liquida non exhalent, nec resorbeantur. Causæ hæ sunt variæ, aliæ
quando morbi acuti, tumores scirrhusi alicuius visceris insignioris
evacuaciones quæcunque nimix, præsertim hæmorrhagiæ, &c.

(*Signa.*) Signa sunt tumores, primo pedum ac crurum, & postea
abdominis indies crescentis, hujus extensi sonus in *tympanite*, si per-
cutiatur, in *ascite* strepitus fluctuantis aquæ; at in *ascite* ab aquis
clausis in suis cistis, fallit. Adest insuper dyspnœa, sitis, gravitas,
torpor, alvus dura, urina pauca, febricula lenta, sudor nullus, ma-
cies, vultus livor, &c.

(*Intentiones curativæ.*) Art. 810. Ad curationem primo fluor con-
ciliandus est lymphæ cardiacis, roborantibus & stimulantibus, quæ, si
sitis valida non urgeat, petuntur ex aromaticis, salinis, oleosis, &
calidis sub variis formis, inter quas eminet *vinum medicatum* & *insu-
sum nostrum*. Si vero morbus erit calidior, & sitis vehementer urgeat,
adhibenda sunt *cardiaca reficientia*, *acida grata*, & leniter *aromatica*.
videantur remedia. (In hoc casu *tartarus vitriolatus* est proficuus.
item *aquæ Spadanæ*, *Tunbrigenses*, &c. cum vin. Rhenan.) Secundo li-
quidi nimia tenacitas (si adfit) tollenda est *salibus alcalinis*, *volatilibus*
& *fixis*, item remediis *mercurialibus*, *antimoniatis*, & e *cupro* præpa-
ratis. Tertio aquæ in cavitates congestæ educuntur, interdum, *Para-
centesi*, de qua operatione vid. locum, *emissariis arte factis*, *causticis*,
lanceolis, &c. (sed huic praxi adversantur *aphorismus Hippocratis*,
Hydropicis ulcera in corpore orta non facile sanantur.) *Diureticis*,
vomitoriis, quæ mirabiliter in hoc morbo profunt; *catharticis*, *dissipa-
tione*, *calore foci*, *hypocausti*, *furni*, *arenæ*, *solis*, *salis*, *fimi*, &c. tum
maxime pertinaci abstinentia a potu, victu panis biscocti cum pauca
sale ex pauxillo vini oleosi. Labes viscerum debilitatorum emendatur
chalybeatis & *roborantibus*, *victu sicco*, *vino veteri meraco*, & *exercitio*.
Egregium est *vinum chalybeatum stomachicum nostrum*. ℞. *Limatur.*
chalyb. cort. Peruv. *crasse pulv. ana* ℥ij. *rad. rhei pulv.* ℥ss. *vin. hoc-
comorens.* ℔ij. *infunde frigide*; *dos.* ℥ij. vel iiij. *ter in die*.

Mayeri sententia.

(*Laus mercurii dulcis.*) Artic. 811. Mercurius dulcis cæteris inta-
ctis quasvis causas morbificas aggreditur, & si superari possint, pro-
sternit; sed dandus est iste athleta in debita dosi: scio aliquando huic
succedere *ptyalismum*, qui præcavebitur addito *cathartico* satis activo;
sed si nihilominus moveatur sputum, nihil est periculi, immo *salu-
vatio*, in Hydrope, quamvis semper sit molesta, attamen sæpissime
est salutaris.

(*Nitri.*) Nihil majus dat Hydropicis levamen, quam larga *urina-
rum profusio*, idque cum minima virium dejectione. Sales omnes sunt
diuretici, verum *nitrum* omnibus præfero, quod sitim, intolerabilem
in hoc morbo flagellum, extinguit, & calorem præternaturalem vi-
sceribus in hac mæria mersis impressum egregie temperat.

(*Ovorum formicarum.*) *Ova formicarum* in lacte ebutyrato cocta
copiose urinam movent. ℞. *Ovor. formicar. coch.* j. *coq. in lacte*
ebutyrato, exprime & dulcora pauco sacchar. detur mane superam-
bulando hor. 4. ante prandium per ostidium. Mulier Hydropica, cui
hæc

hæc ova præscripsi, mire commendavit, dixitque movisse ingentem flatuum copiam & prolixos crepitus magno cum levamine; dixit etiam frequens primo ortum mejendi desiderium, tandem se fuisse copiosas urinas, ita ut una vice totam replevit matulam sæpius.

Listeri sententia.

(*Abstinencia a potu.*) Art. 812. Quædam Hydropica ab omni portione ex toto abstinuit per mensem; ad sitim autem fallendam sic fecit, tenuem ac pravam particulam panis tostæ cum *spiritu vini* intinctæ super linguam detinuit ad salivam potenter movendam, & convaluit.

(*Abstinencia a potu.*) Art. 813. „ Pharmacopola quidam, habitus „ oberioris, vir equidem haud mediocris ingenii, neque inhonestæ exi- „ stimationis, in Hydropem incidebat; valde intumuerunt crura, & „ venter quoque turgescere incepit, hic ex lectione *precedentis sectio-* „ *nis* animum obfirmavit, & secum decrevit ab omni potu per 30. „ dies abstinere, & abstinuit; unde a morbo gravissimo liberatus est. „ Idem vir probus (ut nuper aliquis mihi retulit) in eundem morbus „ lapsus *eidem experimento* spem omnem sanitatis recuperandæ iterum „ crediturus est. Huic affinis est Historia *Samuelis Ongly Equitis au-* „ *rati opulentissimi*, civibus Londinensibus, dum vixit, satis noti. „ Hic, cum septuagenarius esset, in Hydropem incidit deploratissimum, „ medicis celeberrimis (quibus fretus) prorsus incurabilem. In hoc „ rerum statu animo secum statuit *se a potulentis quibuscunque ex toto* „ *abstinere*: sitim vix tolerabilem forti animo aliquot menses sustinuit, „ ac convaluit; & vixit sex vel septem annos ab isto morbo immu- „ nis, & non nisi biennium circiter abhinc, dum hæc scribo, mor- „ tuus est. Atque hic reticere nequeo (*utuncunque me forsitan ludibrio* „ *sibi quis habuerit*) experimentum, paucis credo adhuc notum, cu- „ randi intumescentiam crurum equorum mediante nimirum *potus eo-* „ *rum decurtatione*. Hic morbus Hippiatris, vulgo *The Grease* appel- „ latur: equi hoc malo affecti decumbere omnino respuunt, unde in- „ tumescentia valde augetur, & insuperabilis quandoque evadit. Me- „ thodus medendi breviter sic se habet. Qui curam equi attendit, „ *duas tantum aquæ libras* ad potandum equo præbere solet, mane & „ vesperi, ad diēs 6. vel 8. quo tempore curatio efficitur; crura de- „ tument, & equus ad dormiendum procumbit, &c. „

(*Laus elaterii.*) Art. 814. Quod ptarmica faciunt in naribus, idem elaterium aut euphorbium in intestinis efficere videtur, pituitam vehementer movendo. Illud notandum est, *elaterium* (quæ istius medicamenti summa est commendatio) dejectiones movere, *authore Dioscori-* „ *de*, citra stomachi injuriam; exhiberi potest ad gr. x. ʒ℥. Elater. gr. x. sal. gemm. ʒj mir. cydon. q. s. f. bolus. In casu ancipiti & moribundo ex dysuria plurium dierum, aliis medicis dimissis, sic hominem restitui; ʒ℥. Succ. limon. recenter express. ʒvj. cochlear. bortenf. ʒiv. hepatic. plantag. syr. violar. ana ʒij. m. hujus ʒiv. omni trihorio siccavit, postridie urinam copiose reddidit, & postea modicis *hy-* „ *dragogis* detumuit venter, & convaluit. Hydrope siccato *aq. absynthii* „ *stillat.* in qua *rhabarbarum* maceratum est, est usus eximii ad confir- „ manda viscera. (Virtutes elaterii per totam exercitationem summo- „ pere extollit author, & revera laudem omnem exsuperat.) „ Hoc „ remedium equidem successu vix credibili aliquoties exhibui. Anno „ proxime elapso, verno tempore, seni asthmaticæ, diuturnitate „ morbi contritæ, cui pedes, crura & femora valde intumebant, „ quod moribundis fere semper evenire solet, elaterii dosin unam & „ „ alte-

alteram atque tertiam, interpositis debitis intervallis, effectu plane admirando propinavi. Prima vice humoris serosi per sedem evacuatæ sunt duodecim pondo, secunda purgatione decem, & tertia decem vice solummodo duo vel tria. Atque ita a tumoribus Hydro-picis omnino liberata est, & valetudine mediocri vixit usque ad initium hyemis, cum, ingravescente asthma, colica vel iliaca passionem correpta est, ex qua, postquam ultra hominis ætatem vixisset, tandem naturæ satisfecit. ,

HYDROPS VESICALIS.

(*Hydrops Vesicalis.*) Art. 815. Hydrops abdominis Vesicalis est *asci-sis quedam species*, in qua quidem inclusa aqua tumorem abdominis facit, non vero in ejus cavo fluctuans, sed in vesiculis sive hydatidibus innumeris variæ magnitudinis contenta; quæ hydatides nihil aliud sunt, quam portiones vasorum lymphaticorum alicujus visceris, in quibus motus lymphæ est impeditus; unde spatiola inter valvulas, liquore prædicto distenta, in figuras oblongosphæroidales efformantur, & totam cavitatem adimplent; ita ut post abdominis apertionem quandoque nihil aut parum aquæ extravasatæ effluxerit. Hic morbus in brutis animantibus frequentius occurrit, præcipue in ovibus. In corporibus humanis exempla prostant apud *Sennertum*, *Tulpium*, *Bartolinum*, &c. Valde curiosum est istud in Collectaneis Gallicanis Acad. Scien. *Memoir.* p. 215. anno 1722.

(*Historia.*) Art. 816. Sexennium abhinc historiam mihi communicavit D. *Richardus Blinck pharmacopola Bidfordensis*, juvenis cujusdam nautici, qui ex febre ardente, in qua permagnam frigidæ copiam potasset, in ingentem abdominis intumescientiam incidebat. Applicata erant emplastra, & cataplasmata, ex quibus parum utilitatis: qui demum loco prominenti ad latus sinistrum umbilici caustico imposito apertum est foramen, ex quo *hydatides quamplurimæ prodierunt*, aliæ ova gallinæ æquantes, nonnullæ grandiores, plurimæ minores, omnes numero ad minimum octoginta. Homo convaleuit, & adhuc vivit ab omni morbo immunis.

(*Alia*) In Transactionibus N. 370. extat historia cujusdam hominis hujusmodi Hydrope laborantis, e cujus abdomine facta paracentesi exivit ingens hydatidum copia, figura & magnitudine diversarum N. septem vel octo millium, una cum his etiam evacuata erat magna quantitas materiæ gelatinosæ, coloris grisei & lutei, albumine ovorum aliquanto spissioris. Vid. locum.

HYDROPS PERITONÆI.

(*Hydrops Peritonæi.*) Art. 817. Hydrops Peritonæi est collectio aquæ inter abdominis musculos & Peritonæum, maxime inter hoc & tendines musculorum transversalium, unde ex errore quidam authores, anatomix ignari, hunc morbum *Hydropem duplicaturæ peritonæi* falso nominarunt. Tumor abdominis aliorum æquabilis circa umbilicum minus prominet, ob strictam ibidem tendinum muscularium peritonæo adhæSIONem: atque hoc *propriam morbi hujusce diagnosi* constituit. Aqua sive lymphæ eo loci comprehensa, ibidemque moram ducens, carnem muscularem corrumpit, & hinc ulcus sordidissimum internum progressu temporis procreatur. Hic Hydrops *tempestitiva paracentesi* forsan sanari potest. D. *Cbeselden* vero aliter sentire videtur, Anat. p. 126.

(*Paracentesis.*) Art. 818. Operatio Paracenteseos cum historia ipsius medi-

medicinæ est coætanea, ab Hippocrate memorata, & ab Albucasiæque accurate descripta ac in nostra ætate. Experientia recentiori docemur aquas una vice ad siccitatem tuto depromi posse, quod praxi in nostris Nosocomiis & Lutetiæ Parisiorum confirmatur.

Art. 819. Memorabilis est historia apud D. Cheselden *Anat.* p. 187. &c. cujusdam ascite laborantis, qui novies vigesiesque in uno anno paracentesin subivit, & deprompti fuerunt plusquam septuaginta aquarum congii. Tribus ultimis septimanis ante obitum *rheumatismo* laborabat, & frequenti *navium hæmorrhagia*, quæ immediatæ rationes vel causæ mortis ejus videbantur; aperto cadavere jecur repertum est sanum.

Art. 820. Operatio paracenteseos non molienda est in corporibus valde macilentis, vel senio vel tabe confectis, nec (nisi in Hydrope subito exorto) in ægris, qui non respirandi difficultate laborant, & quorum partes nobiliores adhuc fere sanæ & integræ sunt. De operatione, & ejusdem difficultatibus, vide *Barbette* & alios scriptores chirurgicos.

Farrago sententiarum.

(*Tussis in Hydrope.*) Art. 821. Qui ex morbo jecore oritur hydrops, vehementissimam, sed inanem tussim conjunctam habet, quæ in aliis hydropum speciebus vix aut raro apparet. *Baglivius*.

(*Prognostica varia ex Hippocrate.*) Art. 822. Hydrops (inquit Hippocrat. in *Coac.*) qui medicinæ concedit & revenit, desperatus est. Hydrops omnis (inquit idem) qui ex acutis morbis oritur, malus & lethalis. Hydrope detentus (addit) curari potest, si robustis sit visceribus, si bene concoquat & spiret, sine dolore sit, & extrema colliquefacta non habeat. Omnes fere Hydropici circa plenilunium moriuntur. *Tycho Brayhe*. Diarrhœa in Hydrope, quæ non juvat, est pessima; pravam enim in visceribus diathesin ostendit.

Art. 823. In Hydropicorum cadaveribus (inquit Cheselden) semper observavi cor solito majus, fibrasque ejusdem valde laxatas, & vasa sanguifera plurimum distenta, & præterea concretiones polyposas, interdum in ambobus auriculis & ventriculis, sed frequentius in dextris.

(*Infusum theæ.*) Art. 824. Stomacho & visceribus rite emundatis *infusum theæ viridis* in vino Rhenano evadit medicamentum laudabile, non modo diureticum & stomachicum; sed etiam sanguinem exagitant, & ejus motum adaugens. *Wainewright*.

(*Succus rad. brionie.*) Ex vegetabilium classe (inquit *Dolæus*) pro arcano in hoc morbo revelo succum *brionie* sequenti modo collectum; luna crescente, tempore imprimis verno, radicem *brionie* terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis mane invenies coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico a coch. j. ad ij. vel iij. quo solo vili medicamine plures, Deo adjuvante, curavi. Deploratissimum Hydropicum curatum vidit Dr. *Beeston* medicus *Bathoniensis* celebris, nuper defunctus, ut mihi retulit, per radicem *brionie* circumforaneo quodam exhibente, cum ex aliis remediis quotcunque a peritis medicis exhibitis nullum juvamen acceperat. Sequens infusum diureticum fuit præscriptum celeberrimi *Loweri* & in sua praxi frequenter usurpatum ʒi. *Rad. lapathi acut.* ʒij. *taraxac.* ʒi. *flor. sambuc.* m. *summit. abiet. fol. cochlear. becabung. nasturt. aqua.* ma m. ʒ. *raphan. sylv.* ʒij. *sem. sinap.* ʒi. *infund. in vin. alb.* ʒij. *clausa* & calide per hor. 4. coletur pro usu, dos. coch. lv. vel v. bis vel ter in die.

(*Remedia varia.*) Art. 825. Inter remedia reliqua melioris notæ recensentur *pil. hydropicæ* Bontii; ʒ℥. *Aloes opt.* ʒi℥ss. *gum. gut. gam.* ʒi℥ss. *diagrid.* ʒj. *gum. ammoniac.* ʒi℥ss. *tart. vitriolat.* ʒss. *syr. ros. sol.* q. s. f. *massa pil. dos. a ʒ℥ss. ad ʒj.* *Electuar. hydragogum* Sylvii; ʒ℥. *Bacc. junip. in aq. coct. express.* & ad pulpæ consistentiam redact. *vulp. tamarind. ana* ʒiv. *rad. jalap.* ʒi℥ss. *scammon. elect.* ʒj. *cinnam. acut. sem. fœnic. dulc. ana* ʒij. *sacchar. clarific.* ʒx. m. f. *electuarium*; dosis in adultis a ʒiij. ad ʒ℥ss. *Potio hydragoga* Listeri; ʒ℥. *Decoct. sennæ Gereon.* ʒiij. *syr. e spin. cervin.* ʒi℥ss. *succ. limon.* ʒ℥ss. *elater. gr. iv. m. f. potio.* *Tinctura allii vino absynth. extract. tinctura cochlear. compos. cataplasma Hydropicum, pil. hydragogæ, cerevisia Hydropic. cerevisia purgans Hydrop. haustus hydragogus, lixivium de calce, vinum Hydropicum. Sapo Castiliensis, express. diuretic.*

T Y M P A N I T E S.

Boerhaavii Sententia.

(*Tympanites.*) Art. 826. Tympanites iisdem mediis, & eadem methodo tollitur, ac *anasarca* & *ascites*, si ortum duxit a rarefacto vapore humoris extravasati, & putrefacti; tum enim, causa ablata, tollitur: Si vero ortum duxit ex aere per membranas intestinorum putrefactorum perforatas in cava delapso; retroire non potente; sed calore corporis rarefcente; tum cuncta cito putrescunt aere juvante, malumque ex posita causa est fere semper insanabile: unde *hydrops siccus humido* longe magis immedicabilis habetur: *punctura* sæpe solatio, raro sanationi, sufficit; *fasciæ* post puncturam locum habent.

Willisii Sententia.

(*Quomodo generatur.*) Art. 827. De hujus morbi ætiologia præ reliquis audiendus est *Willisius*. Tympanites est tumor ventris; sed quæ sit materies morbifica tumorem istum inducens, quomodo in ventre aut progignatur, aut aliunde illuc adveniat, plane nescitur. In *ascitem* degenerare solet. Non a flatibus intra vel extra intestinorum cavitates conclusis excitatur, verum exoritur (quantum conjectura assequi possumus) quatenus in imo ventre spiritus animales ad viscera membranacea spectantes, ab incongruo quodam in *αταξίας* adaecti, fibras ubique nerveas tumultuarie irruunt inflantque, nec statim denuo ab iis recedunt; hinc peritonæum extumescit, intestina ampliata & distenta velut inflantur, mesenterium, aliaque viscera membranacea spiritu impetuoso turgida, velut in molem attolluntur; porro dum hæc fiunt, ut vacuitates a viscerum concavorum extumescentiis factæ impleantur, humoris statim cujusvis intus contenti portio in vapores rarefacta, illico in flatus spatia isthæc inania oberrantes cedit.

(*Quinam huic morbo sunt obnoxii.*) Art. 828. Spiritus animales potius quam flatus ejusmodi ventris intumescencias, saltem breves & transitorias, quales in paroxysmis colicis & hysteriis contingunt, excitant: atque hinc evenit, quod qui affectibus *hypocondriacis, colicis*, aliisque imi ventris *spasmodicis* diu obnoxii fuerant, demum *tympanitici* fiant.

(*Curatio.*) Art. 829. Hic affectus raro per se interficit, quin longo tempore protractus, quo demum certius jugulet, sibimet *ascitem* lethi prænunciam adsciscit. A *catharticis*, præsertim fortioribus, fere semper exacerbatur hic morbus, saltem non alleviatur. *Enemata crebro injecta* eximii sunt usus, & hoc præ cæteris; ʒ℥. *Urin. sani* ʒij. *sal. prunel.* ʒj. *tereb. Venet. cum vitel. ovi solut.* ʒi℥ss. m. f. *enema.* Appli-

plicetur empl. de sapon. toti abdomini. Ad sitim intolerabilem in hoc morbo; ℞. Conserv. lujul. per setaceum traject. ℥iij. pulp. tamarind. ℥ij. sal. prunel. ℥j. syr. e succ. lujul. q. s. f. Eclegma molle, de quo sæpius lambat æger.

(*Vix differt ab ascite.*) Art. 830. Tympanites est flatuosa abdominis moles, rugitu strepens, dumque percutitur, instar tympani resonans. Vix differt ab ascite; raro enim flatus absque aqua reperiuntur, nisi in ipsis morbi primordiis. Experientia didici hoc malum tractari debuisse remediis antihystericis, antiscorbuticis, & corroborantibus, priusquam in ascitem demigraverit.

(*Remedium empiricum.*) Sequens est remedium empiricum valde decantatum; ℞. Succ. folior. porri & sambuci ana p. æ. analytice misceantur, capiat æger coch. iij. vel iv. bis vel ter in die; hoc valet aliquando in extremis post alia omnia incassum tentata. Antihysterica, chalybeata, empl. de cicuta cum ammoniaco, fofus ad tympaniten, &c. sunt valde proficua.

M. L I T T E R E.

(*Essentia morbi tandem detegitur.*) Art. 831. Scriptoribus de Tympanite inter se minus convenit, quippe qui neque causam morbi, neque sedem designarunt. Ex cadaverum Tympanite mortuorum sectionibus patet ventriculus & intestina, præ reliquis crassa, mirum in modum distendi, ac ingenti mole vix sane incredibili ampliari. Frequenter (*souvent*) observavi cæcum & colon femur humanum crassitie æquantia, reliquorum viscerum in abdomine contentorum dimensionem ultra naturalem nusquam inveni. In recentibus Tympaniticis humiditatem tantum aliqualem in abdominis cavo reperi, & in inveteratis non nisi duas vel tres libras aquæ; quantitas adeo exigua neutiquam pro morbi causa haberi potest: ideoque inflationi ventriculi & intestinorum monstruosa ista ventris moles soli debetur. Ventriculus & intestina quasi musculus cavatus spectari possunt, cni aer inclusus est antagonista. Parietes intestinorum & aer internus sunt tanquam duo ελασται se mutuo indefinenter impellentia. Quamdiu hæc duæ potestates æquipollent, ventriculus & intestina alternatim se contrahunt & dilatant, salva dimensione naturali, suntque officiis suis obeundis paria, manente scilicet æquilibrio: si autem laterum ventriculi & intestinorum systole vim elasticam aeris inclusi superat, fistula intestinalis supra modum coarctabitur: e contra si quando fibrarum intestinalium vires elasticæ quoquo modo imminuantur, aer inclusus canalem plus justo dilatatur, & quo debilior est intestinorum elasticitas, eo major evadit eorum capacitas, unde Tympanites ortum ducit; qui affectus ut plurimum est incurabilis ob omissam aut valde diminutam istorum viscerum elasticitatem; fibræ nimis laxatæ sese contrahere rursus nequeunt, aut saltem admodum debiliter: & proinde ventriculus & intestina non nisi imperfecte admodum officia sua peragunt, in quantum præcipua eorumdem energia & operatio a contractione, dilatatione, & motu peristaltico magnopere pendent. *Memoir. de l' Acad. Vol. 17. p. 314.*

HYDROCEPHALUS.

Schenckii Sententia.

(*Hydrocephalus.*) Art. 832. Hydrocephalus est morbus adultis raro accidens, infantes vero sunt magis obnoxii, & frequenter fit a violenta ob-

stetricatione. Est *tumor capitis aquosus*; colligitur autem humor vel inter cutem & cranium, aut inter cranium & cerebri membranas; *Aetius* addit inter membranas & cerebrum; (*Boerhaave* addit inter cerebri plicas, & in cavitatibus;) sed hæc posteriores species sunt incurabiles; externa & evidens causa est plaga aut contusio in puerperio. (Ex tumore intus sub cranio neminem convaluisse vidi; sed ab externo tumore facile sanescunt.) „ Caput in tantam molem turgescit, ut

„ quandoque *integrum corpus præponderet*. Insignis historia habetur in „ *Transact. Philos.* p. 207. Infantis biennis hoc malo mortui, e cujus „ capite sectione patefacto exivere *aquarum decem pondo*; humor erat „ tenuis, pallidus, & insipidus, in interstitiis meningum & cerebri „ ventriculis reconditus; de reliquis circumstantiis vid. locum.

(*Methodus medendi.*) Art. 833. Oppugnandus est hic affectus primo *resolventibus*; sed si id fieri nequeat, facienda est *incisio* vitato temporum musculo, & humor exprimendus est, (*Ambr. Paræus*) ℞. Ol. cham. ℥iv. sulph. ℥j. m. f. f. a. ungt. in hoc affectu magnarum virium. „ Hydrocephalus secundum *Boerhaave* levi *inustione, terebratione, pun-*

„ *ctura*, prudenter, lente, adhibitis, simulque *hydragogis & roboran-*

„ *tibus* internis curatur; vel externis *discutientibus* dissipatur, excepta

„ ista specie incurabili, quæ in cerebri cavitatibus formatur.

(*Remedia varia.*) Art. 834. „ Inter cætera ad hunc morbum oppu-

„ gnandum *psycrolousiam* emolumento fuisse animadverti. Inter eva-

„ cuantia & corroborantia eadem sunt ac in *ascite*. Pro usu externo

„ lixivium calcis vivæ egregium admodum est in discutiendo Hydro-

„ cephalo, teste *Aquapendente*, & linimentum sequens a *Foresto* com-

„ mendatur; ℞. Ol. cham. ℥iv. flor. sulph. ℥j. digere s. a. Hydroce-

„ phali curatio (inquit *Barbette*) omni tempore experientissimis me-

„ dicis insignem creavit molestiam. Purgantia, sudorifera vel diureti-

„ ca raro aliquid conferunt: cauteria, vesicatoria, fonticuli, setacea,

„ immo plerumque ad incisionem vel ustionem impellimur, quæ ta-

„ men media quosdam in vita conservarunt.

M. P E T I T.

(*Accurata morbi descriptio.*) Art. 835. Hydrocephalus est tumor capitis aquosus adultis raro accidens; infantes vero in primis annis a nativitate, immo interdum ante nativitatem occupat; & caput infantuli ex utero nondum educti tam grande existit, ut *puncturam vel sectionem capitis* facere ad partum facilitandum chirurgus incumbat. Aqua secundum authores colligitur, vel externe inter cutem & cranium, vel interne 1. inter cranium & duram matrem, 2. inter duram & piam matrem, 3. in ventriculis ipsius cerebri; atque hanc ultimam speciem solam in praxi vel in cadaverum sectionibus unquam observare potui; credo itaque reliquas rarissime occurrere. Hoc morbo affecti sunt languidi, tristes, & pallidi, oculi illorum luridi & prominentes pupillis dilatatis; ossa cranii tenuia & mollia evadunt, & figuras irregulares induunt, nasus depressus, frons valde elatus, capitis magnitudo plane monstruosa, & gravitatis non sustentandæ, non raro crepat & disrumpitur, & mors non multo post insequitur. In cadaverum sectionibus notavi duram meningem plus solito cranio adherentem, crasin cranii valde prolatam, & quasi ubique confluentem, ossium margines membranis e longinquo connexos, cerebrum minime corruptum, ventriculos cerebri adeo in immensum distentos, ut

substan-

substantia ejus corticalis & medullaris extrorsum detrusa digiti vitæ duas lineas crassitie æquabat, & multis in locis a protrusione aquarum penitus divisa aquis usque ad meningees pertingentibus, vasa sanguifera prolongata & crassa, in pluribus glandulam pituitariam scirrhosam, quod inter causas hujus morbi locum habere videtur. Paracentesin quod attinet, tam diu procrastinari solet, ut vix ullum ista operatione servatum vidi; intra 4. vel 5. horas plerumque moriuntur, si una vice aquas ad ficcitatem depromant; sin vero tardius progrediantur, non ultra quadraginta horas supervivere solent.

HYDROPS PECTORIS.

Sponii Sententia:

(*Hydrops pectoris signa diagnostica.*) Art. 836. Si Hydrops in pulmone accidat, juxta Hippocratem, febris & tussis vexant, æger confertim respirat, pedes intumescunt, ungues incurvantur, & velut empyicus afficitur, sed remissius & diutius. Hæc signa diagnostica Hydrophis pectoris apprimè sunt scitu necessaria; est enim morbus satis frequens, nec tamen satis cognitus: sed qui ista ad linguam tenebit, hunc morbum ab aliis facile distinguet. Plurima habet cum empyemate signa communia; ea tamen symptomata sunt remissiora, quia serum sive aqua minus impediendi in pulmonum bronchiis & pectore afferunt quam pus ipsum; at diutius durat affectus, quia sero non ita corrumpitur aut opprimitur pulmo, ac purulenta ibidem collecta materia. Sponii Aphor. p. 145. &c.

Ettmulleri Sententia.

(*Symptomata.*) Art. 837. In Hydrope pectoris præter pectoris tumorem & sensum fluctuationis adest tussis sicca, difficilis respiratio, orthopnoea, palpitatio cordis, febricula. Ex ruptis vasis lymphaticis oritur, & curatur ut aliæ Hydropis species. De paracentesi vid. locum, p. 766.

Willisii Sententia.

(*Hic affectus in ovibus valde frequens.*) Art. 838. In Hydrope pectoris lympa in compagem pulmonarem restagnante sæpenumero accidit vesiculas, hydatidas dictas, in extima hujus visceris superficie excitari, quæ postea disruptæ ascitem in thorace produciunt. Hujusmodi affectio in ovibus, quando ob tempestatem humidior, & pascua aquosa ab Hydrope gregatim intereunt, passim cernitur. Morbus dignoscitur ex aquarum fluctuatione. Auctor historiam producit Hydropis Pectoris per paracentesin curati; & aliud affert exemplum cujusdam juvenis curati per cathartica & diuretica.

Art. 839. De Hydrope ovarii, Hydrope uterino, & uteri inflati affe-
bi in morbis mulierum dictum est.

I C T E R U S.

Inter legendum & ex observatione.

(*Icteri signa diagnostica.*) Art. 840. Signa hujus morbi & symptomata præcipua sunt lassitudines totius corporis, anxietas præcordiorum, difficilis respiratio, virium dejectiones, faciei pallor, pulsus debilis & lentus, urinæ tenues, aut crassæ, coloris flavi ad rubrum vergentis, croceo colore pannum immersum tingentes; interdum adsunt vomitus biliosus, dejectiones albæ, pruritus totius corporis, & ariditas, &

veluti exustione solis aspera cutis superficies, flavedo per universam cutem, maxime in oculorum albis, quo quidem colore interdum obiecta omnia apparent tincta.

Sydenhami sententia.

(*Icterus ex colica.*) Art. 841. Icterus interdum est proles colicæ.

(*Eiusdem curatio.*) In tali casu solo rhabarbaro purgandum est, & morbus plerumque sponte sua sensim facessit; sin vero non nisi ægrè discedere videatur, convenit sequens apozema; ℞. Rad. rub. tinctorum curcum. ana ℥i. chelidon. maj. cum toto, summit. centaur. min. ana m℥. coq. in p. æ. aq. font. & vin. Rhenan. ad ℥ij. colatur. add. syr. e quinque rad. ℥ij. m. f. apozem. capiat ℥ss. calide mane & sero usque dum convalescit.

(*Curatio in genere.*) Art. 842. At ubi icterus per se invadit, colica neutiquam prægressa, cholagoga, quæ per alvum bilem subducunt, ægro sunt exhibenda, & alia antiictERICA usurpanda. His denique morbum non subigentibus ad aquas ferreas, quales sunt Tumbrienses, adeundum, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ettmulleri sententia.

(*Symptomata.*) Art. 843. Icterus est totius corporis cachexia flavèdinem inducens, ut plurimum cum cardialgia, hypochondriorum dolore, præcipue dextri, alvi segnitie, lassitudine, &c. Si flavedo ad viriditatem, vel ad cœrulitatem, vel ad obscurum livorem inclinet, Icterus niger vocari solet; febris interdum conjuncta est, interdum abest. Tristitia aliquando inducit Icterum. Icterus flavus diuturnior semper in nigrum degenerat, unde essentialiter non differunt. Anxietas in præcordiis, dolor præcordiorum compressivus, virium dejectiones, lipothyriæ, &c. ante eruptionem Icteri frequentissime occurrunt. Urina ictericorum succussa spumam flavam ostendit, & linteum tingit colore croceo, sed non semper, sedimentum croceum dimittit; fæces alvinæ sunt plerumque albicantes, vel cineritii coloris, & hoc postremum ut plurimum est signum calculi in vesica fellea. Urina crassa turbida & nigerrima est signum solutionis morbi.

(*Prognosis.*) Quo magis flavus existit Icterus, eo facilior est curatu, quo vero magis niger, eo difficilior. Cum hydropè conjunctus raro curatur. „ Si sudor erumpat (inquit Sylvius) citior plerumque curatio expectanda erit, sin vero urinis plus deponatur materiæ rubentis & paulo post subsidentis, segnior erit expectanda.

(*Curatio.*) Art. 844. Quoad curam vomitoria, martialia, & hinc amara, totam absolvant paginam. Præmissis universalibus usurpentur stomachica, martialia (limaturæ crudæ in Ictero nigro) rhabarbarum, lumbricalia, viperina, alcalina, volatilia, amara, aquæ acidulæ, gum. ammoniacum. Venesectio & catharsis vix locum habent. Specifica sunt (omnium optimum) chelidonium majus, marrubium, flor. hyperici, crocus, genista, absinthium, sem. cannab. in lacte coctum, rad. curcum. rub. tinctor. urine potus, stercora sere omnium avium & animalium, pediculi, lapis in folliculo fellis tauri. In genere moneo in curando Ictero insistendum esse ad tempus medicamentis antiictERICIS, quia morbus est chronicus & contumax: & quidem quamdiu urina mingitur tenuis & splendida, tamdiu illis insistendum, donec signa coctionis apparent, usque dum urina sit crassa, & turbida, & cum sedimento repleta; his tamen apparentibus spes est salutis. Cura peracta, ad abigendum cutis flavum colorem conveniunt frictiones & balneatio.

Willisii sententia.

(*Vomitorium & alia remedia.*) Art. 845. Curatio Icteri inchoanda est cum vomitorio; 2℥. Fol. asari N. 9. incis. & contus. affund. vin. alb. ℥iij. exprimatur succus & detur cum regim. Remedium vulgare & empiricum apud nostrates est, ut ix. pediculi vivi fumantur mane, per 5. vel 6. dies, quo remedio (cum alia minus efficerent) plures sanatos audiui. Chalybeata ut in aliis cachexie affectibus, ita in hoc iuvimen præstant, atque hinc est quod acidulæ frequenter post omnia profunt. „ Cum apozemate sequente (inquit Doleus) semper initium curationis facere soleo; 2℥. Rad. tarax. chelidon. maj. ana ℥j. herb. cichor. fragar. ana m℥. marrub. alb. m℥. tartar. alb. fol. senn. ana ℥iij. infund. in vin. alb. & aq. font. ana p. æ. coq. ab ℔ij. cola, &c.

Velschii sententia.

(*Est affectus in prægnantibus satis frequens.*) Art. 846. Mulieres sæpe gestationis tempore fiunt Ictericæ, præsertim in ultimis mensibus; an quod bilis tunc temporis viscosior evadat, & ita in glandulis hepaticis non secernatur? an quod uterus tumens comprimendo intestina in causa est, quod ductus choledochus nimis compressus bilem in intestina non transmittat? notandum est, quod hic morbus in prægnantibus post partum statim evanescat.

Sampsonii sententia.

(*Sapo Castellensis.*) Art. 847. Saponis Castellensis ℥℔. in haustul. vin. alb. solut. valet ad urinas provocandas in Ictero & Hydropæ experimento domus Bedfordiensis, ubi pro magno secreto habetur. Sylvius hoc idem medicamentum laudat, sed in lacte solutum ob salem fixum & oleosam ejus substantiam. Ego quoque in nonnullis Ictericis expertus sum, in his cum fructu, in illis aliter. Ubi acidi humores vel in Ictericis vel in Hydropicis abundant, credo hoc medicamentum valere, quoniam ab acri sale fixo temperantur, subiguntur, & per vias urinarias expelluntur: & e contra ubi acres humores dominio potiuntur, acre medicamentum nihil valet, metuo, ut noceat.

Farrago sententiarum.

(*Dubitatio.*) Art. 848. Dubitatur, an Icterus semper oriatur ab obstructione bilis; quoniam neque in sanguine vel urina ictericorum ulla est amarities: Icterus etiam generari potest sine hepatis obstructione, teste Sylvio, & obstructions in hepate non semper pariunt Icterus, auctore Ettmullero. Aliquando oritur ex animalium quorundam morfu. Ictericorum alvus & aperta & faeces flavo colore tinctæ (interdum) conspiciuntur. D. Gaillard. in Thesi apud Cantabrigienses.

(*In hepatis scirrbo.*) Art. 849. Si sit suspicio hepatis scirrbi, apprime conveniunt fots & empl. seq. 2℥. Fol. malv. alth. absynth. flor. melilot. chamem. ana m℥. fol. meliss. chamepit. ana m℥. sem. fœnugr. ℥i℔. coq. ex aq. ℔v. sub finem add. vin. alb. ℔ij. &c. cum pannis laneis foveatur latus, deinde superimponatur emp. de cicuta cum ammoniac. vel de ranis cum mercurio. Pitcarnius in MS. Si vero jecur durum sit, i. e. scirrhusum, res est desperata. Hippocr. Aphor. Si morbus diu dureret, hydropem minatur.

(*Avium stercora.*) Art. 850. Candidum ex avium fimo est earum urina, ideo confert Ictero, qui morbus inflatio est: album in anserino stercore diligenter abrasum siccaturumque privatim ad icterum facit. Listerus.

Art. 851. In ictero pertinaci, medicamentis usitatis minus cedente, ex repetitis experimentis omnibus commendo Æthiopem mineralem tan-

quam remedium in hoc affectu potentissimum. Icterus in ultimo stadio sanguinem fundens per sedem, per urinas, per ipsam cutem, per sputum, vel stillicidium ex naso, &c. vix unquam curatur.

(Boerhaave.) Art. 852. Instar omnium religiose consulendus est præclarissimus Boerhaave, qui de Ictero multiplici, & de hepatite egregie scripsit. p. 201.

(Remedia varia.) Art. 853. Stercus ovinum in cerevisia infusum pro pauperibus est laudabile medicamentum. Decoctum sem. cannabin. sapon. Venet. flores sal. armoniaci martiati, ens veneris, &c. sunt remedia optatissima, ut etiam sequentia, cerevisia ictERICA, decoct. berber. decoct. ictERIC. expressio milleped. ictERIC. haust. saponac. pil. ictERIC. (probatissimum medicamentum) vinum chalybeatum.

C A P. IX.

Sive Fasciculus Morborum nonus.

R H E U M A T I S M U S.

Sydenhami sententia.

(Rheumatismi historia.) **N**ULLO non tempore, maxime autumnō, cum rigore & horrore & cæteris febrium symptomatibus adoritur; elapso uno vel altero die (citiussve) dolor adest atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris, & genibus præsertim, vicissim hos relinqueris & illos occupans, frequentius cum rubore & tumore. Febris sensim evanescit, manente dolore: est morbus diuturnior, aliquando per menses aliquot durans, & annos, non continuo, sed paroxysmis repetitis.

(Lumbago Rheumatica.) In lumbagine Rheumatica immanis dolor adest circa lumborum regionem fixus, nephritin mentiens, nisi quod æger non vomituriat. In Rheumatismo sanguis pleuriticorum similis est.

(Curatio.) Art. 855. Sanguis mittendus est ad tertiam quartamve vicem, habita ratione virium, alternis vel tertiis diebus. Viæus admodum tenuis præbendus est; æger quotidie e lecto ad horas aliquot exsurgat. Potus ordinarius sit cerevisia tenuis vel potius ptisana ex hordeo rad. liquerit. acetos. &c. vel emulsio; parti dolenti applicari potest cataplasma ex pane albo in lacte coct. cum tantillo croc. diebus a venæsectione liberis injiciendum est enema ex lacte saccharato, vel ex decocto communi pro clystere &c.

(Aliæ medendi methodi.) Art. 856. Si imbecillitas ægri phlebotomiæ repetitionem non ferat, tum post secundam vel tertiam venæsectionem curatio alia methodo tentanda est, viz. capiat alternis diebus potionem purgativam communem, donec convaluerit, & iisdem noctibus paregoricum ex syrupo de mecon. his minus ad votum conducentibus, antiscorbuticis morbi reliquæ fugandæ sunt. In juvenibus, atque iis, qui temperate vixerunt, vino non plus æquo dediti, Rheumatismus diætâ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æque feliciter, ac repetitis venæsectionibus profligari potest, nempe diætâ ex solo sero lactis.

Schmitzii sententia.

(Rheumatismus est quodammodo arthritis universalis.) Art. 857. Per Rheumatismum vulgo intelliguntur dolores erratici externum corporis habitum occupantes; crebri quandoque ac leviusculi horrores adsunt; febris

febris si quæ adfit, mitis, noctu plerumque recrudescens. Sed nocturna exacerbatione & contumacia *luis venereæ* cruciamina æmularur. Lubricus est Rheumatismi in *arthritin* transitus; nam communis est utriusque morbi materia, hinc *arthritidis universalis* nonnullis appellatur.

(*Indicationes curativæ.*) Art. 858. Commodius *sudoribus* solvitur. *Venæsectio* semper in hoc affectu curando est necessaria; est enim remedium *ἡγεμονικόν*, neque sine magna sanguinis jactura & virium ruina domari potest; post *venæsectionem* *emetica* fortiora sunt propinanda, hinc *purgantia* leniora, ut pulv. Comitiss. Warvicens. &c. Partes affectæ foveantur tepide cum *lapide medicamentofo* in aq. pluviali solut.

Musgravii sententia.

(*Lentor in sanguine a sale alcalico provenit.*) Art. 859. In Rheumatismo ab acri sale alcalico, quam ab acido, lentorem fieri longe probabilius, *Baynardi* experimento liquet, viz. ex Rheumaticorum urina, salis alcalici ejus, quem habent sani bonaque utentes valetudine, pars quasi trigesima, nec quidem supra, distillando elicitur: unde conjicitur saltem istum in sanguine retentum pituita (forasan adjuvante oleo, veluti in *sapæ* compositione) irretiri involvique, & ad viscidum in Rheumatismo faciendum, ad dolores & tumores inferendos opere quidem maximo contribuere. Serum quoque sanguinis Rheumatismo laborantium *syrupo violarum* admixtum viridescit, & cum *mercurio sublimato* albissimum deponit concretum.

(*Vomitoriorum præstantia.*) Art. 860. De magna efficacia vomitorii aliquoties repetiti in hoc morbo debellando dignus est, ut consulatur auctor, p. 26. *Balsamo sulphuris terebinthinato* artus motu privati bis die superillinantur, vel etiam *vernice terebinthinat.* *oleum terebinthinæ* & *camphora* sunt remedia interne & externe proficua.

Ettmulleri sententia.

(*Rheumatismus cum arthritide convenit.*) Art. 861. Arthritis vaga scorbutica seu Rheumatismus revera cum *arthritide vera* convenit, accidentibus saltem variat, terminatur nunc per sudorem aut urinam aut per eruptionem cutaneam instar purpuræ relicta cutis asperitate; adsunt interdum gravissimæ præcordiorum anxietates. sitis clangosa, sudores, dolores lancinantes & pungentes; imbecillitas ad motum, locorum dolentium tumores, &c. fundamentum hujus morbi est sal scorbuticum fibras vellicans.

(*Curatio.*) Art. 862. Vomitus in principio convenit; *venæsectio* in principio & incremento: *volatilia* non debent exhiberi in principio, sed *alcalica* & *testacea*, ut etiam *antimonium diaphoretic.* *cinnabaris antimonii*, speciatim *arcanum duplicatum Mynsichti*; postmodum fiat accessus ad *volatilia* cum *antis scorbuticis* mixta; *lumbrici terrestres* sunt remedium sine pari in vino infusi, vel in sero lactis cocti, vel pulverisati, *millepedes* etiam commendantur. Declinante morbo conveniunt remedia ex *pino* vel *abiete* (*scobs abietis in sero lactis coct.*) *rob. bacc. junip. sambuc. decoct. e lignis.* *Decoct. strobilorum pini* curam ferre absolvit. Externe locis dolentibus applicandi sunt *lumbrici terrestres* donec moriantur.

Farrago sententiarum.

(*Partes nobiliores quandoque obsidet.*) Art. 863. Miasma rheumaticum quandoque cerebrum, pulmones & viscera obsidet cum dolore & ægritudine excrucians, *Boerhaave*.

(*Vires terebinthinæ.*) Art. 864. Dedi nonnunquam *terebinth. Venet.* ℥vj. vel

vel ℥j. (& tantum ejus quantitatem veteres vulgo adhibebant) cum vitello ovi solut. in haustu quodam, non modo in *paralyfi*, verum in *arthriticis* & *rheumaticis* affectibus cum optimo successu, sed in hoc postremo affectu *venæsectio* debet anteire, & , si opus fuerit, repeti. *Harris*.

(*Stercus equi*.) Art. 865. Infusio *stercoris equi masculi* in vino tenui vel liquore posset. facta, ad ℥iv. vel vj. bis in die propinata est medicina in hoc affectu minime contemnenda. *Willis*. „ Et nunc quoniam de medicamentis sordidis sermo agitur, prætereunda non est „ *urina vaccæ* apud *Parisienses*, & etiam non ita pridem *Londinenses*, „ perquam celebrata, non modo in rheumatismo, sed etiam arthritide, „ de, hydrope, asthma, ictero, &c. curandis. *Memoir. de l'Academ.* „ Vol. XI. p. 41.

(*Linum sylvestre*.) Art. 866. Lini *sylvestris* cathartici herba integra cum caulibus & capitulis vino albo leni calore infusa satis valide purgat serosos humores, indeque in *Rheumatismo* valde prodest; sed non nisi robustis propinanda est, quorum plurimos, ruri degentes, solo usu istius remedii curatos vidi.

(*Rhabarbarum*.) Non novi præstantius remedium quam *rhabarbarum* diu continuatum ad hunc morbum contumacem oppugnandum. Et si malum sit habituale, ejusdem *masficatio* non modo morbum tollit, sed etiam *recidivationem* præcavet.

(*Lac Asininum*.) In corporibus languidis & emaciatis, hujus morbi diuturnitate; nec non medicamentorum farragine, fractis & detritis, *lac asininum cum pulveribus testaceis*, vel saltem *dieta lactea*, plerumque felici adjumento esse potest.

(*Infus. theelactæ*.) Art. 867. Ad rheumaticos lumborum dolores potum *lactis cocti cum aqua decoctionis theæ* & mane sumptum ad ℥j. circiter, felicissime sum expertus. *Baglivius*.

(*Remedia varia*.) Art. 868. Remedia *antiarthritica* & *antiscorbutica* fere omnia hic conferunt, præcipue declinante morbo & in intervalis. *Pil. volatil. epithema saponaceum, unguent, salino-volatile* &c.

S C O R B U T U S.

Barbetti & Deckerzii sententia.

(*Scorbutus qualis morbus*.) Art. 869. Scorbutus est aliqualis *cachexie* species ab humore melancholico peculiariter corrupto ortus; in *calidum* & *frigidum* plerumque distinguitur; sed revera omnis provenit ab unica causa, nempe *lymphæ vel pituitæ crassæ*; unde tot symptomata pro temperamentorum & locorum diversitate; ex variis obstructionibus & humorum stagnationibus; Quadraginta novem diversa enumerat *Eugalenus* in suo tractatu de *scorbuto*, sed illa omnia nunquam concurrunt in uno eodemque corpore.

(*Symptomata varia*.) Conqueruntur de dolore interdum punctorio, plerumque gravativo capitis, de cordis palpitatione, angustia, inflatione ventriculi, tensione ventris; tussunt, putant se interdum suffocari; difficulter respirant, vomunt, febricitant; appetitus prostermitur; singultu, ructibus, flatibus, convulsionibus vexantur; tremunt, laffi sunt artus, maculis rubris vel purpureis aspersi, (quæ tamen non sunt multi faciendæ, nisi degeneraverint in ulcera, vel elevatae sint) adest plerumque oris pruritus, gingivarum erosio, cum sanguinis effusione, dentium vacillatione ac nigredine, halitus gravis, immo cum

cum terribissimo aliquando odore; salivatio adest multa, urina cruda & tenuis, jam vero crassa & rubra, immo fere nigra; pulsus semper inæqualis, ac ut plurimum debilis; dolores vagi; imprimis crurum, præcipue noctu ingravescentes; ulcera maligna, tumores varii generis plerumque oedematosi, sudores copiosi, ipsa atrophia, viriumque defectus, caries, & sopor profundus.

(*Est morbus frequentissimus & diuturnus, & difficilis curationis.*) Art. 870. His regionibus adeo familiaris est ut nullus fere reperiatur morbus, cui non aliquid scorbuti subsit; vere & autumnò maxime infestat, in adultis & senibus gravior est; inveteratus & hæreditarius difficillime curatur; solvitur aliquando per alvum, per hæmorrhoides, vel per urinam; aliquando in alios morbos degenerat, scilicet, *hydropem, atrophiam, apoplexiam, epilepsiam, stuporem, aut convulsionem*; interdum Scorbutici subito moriuntur, dysenteria rarissime laborant; plerumque *diarrhœa* vel *lienteria*, quæ difficulter curantur, longo temporis tractu ægros necant *hydropicos* vel *tabidos*; respiratio difficilis non adeo periculosum est malum quam vulgo putatur. Scorbutus fixam habens sedem (inquit *Waldschmidius*) raro curatur, nisi quandoque palliative: impossibile enim est sanguinem totaliter corruptum ad statum naturalem reducere. *Dieta* in hoc malo est optima medicina, de qua videatur *Sennertus* in praxi.

(*Curatio.*) Art. 871. Exactissima *dieta* medicamentis præstat, sine qua Scorbutus sensim fit incurabilis; *venæsectio* non prodest; *purgantia* fortiora nocent; sufficiunt suo tempore leniora; præparandi sunt humores *incidentibus*, inter quæ *salia volatilia* quæcunque primarium obtinent locum. *Antiscorbutica simplicia primaria* sunt, *radix raphan. sylv. oxylapath. petasidit. scorzonæ. taraxici, zedoar. angel. pelypod. belenii, lignum guaiac. sassrafr. sem. sinap. fol. cochlear. becabung. nasturt. aquat. trifol. paludos. acetos. persicar. mala aurant. acidor. pom. citri, bacc. junip. sem. dauci, gum. ammoniac. lacc. crem. tart. vitriolat. chalybs, &c.* Saccharum & saccharata omnia *Scorbuticis* nocent.

(*Vires mercurii dulcis.*) „ Omnem Scorbutum (inquit *Doleus*) feliciter intra xij. dies, Diis faventibus, tollam per *mercur. dulc.* & revera dulcificatur singulari & peculiari motu sublimatum, ut dumtaxat sudorem moveat, & nullam efficiat salivationem, cujus ope omnes scorbuti humores intra prædictum tempus consumuntur & educuntur, sed durante hac cura nihil bibendum, nisi decoctum appropriatum, & ab acidis & carne suilla abstinendum.

Art. 872. Singulorum symptomatum curam peculiarem videre licet apud *Eugalenum*, cujus hæc summa est; quod omnibus *specificis* parti affectæ dicatis admiscenda sint *antiscorbutica*.

(*Dyspnœa.*) In difficili respiratione *sp. salis armoniac. cum tinctura croci & aq. cochlear.* specificè prodest. (875.)

(*Gingivarum laxitas.*) In gingivarum laxitate & putrefactione *tinctura gum. lacc. sp. cochlear. &c.* pro lotionè, item *mistura* sequens. ʒ℥. Pulv. rad. ireos Florent. gum. lacc. ana ʒj. alum. ust. ʒj. mel. ros. q. s. *sp. salis* parum pro grato acore, m. (883. 892.)

(*Dolores vagi.*) In doloribus vagis crurum, & inter externa topica *epithema saponaceum Fulleri* maxime commendatur. (884. 894.)

(*Tormina ventris.*) In torminibus ventris convenit *sp. sal. armoniac. cort. aurant. infus. cumque sp. junip. vel sem. anisi* mixtus: externe *fo-tus*, & *linimentum* seq. ʒ℥. Ol. *lumbrior. terrest. cbamam. sp. cochlear. ana p. e.* (877.)

(*Convulsio.*) In convulsione & contractione interne convenit *sp. sal. armoniac. cortic. aurant. salu. & roremarino affusus*, item *ol. hyperic. & cochlear.* pro inunctione tendinum. (878. 901.)

(*Erysipelas.*) In erysipelate (1167.) præter externa exhibeantur *sudorifera*, ut *rob. sambuci*, *sp. ejusdem*, *bezoar. mineral. sp. sal. armoniac. cochlear. &c.*

(*Atrophia.*) In atrophia non datur præstantius remedium quam *lac caprillum spiritu aliquo antiscorbutico prius ipsi instillato.* (879.)

Charletonii sententia.

(*Scorbuti causæ insigniores.*) Art. 873. Scorbutus in his regionibus septentrionalibus est morbus *endemicus*, & maxime frequens in locis Boreæ patentibus, uliginosis, palustribus & maritimis: hoc faciunt quoque insalubres ædium calce recens obductarum expirationes; & in carcerum, fornicum, speluncarumque angustiis conclusus, nec solutus syderum luce aer. Scorbuto præ aliis maxime tentantur ii, quibus alimenta sale ac fumo indurata, crassa, viscida, terrestria, nautica, atque id genus alia, quæ nec facile digeri, nec ad statum summæ fluxilitatis cito perducì norunt, diutino in usu sunt; item quibus vina polygophora & spiritus ardentes sunt in deliciis, utpote ex quibus confertim scaturientes particulæ salinæ & sulphuræ sanguinem succumque nutrimentum foeda ranciditate inficiunt; adijce & illos, qui oxygari, omphacii, acetariorum, aceti, &c. ejusdem commatis condimentorum languenti per luxum stomacho male consulunt; acida quippe omnia strenue faciunt ad productionem *melancholiæ hypochondriacæ*, quæ scorbuto adeo affinis est, ut nonnisi gradibus quibusdam ab eo differre videatur; sub eodem censu cadunt insalubres potus, aquæ nimirum corruptæ, crassæ, sæculentæ, graves, subsalsæ, cerevisiæ, & vina vitiosa. Qui delicate vivunt magis Scorbuto obnoxii sunt, quam qui laboriose, foeminæ viris, urbani agricolis, studiosi obtusis, &c. Plures sibi Scorbutum *contagio*, quam ex aliis ullis causis forinsecus advenientibus contrahunt.

(*Causa scorbuti secundum Doleum.*) „Causa Scorbuti (inquit Doleus) est sal fixum acre in massa sanguinea, in qua latent multæ particulæ vel acidæ vel muriaticæ; acidæ quando sanguis crassior & nigricantior apparet, *muriaticæ* vero ubi consistentia amissa tota diffluit; certum est utcunque Scorbutum non semper ab una aliqua singulari & simplici causa proxima ortum suum habere ac dependere, sed sæpe à multiplici: tot enim Scorbutici species seu differentiæ dici possunt, quot sunt vitiosæ sanguinis tincturæ e salibus diversis (quæ propemodam infinitæ sunt) & horum diversimoda combinatione ortæ.

(*Remedia ad Scorbutum acidum.*) Art. 874. Acido scorbuto affectis nullum (spondemus) sive præsentius, sive certius adhibueris remedium, quam *lactis emulsionem ex amygd. dulc. decocti chinæ*, *jusculorum consummatorium* & ceteri *antiacidorum* & *analepti corum* usum ad plures septimanas productum.

(*Dyspnœa.*) Art. 875. Difficilis respiratio oritur plerumque vel a sanguine grumesciente vel ab irritatione spasmodica a salium stimulis: in priore casu conveniunt *incidentia*, *spiritus* & *salia volatilia*, *viparina*, *fmus equinus*, &c. aliquando *venæsectio* est necessaria; in posteriori casu *antispasmodica*, *spiritus castorei*, *lavendulæ*, interdum *opiatæ*. (872. 890.)

(*Diarrhœa.*) Art. 876. In diarrhœa Scorbutica pluribus indicationibus satisfacit *rhabarbarum modice tostum*, quo præmisso, cæteris omnibus

omnibus merito præfertur *crocus martis astringens cum conserva ros. rub.* (882.)

(*Tormina ventris.*) Art. 877. In torminibus ventris *lac asininum*, *caprillum*, aut *serum lactis vaccin.* adhuc a coagulo tepidum, sunt remedia proficua: his enim, post mitigata tormina primarumque viarum purgationem propinatis, non alvina tantum regio, sed totum etiam corpus perfectum *neoterisimum* consequetur; sed omnium instar sunt *aque minerales catharticae*, ut *Ebshamienses*, harum virtus est plane admirabilis (nec minores sunt vires *aquarum Bathoniensium* (872.)

(*Paralysis, stupor, &c.*) Art. 878. In paralysis, stupore, tremore &c. conveniunt remedia invigorandis corroborandisque cerebro & nervis appropriata cum *antiscorbuticis generosioribus* conjuncta, item *Balneatio in thermis sulphureis* (& earundem *aquarum potatio.*) (872.)

(*Atrophia.*) Art. 879. Atrophia Scorbutica partium nutriendarum crimine contingit. Inter *deobstruentia* haud scio an quicquam utilius datum sit *acidulis*, quæ facile in adyta mesenterii & glandularum sese penetrantes vias chylicas omni ab infarctu liberant, nec tamen ullum interim relinquunt sive caloris sive acrimoniæ vestigium; locum etiam habent *lac asininum*, *caprillum*, *juscula instaurantia ex limacum*, *cancrorum aslacorumve fluviatilium carnibus*, &c. (872. 901.)

(*Dejectiones unguinosæ.*) In atrophia scorbutica interdum contingunt dejectiones unguinosæ, quasi adipe vel oleo perfusæ, nimirum solidarum partium colliquationes sunt: æroti *hæticorum* more sunt tractandi, advocatis simul in subsidium *antiscorbuticis temperatioribus*.

Willisi sententia.

(*Scorbutus est morborum legio.*) Art. 880. Scorbutus non est affectio simplex, sed potius morborum legio, secundum vulgares appellationes dicitur *biliosus* sive *calidior* exanthematis aliisque symptomatis apertioribus se prodens, vel *melancholicus*, cujus virus quasi sub cineribus latet. Dolor ventris Scorbutico adeo familiaris est, ut juxta *idioma Germanicum Scheurbark* exinde nomen acceperit; hoc symptoma nonnullos, in mitiori licet gradu fere continuo affligit; in quibusdam vero dolores valde acuti sunt, & tanquam affectiones *colicæ* frequenter eveniunt; paroxysmo autem diutius persistente cruciatus sæpenumero in lumbos & dorsum propagantur, cujusmodi affectioni non raro *paralysis* succedit; ratio est, quoniam nervi lumbares, & mesenterii intime communicant, ac pluribus in locis inosculantur. Dolores etiam alibi frequenter sentiuntur, ut in capite, pectore, cruribus &c. Novi plures Scorbuticos dolore molestissimo subter *sternum* excitato perquam diu vexatos, ut in quibusdam nihil minus quam *abscessum* in mediastino latentem suspicarer. Cephalalgia sunt frequentissima & intolerabiles, & tibiæ dolores atrocissimi.

(*Cathartica & digestiva.*) Art. 881. Si ægrotantis constitutio sit calidior, *aloetica* & *diagridiata* vitentur, & temperatiora ex *senna*, *rhabarb.* &c. exhibeantur pro catharsi. Inter medicamenta *digestiva* merito recensentur *crem. tartari*, *tart. vitr. tinct. salis tart. elix. propriet. mixtura simplex*, &c. Tincturæ cum menstruo sequenti melius ac facilius conficiuntur, quam vulgari modo; *℥℥. vitriol. rectificat. ℥vj. sp. vin. alcalisat. ℥xvj. m.* & distilla in retorta vitrea cum ternis cohibitis.

(*Diarrhœa.*) Art. 882. Præter scorbuti curam radicalem medicus symptomatis gravioribus sublevandis subinde operam navare debet. In Diarrhœa inveterata methodo sequenti sæpe bono cum successu usus sum; imprimis purgatio cum *infuso rhabarbari, aromaticis astringen-*
ribus

tibus adjectis, instituat^{ur}, & aliquoties iterata intervallo trium & quatuor dierum: cæteris diebus sumatur dosis elect. seq. bis in die. 2℥. *Conserv. absynth. vulgar. 3vj. spec. diarrhod. Abbat. Zij. santal. alb. rub. ana 3j. croc. mart. opt. 3℥. syr. chalyb. q. s. m. f. elect. (876.)*

(*Oris vitia.*) Art. 883. Quoad oris vitia, quando caro gingivarum intumescit & fungosa evadit, valet gargarisma *Scorbuticum nostrum*; quando gingivæ putrescunt & corrumpuntur, medicamenta fortiora adhibeantur, imprimis infusio lapidis medicamentosi, & astringentia in dentium vacillatione. (872. 892.)

(*Artuum dolores.*) Art. 884. In artuum doloribus *sudorifera* cum julep. ex aq. cochlear. & sp. lumbricorum, & diuretica, item lumbrici terrestres quocunque modo usurpati frequenter juvamen præstant: aliquando tamen phlebotomia convenit. „ Infusum stercoris equi masculi, de „ coct. e lignis, gum. guaiac. &c. hic locum habent. (872. 894.)

(*Scorbuti essentia.*) Art. 885. Crepitus ossium medelam vix admittit. „ Nec mirandum; nam ex cadaverum sectionibus patet *epiphyses* „ ab ossium extremitatibus *sejungi & penitus separari*; unde sonum crepitantem inter movendum edunt. *Memoir. de l' Acad. Vol. III. p. 238.*

Pitcarnii sententia.

(*Scorbuti Essentia.*) Art. 886. Scorbutus est congeries plurium morborum natura diversorum. Ut febris est vitium sanguinis, sive omnium excernendorum, intra arterias dum fluunt, ita Scorbutus est vitium omnium aut multorum simul excretorum, dum per excretoria fluunt sua; vel est defectus aut augmentum in excretoriis canalibus. Pulsus in omnibus Scorbuticis est tardus (inter signa *pathognomonica*) ideoque generaliter *naslurtia & antischorbutica* dicta prosunt; quia talia remedia pulsui frequentiam conciliant.

(*Curatio.*) Artic. 887. Scorbuti cura optime eruitur resolvendo ipsum in symptomata, quibus constat, quorum remedia sunt nota.

(*Maculae.*) Art. 888. Pro maculis in Scorbuto exhibe *antiicterica*; nam maculae istæ sunt lividae & fere nigrae, ut in ictero nigro. (893.)

Ettmulleri sententia.

(*Signa Scorbuti primaria.*) Art. 889. Præ aliis Belgæ & Angli Scorbuto sunt obnoxii, urina plerumque est nimis flammea, vel cum arenulis istis rufis imprægnata, in summitate vari-colorata instar caudæ pavonis; jejuno stomacho frequens est *ptyalismus*. Sequentia ceu signa primaria Scorbuti recenset *Lindanus*, colorem purpureum semilunarem sub concavo oculorum apparentem, cruentationem gingivarum, foetorem oris, maculas in femoribus & tibiis, vacillationem genuum, phlogosin & exæstuationem per totum corpus.

(*Respiratio difficilis.*) Art. 890. Maxime observatu dignum est prognosticon *Sennerti* de Scorbuto: Respirationis (inquit) difficultas & pectoris angustia periculosum est malum, ob quam si medicus & adstantes suum officium non faciant, sæpe ægri *syncope* præter expectationem intereunt; si vero fortior natura morbum diutius tolerare possit, plerumque in *hydropem* incidunt, præcipue ii, qui purgantibus fortioribus subinde uti solent. Scorbutus calidus difficiliore est curationis quam frigidus; imprimis Scorbutus cum diarrhoea est periculosissimus, inquit *Eugalenus* (872. 875.)

(*Curatio.*) Art. 891. Basis curandi mali hypochondriaci & Scorbuti est vomitus in majori dosi; purgantia fortiora nocent, laxantia conveniunt; alvus enim semper servanda est aperta: de usu *martialium*

notabilis est cautela *Tachenii*; in iis, quibus viscera tumida & infarcta jam ad schirrosam naturam degenerant, minus proficua. *Acetum* est nocivum, non tamen *succi acidi* vegetabilium & fructuum. *Lac* & omnia *lacticia* in Scorbuto, præmissis universalibus, quamdiu stomachus adhuc digerendo aliquid valet, sunt optima. *Mercurialia* sunt vitanda ob metum salivationis, *antimonialia* potius sunt eligenda. Ad curam conducunt *martialia* omnia, præmissis *digestivis* & *vomitoriis*, at *sal digestivum hypochondriacum* (i.e. caput mortuum *sp. salis armoniac.* per solutionem, chrysalisationem &c. factum) *tartarus vitriolatus*, *sal. absinthii* (*pulv. hyst. Batean.*) *antibetic.* *Poterii*, *bezoar. min. elixir. proprietat.* &c. Præmissis ita *digestivis*, propinandum est *vomitorium*, inter quæ eminent *antimonialia*, *tart. emetic.* *dos. a gr. iv. ad vi.* & postea per alvum *laxantia*, inter quæ *gum. ammoniacum*, *extract. hellebor. nigr. rhabarbarum*, *mercur. dulcis* (sed parce.) Deum accessus fiat ad *martialia* & *acidulas naturales*, *amara*, & *stomachica*, *arcanum duplicatum Mynsicht*.

(*Specificæ.*) *Antiscorbutica* *specificæ* sunt, *cochlearia*, *nasurt. flammul. Jovis*, *trifolium palustre*, *radix raphani*, *oxylapath. bardan. ari.*, *semi. sinap. abies*, *junip. chin. sarsaparilla*, *sasaff. cort. Win. teran. citri*, *aurant. sp. cochlear. rob. sambuci juniperi*, *sp. sal. armoniac. & sal. volat. & sal. volat. ejusdem.*

(*Gingivarum laxitas.*) *Art. 892.* In gingivarum pathematis succus *salviæ*, *cochleariæ*, *orismarini*; *gum. lac. myrrh. alum.* utramque faciunt paginam, cui addi potest *cremor aquæ calcis supernatans* (871. 893.)

(*Maculæ.*) *Art. 893.* *Maculæ cutaneæ* sunt semper bonum signum malæ causæ foras erumpentis; interne conveniunt *diaphoretica*, *antibetic.* *Poterii*, *cinnab. antimon. tinct. coral. &c.* item *decoctum summit. pini* expectando sudorem.

(*Dolores crurum.*) *Art. 894.* Ad dolores crurum interne *sp. junip. camphor.* item *sal. armoniac. in sp. lumbricorum solut.* *Balneum* quoque ex formicis earumque cubile est egregium. (872. 884.)

(*Colica scorbutica.*) *Art. 895.* „ Est & colica quædam Scorbutica „ (inquit *Waldschmidius*) ubi ægri queruntur de intenso dolore cir- „ ca lumbos, & non in intestinis, sed in muscoli abdominis; ibi me- „ senterium afficitur, & causa morbifica hæret in plexibus nervorum „ succo nutritio depravato, sæpe terminatur in paralyfin, & cessan- „ te paralyfi redit dolor consuetus. Conveniunt *antiscorbutica*, &c. „ Ad colicam & nephritin notham *ol. amygd. dulc.* in jusculo gallinaceo, item *spermaceti*, & *opiata* cum *catharticis*, *clysmata terebinth. stoma-* „ *chica & carminativa.* (906.) De arthritide vaga scorbutica vide in- „ fra.

(*Capitis dolor.*) *Art. 896.* Ad cephalalgiam *sal volatile succini cin-* „ *nab. antimonii*, & *usus lactis.*

(*Paralysis, &c.*) *Art. 897.* *Paralysis Scorbutica*, ut & *convulsiones* & *contracturæ* curantur *vomitoriis*, *antiparalyticis*, & *antispasmodicis* cum *antiscorbuticis* permixtis. (872. 878.)

(*Febris scorbutica.*) *Art. 898.* *Febris Scorbuticæ* signa sunt omnia ea, quæ per se Scorbutum significant; palmarium interim notetur si- „ gnum, quod in febre hac adsint notabilia circa appetitum vitia, v.g. adest „ nimius, ut plurimum autem cum vomitu, aut depravatus, ut ad o- „ mnis generis falsa appetitus feratur, *obstructiones alvi* contumaces, &c.

(*Curatio.*) *Art. 903.* *Febres hæ* curantur, ut aliæ, *adhibitis et-* „ *iam*

iam antiscorbuticis, arcanum duplicatum est optimum remedium, & *sp. sal armoniac.*

Farrago Sententiarum.

(*Sydenhami Sententia de scorbuto.*) Art. 904. Scorbutus non ita frequens est morbus, ac vulgo putatur; nam multi ex iis affectibus, qui Scorbutici audiunt, sunt vel effecta morborum fientium, vel reliquæ nondum perfecte devictorum, quod facile probatur exemplo *arthritidis*, *podagræ*, atque *hydropis*: rebus ita se habentibus, methodus mædendi non adulterinis illis symptomatibus, sed ipso morbo, jamque actu existenti accommodanda est. *Sydenham*, videatur locus *m. p. 207.*

(*Vires limonum & aurant.*) Art. 905. Succum limonum aurantiorumve sunt antiscorbutica nunquam satis laudanda. „ Peritissimi, inquit *Pisso*, nonnulli *Indiæ* medicastri plus præsidii in limonibus ponunt, „ quam in *lapid. bezoart.* aut *theriaca* contra malignos morbos, & pe- „ stilentiales febres atque ipsa venena: Ego autem sine jactantia as- „ firmo, me ex nullo alio aliquo remedio simplici tot felices effectus „ in tota praxi mea observasse, quam ex limonibus. *Lister.*

(*Stranguria.*) Art. 906. Sabulum rutilum tartareum in urinis Scorbuticorum excerni solitum nephritidem spuriam sæpius inducit, quatenus angulis acutis ejusdem atomi gaudent (quod patet ex adhæensione ejus tam firma matulæ lateribus, ut nonnisi vi inde ablui possit) quibus partes nervosas vellicant, & tormenta ipsis nephriticis graviora excitant, unde quoque sæpius in stranguriam inducunt, in quo casu omnia diuretica calidiora malum exasperant, *sp. salis dulcis* tamen hic multum præstat. *Ephem. German. Anno 30. obs. 45. (895.)*

(*Remedia varia.*) Art. 907. Usus remediorum sequentium peritus non ignorat. *Æthiopis mineral. aqua limacum* Scorbut. *aq. omnium florum*, *aq. raphan. comp.* *aq. scelotyrbica*, *cerevisia Scorbutica*, *cerevisia Scorbutica attemperans*, *epithema de calce*, *expressio Scorbutica calida*, *expressio Scorbutica temperata*, *fotus podagricus*, *fotus spirituosus*, *galbanetum Sennerti*, *gargarisma contra fetorem*, *gargarism. myrrhysatum 1. 2.* *Gargarisma prunellorum*, *mistura ecphratica*, *pil. cathartic. Scorbutic.* *serum sinapium*, *succi antiscorbutici 1. 2.* *tinctura cantarid. 1. 2.* *tinctur. gum. lacce*, *tinctura antimonii*, *tinct. virginiana*, *pulv. ari comp.* *vinum viperinum*, *vitriolum Martis.*

A R T H R I T I S.

Sydenhami Sententia.

(*Podagræ historiæ accurata.*) Art. 908. Podagra, exeunte Januario aut incipiente Februario, derepente & nulla fere præensione antecedente ingruit, nisi quod ventriculi cruditate, aut apèpsia ad septimanas aliquot æger laboraverit, corporis interim intumescencia quasi ventosa & gravitate; quæ in dies augetur donec tandem detonet paroxysmus; quem paucis diebus præit torpor & quasi flatuum descensus per femorum carnes cum affectione $\sigma\chi\alpha\iota\sigma\epsilon\iota\delta\acute{\alpha}$, tum etiam pridie paroxysmi appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanus lecto somnoque committitur, hora vero secunda post mediam noctem excitatur a dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque vero calcaneum, suram aut talum hic dolor eum refert, qui ossium dictorum dislocationem comitatur, cum sensu quasi aquæ tantum non frigidæ partis affectæ membranæ affusæ. Max sequitur rigor cum horrore & febricitatione aliquali. Dolor autem hic primo remissior gradatim intenditur (pa-
ri pas-

ri passu rigor & horror recedunt) idque in singulis horis donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad varietatem officulorum *tharsi* & *metatarsi*, quorum ligamenta obsidet, perbelle accommodans: nunc tensionem violentam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram & coarctationem exprimens: ad hæc, ita vivum exquisitumque habet sensum pars affecta, ut nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubiculi a fortiori ambulatione concussionem ferre valeat; hinc mille conamina, situs tum ipsius corporis, tum membri affecti mutatione assidua, doloris sedationem incassum exambit; quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam (decurso scilicet *nycthemeri* spatio a primo appulsu paroxysmi), quo tempore æger post materiæ peccantis modicam digestionem & distillationem aliqualem, subito a dolore respirat. Jam leni madore perfusus somno concedit, a quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur, easdemque excitat tragœdias; nonnunquam etiam ambos pedes in initio occupat; postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum etiam quoad durationem; hoc tamen ubique servant, quod dolor noctu recrudescat, mane vero remittatur; atque ex serie horum paroxysmulorum constat paroxysmus, qui dicitur podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate, &c. quod in vegetioribus, & iis, quos podagra rarius invisit, diebus sæpe afflixit, duobus mensibus; iis vero qui aliquot annis podagræ fuerunt, non prius valedicit, quam ætas adultior eam fugaverit.

(*Paroxysmi progressus & terminatio.*) Art. 909. Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, quæ post separationem sedimentum rubrum, & quasi arenulis infertum deponit, nec æger ut plurimum nisi tertiam potulentorum quæ assumpsit partem per vesicam reddit, alvus item ad dictos fere primos dies constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, partium etiam non affectarum gravitas & molesta sensatio integrum paroxysmum comitantur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritus vix ferendus, maxime inter digitos, unde decidunt fursures, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur.

(*Symptomata morbi post annos aliquos infestantis.*) Art. 910. Atque hoc modo se habet podagra *regularis*, cum vero vel indebita medicatione turbetur, vel diuturnior invaserit, jam per annos aliquot, phænomena sunt multum diversa a jam descriptis; jam manus, carpos, cubitos, aliasque regiones occupat; quandoque digitos distorquens, motu paulatim privans, tandemque concreciones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam vel oculos cancerorum æmulantes: nonnumquam in cubitis tumorem subalbum ciet, fere ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur; nonnumquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili; at genu exinde petens id acius urget, artus jam habet æger ferè undequaque contractos & impeditos, ita ut claudicet, & permolestè prorepat.

(*In morbo inveterato minuitur dolor & augetur ægritudo.*) Art. 911. Animadvertendum est, quod ubi quis ad multos annos podagra laboraverit, dolor singulis paroxysmis gradatim imminuitur, tandemque ægritudine potius afficitur, quam dolore; & dolor & ægritudo quasi alternatim lacescit; DOLOR IN HOC MORBO EST AMARIS-

SIMUM NATURÆ PHARMACUM, qui, quo vehementior est, eo citius præterlabitur paroxysmus, atque insuper, & longior erit intermissio, & magis perfecta, & vice versa.

(*Neque venæsectio, neque catharsis ullatenus prodest.*) Art. 912. In podagricis quamvis qui educitur sanguis pleuriticorum & rheumatismo laborantium sanguinem ut plurimum referat; attamen *venæsectio* haud minus insigniter in hoc morbo officere ægro, quam in duobus prædictis prodesse cernitur; *catharsis* etiam iustissimis de causis damnatur. Tam in hoc, quam in aliis morbis quibuscumque, dempta sola peste, sudores prolicere non tam medici quam naturæ provincia est; ideoque curatio medicamentis *diaphoreticis* incassum tentatur.

(*Unde difficilis est curatu.*) Art. 913. In hoc morbo curando duæ sunt causæ principales præcipue spectandæ, prima est *causa antecedens*, viz. humorum indigestio a caloris & spirituum defectu orta, altera est *causa continens*, viz. humorum calor & exæstuatio; hæ duæ toto cælo discrepant, atque hinc quæ huic prosint remedia alteri obsint, unde hic affectus tam difficilis est curatu.

(*Præcipua indicatio curativa.*) Art. 914. Quæ *ventriculum roborant & concoctionem* adjuvant, medicamenta *digestiva* appellata, intentioni adimplendæ conferunt; hujusmodi sunt *radix angelic. enul. campan. & antiscorbutica*, e medicamentis vulgo cognitis *theriaca Andromachi* concoctionibus roborandis præ cæteris confert. Inter simplicia *cortex Peruvianus* primas obtinet, cum sanguinem corroboraret vegetumque reddat, si ejus grana aliquot mane & sero assumantur. Medicamenta *digestiva* modo laudata præcipue in paroxysmorum intervallis, idque longissime a paroxysmo infecuto in usum revocanda sunt majori cum fructu. Liquor sequens, utpote qui gustu ac colore jucundo est, auctori maxime arridet; 2℥. Rad. sarsaparil. ʒvj. chin. lign. Jassas. ras. C. C. ana ʒij. glycyrrhiz. ʒj. coq. in aq. font. cong. ij. per hor. dimid. deinde stent clausæ super ciner. calid. per hor. 12. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, cum primum ab igne amoveniuntur, infund. sem. anis. ʒß. post hor. ij. coletur liquor & per residentiam depuretur, &c.

(*Tophi.*) Art. 915. Tollere nodosam nescit medicina podagram; exercitatio tamen *tophorum* generationem præscindit, & etiam generatos & induratos solvit: si cuivis innotesceret medicamentum, quod & celare vellet, æque efficax in hoc morbo, ut in chronicis plerisque, ac est *equitatio* constans & assidua, opes ille exinde amplissimas facile accumulare posset. (931.)

(*Languores.*) Art. 916. In debilitate & languore ventriculi aut ventris torminibus neque *vinum gallicum rubrum* vel *theriaca Andromachi*, neque aliud quodlibet e *cardiacis* mihi hætenus notis pares habet vires, ac *vinum Canariensis* haustulus subinde deglutitus languore & ægritudine urgentibus.

(*Arthritidis retrocessio.*) Art. 917. Sin autem gravius aliquod symptoma ex retrocessu materiæ podagricæ subito ingruat, & mortem ægro minitetur, neque vino neque exercitio supra laudatis fidendum est, verum modo non caput, at partes vel naturales vel vitales ejusmodi malum impetat, ad *laudanum cum cardiacis* permixtis statim confugiendum. Signum *retrocessionis* materiæ Arthriticæ, est ægritudo ingens cum vomituritione & aliquali ventris dolore; in hoc casu congium unum liquoris *possetici*, vel alicujus istiusmodi devoro, & cum totum per vomitionem rejecerim, tum ebibo haustum *vin. Canarin. cum laudan.*

laudan. liquid. gr. xviii in lecto ad quietem me componens. Schedul. monit. p. (934.)

(*Diarrhœa.*) Art. 918. Ad diarrhœam, si *laudano* non obtemperet, unicum remedium est, ut *sudor* provocetur *methodo* & *medicamentis* huic destinatis; quod si fiat ad biduum triduumve per duas tresve horas continuas, sistetur ut plurimum diarrhœa, & morbi fomes magna vi in artus detonabit. (937.)

(*Peripneumonia.*) Art. 919. *Metastasis* materiæ peccantis in pulmonum lobos pari modo tractanda est, quo *peripneumonia* absoluta, viz. *venesectione*, &c. (941.)

(*Nephritis.*) Art. 920. Si *podagricis* superveniat *nephritis* (quod sæpiissime accidit) posthabitis aliis bibat æger magna copia *liquor. posset. cui radix* (& *fol. alth. & malv.*) *incoct. sunt.* Et injiciatur *enema*, & postremo exhibeatur *laudani* dosis grandior. (938.)

(*Therapia radicalis adhuc desideratur.*) Art. 921. *Therapia radicalis* *podagræ* adhuc in *Democriti* puteo latet: neque temere curanda est *arthritis*; quid enim est nisi naturæ providentia ad depurandum corporis profundum? ut cum *Hippocrate* loquamur.

Lisieri sententia,

(*Arthritidis causa.*) Art. 922. Ductus humori pituitoso in artubus excernendo dicati, aliquo modo labefactati, i. e. vel laxati ab improbo aliquo exercitio, maxime a cibo, ex nimia Venere, a qua tot motus articulorum convulsivi, ex frequenti usu vini &c. quibus iidem ductus vehementer resolvuntur; vel ex naturali quadam imbecillitate, qua contractioni impares sunt; vel obstructi ex aliqua longa hæmorrhagia, ex crapula & otio, humor ille ex crudo jam & lento ferro confectus, in ductibus articulorum excretoriis, moram trahendo, facile putredinem & acrimoniam concipit, & ichorosus tandem fit; ipsa denique ossa rodendo, illa tophos dissolvere potis est; quod satis constat ex ossibus cariosis vermiculato quodam opere profunde insculptis. Unde primum atrox dolor, nempe a continua distentione & dilatatione ductuum, a corrumpente humore, ex nativa autem partium istarum conformatione dolor acerbior evadit; atque hinc illi sensus stricturæ infinitæ, compressionis, ponderis, caloris urentis, lancinationis, punctiōum, rosionum, ut humor putrescens in angustis & vix dilatabilibus ductibus impactus viam sibi faciat.

(*Ad dolorem & sitim in arthritide laborantibus.*) Art. 923. Ad dolorem mitigandum (922) sequens cataplasma præscripti; ʒ℥. *Mic. panis siliginei ex lacte coct.* ℞j. *croc.* ʒ℥. *aloes succotrin.* ad pulp. sicco. & friabilem ustulat. ʒiij. *ol. lilior.* q. s. m. f. cataplasma. & alio paroxysmo atroci Emplast. virid. glyconis apud Scribonium Largum descriptum adhibui non minori cum successu. ʒ℥. *Æris ust.* *arugin. ana* ʒvj. *sal. gem. gum. ammoniac. thur. ana* ʒ℥. *aristol. rotund.* ʒj. *alum.* ʒ℥. *myrrh. galban. aloes. ana* ʒj. *cere* ʒij. *terebinth. chie* ʒi℥. *ol.* ℞j. m. f. s. a. empl. Decursu morbi ad sitim leniendam convenit hujusmodi aq. *limac.* ad ʒvj. ter in die ʒ℥. *Cochlear. hortens.* NM. ʒj *lact. recent.* ℞xij caute distillantur evitando empyreuma ad medias. Sing. ℞j. adde succ. limon. matur. ʒ℥. sacchar. cand. q. s.

(*Quantum valet abstinencia.*) Art. 924. Unica illa aurea regula de abstinencia mihi certe maxime arridet; nempe ut iis, quibus aut integra sanitas, aut longiora valetudinis bona intervalla cordi sunt, PARVA CIBATIO SUMMÆ CURÆ SIT, atque hoc omnibus hominibus,

bus, quocunque statu & conditione sint cum ipsius quoque EXERCITII loco esse potest, etiam *pedibus ex toto captis*.

Ettmulleri sententia.

(*Signa arthritidis appropinquantis & Symptomata presentis.*) Art. 925. Arthritis fere per paroxysmos affligere solet, extra quos, nisi in inveterato malo, satis commode habent ægri; quoties imminet paroxysmus, alvus fere segnior evadit, ægri molestiam quandam haud bene explicabilem circa præcordia sentiunt, consuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur, & circa articulos tensio percipitur, hinc dolor pungens, lacerans & pulsans, interdum ardens in Arthritide *calida* dicta, in hac symptomata sunt acriora, sed breviores sunt paroxysmi; in *frigida* tumor plus minus oedematosus, nec nisi post longum tempus evanescens; in incremento paroxysmi conqueruntur ægri de æstu circa regionem stomachi, hinc sitis, & appetitus prostratus. Hæc fere ipsa symptomata in dolore *ischiadico* occurrunt; si crebrius redeant paroxysmi, & vehementius affligant, insigniter debilitantur articuli. *Bacchus dicitur pater, Venus mater, & ira obstetrix Arthritidis.*

(*Qualia remedia utiliter usurpantur.*) Art. 930. Inguente podagra convenit vomitus, & forsan blanda purgatio, quæ omnino vitanda est in statu morbi. Opiata nunquam fere sunt proficua, malum contumacius reddunt, & motum naturæ impediunt. Optime conducunt *fixa acida absorbentia, volatilia, & Venæsectio* minus convenit, nisi in *ischiadico* dolore, in principio paroxysmi, decoctum e *lignis*. *Spiritus cochlear, trifolium palustre, &c.* laudantur. *Topica*, non nisi præmissis universalibus, locum habent, *narcotica* fugienda sunt; symptomata adjuncta sunt considerata, ardor, dolor, tumor, &c. *Topica* non nisi in statu morbi sunt applicanda; laudantur *sp. lumbricorum cum camphora, sale armoniaco, &c. sp. theriacalis camphorat.* mixturæ ex *calce viv. & sal. armoniac.* affundatur *sp. vini*, & huic distillato adde *camphoram*, & sic optimum habetur specificum in inflammationibus podagræ *flores sambuci* in lacte cocti dolorem leniunt. *Caro bubula* sine pinguedine mane & sero mutata dolorem compescit, & omnibus præfertur; item *stercus bubulum* cum *urina humana putrefacta*, in qua *calx viva* extincta est; *sapo Venetus* in spiritu vini solutus cum additione olei *juniperi & petrolei* insigne facit unguentum.

(*Ischias.*) Art. 931. *Vesicatoria* in malo *ischiadico* multum conducunt. Ad tophos (915.) *caseus vetus & putridus* cum decoct. *suillæ* est proficuum. In malo *ischiadico* omnibus encomiis dignum est *Poterii emplastr. de pice sulphuratum*; ʒ℥. *Pic. naval.* ʒiv. *terebinth. Ven.* ʒ℥. *mastic. succin. ana* ʒij. *sulphur. commun.* ʒ℥. m. f. empl.

Pitcarnii sententia.

(*Pitcarnii methodus.*) Art. 932. In Arthritide nihil ages urgendo *pharmaca purgantia*; vomitoria profunt, post illa *mercurius* sensim datus. Parti dolenti (923.) applicare licet *balsamum Guidonis*, aut *lintea* liquore sequenti madentia; ʒ℥. *Aq. font. fervent.* ℥viii. *arsenic. alb. vel flav.* ʒij. *calcis viv.* ʒvj. digere per hor. 24. lento igne. (Sed de ejus usu incidit mihi suspicio.) Si dolor accedat in ventriculo, uterè *N. M. condit. pulv. rad. sarsaparil. cort. Peruv. ol. cinnamon. zinzib. condit. &c.* Proderit etiam in podagra decoct. sequens ʒ℥. *Vin. alb. vel. cerevis.* ℥viii. *lact. fervent.* ℥iv. ablato coagulo immitte *bacc. oxyacanth.* ℥j coq. per hor. dimid. bibat æger ℥j. mane & vesperi.

Musgravii sententia.

(*Sedes arthritidis propria in artubus.*) Art. 933. Sedes Arthritidis propria & exoptatissima est in artubus, non in trunco corporis; posteriori autem casu, non priori mortem minatur: „ quid agendum sit, brevi comprehenditur in divini Hippocratis effato, nimirum, „ revellenda ea, quæ quo non oportet, repunt: sin autem, quo „ convenit, iis viam sternere oportet, ut singula eo vergant. „ Quando recessus fiat miasmatis Arthritici in partem aliquam internam, morbum istius partis adeo exquisitè imitatur, ut de existentia ipsius minime constaret, nisi Arthritis regularis præcesserit.

(*Indicatio generalis in arthritide anomala.*) Art. 934. Medendi indicatio generalis est, ut Arthritide anomala pars affecta quam citissime, quam tutissime levetur; accurate itaque perpenso morbi genio, juxta partem, quam occupat; & factis necessariis *evacuationibus*, optime felicissimeque curatio perficitur per materiæ in artus translationem; hoc enim est ipsum naturæ propositum. Medicamenta huic intentioni inservientia interna, *expellentia* dicta, plerumque *cardiaca*, quæ satis nota sunt; ad extrudendam autem Arthritidem nihil potentius aut efficacius invenitur quam *chalybs nutritus* (præparationem vide sis apud auctorem.) *Topica*, quæ Arthritidem artubus invitant, sunt emplastra ex *gum. caran. vel oxycoc. vel cephalic. cum pice Burgund. dimidio vel triente*, vel *ceratum viride* vulgo *Harcase*, &, si vires ægri ferant, & res in dubio versetur, *Phœnigmus* seq. 2℥. *Ferment. vet. partes ij. sem. sinap. rad. raphan. sylv. allii, cacumin. rut. fim. columbin. ana part. j. contunde cum aceto vin. alb. q. s. & redige ad spissitudinem cataplasmat.* (927.)

(*Arthritis.*) Art. 935. Si Arthritis ventriculum occupet, ibique commoretur, indicatur lene *emeticum* ex decocto *fol. theæ viridis*, vel *cardui benedicti*, vel ex *sale vitrioli*; & finita operatione, *paregoricum*; convenit etiam interdum *catharsis*, & demum Arthritis in artus omni vi depellenda est, ut ante ostensum est.

(*Colica arthritica.*) Art. 936. In colica Arthritica propinari debet *catharticum* huic morbo idoneum, & tunc *podagram expellentibus*, una cum *anticolicis*, utendum est.

(*Nota bene.*) *Fotus* etiam & *linimenta* suum habent locum: sed (quod maximi est momenti) probe animadvertendum est, & recordandum, quod *vana & frustra arthritidis regularis in artubus excitandæ sit spes omnis, quamdiu intestina fuerint immunda fecibusque onerata.*

(*Diarrhœa*) Art. 937. In diarrhœa vel dysenteria arthritica *laudano* sensim cohibendus est fluxus, & postea expellendus est cum cautela inimicus. (918.)

(*Nephritis.*) Art. 938. In paroxysmo arthritico & nephritico simul *paregorica* sunt necessaria: *adeps cuniculi* externe inunct. dolorem mirifice lenit ex senis calculosi experimento. (920.)

(*Asthma.*) Art. 939. In asthmate arthritico cura varie instituenda est pro diversitate morbi vel *sicci* vel *humidi*; arthritis (si fieri possit) in artubus excitanda est; interim in spirandi difficultatibus omnium maxime certissimeque inflationem mirum in modum cicurat compescitque *potio Coffee*.

(*Angina.*) Art. 940. In angina arthritica plurimum valet sequens *gargarisma*; 2℥. *Aq. bord. ℥j. diamor. ℥iij. sp. sulphur. per campan. quantum lingua ferre poterit. m. nihil vero pulvere sequenti præstantius efficaciusve novi*: 2℥. *Crystal. mineral. sacchar. crystal. anap. e. misce, te-*

neatur. in ore Sj. donec saliva abundaverit, tunc expuatur, & repetatur frequentissime, mirum quantum hinc saliva, &c. (941.)

(*Pleuritis, peripneumonia, &c.*) Art. 941. „ In pleuritide, peripneumonia & angina arthritica non novi præstantius remedium, quam „ infusum vel decoctum stercore equini, est etenim medicamentum „ non modo iis affectibus primario proficuum, sed etiam arthritidis „ in artus expulso fortissimus; expertus loquor. „ (119.)

(*Arthritis caput petens.*) Art. 942. Arthritis caput petens, varios ac periculosos producit affectus, cephalalgiam, vertiginem, apoplexiam, convulsiones, paralyin, &c. in his affectibus cerebrum quam citissime allevetur *evacuatione, revulsione, & in artus amandatione*; in hujusmodi casibus ægrotantium pedes in *aquam fontan. fervidam* immitti curo, ibidemque ad tempus detineri, unde capiti juvamen præsentaneum obtinetur.

(*Consulendus est author.*) Art. 943. „ Si doctissimum auctorem inspicere haud graveris, ille tibi plura amplissime suppeditabit de arthritidis anomalæ ætiologia & curatione. „

Farrago sententiarum.

(*Temperantia.*) Art. 944. Omnia remedia calculosis & podagricis præscripta inutilia propemodum erunt, nisi *vinum, Venus, otium, & crapula* temperantius usurpentur. *Baglivius.*

(*Dieta lactea.* Art. 945. Novi quosdam insigne levamen accepisse ex *dieta lactea* per tres aut quatuor menses sine ullo alimento: alios vero ex *lactis* usu deterius habuisse, viscerum obstructions contraxisse; ideoque sine prudentis medici consilio utrum conveniat, necne haud temere ineatur. *Willis.*

Art. 946. Cum ego olim articulorum doloribus vexarer (inquit *Sennertus*) & varios de ea re authores legerem, in eo omnes consentire animadverti, in arthritidis curatione, plus spei in *bona dieta*, quam in medicamentis ponendum esse.

Art. 947. Summarium præscripti celeberrimi D. B. pro Nobili quodam Anglicano ad *arthritidem eradicandam* hujusmodi fuit.

Lac novum cum duplici aqua commista repudiatis aliis quotcunque liquoribus solummodo ad potandum concedendum est; utcunque tamen *coffee & thea* modica quantitate interdum permittenda sunt, his vero forbitionibus lac semper conjungendum est. Mane cum primum expergiscaris, coctionibus plene ac perfecte absolutis, libram aquæ fontanæ bibas, suadeo; & deinde elapsis duabus horis ad jentaculum accedas; cui sufficiat lac coctum addito exiguo pane, jusculum avenaceum, cum vel sine lacte; interdum *coffee, thea, vel chocolata* cum lacte temperata, panis butyratus, &c. Prandio nihil edendum est, nisi ex avenis, hordeo, oryza vel seminibus millii paratum fuerit, radices duaci vel raparum, spinachia, fabæ vel pisæ, &c. admitti possunt in vitum; quinetiam fructibus vesci, cum maturi sint, non interdico; pyra vel mala furno cocta inter edulia minime contemnenda recensentur; sed præ reliquis panem biscoctum cum lacte commendo; aliquando sed rarius de piscibus non salitis modicum comedere licebit. Acida & falsa vitanda sunt. Coena sit lac & panis. Hora 9. vespertina vel citius cubitum eundum est. Somno indulgeas; quanto enim plus somni capis eo melius tibi cessurum est. Frictio sicca artuum mane & vesperti repetita plurimum valet: Humores enim dissipat, & nodorum ac toporum generationem prohibet: Exercitium inter primaria auxilia pono, equitatio licet potior sit quam curru vehi, ambo tamen utilia sunt,

& in

& in eorum frequenti usu esse debes. Inter exercendum solummodo caveas, ne aeri frigido ac humido teipsum nimium exponas. Si denique his non obstantibus arthritis insultum faciat, & cum vehementia desævierit, quod vix credibile est, interdum dosin laudani exhiberi, parca licet manu & non nisi premente necessitate, concedimus. a communi vivendi more ad hoc vitæ genus est tutissimus, neque est quod extimescas a subitanea mutatione; sed hoc semel instituto in eo usque ad vitæ terminum persistendum est: nam reditus ad luxum, & liberam vivendi consuetudinem periculo haud vacaret. Arthritis hæreditaria perinde ac adventitia huic regimini cedit: labes etenim morbi in gremio sanguinis latitat, & in utroque genere huiusmodi victu facillime exterminabitur. Amplexibus Venereis ne nimis obediens te geras, concubitus illicitos omnino fugias, &c.

(*Remedium celebre.*) Art. 948. Perquam celebre fuit præscriptum sequens aliquando apud Londinenses; ʒ℥. Rad. turbit. hermodact. jalap. tar. vitriolat. ana gr. xv. m. f. pulv. in haust. vin. alb. sumendus singulis mensibus. In eundem etiam usum electuarius caryocostinum a quibusdam valde prædicatur. Ast omnium vomitus podagræ est prophylacticum præstantissimum, qui potest provocari emeticorum ope in insigni humorum colluvie, ubi juncturæ admodum laxæ, & morbus præ foribus est. Atqui Podagricus est vir sui arbitrii, præceptis medicis non auscultat, sed genio in valetudinis incommodum plerumque indulget.

(*Ad nauseam ventriculi.*) Art. 949. Ad nauseam ventriculi in hoc morbo frequentem non datur præstantius remedium quam vinum Canariense radice zedoariæ medicatum. Tinctura corallii specificum audit.

Art. 950. Singularis est ista clarissimi Verulamii methodus. ʒ℥. Mic. panis albissim. ʒiij. coq. in lacte recent. Sub finem add. flor. ros. rub. ʒ℥. croc. ʒ℥. ol. ros. ʒj. m. f. cataplasma parti affectæ applicand. sub tepide; post horas tres amoveatur, & usurpetur fots sequens per horæ quadrantem cum coccineo panno vel lana ejusdem coloris: ʒ℥. Fol. salviæ m. j. ʒ. rad. cicut. ʒvj. brion. ʒ℥. fol. ros. rub. p. ij. coq. in aq. font. in qua chalybs candens sæpius extinctus fuerit ʒ℥. iv. ad ʒ℥. ij. colaturæ add. sal. marin. m℥. statim post usum fots applicetur emplast. diacalcit. cum ol. ros. malaxat Baconis hist. nat.

(*Topicum singulare Dolæi.*), „ In podagra unicum commendamus „ topicum (inquit Dolæus), repellentia vero in hoc affectu non magni facimus, quia inde plus damni quam commodi experti sumus. „ Sequens vero pro arcano hic in solatium podagricorum communi- „ care volumus, quod nunquam te frustrabit affectu, modo in tem- „ pore adhibeas; mille enim experientiis est comprobatum, quod extra- „ hat dolores podagricos non repellendo eosdem, sed morbificam ma- „ teriam extrahendo, resolvendo, & discutiendo. Quandoquidem pri- „ mordia sunt ut plurimum ab aciditate hostili, ad corporis ambitum „ delata, & artus molestante; unde podagræ character digestionem „ afficit. ʒ℥. Confect. hamech. ʒj. pulv. jalap. ʒ℥. extract. trifol. f- „ brin. ʒij. sapæ antimon. ʒ℥. sacchar. cantb. ʒvj. ol. o'ivar. q. s. ceræ „ & picis parum f. s. a. emplastrum, quod imponatur artubus do- „ lorificis quamvis inflammatis, & relinquantur donec dolores & humo- „ res evanuerint, quod mire præstat.

(*Remedia varia.*) Art. 951. Remedia sequentia interdum pro re nata in usum adduci possunt; allium conditum, aq. omnium florum, aurum mosaicum, balsamum Rhamelii, cinnab. antimonii, electuarius

caryocostinum, empl. pleuriticum, empl. smecticum, epithema saponaceum, expressio millepedum. Flores salis armoniaci martiati, fots podagricus; gum. guajac. mistura balsamica nephritica; rob. Sambuci fere specificum.

I S C H I A S.

Cælii Aureliani sententia.

(*Accurata morbi historia.*) Art. 952. Dolor Ischiadicus nunc ex manifestis, nunc ex occultis causis generatur, ut susceptione frigoris, terrena cubatione, casu aut repentino percussu, vel luxatione, Venere immodica, vel morbo aliquo prægresso. Adest primo membri affecti gravedo & difficilis motus cum levi torpore ac formicatione, in quibusdam cum vehementi, pungenti, ac fervido dolore, & ad sensum patientis tamquam serpentis convoluti motu; interdum etiam adest febris, ut se in lecto continere non valeant ægotantes; dolor in vertebro sentitur, dehinc in articulationes partium vicinarum penetrans, ad popliteum pertingens atque furam, dehinc etiam ad talum, & pedis summitatem: progressu temporis fit cruris totius extenuatio cum debilitate, & ejusdem abbreviatio, & miserrima claudicatio, quidam ambulant, capitibus digitorum gradientes, alii antrorsum, alii extrorsum, &c. Loci principaliter affecti sunt periosteum & musculorum capita sive insertiones; aliquando in abscessum tendit. Si quis velit, consulat auctorem de curatione.

Art. 953. „ Methodus medendi hunc morbum satis contumacem D.
 „ Cheynei ex suggestione præclari Pitcarnii sic se habet. Sumat æger
 „ pro virium sufficientia & ventriculi tolerantia spiritus æther. terebin-
 „ th. a ʒj. ad ʒij. vel ʒʒ. cum triplici quantitate mellis purissimi
 „ quotidie mane jejuno ventriculo ad 4. 6. vel ad summum 8. vices
 „ superbibendo haust. ij. vel iij. ser. lact. cum vin. Canarien. alterati.
 „ Intermitti potest ad diem unam aut alteram, si nauseam pariat;
 „ diebus, quibus spiritum assumpserit, hora decubitus capiat dosin
 „ Pil. Matthæi. Spiritus Æthereus est iste, qui in distillatione inter
 „ spiritum & oleum prodit. Hæc methodus doloris vehementiam
 „ (inquit author) infallibiliter aufert manente solummodo artus
 „ quadam debilitate. Et ut reliquæ penitus eliminantur, exhibenda
 „ est dosis florum sulphuris in lacte ad tempus bis in die.

Farrago sententiarum.

(*Causticum.* Art. 954. Si alia non proficiant, ad causticum deveniendum est; ipse uti soleo foliis ranunculi vel mixtura calcis vivæ & saponis liquid. hæc summopere confert. Baglivius. Folia ranunculi (inquit Ettmullerius) contusa & regioni lumbari applicata per 6. horas, donec vesicas excitent, quæ discussæ pro more suo emittunt serum acre, Ischiadicum dolorem penitus tollunt & morbum subigunt, p. 630. Applicatio foliorum renunculi flammei minoris facta fuit paulo infra genu a circumforaneo quodam ut ipse observavi plusquam triginta abhinc annis cum successu mirabili: Ego quoque plus semel idem experimentum compertum habui.

Art. 955. Radix Brion. alb. recens tusa & cum ol. sem. lini mixta & loco dolenti tepide applicata mirum in modum dolorem pacat; & renovandus est labor, donec tota materia morbifica transfudetur. Tabernienus de morborum principiis. Laudatur empl. Poterii (931.) „ Em-

„ plastrum sequens in praxi expertus sum. ʒʒ. Pic. burgund. q. s. ma-

„ laxetur cum q. s. ol. sem. sinap. per expressionem . Emplastrum Ij-
 „ chiat. quoque applicari potest . „
 (*Colocynthis* .) Art. 960. *Colocynthis clysteribus* indita privatim co-
 xendicum doloribus prodest . *Lister*. Interna eadem ac in podagra .

L U E S V E N E R E A .

Ettmulleri sententia .

(*Lues Venerea* .) Art. 961. Innotuit hic morbus *Europæis* non nisi circa annum 1494. Controvertitur, an veteribus cognitus fuerit, necne.

(*Symptomata varia* .) Primo post impurum coitum plerumque exoriantur, inflammatio præputii & tumor, urinæ ardor, gonorrhœa, bubones inguinibus, pustulæ variæ in pene & aliis partibus, atque hinc ulcera fordida & maligna, cancrofa & callosa, progressu temporis etiam ossa corrodentia, dolores atrocissimi noctu exacerbantes, nodi, tophi, calor in volis manuum, & plantis pedum, atque hinc fissuræ, excoriationes, verrucæ, condylomata, &c. circa anum, pilorum defluvium, maculæ rubescences, flavescentes, aut livescentes. Inflammatio testium, rauco, uvulæ relaxatio & erosio, palati ulcus, ozæna, tinnitus aurium, surditas, cæcitas, scabies, tabes, &c. Sed hæc symptomata omnia non cuiusvis contingunt; non raro sub larva *scorbuti* & *arthritidis* latitat. Ægri ut plurimum rem cum infectis se habuisse constanter negant.

(*Morbus varie incipit* .) Art. 962. Paulo post congressum impurum circa penem aut vulvam æstus exoritur, aut ardor urinæ, hinc inter biduum aut triduum gonorrhœa; interdum nulla succedit gonorrhœa, sed virus per cutem potius ad inguina fertur, & bubones excitat; contingunt etiam quandoque ulcera callosa in scroto ac perinæo; interdum ulcus cancrosum ac callosum inter præputium & glandem; in quibusdam intumescunt testes. Sanguis missus in lue inveterata fere maculis lividis aut colore quasi cæruleo in superficie conspici solet.

(*Maculæ ac pustulæ* .) „ In lue confirmata (ut recte observavit Lom-
 „ mius) erumpunt maculæ frequentes, æque more lentiginis exiguæ,
 „ alias rubræ, alias flavæ; in fronte quoque & temporibus & pone au-
 „ res, maxime circa radices capillorum; dein in capite, vel etiam u-
 „ niverso corpore, malignæ pustulæ, tumoresque non unius coloris ef-
 „ florescunt, quæ sponte sanantur, iterumque passim expullulant: pu-
 „ stulæ modo flavæ, modo rubræ sunt, rotundæ omnes, siccæ, puris
 „ expertes, & aridam crustam habent; ex his deinde in ambitum ser-
 „ pentibus pustulis, cutemque cavantibus, ulcus oritur virulentum &
 „ fordidum .

(*Curatio generalis* .) Art. 963. Galli facilius salivant & citius curantur quam Germani. Inter *sudorifera* eminent *guaiacum* & *sarsaparilla* & regula semper observanda est, in *frigidis* *guaiacum*, *calidis* *sarsaparilla*; decoctis *sudoriferis* non incommode addatur *antimonium crudum*. In inunctione mercuriali tutius procedunt qui artuum flexuras, inguina & alas sufficien-ter fricant; abdomen, pectus, & caput non inungenda, aut rarissime.

(*Gonorrhœa* .) Art. 964. In gonorrhœa effluit humor cum acerbodolore a locis circa penis radicem, ubi sunt prostates, primo semina-
 lis aquosus liquor; qui hinc successive flavescit, tum magis acrescit,
 tandem viridescit, aut cærulescit, non raro graviter foetet; urina cum
 acerbodolore mittitur; supervenit tumor præputii & glandis, & ulcu-
 la, interdum carunculæ in urethra .

(*Curatio* .) Præter *cathartica mercurialia* convenit privatim *emulsio ex*
sem. cannab. viridi parata, *os sepia*, *terebinthina*, *saccharum Saturni*, &c.
 mul-

multum laudatur mercurius præcipitatus viridis, & mercur. dulc. balsam. Saturni terebinthinatum, ex sacchar. Saturni & ol. terebinth. blando igne paratum, egregie conducit, ardor nimius circa renes & genitalia, ut & camphora; item infusum cantbaridum in vino, quod expertum est remedium medici cujusdam Belgie. 2℥. Pulv. cantbarid. ℥i. infund. in vin. Rhenan. ℥iij., vel iv. infusum stet per aliquot dies in loco tepido, & postea filtretur liquor, usus tempore misceantur coch. vj. vij. vel vii. cum cantbaro vini, &c. Resina ligni guajaci, balsam. de Copaibe, specificum habetur, antimonium diaphoretic. bezoardic. minérale; aqua simplex in qua argentum vivum incoctum fuerit. Injunctio. 2℥. Alq. calc. viv. ℥iv. mercur. dulc. 3℔. sacchar. Saturn. ℥j m. pro injectione. Usurpetur liquor per residentiam depuratus. (981. 126.)

Digressio de Gonorrhœis non virulentis.

(Gonorrhœa vera non virulenta.) Art. 965. Gonorrhœa vera est, in qua semen verum effluit. Succus citri, granator. limon. &c. sunt remedia optima, venerem extinguunt, præcipue si camphora & terebin. in usum adhibeantur, ut & emulsio cum sem. cannabin. sacch. Saturn. os sepiæ (specificum) cum ceruss. antimonii, balsam. copai. extract. rad. tormentil. vel ejus decoct. Lenis purgatio cum bolo mercuriali, & die sequent. rhubarb. externe fots astringentes, &c.

(Gonorrhœa notha.) Art. 966. Gonorrhœa notha, benigna dicta, non virulenta, est quando materia, non semen verum continuo effluit ex pene citra tentiginem aut pruritum venereum, diu durans sine multa virium prostratione, fluori albo mulierum respondens; gonorrhœa catarrhalis vocari solet. Partes affectæ sunt glandulæ prostratæ, nimis laxæ vel exulceratæ.

(Curatio.) Art. 967. Cura debet institui generalis, digestio rectificanda, stomachus roborandus, cruditas corrigenda, pars affecta astringentibus firmanda. Est affectus catarrhalis; rosmarinus decoct. e lignis acidulæ profunt; interdum a scorbuto pendet. Non nimis cito supprimenda est hæc gonorrhœa. Ad majorem cautelam aperiendus est fonticulus in crure.

(Ulceræ glandis &c.) Art. 968. Ulcuscula glandis & præputii curantur cum unguento diapomphol. & mercurio dulci; si fuerit cancrofa & callosa in usum venit solutio mercurii sublimat. corrosiv. in aq. plantag. Si præputium insigniter tumet, & inflammatur, applicetur solutio sacchar. Saturn. in aq. calcis, item camphora in ol. amygd. dulc. soluta 984.)

(Ulceræ vaginæ.) Art. 969. In mulieribus exulcerantur partes internæ vaginæ, & saniem plorant plus minus purulentam ac lividam, cum insigni dolore ac molestia; nec multo diversam a virorum postulant medelam.

(Pustulæ.) Art. 970. Pro pustulis & tuberculis lac virginale.

(Ulceræ.) Art. 971. Ad ulceræ sananda unguent. basil. cum mercur. dulc. (968. 982.)

(Oris & palati ulceræ.) Art. 972. Ulceræ oris & palati curantur cum gargarism. ex decoct. lign. cum melle ros. & pauco alumine.

(Ozæna.) Ozæna decoct. emol. bord. alth. &c. primo tractanda est ad removendam crustam, & postea decoct. e lignis, &c. tanquam palati ulceræ. Omnia hæc ulceræ sub litu mercuriali sponte evanescent, nec metuenda sunt ulceræ oris; nam per salivationem citius sanantur.

(Bubones.) Art. 973. Bubonum suppurationi & apertioni pro elicenda

da virulentia, mature opera danda est, interne *sudorifera* exhibenda sunt, externe *sappurantia*, quin & *cucurbitæ*, & si secundum votum haud succedant, aperiantur, *lanceola* profundius intrusa. (99. 1.)

Quot modis contagium propagatur.) Art. 974. Lues venerea contagiosa est, generatione, lactatione, contrectatione, saliva, sudore, liquido genitali, exhalatione; & qua parte contrahitur, primo se manifestare solet. *Boerhaave*.

Sydenhami Sententia.

(*Methodus salivandi.*) Art. 975. Lues confirmata non nisi per *salivationem* ab *hydrargyro* excitatam extirpari potest; ad hanc autem res licet procedere, sine ulla præcedente evacuatione aut corporis præparatione. Unguentum præscribere soleo ex *axung. porcin. ℥ij. argenti vivi ℥j.* cum hujusce parte tertia brachia, crura, tibias ad tres noctes continuas manibus suis ægrum perungere permitto, ita tamen ut nec axillas, neque inguina neque abdomen attingat uspiam. Post tertiam inunctionem gingivæ ut plurimum intumescunt, & *ptyalismus* suboritur; si vero intra id tempus haud procedat, tum *turbith. mineral. gr. viij* in *conserv. ros. rub.* exhibeantur ægro, quod remedium vomitum ciet, & *ptyalismum* suscitabit, & postea si salivatio jam incepta prius elanguescat, quam symptomata penitus disparuerint, extimulanda est subinde cum dosi *mercur. dulc.* Diætam quod spectat & reliquum ægri regimen, eadem prorsus, ac in catharsi, imperanda sunt.

(*Quid agendum sit, quando ptyalismus excitari non possit.*) Art. 976. In quibusdam reperitur *idiosyncrasia* peculiaris tam salivationis respectu, quam purgationis, ita ut methodus laudata vix gingivarum exulcerationem queat efficere, multo minus *ptyalismum* movere; in hujusmodi ægris cavendum est medico ne importunius urgeat, recalcitrante natura, & horrenda symptomata accersat; lente itaque festinet & moras trahat *mercur. dulc. ℥j.* semel in septimana exhibendo, & quantumvis salivatio ad plenum nunquam assurgat, æger tamen copiosius quam pro more solito expuet, & foetor justæ salivationis comes aderit, atque hac methodo morbus expugnabitur concessio debito temporis spatio. His rite peractis (etiamsi morbis penitus profligari videatur) quo minus recidivam postliminio patiatur æger, (utcumque bene se habeat) capiat *merc. dulc. ℥j.* semel in septimana ad 4. vel 6. vices, Unguenta mercurialia minore quantitate, quam ad excitandum *ptyalismum* sufficiat, inuncta, & diutius continuata, universa Luis venereæ symptomata tollere & morbum penitus eradicare a quibusdam perhibetur.

Listeri Sententia.

(*Origo luis venereæ.*) Art. 977. Lues venerea est morbus contagiosus ab humore aliquo venenato, fere in coitu contractus ulceribus doloribusque se manifestans. Ab *insulis Americanis*, in quibus, ante *Hispanorum* adventum, hic affectus populariter grassatus est, illum per *Hispanos* in *Europam* allatum esse, nullus jam dubitat: Credibile est a serpentino genere vel morsu vel cibo assumpto illum ortum esse. A serpente aut scorpione percussos coitu levare produnt; verum foeminas Venere ea lædi authore *Plinio*, magnum argumentum originis Luis Venereæ ab aliquo infecto venenato. Idus serpentum omnium malorum pessimum, ideo lui vener. comparandum. Quis adeo dubitet istam luem ex animalibus ortam esse: nam penis ab istis moribus venenatis vehementer intenditur; & *satyriasi*, id est, furore & libidine perciti nihil præter coitum anhelant. Ita quod vulnera-

his remedium, foeminis calamitas est; & a foeminis sic infectis invicem mares conflictantur in posterorum diram perniciem. (*de humoribus*, p. 417.)

(*Curatio.*) Art. 978. Foemina gravissimo urinæ ardore & punctationibus ibidem, item condylomatis cancrofis in pudendi labiis, non sine vehementi capitis dolore afflicta est; illam *purgavi* 4. quoque die *pilulis de duobus*, quibus æqua pars *mercur. dulc.* adjecta est; *apozema ex guaiaco*, &c. fuit pro potu ordinario, citra sudorem. Sumpsit etiam bis quotidie *cochlear. tinct. sequent. in decoct. guaiaci* ℥iv. 2℥. *Cochinel.* ℥iij. *cantharid.* ℥j. *vin. Rhenan.* ℥vj. digere in B. M. & f. tinctur. Horum usu gonorrhœa admodum virulenta, foetidum & sanguineo-viride pus effundens, integre sublata est, & duobus plus minus mensibus sine ulla ope chirurgica etiam ulcera siccata sunt, dolorque capitis ex toto desit.

(*Dolores nocturni.*) Art. 979. In doloribus nocturnis, præmissis universalibus pulvis sequens est maxime proficuus: 2℥. *Cochinel.* ℥j. off. *sepia subtilissime lævigat.* ℥ ℞. m. dos. ℥ij. 6. quaque hora decoct. *valid.* *Guajac.* *Guaiacum hydrargyri*, ut *hydrargyrus veneni*, in lue antidotum est. *Pitcarnii sententia.*

(*Gonorrhœæ curatio.*) Art. 980. In principio gonorrhœæ virulentæ purgandum est cum ptisana laxante ex *sen. sal. tart. & flor. melilot.* & bibat æger *serum lactis*; post tres quatuorve dies purgationis insumptos, si ardor urinæ & fluxus sint minores, & color & consistentia meliores, bolum assumat ex *terebinth. & rheo* per 6. aut 7. dies, si alvum laxat, id fieri solet cum euphoria. Vitanda omnino sunt astringentia; gonorrhœa enim nunquam evadet in Luem Vener. nisi nimis intempestive sistatur. *Pitcarn. in MS. (964. 987.)*

(*Methodus therapeutica.*) Art. 981. Methodus therapeutica *Pitcarnii* radicalis sic se habet; post vomitum bis aut ter iteratum exhibeatur *mercurius* per aliquot dies, bis in die; cum os inceperit dolere, abstineat se a *mercurio* per tres aut quatuor dies, tum *purgetur* alternis diebus; oris dolore cessante, iteretur usus *mercurii*; & iteretur hæc methodus, donec symptomata cessarint.

(*Infantes quomodo curantur.*) Art. 982. Ad ulcera & eruptiones leprosas decoctum pro lotionem, unguentum, aqua cosmetica, & cerevisia *guaiacana*, tanquam remedia maxime efficacia, ab authore laudantur. (968. 971.)

Harrisi sententia.

Art. 983. Infantes a nutricibus lactantibus infecti, quamquam maculis, pustulis, ulceribusque scatent, quandoque & nocturnis illis doloribus erunt excruciiati, facillime omnium restituuntur. *Farina sarsaparillæ* fere insipida, saltem nullo gustu ingrato, panatellis aut pultibus suis, ut par est, commista, addito etiam, ventriculi gratia, *santalini citrini* polline, *cathartici* debitis intercalatis, tenerimæ ætatis, ut læte nonnunquam observavi, salutem perfectam reddidit.

Blegnei sententia.

(*Ulcera penis & præputii.*) Art. 984. Pro ulceribus penis & præputii curandis apprime valet sequens lotio; 2℥. *Vitriol. alb.* ℥ij. *auripigmet. alumin. nitr. ana* ℥j. comburantur in crucibulo, ut in lapidem coeant; 2℥. *Pul. prædict.* ℥j. *aqu. calc. vin. alb. ana* ℥vj. f. solutio, &c. Egregie etiam conducit lotio sequens *Lanfranci*, maxime in ulceribus glandis & præputii. 2℥. *Vin. alb.* ℥vj. *aq. ros. plantag. ana* ℥iij. *auripigment.* ℥ij. *eris virid.* ℥j. *myrrh. aloë. ana* ℥j. misce. Ulceribus satis deterfis medicamentum affusa aqua lenius fieri debet pro futuro; & postremo cura cum

laet. virgin. vel aqua divina Fernelii (1147.) 2℥. Alumnin. rupei ʒiv. coq. in aq. font. ℥ij. ad tertias; tum 2℥. Lithar. auri ℥ss. vin. alb. ℥ss. decoquantur ad ℥j. colentur, ambæque aquæ commisceantur, & agitentur, donec albescant) perficienda est.

(*Ulcera callosa.*) Si vero ulcera fuerint diuturniora, adeo ut callosa & cancrofa evaserint, vulgo *Shankers* appellata, applicanda sunt remedia valde penetrantia, qualia *mercur. præcip. rub. lapis infernalis, aq. phagedenica*. Notandum tamen cum primum ex usu horum crustæ inducantur, statim amovenda esse *escharotica*, & *suppurantia ac digestiva* adhibenda, quibus crusta sublata, ulcera tandem cum unguent. *Devigonis* sananda esse (vid. etiam, p. 102.) internis remediis interim non neglectis.

(*Tumores œdematosi genitalium.*) Art. 985. Accidunt interdum tumores genitalium œdematosi sive crystallini; remedia externa hoc in casu debent esse *exsiccantia, discutientia*, & aliquatenus *astringentia*; talia sunt *spirit. vin. camphorat. aq. calc. cum sal. armoniac. sp. vin. cum sapone nigro, pauco pipere, zinzib. & alum. ust.* si adsint simul ulcera cancrofa & tumores duri, præcavenda est *gangræna*.

(*Phimosis &c.*) Art. 986. De phimosis, paraphimosis, & amputatione penis consulatur author, p. 112. &c.

(*Gonorrhœa.*) Art. 987. Cura rationalis gonorrhœæ inchoanda est cum *leni cathartico*, alternis diebus ex *castia decoct. senn. & crystal. mineral. in fero laet. decoct. tamarind. & alth. & rhabarb.* (gonorrhœa prope occlusa) interim exhibenda sunt quoque *diuretica maxime terebinthinata*, & postremo leviter *astringentia, aq. minerales, troc. mart. astring. in aq. simplici coct. tinct. rosar. tinct. coral. in coch. syr. ejusdem vel cydon.* Ptyalismus nunquam tollit gonorrhœam. (*Pil. de creta Palmarii. Tinctura cantharid.*)

(*Ardor urinæ.*) Art. 988. Ardor urinæ emulsionibus & ptisana seq. 2℥. Rad. alth. ʒvi. malv. ʒj. fol. acetos. p. ʒ. bord. mundat. sem. papav. alb. ana ʒij. coq. in aq. font. ℥x. ad tertias, sub finem addendo *glycyrrhiz. ras. ʒj. f. ptisana* mihi in frequenti usu; mitigari & tolli potest; interdum in graviore casu *venæsectio* est necessaria; ut in urinæ suppressione, *semicupium*; 2℥. Rad. & fol. alth. rad. & fol. malv. rad. fœnicul. apii, petroselin. eryng. marin. ana ʒij. (rad. raparum ℥ij.) herb. parietar. violar. veronic. flor. cham. melilot. genist. sambuc. ana ℥j. sem. fœnugr. lin. ana ʒj. petroselin. anis. fœnic. genist. ana ʒij. coq. in q. s. aq. font. pro *semicupio*.

) *Tumores testiculorum.* Art. 989. In tumoribus inflammatoriis testiculorum & scroti convenit *venæsectio*; *topica discutientia*, & *dolorem mitigantia* sunt usurpanda.


(*Caruncula in urethra.*) Art. 990. Carunculæ in urethra sunt curatu difficillimæ; remedium sequens optimum perhibetur; 2℥. Pulv. alumin. ust. ʒj. præcipit. rab. auripigment. æris virid. ana ʒss. unguent. desiccat. rub. ʒj. coq. ad consistentiam in mediam inter unguent. & empl. hujus portiuncula cereoli summitati apponatur, & in urethram intrudatur, &c. de consumendis carunculis vide locum p. 177. &c. & consulantur alii scriptores Chirurgici.

(*Bubones.*) Art. 991. Bubones quoquo pacto sunt suppurandi, interne conducunt *cardiaca, alexipharmaca, victus & potus generosus*; externe *suppurantia potentiora, emplastra*, potius *cataplasmata*; cum cucurbita semel vel bis in die attrahendi sunt, & cum sint satis maturi cum caustico aperiri debent, potius quam *lanceola*, & aperti diutius sunt

sunt fervandi. (973.) Ex erudito & eleganti tractatu Chirurghi Galli-
ci D. Blegny.

P. S. In hoc morbo tractando D. Turneri Syphilidis epitomen ex-
hibere in animo habui : sed defuit mihi otium : ideoque ad ipsum tra-
ctatum præstantissimum remittendus est lector , & simul admonendus
commentationes præclarissimi Boerhaavii de hoc morbo ut consulat .
Ibi habemus novam morbi ideam , novam theoriam a medicæ artis
antistite , ne oraculo dicam , traditam , & novam medendi methodum ,
saltem aliquid in hunc finem candide & modeste propositum , pace no-
stratis D. Turneri , qui etiam de facultate bene meruit . O fortunati
ter & amplius juvenes nobis senescentibus propemodum invidendi , qui
sub tanto Gamaliele vel in ipso pavimento super mattas sedentes fe-
licitatem habetis vos ipsos pulverizare pulvere pedum illius summi
scientia promicondi !

Finis Partis Primæ.



SYNOPSIS
UNIVERSÆ
MEDICINÆ PRACTICÆ,
S I V E

DOCTISSIMORUM VIRORUM

DE MORBIS

Eorumque Causis ac Remediis Judicia.

ACCESSERUNT NUNC DEMUM

Casus nonnulli oppido vari.

PARS SECUNDA

AUTHORE

JO. ALLEN, M. D.

EDITIO NOVISSIMA

Omnibus auctior, additis præterea FORMULIS remediorum ex
quinta AMSTELODAMENSI desumptis.

Τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶ γινῶναι τὰ ὁρῶνς ἑρμηνεία.
Ἰπποκράτ. περὶ διαίτης.



IN TYPOGRAPHIA BASSANENSI,
M D C C L X V I.

SUMPTIBUS REMONDINIANIS.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

2. Y. M. O. P. 2. 1. 2.

RECEIVED

1. 1. 2. 1. 2.

RECEIVED

2. Y. M. O. P. 2. 1. 2.

RECEIVED

2. Y. M. O. P. 2. 1. 2.

RECEIVED

2. Y. M. O. P. 2. 1. 2.

RECEIVED

2. Y. M. O. P. 2. 1. 2.

RECEIVED

2. Y. M. O. P. 2. 1. 2.

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



C A P. X.

Sive Fasciculus Morborum decimus.

P L I C A P O L O N I C A.

Boneti sententia.

(*Plica*
in Polo-
nia en-
demia,
&
alibi co-
gnita.)
Art.
992.



LICA capillorum morbus est *Polonis*, ple-
rumque *endemi*us, tam maribus quam fæ-
minis, imo pueris & infantibus; item in
aliis regionibus, ut in *Helvetia*, *Alsatia*, &
Belgii parte ad *Rhenum*, ac in *Hungaria* co-
gnitus, ast non tam frequens. *Hungaria* in-
terdum animalia hoc morbo infestari, præ-
sertim equos, testatur *Sennertus*.

(*Morbus gravissimus.*) Art. 993. Est autem plica affectus capillorum
gravis, malignus, periculosus, in quo capilli capitis indissolubili im-
plicatione, & agglutinatione, seu inviscatione contorquentur, cum
gravissima totius corporis artuumque tam superiorum, quam inferio-
rum capitisque læsione, antequam capilli complicantur, magno dolo-
re, sudore plerumque comitante.

(*Incurabilis.*) Art. 994. Præcisio capillorum intempestiva in sic af-
fectis est admodum periculosa. „ Nulla certa & appropriata remedia
„ hujus morbi hætenus inventa sunt, quæ illum perfecte sanare vel
„ penitus extirpare valeant, & quoniam in his regionibus nusquam
„ invenitur, supervacuum erit de illo diutius expatiari.

T I N E A.

Turneri sententia.

(*Tinea.*) Art. 995. *Sahafati* seu tinea; Angli sonant a *Scalp d' He-*
ad. Hujus affectus tres species ab authoribus numerantur, viz. *tinea sic-*
ca, *humida*, & *lupinosa*, quæ revera sunt tantum varii gradus ejus-
dem affectus; sed prætermisiss his divisionibus minus necessariis mor-
bus definiri potest;

(*Definitio morbi.*) ulcuscula manantia capitibus infantum exorta a vi-
tioso, corrosivo, aut salino humore, glandulas cutaneas exedente, quæ
tractu temporis texturam earum destruunt, & deprædantur. In primo
gradu velamine albido, sicco, furfuraceo, aut squamoso caput obducitur.

(*Ejusdem gradus varii.*) In secundo gradu caro subjacens granula-
ta apparet, ad instar seminum in ficibus transversim sectis. Gradus
tertius est ulcerosus, sicut *achores* & *favi*.

(*Ratio nominis.*) Nomen desumitur a *vermiculo tinea* ob similitudinem foraminum, quæ ab isto animali in chartis & vestimentis efodiuntur.

(*Curatio.*) Art. 996. Ad amovendam incrustationem fots & unguentum sequentia ab *Ambrosio Paræo* laudantur; 24. Rad. alth. lapath. acut. acetos. ana q. s. coque in *lixivio tenui*, cui addatur modicum aceti pro fots bis in die usurpand. unguentum conficitur ex foliis nasturtii hortensis cum axungia porcina contusis vel frixis, quod 24. horis opus absolvet; ad radicalem autem curam hujusce mali contumacissimi recte perficiendam consulatur author, qui de eo pulchre scripsit, & optima remedia ex probatissimis scriptoribus cum judicio accumulavit. „ Sed negotium adhuc abbreviare possumus: *Experientia* etenim „ edoctus sum hunc affectum sola *Pisselæi Indici* inunctione (amota „ prius incrustatione, ut ante dictum fuit) tuto accito sanari posse.

TRACTATUS DE OCULORUM MORBIS COGNOSCENDIS & CURANDIS.

(*Subjecti dignitas.*) Art. 997. Oculum nobilissimum totius corporis organon (quod emphasi quadam *lux corporis* appellatur) curam medicorum præcipuam mereri damnum illud ingens, quod a cæcitate patimur, testatur.

Series Morborum Ocularium (primariorum saltem, quibus reliqui referri possunt) a scriptoribus passim recensitorum in ordinem redacta.

Nomenclatura Morborum.

Morbi vel vitia palpebra- rum. N. XVI.	Art. 998. Emphysema, Tumor flatulentus.	
	Pladorosis, Tuberculum lividum.	1000
	Acrochordon, verruca.	1001
	Psorophthalmia, lippitudo pruriginosa.	1003
	Xerophthalmia, lippitudo arida.	1005
	Sclerophthalmia, lippitudo dura.	1007
	Scleriasis, lippitudo schirrosa, livida.	1008
	Tracoma, asperitas interna.	1009
	Trichiasis, pilorum vitium.	1011
	Madorosis, defluvium pilorum.	1012
	Anchyloblepharon, coalescentia palpebrarum.	1014
	Lagophthalmia, superior palpebra justo brevior.	1014
	Atoniatonblepharon, defectus quoad motum.	1016
	Hippos, oculi nictatio.	1017
	Ectropium, inversio palpebræ inferioris.	1018
Morbi Tunicarum & Hume- rum. N. XIV.	Phthiriasis, pediculatio.	1020
	Ophthalmia, inflammatio oculi.	1021
	Oedema, tumor œdematosus.	1023
	Hypopyon, sanies sub cornea.	1030
	Phlyctenæ, pustulæ miliares.	1032
	Anthracosis, carbunculus oculi.	1039
	Synchysis, humorum confusio.	1040
	Pterigium, unguis oculi.	1041
	Proptosis, ruptura corneæ.	1042

Morbi ac
vitia reli-
qua in
prioribus
classibus
minus
comprehen-
sa. N. xv.

Rhexis ruptura tunicarum cum humorum effluxu.	1047
Oule, cicatrix, leucoma, &c.	1049
Hyposphagma, Sugillatio.	1052
Hypochyma, suffusio, vel cataracta.	1054
Glaucoma, mutatio humoris crystallini in glaucum co- lorem.	1062
Epiphora, catarrhus oculi.	1064
Proptosis, exitus oculi fere ex orbita.	1069
Atrophia, tabes oculi.	1073
Mydriasis, pupillæ dilatatio.	1071
Meiopsis, pupillæ angustia.	1072
Plege, oculorum vulnera & contusiones.	1073
Elcos, ulcus oculi.	1074
Paralysis, musculorum resolutio.	1078
Strabismus, oculorum distortio.	1790
Encanthis, excrecentia carnea.	1018
Anchilops, agilops, & fistula lacrymalis.	1083
Amblyopia, hebetudo visus.	1085
Amaurosis, gutta serena.	1088
Myopia, propinqua visio.	1093
Presbytia, affectus priori contrarius.	1094
Nyctalopia vitium duplex infra videndum.	1095

Emphysema.

(*Emphysema*.) Art. 999. Emphysema sive oculi inflatio est Tumor flatulentus palpebrarum citra coloris mutationem subito accidens: in corporibus cachecticis & scorbuticis est affectus levioris momenti. (vid. Emphysema 1298.)

Pladorosis.

(*Pladorosis*.) Art. 1000. Pladorosis, *sarcomatis* quodammodo species, tumorum ob similitudinem vocata, est tuberculum lividum in palpebris nascens, non in margine, sed frequentius in medio cili superioris, doloris expers; est Tumor in *cista* contentus, sicut Atheroma, Neatoma, & meliceris; quæ in palpebris etiam quandoque accidunt. Hi Tumores extirpati haud difficiles sunt. (vid. Art. 1304.)

Acrochordon.

(*Acrochordon*.) Art. 1001. Acrochordon, sive *verruca* oculi latiori sensu pro excrecentia præternaturali accepta, est vitium multifarium, viz.

(*Hydatis*.) 1. *Hydatis* in superiori palpebra quæ est excrecentia substantiæ pinguis, infantibus maxime familiaris, quæ in maiorem molem quam reliquæ, accrescere solet, unde tota palpebra quandoque oedematosa fit; si sit recens & parva, sæpe sponte evanescit, vel medicamentis facile curatur.

(*Crithe*.) 2. *Crithe seu Hordeolum*, quod est tuberculum in summa palpebra ortum, prope cilia, quod grano hordei simile est, unde nomen mutuatur: Foveatur cera alba, vel adipe Gallinæ, vel saliva jejuni, vel corpore musci abjecto capite fricetur, vel sanguine co-
mbæ vel perdicis. Si omnia frustra, sectione opus est.

(Grando.) 3. Chalazion seu Grando, quæ ab Hordeolo parum aut nihil differt, nisi forma externa, & forsân quod sit aliquanto durior.

(Tophus.) 4. Lithiasis, sive Tophus, cum materia verruca contenta ad cretæ vel lapidis substantiam accedit.

(Curatio.) Art. 1002. Hæc omnia Tubercula in cistis continentur, ut plurimum operatione manuali extirpanda sunt: nihilominus vero recordandum est, has operationes; utcumque leviores videantur, non sine cautela, temere suscipiendas esse.

Psorophthalmia.

(Psorophthalmia.) Art. 2003. „ Psorophthalmia sive Lippitudo truriginosa est morbus palpebrarum Psoræ in reliquo corpore non multum abfimilis, ab acri & mordaci humore proveniente, palpebrarum margines leviter inflammante, quandoque in tuberculis minimis erumpente, alias farinacea vel pruriginosa scabie incrustante.

(Curatio.) Art. 1004. Est malum contumacissimum & curatu difficilimum, præcipue si fuerit inveteratum. Ut curatio regularis instituat, imprimis mittendus est sanguis, & deinde exhibendæ sunt doses aliquot calomelanos alternis vel tertiis noctibus; & bibendæ sunt aquæ minerales catharticæ singulis auroris, quales sunt *Ebshamenses* & nostrates *Alfordenses*, *Lidfordenses* vel *Holtenses*. „ Interim foveantur oculi quotidie fotu sequent. ʒj. Fol. ros. rub. sambuc. ana Mj. sem. lin. fœnugr. ana ʒij. carui ʒj. coq. in q.s. aq. & vin. alb. ad ℥. pro fotu bis vel ter in die usurpand. Inflammatione & humorum acrimonia in hunc modum sublatis vel lenitis demum palpebrarum liniment. sequent. illinantur. ʒj. Ungu. Pom. ʒj. stor. Sulph. ʒss. Camphor. ʒj. ol. ros. q. s. M. vel cum Infus. sequent. humectentur bis terve in die. ʒj. Fol. Nicotian. opt. ʒj. flor. rorismarin. P. 1. superaffund. aq. calcis bullient. ℥ss. infund. per hor. quadrant. & coletur. Valere potest etiam unguentum Ophthalmicum Pharm. Londinens.

Xerophthalmia.

(Xerophthalmia.) Art. 1005. Est etiam genus aridæ Lippitudinis, quod ξεροφθαλμία Græci appellant. Sub hoc neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam fere levi, ac prurigine graves sunt, & palpebræ citra duritiem ullam noctu prægravi pituita inhærescunt.

(Curatio.) Art. 1006. „ Quoad curam præmissis præmittendis, quemadmodum in quibusdam similibus oculorum morbis, Celsus commendat vipam oculis nostru apponendam; nec video quid panis rosti oleo appropriato aliove liquore idoneo imbuti applicationem prohibet; fotus emolliens in Articulo de Psorophthalmia memoratus, hic etiam locum habet.

Sclerophthalmia.

(Sclerophthalmia.) Art. 1007. Sclerophthalmia est Lippitudo dura, sicca, dolorosa, callositatem crassam in palpebris efficiens, earumque motum valde impediens. Ad effectus alterutriusque priorum fere semper quoad medendi rationem referenda est.

Scleriasis.

(Scleriasis.) Art. 1008. Scleriasis vel scleroma oculi est durities palpebrarum scirrhusa; vix a sclerophthalmia differt nisi gradu, unde prorsus malum incurabile evadit.

Tracoma.

(Tracoma.) Art. 1009. Tracoma est interna palpebrarum partis aspe-

asperitas, cum pruritu & rubore; sæpe & pustulis semen milii referentibus, ab humore acri: Gradus ejus sunt *sycosis*; & *tylosis*.

(*Curatio.*) Art. 1010. Præter generalia, *revellentia*, *intercipientia*, *topica* sint *mollientia*, postea *refrigerantia*, ultimo *detergentia*. Paræus seq. instar omnium esse scribit; si parum *vitrioli* in multa *aq. ros.* solvas.

Trichiasis.

(*Trichiasis.*) Art. 1011. *Trichiasis* vel *Phalangosis* est vitium pilorum in ciliis, duplici ordine crescentium, vel saltem introrsum spectantium, atque ita oculum lædentium: *Ophthalmiam* non raro inducit. Forcipe evellendi sunt hi pili nocentes, si fieri possit; secus cura non est expectanda.

Madarosis.

(*Madarosis.*) Art. 1012. *Madarosis* sive *Ptilosis* est *defluvium pilorum* vel *palpebrarum glabrities*; ex vehementia alicujus morborum trium supra recensitorum plerumque oritur, viz. *Psorophthalmie*, *Xerophthalmie* vel *Sclerophthalmie*.

Anchyloblepharon.

(*Anchyloblepharon.*) Art. 1013. *Anchyloblepharon* est palpebrarum inter se invicem vel inter ipsas & tunicam conjunctivam *coagmentatio* vel *potius coalescentia*. Interdum (ut ajunt) est vitium infantibus connatum; sed frequentius ob incuriam in curandis ulceribus vel aliis quibusdam oculorum morbis provenit. *Coalescentiæ* præternaturales manu chirurgica cum cautela separandæ sunt; & oculus tanquam in vulneribus & ulceribus topicis appropriatis tractandus.

Lagophthalmia.

(*Lagophthalmia quid.*) Art. 1014. *Lagophthalmia* est cum superior palpebra justo est brevior: vel nativa est, vel a cicatrice vel convulsione; vel cum infantes in cunis sursum vel retro semper spectant.

(*Curatio.*) Art. 1015. Curatur *mollientibus*. Si a cicatrice, sectio fit supra eam figura *falcatae lunæ*, in plagam *litus* injiciendus est. Sed, revera est malum ut plurimum prorsus insanabile.

Atoniatonblepharon.

(*Atoniatonblepharon.*) Art. 1016. *Atoniatonblepharon* est affectus palpebræ superioris ex impotentia musculi attollentis ortus, hinc motus ejusdem superne in totum amissus est; provenire potest a *paralyti*; (novi quosdam a *nativitate* sic affectos) a vulnere vel contusione gravi, discissis scilicet istius musculi fibris: hujus rei documentum habemus satis notabile ac æque deplorandum in insigni quodam *Baronetto Anglicolis* fere omnibus noto ex ictu infelici calcis equinæ. Fœmina quadam a *fistula lacrymali*, qua aliquandiu afficiebatur, ope chirurgica sanata, hunc defectum in supercilio contraxit, &, quod mirum videatur, idem in nepotem traductus est, nimirum virium *imaginatio* nis impressione: filia etenim, cum prægnans esset cum matre prædicta cohabitans, & intuitu ac consuetudine quotidie utens filium peperit similiter oculo affectum & insanabilem mansurum. Et fatendum est quidem *Atoniatonblepharon* a quacunque causa oriundum esse prorsus incurabile, neque curatio sectione, ut nonnulli suadent, temere tentanda est, ne gravius malum, nempe *Lagophthalmia* accersatur.

Hippos.

(*Hippos.*) Art. 1017. *Hippos* est instabilitas palpebrarum, cum palpebræ inordinato motu continuo clauduntur & aperiuntur, hujusmodi nictatio ut plurimum est hæreditaria; interdum vero ex mala

consuetudine comparatur, vel a gravi aliquo affectu, ut terrore, ira, vel timore accidit: sub curam medicam proprie dictam nunquam cadit.

Ectropium.

(*Ectropium.*) Art. 1018. Ectropium est affectus inferioris palpebrae, quae invertitur, & deorsum trahitur, ut interna pars cum deformitate videatur, & instar rubrae carnis appareat; neque enim superiori committitur, sed pendet ac hiat. A paralyti, convulsione, vel vulnere male curato plerumque oritur.

Art. 1019. Hoc curant *astringentia* (inquit *Forestus*) in aqua ros. in qua ferrum ignitum sit extinctum; seq. saepe expertus est, ℥℥. Butyr. rec. diligenter lot. in aq. commun. & postea in aq. plantag. vel ros. ℥i℥℥. tutiae præp. & in aq. ros. lot. aloe in aq. plantag. lot. sirop. alb. cum opio ana ℥i℥℥. camphor. lot. ℥j. f. ung. quo vesperi inunge & aq. calida ablue. De operatione Chirurgica vide Celsum.

Phthiriasis.

(*Curatio.*) Art. 1020. Phthiriasis sive palpebrarum pediculatio est vitium in quo pediculi inter pilos nascuntur. Malum est (inquit *Sennerius*) minime contemnendum: acres enim fluxiones concitat, & oculi tandem ab iis valde laeduntur; idem varia medicamenta enumerat; sed non opus est, ut hic recenseantur; nam sola inunctione saponis nigri pediculi cujuscumque generis facili negotio necandi sunt, vid. Art. 1569.)

Ophthalmia.

Riverii sententia.

(*Morbi definitio, & divisio.*) Art. 1021. Ophthalmia sive Lippitudo est oculi inflammatio cum tumore, rubore, & dolore; levis inflammatio *phlogosis* appellatur, quando utraque palpebra inversa sit, ut vix ab iis oculi contegantur, rubrumque magna ex parte iridem occupet. Alia est ophthalmia *sicca*, alia *periodica*. Elegantem hujus affectus descriptionem habemus apud *Longium*; „ Vehemens oculos urget inflammatio cum multo dolore, & tensione, & tumore & ardore & rubedine; interdum etiam cum tanta punctione, & oculi tanquam ab infixa acu aut spina stimulari videantur; fervente humore implentur, sequiturque pituita modo paucior, modo uberior; sed & sordes quaedam majoribus angulis inhærescunt; & ubi gravius est malum, vicina etiam loca ad malas usque attolluntur, circum circa arteriae vehementer pulsant; vasa sanguifera tenuia urgent, conspicuaque redduntur, quæ per sanitatem in albo fuerant obscura.

(*Curatio.*) Art. 1022. Venæsectio docente *Avicenna* usque ad lippithymiam celebranda est; cucurbitule scapulis & spinæ dorsii affigendæ; catharsis lenientibus instituenda. Remedium sequens inflammationem sedat, & fluxionem cohibet. ℥℥. Alb. ovi unius agitetur cum frusto aluminis satis magno, donec unguenti consistentiam adeptum sit, quod extendatur super linteam, & oculo tepide applicetur, post horas 2. vel 3. auferendum est, ne humores nimis astringat. Unguentum fieri potest ex butyro & succo nicotianæ simul coctis maxime efficax. In declinatione collyria magis resolventia usurpanda sunt, ut ℥℥. Sarcocol. nutrit. i. e. per plures dies in lacte macerat.) tutiae præparat. ana ℥i℥℥. aloe ℥j. myrrh. ℥℥. mucilag. sem. fœnugr. ℥℥. aq. fenic. euphras. ana ℥i℥℥. m. f. collyr.

(*In morbo inveterato.*) In ophthalmiis inveteratis, cum alia remedia

dia non sufficient, ad *mercurialia* tanquam ad *sacram anchoram* con-
ugiendum est. In *graviori casu* convenit *Setaceum*; aliquando etiam
masticatoria, & *decoctum e lignis* prosunt.

Cowardi sententia.

(*Ophthalmia humida & sicca.*) Art. 1023. *Ophthalmia* est inflam-
matio tunicae adnatæ cum dolore & ardore torquens. Optime dividi-
tur in *humidam* & *siccam*, prout scilicet cum *maiore vel minore hu-*
moris profluvio stipatur. In *humida* vel *ophthalmia sicca* oculus
quidem intumescit cum dolore quodam, leni rubedine, & pruritu, &
gravitate, & cum *levi etiam humoris fluxione* per vices saltem, non
enim datur *ophthalmia absolute sicca*.

(*Prognosis.*) Art. 1024. *Copiosiores lacrymarum effusiones*, ut mor-
dices, *ophthalmiam non diutius duraturam* indicant. *Ophthalmia la-*
brantem alvi profluvio corripit bonum est, inquit *Hippocrates*.

(*Curatio.*) Art. 1025. Ut recte instituat^{ur} *ophthalmiæ cura a venase-*
ctione incipiendum est; conveniunt etiam *cathartica mitiora*, privatim
aque minerales purgantes, vel *sal mirabile* in *aqua communi solut*.

(*Varianda est pro ratione morbi stadiorum.*) Quoad *topica* confide-
randus est præ omnibus morbi status:

(*In principio.*) In principio, factis debitis *evacuationibus*, ℥℥. Aq.
euphrag. fœnic. dulc. ana ℥j. tut. prepar. ℥℥. trochisc. alb. rhas. ℥j.
f. *mistura* ℥℥. Lact. feminin. ℥j. succ. fœnicul. dulc. ℥℥. camphor. ℥j. al-
bum ovi unius, probe conquassando misceantur, & redigantur in pul-
verem forma cataplasmati applicand. Huic usui quoque interserviunt mucilagi-
nes *seminum cydon. psyl. papav. &c.* quæ sæpius renovandæ sunt, ne
acorem contrahant.

(*In augmento.*) In augmento ℥℥. Aq. Plantag. rosar. pallidarum
ana ℥j℥. sacchar. saturn. vel ceruss. lot. ℥j. s. p. sal. armon. ℥℥. f. f.
a. *mistura*. ℥℥. Aq. solani ℥ij. succ. sedi ℥℥. opii thebaici gr. ij. al-
bum ovi q. f. conquassando probe f. *mistura ophthalmica*. Si comi-
tetur epiphora, sine *vitriolatis commixtis* incassum laboramus.

(*In statu.*) In statu *resolventia remedia repellentibus* prævalere de-
bent, inquit *Riverius*, præcipue *sotus e flor. sambuci parat. discutien-*
di gratia, sed mallet ego sequens adhibere, ℥℥. Fol. euphrag. fœnic.
ana Mj. semin. fenugr. aloes lot. ana ℥ij. aq. font. pauco aceto acescen-
tis (ita ut gustu leviter deprehendi poterit) ℥℥. coquantur simul ad
dimid. consumpt. colatura servetur ad usum.

(*In declinatione.*) In declinatione sola *sarcocolla*, uti suadet *Sen-*
nertus, maxime conandum est, si *ophthalmia sordes reliquerit*, quod
priusquam aliquod applicueris *medicamentum ophthalmicum*, penitus
eluantur seu detergantur.

(*Ophthalmia sicca.*) Art. 1026. In *ophthalmia sicca emollientia &*
lenientia perpetuo intermiscenda sunt, ne *discutientium & exsiccantium*
medicamentorum usu inflammatio asperior & intensior reddatur.

Pitcarn. in MSS.

(*Ophthalmia interna.*) Art. 1027. *Ophthalmia externa* diligenter di-
stingui debet ab ea, quæ simul est & *externa & interna: interna est*
inflammatio retinæ, quam nemo (quantum scio) descripsit; dabo
itaque signum pathognomonicum, & in praxi utilissimum: nam
si signa *externæ ophthalmiæ* adsint, viz. rubor, calor, dolorque, &
nihil aliud visui se offerat, est solum *ophthalmia externa*; at si præ-
ter illa *externa signa* videantur *ophthalmico oculis suis obversari*
muscæ in aere volitantes, pulvisve quilibet obscurus vagare, aliarumve

terum incerta simulacra, tūc erit ophthalmia *interna externa conjuncta* (V. S. *copiosa*.) Art. 1028. Nullus est morbus, qui natura sua *venæsectionem* sapius postulet, quam ophthalmia. „ Et ex observatione „ quorundam Chirurgorum Gallicorum constat unam Arteriæ Tempo- „ ralis Sectionem plus valere ad inflammationem minuendam, quam „ duas vel tres iteratas venæsectiones.

Farrago sententiarum.

(*Epidemica*.) Art. 1029. Interdum ophthalmia est *epidemica & contagiosa* ex aere inclementiori. In curanda ophthalmia aliquando ap- prime convenit *venæsectio* in pede ob majorem revulsionem. Ubi hu- mores sunt acriores & corrosivi, collyriis addenda sunt remedia *fixa metallica*, viz. *tutia preparata*, *lapis calaminaris*, *cerussa sacchar. saturni*, imprimis *flores Zynci*, & *flores Jovis*, quos *Barbette* insigniter commendat. In levi inflammatione frustum *carnis vitulinæ* vel *bovinæ* applicatum morbum discutit. *Ettmull.*

(*Prognosis*.) Art. 1030. Ophthalmia ab uno oculo ad alterum facil- lime, ac citissime frequenter transit. Tumor, sicut aliarum partium *Phlegmones*, vel medicamentis discutitur, vel ad suppurationem & disruptionem vergit, & exinde ulcera consecutaria, vel denique, quod pessimum est, ex intempestivo & imprudenti frigidorum Topicorum ac repellentium usu *gangrænescit*. Medici præstantiores uno ore mo- nent, ne topica in principio ophthalmiæ applicemus; multi enim cæ- ci facti sunt medicamentorum copia.

(*Ophthalmia scrophulosa*.) Art. 1031. „ Ophthalmia frequentissime „ est *scrophulosa*; quo in casu præter *evacuantia* remedia *mercurialia* „ & *specifica* exhibenda sunt, item *millepedes* & *herb. euphras.* in cere- „ visia infus. pro usu communi per longum tempus; sed præ omni- „ bus, quocunque mihi hætenus innotescunt, *aquæ minerales cathar- „ ticæ*, quales sunt *Ebeshamenses* & nostræ *Alfordenses*, *Lidfordenses*, „ *Holtenses*, &c. diutius epotæ morbum hunc pertinacissimum subigunt, „ aut saltem inducias paciscuntur; ut aliquoties observavi. Pro usu „ externo collyrium sequens, ℞. *Mercur. dulc.* ℥ij. teratur in mortario „ lapideo affundendo *aq. ros.* ℥ij. per 4. vices, & agitetur pistillo fer- „ reo candenti toties calefacto. Prodest interdum *cataplasma de pomis* „ *Fulleri*, & etiam *fotus* sequens *Boyleanus*, ℞. *Flor. melilot. sambuc. „ calend. ana* Mj. *sem. lin. fœnugr. cymin. psyl. cydon. ana* ℥ss. *hord. „ parlat* ℥ss. coq. in *aq. font.* & *vin. canariens.* ana p. æ. ad ℔ij. „ pro fotu in doloribus magnis.

(*Virtus Æthiopis mineralis*.) Art. 1032. D. Cheyne in Tractatu suo de Arthritide testatur *Æthyopem mineralem* larga dosi bis in die sum- ptum diuque continuatum spem Medici nunquam destituere in cura Ophthalmiæ inveteratæ, immo etiam si *Scrophularis* sit. p. 50.

Cataplasma sequens *Ettmulleri* in gravissimis inflammationibus do- lorem sedare solet; ℞. *Pulp. pom. dulc. assat. q. v. alb. ovi unius cum* „ *sacchar. crystal.* bene conquassat. *camphor. gr. xij.* misce.

Stercus vaccinum more Cataplasmatidis tepidum ab animali oculo ap- positum Ophthalmiæ mederi dicitur. Ex *Ephemer. Leopoldin.*

Oedema.

(*Oedema*.) Art. 1033. Oedema oculi est inflatio sive Tumor Oede- matosus in albo oculi, i. e. in tunica conjunctiva sine coloris muta- tione, valde prominens; est malum satis conspicuum. Cum pruritu mor- daci

daci plerumque incipit, tanquam locus idus esset *spiculo apis vel cuculicis morsu*, frequentius in æstate quam hyeme accidit. *Banister.*

Art. 1034. „ Est etiam alia species Oedematis oculi minus recte a quibusdam authoribus sic vocati, quod nihil aliud est quam Emphysema in palpebris contingens: horum posterius frequentissime vidi, & etiam prius semel vel bis conspexi; sed hoc ad alium Articulum pertinet. (Art. 999.)

(Curatio.) Art. 1035. Ad hujus curationem ut recte fiat, præter alias appropriatas evacuationes *cucurbitulæ* cum scarificatione humeris sunt affigendæ; topica quod attinet, *fotus* ex discutientibus *Vino & Aqua incoctis* sunt proficui, ut etiam *Mucilag. sem. lin. & fœnugr. cum solutione Myrrb. & aloe in Aq. rosar.*

Hypopyon.

(Hypopyon.) Art. 1036. Hypopyon est collectio puris sub cornea (secundum *Kennedy* in ophthalmographia sua *inter corneæ laminas*) ab ophthalmia vel contusione violenta plerumque ortum ducens. Intentiones curativæ sunt doloris sedatio & puris evacuatio per discutientia, &c. *Coward.* „ Si materia purulenta discuti nequeat, ipsa cornea lanceolæ mucrone caute & prudenter aperienda est, quæ operatio periculo vacat, neque semper post se cicatricem fœdam relinquit. Incisione facta, & pure expulso oculuseandem medicationem postulat, ac in vulneribus oculorum vel post cataractæ detractionem.

Phlyctenæ.

Cowardi sententia.

(Phlyctena quid.) Art. 1037. Phlyctenæ sunt ulcera nunc in adnata, nunc in tunica cornea emergentia, velut tot minimæ vesicæ aqua repletæ, quales solent aquæ ferventis in aliquas corporis partes affusione excitari, vulgo apud *Anglos Blisters in the Eyes* appellantur, & instar granorum *millii* apparent, & cum usitatus ab acri & corrorente humore producantur, vehementem dolorem & laniationem pariunt. Hæ pustulæ in tunica cornea *albide* sunt, in adnata rubescentes.

(Indicationes curativæ.) Art. 1038. Præmissis rite evacuantibus, discutientia & exsiccantia conveniunt, quæ varianda sunt, prout morbus sit in augmento, statu, vel declinatione. „ Detergendæ sunt Phlyctenæ cum *melle rosar. addito pauxillo unguent. Egyptiac. vel cum pulvere nicotianæ* (cum cautela usurpato.) Post deterfionem sanandæ & exsiccandæ sunt cum *Collyrio ex Aq. plantag. & Trochisc. Alb. Rhas. Kennedy.*

Anthracosis.

(Anthracosis.) Art. 1039. Anthracosis sive Carbunculus oculi est Tuberculum gravissimum in oculo ex inflammatione nascens, & ad Ophthalmiam referri potest.

Synchysis.

(Synchysis.) Art. 1040. Synchysis est humorum oculi confusa admixtio ab ictu, vulnere, vel contusione violenta, vid. vulnus seu contusio oculi.

Pterygium.

Ettmulleri sententia.

(Morbi descriptio.) Art. 1041. Pterygium, vel (Latinis) Unguis, seu oculi pannus, est tunica quædam præternaturalis ab uno oculi angu-

li angulo, frequentius interiori, enata; quæ successive accrescendo tandem ad pupillam pervenit, interdum est tenuis, albida, interdum crassior, & carnosior, aspera, dolorosa, imo cancroso, quæ non est attingenda.

(*Curatio.*) Art. 1042. Commendatur ablutio oculorum cum proprio lotio matutino; usurpanda sunt remedia *abstergentia*, ut *saccharum cand.*, *os sepiæ*, *crocus*, *vitrum*, vel *butyrum Antimonii*, *succus chelidon. maj.*, *vitriol. alb.* In malo pertinaciori tuto confugiendum est ad *Mercur. sublimat.* item *succus formicarum rub. express.* & cum aq. ophthalmica appropriata permistus commendatur.

(*Differentia.*) Art. 1043. Ungulam oculi distinguere solent in *membranosa*, *varicosa* & *adiposa*; membranosa, alias panniculus appellata, est excrescentia carnosae ac nervosae, quæ operationem valde dubiam & incertam admittit; nec tractabilior est secunda species cultro tentanda, propter insignem venarum dilatationem & turgentiam; ultimam adiposam scilicet coloris albicantis & substantiæ quodammodo pinguis, reliquis duobus benigniorem tuto extirpare licet, de operatione consulantur *Author*, ut etiam *Celsus*.

(*Curatio & Prognosis.*) Art. 1044. Si Pterygium sit recens, *erugine*, *alumine usto*, *sacchar. cand.* &c. absumi potest; fel animalium fere omnium valde commendatur. Pterygium revera est malum periculosum & curatu difficillimum; est etiam frequenter contagiosum ab uno oculo in alium transiens & fere semper metus est, ne cancrosum evadat.

Proptosis.

(*Proptosis.*) Art. 1045. Proptosis seu Straphyloma est revera *Hernia oculi* & isto nomine designari debet: disrupta enim tunica cornea quocunque accidente uvea seipsam protrudit, Tumorem vel *Ramicem* faciens, qui a similitudine aliquali rerum quarundam varia apud Græcos sortita est nomina, uti *Straphyloma*, *Melon*, *Helos*, *Myocephale*, &c. (Vid. Art. 1069.)

(*Curatio.*) Art. 1046. Quoad curam in principio haud incongruum erit experiri quid valent *Collyria astringentia*, si ex horum usu spes frustretur, ad chirurgicam operationem accedendum est, nimirum ad evacuationem humoris aquei per *paracentesin*, quæ periculo vacat; iste enim humor de novo supplebitur, & vulnusculum curatu non est difficile.

Rhexis.

(*Rhexis.*) Art. 1047. Rhexis est Tunicarum oculi ruptura cum humorum effluxu a vulnere, contusione violenta, vel ingenti exulceratione orta, cæcitatem perpetuam inducit, si humores omnes emanarunt. Nihilominus vero Globus oculi in hoc casu quandoque humore aquoso replebitur, utcunque tamen haud usque ad dimensionem naturalem: in hoc statu oculo artificiali vitreo deformitas eleganter refarcitur. Si solus humor aqueus reliquis in oculo manentibus effluerit, natura frequenter hunc denuo suppeditat, & oculi pulchritudo ac visio conservantur.

(*Curatio.*) Art. 1048. In hisce gravissimis oculorum lationibus semper convenit *venesectio* quam ocissima, item *enematum* injectiones, & in vulnus vino rubro cum exiguo melle prius ablutum, instillandus est sanguis columbinus ex animali vivo, vel mixtura ex melle rosarum vitell. ovor. & lacte muliebri adhiberi potest, & superimponendæ sunt lintæ albumine ovorum cum tantillo albumine bene agitato imbutæ. Post hujusmodi medicationem aliquandiu continuatam *Collyrium* ex Myrrh. Aloe & Croc. in Aq. Rosar. usui erit.

Oule five Cicatrix.

Cowardi sententia.

(*Albugo quid. Varietas & prognosis.*) Art. 1049. Albugo seu Leucoma est macula corneæ albescentis; quo latior & crassior est, eo magis visum obscurat, & quo magis corneæ superficiei incumbit, eo magis albicat, & quo propius ad nigredinem vergit, eo altius suas egit radices, & vix curabilis existit. Quæ e cicatrice relicta exoritur difficillime dissipatur, quæ *ophthalmiam* sequitur, frequenter sua sponte fa-cessit.

(*Curatio.*) Art. 1050. Totus curationis cardo in *emollientibus*, *resolventibus*, seu *discutientibus*, vertitur, quæ tamen cum summa cautela sunt usurpanda. Pro cicatricibus tollendis *topica* acriora, imo *cathartica* aliquando prudenti manu adhiberi debent, & primo tentanda est via lenioribus, & postea ad fortiora licet devenire. ℞. Rad. althæ. ℥j. folior. malv. euphrag. chelidon. maj. ana Mj. sem. lin. fœnugr. ana ℥iij. flor. melilot. p. j. coq. in aq. font. q. s. ad ℔ij. hujus decocti vapor oculis apertis calide excipiat frequentissime. Mallem ego in his oculorum medicamentis utendis formam *fomentationis*, quam *vaporis* commendare, præcipue si eidem decocto, dum caleſcat, pauculas salis seu spiritus alicujus volatilis guttas instillaveris, quod tum forte prodesse poterit, nisi nimiam affuderis spirituum quantitatem, quæ oculorum tunicas feriat, & irriter. Alii utuntur saccharo cand. in aq. fœnicul. seu euphrag. solut. succus fœnicul. vel chelidon. cum guttulis aliquot balsam. Peruv. potenter albuginem discutit, inquit Riverius. Sequens ex Riverio feliciter expertus sum, ℞. Aq. ros. ℥iv. dissolve in ea paululum salis armoniac. ita ut linguam feriat, deinde imponatur in vase aurichalceo, donec caruleum colorem acquirat. Fella animalium præcipue lucii piscis, succus chelidon. &c. sunt remedia calida & acria, ideoque convenit ea excipere mucilaginis gum. tragacanth. sem. cydon. &c. vel cum pulv. Trochisc. alb. rhas.

Ettmulleri sententia.

(*Pro cicatrice in oculo. Remedia aliquot. Scarificatio Oculi.*) Art. 1051. Albugo seu Leucoma est cicatrix albida post variolas vel alia ulcuscula in oculo. Pro nubecula & albugine delenda conveniunt fel anguillæ, ol. papyri, succ. chelidon. maj. aq. saphirin. mercurius sublimatus. „ Solemne est apud Chirurgos Gallicos ad vitium amovendum „ operationem instituere, quam vocant *scarificationem oculi*. Instru- „ mentum ad hoc opus perficiendum quod *scarificatorem* nominant, fit „ ex aristis hordeaceis, N. xx. vel xxv. puta, ad instar penicilli col- „ ligatis; cum hujusmodi autem scopis sive verriculis oculum abra- „ dunt quandoque usque ad effusionem exigui sanguinis, alternis vel „ tertiis forsan diebus idem repetendo ad quartam, quintam vel plu- „ res vices; finita in hunc modum singula scarificatione oculum „ cum aqua tepida multoties abluunt, imo fere continuo per totum „ diem, & deinde noctu pulpam pomi assati applicant: atque hæc „ est scarificationis methodus; accuratorem vero hujus operationis „ rationem, non modo in hoc vitio, sed etiam in quibusdam aliis „ oculorum affectibus vernaculo sermone evulgandam brevi, ut opi- „ nor, exspectare licet.

Hyposphagma.

(*Hyposphagma.*) Art. 1052. Hyposphagma sive suggillatio oculi est sanguinis ex istu vel lapsu, ruptis aut contusis vasis, vel alio modo apertis,

apertis, in oculorum tunicis adnata, vel cornea, in easdemque effusio, colore primum rubeo, postea livido vel nigro. Cui malo & hoc accidit, si corneam magis occupet, objecta omnia colorem ad rubrum vergentem præ se ferunt; nam & ad corneam venulæ porriguntur, ea parte, qua iridem spectat; & ex vicinis vasis sanguis in eam effundi potest.

(*Curatio.*) Art. 1053. Si malum sit ingens opus est venæsectione & purgatione, & topica debent esse *discutientia*. Galenus in initio fotum usurpat ex decocto *Fœnugræci* & *Meliloti* & postea *astringentia*. *Sennertus*. In oculorum suggillationibus optimum est sequens cataplasma, ℞. Rad. *symphyt. maj.* ℥vj. sigil. *Solomon.* ℥ij. flor. *sambuc.* ℥i℥. *farin. fabar.* ʒj. coq. in q. f. aq. font. Decoctum sit pro fotu, & ex radicibus, &c. f. cataplasma.

Cataracta.

Cowardi sententia.

(*Definitio.*) Art. 1054. Suffusio sive cataracta est pupillæ obstructio ab opaco aliquo interposito inducta, quæ visum minuit, aut extinguit.

(*Causæ.*) Causæ hujus affectus sunt ut plurimum obscuræ, aliquando tamen evidentes, uti contusio, nimis assidua ad lucernam lectio, Balneorum usus inordinatus, & in genere quicquid fluxionem ad oculos promoveat; *epiphora* nonnunquam in *cataractam* transit.

(*Differentiæ.*) Differentiæ suffusionum sunt variæ, nempe 1. ratione crassitie vel tenuitatis materiæ, ex qua pellicula constat. 2. ratione coloris, an alba sit, vel nigra, citrina, vel viridis, aut subfusca. 3. a situ, num etenim uveæ, num corneæ propius adhæreat; Certum enim est cataractam semper inter *uveam* & tunicam *scleroticam* contineri, in quo nunc humore aqueo, instar syndonis, innatare & fluctuare videtur, nunc firmiter tunicis, præsertim uveæ, adhærescere.

Art. 1055. Suffusio in initio discuti potest, ut multi fidei integerimæ authores testantur.

(*Curatio. Regula de Cataractis.*) Suffusio nigra, nec medicamentis, nec acu curabilis est. Sequens est optima regula de cataractis, scilicet; si quando videatur accrescere, & discutientium medicamentorum vires excedere, sufficienti temporis serie permittatur callescere, donec acui depositoryæ idonea naturaliter reddatur.

(*Operatio.*) Modus operationis perficiendæ unicus est; intrudendo scilicet acum depositoryam per adnatam & corneam e minoribus oculorum angulis versus nasum, & cataractam eadem involvendo, tandemque ad oculi basin deponendo, ut ibidem resideat, seu leni manu figatur. Post hæc usitatum est, quietem per plures dies patienti imperare vel in lecto vel extra, & *stypticis* aliquibus seu medicamentis *agglutinantibus* oculum male affectum obducere.

(*Post operationem quid faciendum.*) Art. 1056. „ Statim post operationem simul ac acus oculo evulsa fuerit, instillandæ sunt guttæ „ aliquot *sanguinis columbini* a vivo animali, & toti oculo superim- „ ponantur linteæ duplicatæ *albumine ovorum cum frustulo aluminis* „ *conquassato* & *tantillo melle rosaceo bene irrigatæ*.

(*Prognosis.*) Art. 1057. „ Suffusio, quæ a morbo aliquo graviore, a per- „ tinaci cephalalgia, vel a contusione violenta ortum duxerit, est omnium „ longe pessimæ indolis. Suffusiones, quæ sunt viridis, vel cineritiæ, item

quæ

„ quæ ferri rubiginosi, margaritarum vel testudinis marinæ colorem
 „ referunt, acu curabiles sunt: e contra suffusiones nigræ vel flavæ,
 „ item cretæ, plumbi, mali citrei colore similes, non attingendæ
 „ sunt. Præter colorem, ratio etiam habenda est substantiæ, & confi-
 „ stentiæ suffusionum, quæ a fricatione oculi palpebris operi digno-
 „ scendæ sunt; frictio enim oculi cum digito suffusionem reddit la-
 „ tiorem & extensio-rem cum vel sine disruptione; si autem pristinam
 „ figuram statim recuperat sine disruptione, operationem fausto even-
 „ tu successuram esse sperare licet: sin. vero ex frictione suffusio in-
 „ partes & frustra defiliat, operatio nullatenus molienda est, sed cun-
 „ ctandum est, donec suffusio firmior & maturior evaserit.

(*Notæ quædam.*) Art. 1058. „ De operandi modo alibi dictum est
 „ (Art. 1055.) sed in ipsa operatione quædam adnotanda occurrunt,
 „ ibidem minus memorata. In cataractis adhuc imperfectis interdum
 „ simul ac acus infigitur, statim oculus *inundatione humoris lactei im-*
 „ *pleri* videtur, quem ab ipsius cataractæ vesiculis acu sauciatis pro-
 „ venire credibile est. Quandoque oculus acu introducta *cruore plenus*
 „ conspicitur. Alias intromissa acu *cataracta statim duplo grandior*
 „ augeri videtur, *tuberosis ostrearum testis (vel spermatis ranarum in*
 „ *paludibus,* quodammodo similis. Hæc accidentia saltem ad tempus
 „ operationi impedimento esse solent. Cataractæ nonnullæ, utcunque
 „ aspectu benignæ ac pulchræ ante operationem conspiciuntur, sunt
 „ tamen adeo *tenaces ac rigide*, ut acui depositoriæ obtemperare
 „ omnino respuant, & quoties infra detruduntur, toties iterum assur-
 „ gunt. Aliæ etiam si septennes vel octennes fuerint, sunt tamen *moll es*
 „ *tanquam gelatina*, atque ita vim acus eludunt. Aliæ *Uvæ* tam firmiter
 „ adhærent, ut acu separari nequeant, atque hæ sunt omnium pessimæ ab
 „ icu vel contusione violenta ortum plerumque ducentes. Quod ad acci-
 „ dentia antedicta, nimirum *humoris lactescentis, cruoris,* &c. in operatione
 „ contingentia attinet, octiduo vel noniduo plerumque sponte evane-
 „ scere solent, reliquæ tamen quædam aut fragmenta interdum ma-
 „ nere possunt. Post operationem visio quandoque statim, sed fre-
 „ quentius circa nonum diem aliquatenus succedit, at non perfecta
 „ & fortis ante duas vel tres septimanas, vel forsan tot menses præ-
 „ teritos expectanda est. *Banister & alii.* „

Pitcarnii sententia,

(*Error Riverii, Plempeii, &c.*) Art. 1059. Signum pathognomoni-
 cum a *Riverio, Plempeio,* & aliis traditum suffusioni nullatenus con-
 venit, nempe affirmant suffusionem tum ingruere, cum varia simula-
 cra ante oculos volitant, pili, araneæ & similia, quæ apparitiones ex
 omnim opinione, si perpetuo offerantur, est vera & legitima suffu-
 sio: has apparitiones ascribunt corpusculis humori aqueo innatanti-
 bus, quæ cataractam efformant; verum naturam oculi ignorant: Nam
 corpuscula humori aqueo innatantia nullum sensum in retina depin-
 gunt; imo ea quæ corneæ exteriori adhærent nullam sui in retina pi-
 cturam exprimunt, nec cicatricis corneæ ulla est imago, neque ob eam
 vel eas (si plures sint) ullæ rerum obvolitantium sunt apparitiones:
 Ea enim est concavitas retinæ, ut ad objectum in ea depingendum,
 hoc est ad congregandos in uno ejus puncto omnes radios, e quovis
 objecti puncto emissos, debeat objectum visibile removeri a retina
 ultra distantiam corneæ a fundo oculi. Hinc sequitur, si incipienti ca-
 taractæ conjungantur etiam simulacra muscarum &c. tum oculi etiam
Gutta Serena laborant,

Farrago Sententiarum.

(*Prognostica signa aliquot.*) Art. 1060. Si suffusio sit profunda, & pupilla angusta appareat; intra sex menses plerumque confirmata evadit. Oculo digito compresso suffusio nonnihil diffuens & latior facta, & postmodum ad pristinam magnitudinem revertens nondum matura est; si vero nullam patitur mutationem discuti potest. *Riverius*. Si oculus suffusione affectus soli obversus nullam possit lucem percipere, frustra est omnino operationis periculum facere; est etenim cataracta cum *Amaurosi* conjuncta, quod malum est incurabile. *Barbette*.

(*Opacitas humoris crystal.*) Art. 1061. Cataractam revera ut plurimum nihil aliud esse quam opacitatem præternaturalem humoris *CrySTALLINI* videre licet *Transact. Philosoph. N. 373*. Et hanc fuisse opinionem plurimum Chirurgorum Gallicorum, viz. *Maitre Jean, Antoine, Brissau, Heister, &c.* ex horum authorum lectione plane constat; Cataractas autem membranosas rarissime occurrere fere omnes consentiunt. vid. Artic. subseq.)

Glaucoma.

(*Glaucoma.*) Art. 1062. Glaucoma est mutatio humoris crystallini in glaucum colorem humore crystallino per exsiccationem condensato. *Oribasius in lib. viij. cap. 47.* dicit, Glaucoma & suffusionem veteres unum eundemque morbum esse existimarunt. *Paulus Aegineta* idem asserit. Valde curiosæ sunt disquisitiones Gallorum de distinctione inter suffusionem & Glaucoma. vid. *Acad. sci. Vol. XII. p. 47. item Vol. XXII. p. 36. &c.* Posteriores tamen Græci proprie Glaucoma saltem pro humoris crystallini in glaucum colorem mutatione accipiunt. Quod ubi fit, visio impeditur; nam humore isto pelluciditate spoliato species visibiles ad retinam perfecte transferri nequeunt. Cognoscitur hoc malum, quod citra pupillam insignis & profunda apparet albedo, & omnia tanquam per fumum aut nebulam videntur. A cataracta ergo distinguitur, quod albedo profundior appareat, in cataracta in ipsa pupilla & fere juxta corneam. *Sennertus*. (vid. Art. præcedentem.)

Situs Humoris Crystallini vitiat.

(*Situs humoris Crystallini vitiat.*) Art. 1063. Est & aliud vitium humoris Crystallini, viz. *Situs naturalis mutatio*, ubi, scilicet, latiore sua parte, quæ lentis majoris instar compressa est, Pupillæ forami non recta opponitur, sed vel sursum declinat, vel deorsum, ad latera: & quidem si Crystallinus humor situm mutet in uno oculo, in altero vero naturalem retineat; vel si ambo difformiter situm mutant, ita ut alter sursum, alter deorsum, vel ad latera vergat, res geminatae apparent; *mutatur enim planum*, ut loquuntur optici: hic affectus, sicut antecedens, est omnino incurabilis. *Sennertus*.

EPIPHORA.

Cowardi Sententia.

(*Epiphora quid.*) Art. 1064. Epiphora est præternaturalis oculorum defluxio, quæ *Anglis* sonat a *Rheum in the Eyes*; humore scilicet fetido acri fere continuo depluunt oculi genas excoriantes.

(*Curatio.*) Art. 1065. Intentiones curativæ sunt 1. humoris peccantis alio derivatio per venesectionem, cucurbitulas, vesicatoria, cathartica.

ca, &c. 2. acrimoniæ per remedia idonea correctio, quæ plerumque vino *chalybeato amaro* feliciter peragitur; aliquando vinum simplex liberaliter epotum epiphoram sanat (præcipue non assuetis idem bibere), & postremo, præmissis recte prædictis evacuationibus & alterantibus, *topica astringentia* adhibere licet.

Pitcarnii sententia.

(*Oculorum catarrhus; ejusdem curatio.*) Art. 1066. Epiphora est quasi species *catarrhi* in glandulis oculorum. Præmissis universalibus usurpandi sunt *fotus astringentes, linimenta, & collyria, &c.* Cataplasma sequens ex *Platero* egregias habet vires, 2℥. *Pulp. pomorum acidorum* (vulgo *vinos. dict.*) in aq. ros. macerat. ʒij. *mucilag. sem. fenugr.* ʒss. *album. unius ovi. lapid. hematit.* ʒss. *cort. granat.* ʒj. *ol. ros. q. s. m. f.* Cataplasma tepide applicandum.

Farrago sententiarum.

(*Aq. ophthalmica præcellens.*) Art. 1067. Epiphora antiqua, & quæ senibus accidit, difficulter curatur, imo frequenter in *fistulam lacrymalem* degenerat. Remedia in principio debent esse blande *astringentia* & postea *siccantia*; *lapis calaminaris* est singularis. Aqua ophthalmica sequens ex *Hoffmanno* valet fere in omnibus oculorum affectibus usque ad miraculum 2℥. *Vin. Rhenan. Aq. plantag. rosar. ana* ʒiiij. *tut. præp.* ʒij. *myrrh. elect. pulv.* ʒiʒ. *coq. ad tertiæ partis consumptionem* sub finem in nodul. suspend. *pulv. virid. æris.* ʒj. *camphor. gr.* viij. colatura sine expressione sit pro usu; utilissima quoque est *aq. sapphirina*, item *collyrium certum*.

(*Rheuma oculi.*) Art. 1068. Huc pertinet, si non idem sit, Rheuma sive *fluxus Oculi, vel delacrymatio*, quod est serosorum vel tenuium humorum ab oculo profluvium, sine insigni inflammatione: a *Fistula lacrymali, vel ab ungula male curata* quandoque oritur, & tunc prorsus incurabilis existit; vulgo vocatur a *Weeping Eye*.

Proptosis.

(*Proptosis.*) Art. 1069. Proptosis est exitus oculi fere ex orbita, ex contusione, &c. vid. contusionem Oculi & Vulnera Art. 1052. 1073. Huc referri potest *bubulophthalmia*, magnus oculus, sive oculi valde prominentes, vulgo *Gogle Eyes*, a naturali conformatione oriundi. Quomodo ab alio morbo eodem nomine insignito differt. vid. Art. 1045.

Atrophia.

(*Atrophia.*) Art. 1070. Atrophia oculi, sive imminutio, profunditas vel macies oculi, est quando omnes oculi partes imminuuntur & contabescunt. Nusquam hunc morbum, ut memini, tanquam *particularem* inveni, nisi a tabe universali proveniente; *Celsus* vero & alii hunc agnoscunt; adeo infrequenter, ut opinor, contingit, ut peculiarem medelam vix postulet; ad hanc classem pertinet *Microphthalmos*, sive parvus oculus, *The Pink Eye or the Pig-Eye* a naturali conformatione ortus.

Mydriasis.

(*Mydriasis.*) Art. 1071. Mydriasis, sive *Pupillæ Dilatio*, est cum foramen illud, quo uvea tunica ad species visibiles admittendas donata est, ita præter naturam versus iridis circulum ampliatur, ut visio hac de causa lædatur. Objecta visibilia grandiora apparent & minus distincta: alia est *nativa*, alia *adventitia*, prior est incurabilis; si a siccitate oriatur, humectantia indicantur, Interdum est *guttæ seræ* prodromos.

Mejopis.

(*Mejopis.*) Art. 1072. *Mejopis*, sive *Pupille Angustia*, est malum præcedenti contrarium; nimirum cum pupilla angustior est quam naturaliter esse debet. Hi affectus insanabiles sunt.

Plege.

(*Plege.*) Art. 1073. Oculorum vulnera, sive a punctura, incisione, vel contusione sunt periculosissima. Omni arte fluxus humorum exhibendus est, viz. venæsectione, hirudinibus, &c. & febris supprimenda testaceis, emulsionibus, &c. Interim remedia externa sunt ante omnia *Sanguis columbinus e vivo animali in oculum vulneratum instillatus*, aq. *bordei* & *mel rosar.* pro collyrio, *oxyrrhodium* i. e. *acetum*, in quo *fol. ros. rubr. incocta fuerint cum albumine ovor. conquassat.* pro defensivo. Sequens cataplasma habet *Turner.* Art. *Chirur.* p. 370. Vol. I. 24. *Fol. ros. rubr. sambuc. ana Mj. coq. in q. s. lact. vaccin. colatur.* *℞ss. add. mic. paris alb. q. s. ut reducatur leni coctione ad debitam consistentiam sub finem addendo vitellum unius ovi cum tantillo croco minutim scisso*, f. cataplasma sub tepide applicandi, illinendo prius palpebram tumefactam cum ung. *sambucin.* consulatur author loco citato.

Elcos.

(*Elcos.*) Art. 1074. Ulcera in tunica conjunctiva vel cornea, a quacunque causa oriuntur, a vulnere, inflammatione, a variolis vel combustionibus, &c. periculosa sunt, & aliquando curatu difficilia, & semper metuendum, ne opacam cicatricem post se relinquant.

(*Curatio.*) Artic. 1075. Quoad curam, materia ad oculum fluens divertenda est & evacuanda, sordes detergendæ, dolor, si adsit, mitigandus, & nativa oculi temperies restituenda & conservanda. Detergentia & exsiccantia sunt usurpanda, lenia tamen & temperata, sine asperitate & mordacitate. Ad ulcera detergenda (inflammatione, si adsit, prius penitus sublata) vix datur præstantius remedium quam aq. *ophthalmica sapphirin.* Bat. & deinde collyrium ex *sarcocol.* in cap. de ophthalmia laudatum, & postremo collyr. tum trochis. alb. rhas. cum *camphora*, *sacchar. saturn.* vel *lap. calamin. præp.* &c. oleum ovorum valde commendatur.

(*Species varieg.*) Art. 1076. D. *Banister* a priscis medicinae scriptoribus octo vel decem species ulcerum in oculo accidentium enumeravit, ut *ulcus rotundum, inustum, sordidum, depascens, cancriforme, &c.* Sed distinctio nimis subtilis videtur. Verum enimvero notatu dignum est ulcus istud, quod *Græci Peribrosin* nominant in Angulo oculi cum pruritu vix tolerabili conjunctum. Sequens medicamentum ab auctore valde comprobatur. 24. *Mucilag. sem. cydon. lin. in aq. plantag. & parietar. extract. ana ℥j. vitriol. alb. in aq. rosar. salut. ℥ss. vitriolum album est antidotus ad pruriginem.*

Cowardi sententia.

(*Prognosis, & curatio ulcerum ocularium.*) Art. 1077. Omnia oculorum ulcera sunt periculosa & curatu difficillima. Totus curandi cardo in usu detergentium & exsiccantium vertitur, quibus tamen sæpissime addi debent lenientia sive anodyna. Non differt horum ulcerum ab aliorum curatione methodus tractandi, nisi quod ob teneritudinem & insignem partium usum cura non vulgari suscipienda sint. Porro his in casibus conveniunt agglutinantia cum detergentibus mixta; inter quæ liquorem ex ovo cocto & indurato sacchari cand. q. s. repleto in cella vinarie extillantem maxime commendat *Riverius*; quod medicamentum, si magis absterfivum desideres, addito myrrhae pulverisatæ

pauculo saccharo cand. supra præscripto , magis proficuum red-
detur.

Paralysis.

(*Paralysis.*) Art. 1078. Paralysis oculi est affectus musculorum o-
cularium paralyticus , ex quo motus vel penitus amittitur vel mul-
tum impeditur. Est malum , uti credo , rarissime contingens ; utcun-
que nihil habet in se peculiare a paralyfi aliarum partium diversum
quoad theoriam vel therapiam.

Strabismus.

(*Strabismus.*) Art. 1079. Strabismus seu strabositas est oculorum
unius vel utriusque respectu ad se invicem distortio , sive *obtusus*
transversus , vulgo a *Squinting*. Ex inæquali musculorum ocularium
exercitio provenit. Infantes hunc affectum facile contrahunt ; inter-
dum ob incuriam nutricum , quæ malo situ ad fenestram cunabula dis-
ponunt. Adolescentes quoque interdum in eum incidunt , vel a vitio-
sa oculorum praxi , vel a contagione , dum alios hoc morbo affectos
intuentur.

(*Curatio.*) Art. 1080. Strabismus difficillime curatur ; si a cunabu-
lis perperam versus fenestram locatis ortum duxerit , mutanda est eo-
rum situatio. *Paulus Ægineta* ad hoc vitium emendandum larvam
machinatus est , & faciei adaptavit , ita ut per duo foramina recta
tantum antrorsum liceret prospicere. Ego ad adolescentulum quendam
generosum strabismo affectum accersitus , statim ac intellexi unum tan-
tum oculum affici , consului , ut *sanus subligaculis probe claudatur* per
duas septimanas , quo facto alter oculus omnimodorum motuum li-
berrimus protinus integre sanatus est , & in futurum cum altero motus
sociales recte servavit , & nunc elapsis aliquot annis sine recidivatio-
ne juvenem eleganti forma præditum in bonum virum evasurum
fore spero.

Enchantis.

(*Enchantis.*) Art. 1081. Ex curatione unguis vitia nascuntur , quæ
aliis quoque ab causis oriri solent . Interdum fit in Angulo parum
ungue exciso , vel aliter , tuberculum , quod palpebras parum diduci
patitur : *ἐγκανθίς* Græce nominatur. Excipi Hamulo , & circumcidi
debet : hic quoque diligenter temperata manu , nequid ex ipso Angu-
lo abscindatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cad-
mia , atramento futorio , &c. *Celsus*.

(*Curatio.*) Art. 1082. , Enchantis est excrescentia carnosa in ma-
jori oculi angulo carunculæ lacrymalis adhærens : si mollis & laxa
fuerit , *Alumine usto & saccharo cand.* deleri potest ; sin vero tumor
fit durior , & grandis filo per medium transmissio detinendus est , &
forcipe abscindendus , & vulnus tinctura myrrhæ & melle rosaceo
fovendum. , *Kennedy*. , In operatione suscipienda cavendum est ,
ne *glandula lacrymalis* nimium lædatur , exinde enim fluxus oculi
perpetuus continuo in genam depluens supervenire solet , quemad-
modum in fistula lacrymalis male curata plerumque accidit. , Vid.
Art. 1068.

Fistula Lacrymalis.

Cowardi sententia.

(*Morbi nomina & descriptio.*) Art. 1083. Anchylops , Ægilops , &
Fistula lacrymalis apud authores promiscue usurpantur ; ægilops vero
est

est tumor (vel potius ulcusculum) carunculæ majoris ad internum oculi canthum anchylops nominatur, cum adhuc nondum sit ulcerosus; fistula lacrymalis proprie appellatur, quando ulcus sinuosum ibidem efformatur; compressione digiti liquor e cantho ovi vitello similis, & foetorem emittens extillat; humor corrosivus viam facit, aut invenit, unde meatus colatorii nimis patentes facti, perpetuo stillicidio vexantur: imo frequenter os *ethmoideum* penetrat, erodit, & ad *cariem* miserabilem deducit; in quo statu non nisi *caustico* actuali curabilis est, hujusmodi fistula frequenter cancrosa evadit, & tunc *Riverius* monet remediis non esse attingendam.

(*Curatio.*) Art. 1084. Cura est totaliter chirurgica, nisi quod intus dari possunt pauca *evacuantia* & remedia quædam humorum acrimoniam *destruentia*, præcipue *mercurialia*, & decoctum *e lignis*. In initio si anchylops adhuc sit, *repellentia* maxime proficua sunt, ut suppuratio præveniatur; huic usui inserviunt *refrigerantia*, *astringentia*, & *vitriolica*: Si vero nec refrigerantibus repelli, nec resolventibus discuti poterit, quin ad suppurationem vergat, aperiendus est abscessus, & *detergentibus*, ac *cicatrizantibus* secundum artem tractandus. Alii sunt qui curam ægilopis moliuntur *instrumento chirurgico*, per os nasi tramitem perforando, quo liquor perpetuo extillans per nasum evacuetur. „ Sed graviter errant, qui existimant *perforationem* hoc „ commodum præstare, ut materia per os effluat; foramen enim os „ sis a carne ex ipso pullulante brevi obstruetur. Os non est perfo- „ randum nisi præsentem maximam ipsius corruptionem, quæ perveniat us- „ que ad cavitatem internam ipsius nasi; sola siquidem ejus superfi- „ cie corrupta sat fuerit partem læsam scalpro abraderem, euphorbium „ inspergere, &c. præmitti debet *setaceum*, quod tanti est momenti, „ ut inveteratam fistulam lacrymalem sine hoc præsidio vix curari „ posse in aliquibus observaverim. *Hercules Saxon.* & *Hildanus.* „

Visus Hebetudo.

Cowardi sententia.

(*Hebetudo visus.*) Art. 1085. Hebetudo visus est caliginosus videnti modus, cum objecta nebula velut tenui obvoluta apparent; primus est hic status ingruentis mali pejoris, nisi præveniatur, prodromus; & *cataractam* aliquando ob incuriam patientis, aut incitiam medici inductam præcurrit.

(*Unde.*) A statu sanguinis viscido & pituitoso oriri potest, vel a spirituum animalium penuria, vel ab humoris in oculo defectu, vel ex mala partium conformatione.

(*Curatio.*) Art. 1086. Ad hanc oculorum hebetudinem discutendam indicantur remedia, quæ sanguinis lentorem tollunt & quæ spirituum animalium penuriæ occurrunt. Quandoque convenit *venæsectio*, & deinde *catharticum cum calomel.* exhibere. *Millepedes* inter specifica recensentur; *salia volatilia* & *deobstruentia* in sanguinis lentore mira præstant; salivationem per *masticatoria*, potius quam *tabaci fumo*, excitatam prodesse autumno; *cerevisia oxydrica pharm.* Bat. propinari potest; *collyria vitriolata* & *astringentia* sunt vitanda; convenit *aqua ophthalmica sapphirina* Bat. In genere duæ regulæ ad visum utilissimæ, licet non usquequaque sufficientes, statuuntur.

(*Duæ regulæ ad visum prolongandum.*) 1. Ut mane quolibet, nullo habito

habito ad tempestatem respectu, frigida caput, tempora, & pone aures alluamus. 2. Ut a calidis & piperatis eduliis, nec non potulentis spiritosis, quantum fieri possit, abstineamus.

(*Euphrasie vires.*) Art. 1087. „ Euphrasia quoquo modo sumpta, „ seu in pulverem redacta, & cum vino albo pota, seu per se sola „ masticata & deglutita, seu in vino vel cerevisia infusa, seu in a- „ qua ad modum theæ, seu succusejus expressus, *videndi facultatem* „ mirifice roborat & adauget, debilem aut amissam reparat & restituit. „ Arnoldus de Villa nova & alii.

Gutta Serena.

Cowardi Sententia.

(*Definitio.*) Art. 1088. Gutta serena, seu Amaurosis est visus abolitio, sine ullo sensibili vitio in oculis apparente, ab obstructione *ner- vi optici* orta, influxum spirituum animalium prohibente. Quæ a causa quacunque subitanea exoritur facilius curatur, quam cui deplorabile illud infortunium obrepit. In vera amaurosi pupilla nigrior & amplior solito apparet, sed non semper, & gravitas supercilia premit.

(*Curatio.*) Art. 1089. Quoad therapiam post universalia (ubi indicantur) medicamentis *volatilibus, antiscorbuticis, chalybeatis, mercurialibus, cephalicis, & nervinis* cura tentanda est; vix aliquid sperandum est a *topicis*; si aliquibus utamur, debent esse *discutientia*.

Pitcarnii Sententia.

(*Signum pathognomonicum.*) Art. 1090. Si nullis opthalmiæ signis apparentibus, muscæ aut aranæ & similia oculis obversari videntur, signum est *pathognomonicum* guttæ serenæ nascentis.

(*Curatio.*) Art. 1091. Curatio hujus affectus medicamentis *mercurialibus* tentanda est, imo *salivatione & decocto guajaci*.

Art. 1092. „ Tutiora sunt *purgantia* (inquit Ettmullerus) quam *vo-* „ *mitoria*; conveniunt *sudorifera*, maxime *sassafras & euphrasia, junip.* „ *rosmarin. millepedes, masticatoria, &c.* “

Myopia.

(*Myopia.*) Art. 1093. Myopia, sive luscitio, est propinqua visio, quam nos Angli vocamus *Purblindness*; a naturali conformatione oritur; qui autem oculos ita formatos habent, nunquam cæcutiunt, neque conspiciellorum in extrema senectute indigent.

Presbytia.

(*Presbytia.*) Art. 1094. Presbytia est affectus myopiæ contrarius; longe longinquo melior est visio quam propinqua; senibus præcipue accipit, & est malum prorsus incurabile; conspicii vero egregio sunt adjuvamento.

Nyctalopia.

(*Nyctalopia.*) Art. 1095. Nyctalopia est malum duplex, cujus species duæ sunt sibi invicem contrariæ. In prima specie visio noctu vel in locis obscuris est præstantior, in clara luce valde diminuta & fere nulla. In altera specie nisi clara & splendida luce nihil omnino ceratur. Hæc sunt vitia a mala constructione oculi orta, ideoque incurabilia.

DE MORBIS NARIUM

Hæmorrhagia Narium.

Sydenhami Sententia.

(*Hæmorrhagia narium & hæmoptoe interdum a febre pendent.*) Art.

1096. Nonnullæ febres intercurrentibus annumerari debent, quæ vulgo pro symptomatice tantum habentur; hujusmodi sunt hæmorrhagia narium & hæmoptoe. Primo ut plurimum appulsu febris præ se fert indicia, qua derepente sibi per nares, qua data porta, faciente viam, dolor & calor sinciput adhuc torquent; sanguis per vices profluit, dein aliquandiu sistitur, & mox denuo iterum atque iterum erumpit; donec tandem remediorum usu vel sponte omnino cessat, ita tamen ut ægro singulis annis a recidiva metuendum sit..

(*Curatio.*) Art. 1097. Sanguinis fervorem nimium atque ebullitionem ut compescamus, convenit *venæsectio* (sanguis eductus est pleuriticorum similis) item *viæctus tenuis ac incrassans* imperandus est; quotidie injiciendum est *enema refrigerans*, & dosi *diacodii* hora somni exhibenda est. Quoad externas applicationes, lintea quadruplicata immersa *aquæ frigidae*, in qua *sal prunellæ* dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, ac utrinque cervici sæpius in die. Item post universas evacuationes peractas liquor sequens applicetur; ℞. *Vitriol. Hungar. alum. ana* ℥j. *phlegmat. vitriol.* ℞℞. coque tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigidatum filtra, & add. *ol. vitriol.* partem duodecimam; turunda ex linteo raso liquore hoc probe humectata, nari ex qua sanguis stillat, indatur per dies duos isthic relinquenda.

(*Cortex Peruv.*) Art. 1098., Quando hæmorrhagia narium a febre pendeat, *cortice Peruviano* profligari potest, æque ac hæmoptoe, de qua alibi. (536.)

(*Nota bene.*) Art. 1099., Opinione vulgari hæmorrhagias ordinario ex arteriolarum evanescentium ruptura accidere statutum est; sed in errore magnopere versantur: in omni etenim *critica saltem hæmorrhagia* sive narium, sive partium circa fauces & guttur, sive pulmonum sive renum, sive hæmorrhoidum, sive uteri, sanguinis fluxus *mediantibus glandulis* omnino fit, *per ductus scilicet excretorios* sanguis exilit, quod probe notandum est.

Ettmulleri sententia.

(*Quinam hæmorrhagiis obnoxii sunt.*) Art. 1100. Quidam hypochondriaci, scorbutici & cachectici variis & stupendis hæmorrhagiis obnoxii sunt, ita ut sanguis non unciatim, sed libratim effluat.

(*Curatio.*) Art. 1101. In nimia effervescentia & sanguinis fervore conveniunt *blanda acida*, item succus *menth. urtic. &c. martialia* pluribus scopis in curandis hæmorrhagiis satisfaciunt: *martialia* etenim per se semper astringunt, per accidens aperiunt, ut observare licet in mensibus nimis fluentibus & obstructis. Ipse novi exempla infantum & adultorum etiam frequenter hæmorrhagiis narium obnoxiorum solo esu *passularum* curatorum.

(*Hæmorrhagia habitualis.*) In hæmorrhagia *habituali* sequens *electuar.* est proficuum; ℞. *Pulp. passular.* ℞℞. *pulv. rhabarb.* ℥ij. *tart. vitriolat.* ℥j. *syr. cydon.* q. s. m. (*Materia medica in hæmorrhagia late patet, sequentia simplicia sunt insigniora*) *folia plantaginis, urtic. millefol.heder. terrest. polygon. flor. ros. rub. balaust. cort. granat. rad. symphyt. maj. bistort. tormentil. muscus terrest. galle, sem. hyoscyam. papaverina, (catechu) usnea cran. human. Gum. Arab. sang. dracon. lapid. hæmatit. tinct. mart. sacchar. saturn. stercus asinum aut suillum & caninum.* Externe *bufo sicc. stercus porcinum recens excretum, bol. Armen. pil. leporin. crepitus lupi, alumen ustum, &c.*

Farrago sententiarum.

(*Aliquid notandum in V. S.*) Art. 1102. Phlebotomia ad revellendum ampliori foramine celebrari debet, & ut magis confertim sanguis effluat, inter detrahendum eundem multum prodest vulnus sapius digito occludere, dein aliquantulum sanguinis emittere.

(*Deligatio artuum.*) Art. 1103. Deligatio artuum hæmorrhagiæ sistendæ conducit; notandum est tamen artus omnes simul non diu ligandos esse, quoniam sanguis in extremis diu detentus, & a corde nimis exulans lipothymias terribiles inducit. *Album Græcum* in omnibus hæmorrhagiis est medicamentum singulare; *Spiritus vitriol. vel ejusdem ol. in aq. simpl. stillat.* in hæmorrhagiis periculosis est extremum remedium & raro fallax.

(*Remedia varia.*) Art. 1104. Reliqua melioris notæ sunt *calcanthum rabefactum*, *colophonium pulverisatum*, *stipticum regis*, *ol. terebinth. decoct. catechu*, *decoct. incrassans*, *decoct. styptic. elect.* Boyleanum, *pulvis Galeni*, *elect. styptic. tinctura rosar.* *epithema de sacchar. saturni* in casu deploratissimo moribundi post omnia tentata feliciter expertus sum.

Olfactus amissus.

Ettmulleri sententia.

(*Olfactus amissus raro curatur.*) Art. 1105. Olfactus amissus rarissime recuperatur, præcipue in senibus. Præ reliquis multum confert *majorana* quoquo modo usurpata, item *rosmarinus*, suffitus ex *succino*, *gum. animæ*, &c. quæ valent in *catarrho* hic locum habent. (470.)

(*Ozæna.*) Art. 1106. Ozæna est ulcus sordidum in naribus latens, frequenter est venereum, interdum cancriforme evadit.

(*Curatio.*) Art. 1107. Ad curationem conveniunt folia & unguentum *e nicotiana*, si crusta adfuerit, cum oleo *amygd. dulc.* removenda est; interdum usurpantur fumi ex *cinnabar.* & *mercur. dulc.* in injectionibus, imo nonnunquam *mercurius sublimat.* Galli utuntur *mercur. præcip. cum unguent. ros. subact.* & cum turundis applicato. (972.)

(*Polypus narium.*) Art. 1108. Polypus narium est sarcoma seu excrescentia carnea in naribus ex earum summitate pronascens, & nunc nunc replens, nunc in fauces usque descendens, a *polypo pisce* nomen accepit, nunc mollis est, & lubrica, nunc una, nunc pluribus radiculis se affigit. Excrescentia hæc nunc alba, nunc livida apparet, si livescit, & dolet, fere cancriformem naturam sapit; & non attingendus est polypus cancriformis.

(*Raro curatur.*) Polypus narium est malum curatu admodum difficile. „ *Rhasis polypum hæmorrhoides narium* appellat ob similitudinem. De ejusdem extirpatione videantur scriptores chirurgici. Si „ in ulcus cancriforme degeneraverit, admittit curationem fictam & fucam; in hunc finem unguentum sequens est valde proficuum, „ *℞. Unguent. de plumbo, succ. solan. ana ℥j. aq. ros. ℥ss.* diutissime „ agitentur in mortario plumbeo & f. urg.

Art. 1109. „ Riverius distinguit inter *sarcoma* & *polypum*, & quidem jure merito; *Sarcoma* (inquit) est excrescentia carnea in naribus genita, *hypersarcomi* simillima in imis narium partibus succrescens; *Polypus* vero in summis ac superioribus juxta nasi radicem. Cura tentanda est primo astringentibus lenioribus, & deinde medicamentis potentioribus, inter quæ eminet *mercurius præcipitat. rub. cum melle rosaceo permixtus*; remedia adhuc magis caustica cum cautela usurpanda sunt, idque decrescente luna, cum tumor imminuitur.

LINGUÆ VITIA.

Ettmulleri sententia.

(*Gustus læsiones.*) Art. 1110. Gustus læsiones. In amisso gustu convenit *Raphanus* ante pastum masticatus, item *cephalica* & *nervina*. Sed gustus & odoratus vitia, si inveterata sint, sunt curatu difficilia, maxime in senibus.

(*Aphonia.*) Art. 1111. Loquela amissa frequenter a lingue paralyfi accidit; curatur *aromaticis*; convenit decoctum *salviæ*, *eruc. sinap.* &c. in vino, item *rosmarinus*, *rad. pyreth.* *zinzib.* sed præ reliquis succus *salviæ*.

DENTIUM & GINGIVARUM MORBI.

(*Dentium caries & nigredo.*) Art. 1112. Dentium caries & nigredo fit a nimis calidis, frigidis, dulcibus, acidis fumis, ex mercurio, a scorbuto, &c.

(*Curatio.*) Art. 1113. Vitanda ergo sunt antedicta, & dentes a cibo repurgentur & vino eluantur. *Pumex* bis vel ter ignitus & vino albo extinctus & in pulverem subtilissimum redactus albissimos facit dentes, quidam solo pulvere *panis usti* utuntur (qui optimum & tutissimum est dentifricium.) *Cinis nicotianæ* est turpe medicamentum, sed dentes reddit albos. Ad dentium sordes tollendas & colorem vitiosum emendandum varia extant dentifricia in practicum libris; 2℥. Os *sepia* ʒj. *rad. pyreth.* *lapid. pumic.* *alum. ust.* ʒj. *cinnam. lign. aloe tart. Rhenan. ana* f. pulv. subtilissimus. Pro usu domestico pulv. *panis usti* ad dentes mundandos sing. auroris, & postea opiatum sequens usurpandum. 2℥. Pulv. flor. ros. rub. ʒij. *myrrh. elect.* ʒij. *alum. ust.* ʒj. *sacchar. saturn.* ʒj. *cremor. aq. calc. supernatan. opobalsm. ana* ʒij. *aq. hungar.* q. s. misce. Post usum hujus abluatur os cum vino rubro.

(*Curatio.*) Art. 1114. In dentifriciis usurpandis optime cavendum est, ne crebrior & durior attritus gingivarum, eas atterat & absumat.

(*Dentium vacillatio.*) Art. 1115. Ad dentes firmandos valet solutio *terre japon.* ʒij. in vin. rub. ℥ss. pro lotionem (inquit Boyle multis in locis) conducit etiam *gum. lac.* quocunque modo usurpatum.

(*Gingivæ putridæ.*) Art. 1116. In gingivis putridis & dentium vacillatione inde orta, 2℥. *Gum. lac.* ʒij. *cremor. aq. calc. supernatan.* ʒi. *alum. ust.* ʒj. *flor. ros. rub.* ʒss. m. f. pulv. subtilissimus cum pauco *mel. ros.* usurpand. vel cum vino rub. Gallico in quo infusa sunt *fol. ros. rub. rad. tormentil.* &c. In graviore malo ad unguentum *Ægypt.* deveniendum est (vel *mel unguent. Ægypt. supernatans*) plura videantur in cap. de scorbuto. De gingivis putridis & dentium vacillatione. Interim multum valet *tinctura gum. lac. Fulleri.* „ Præ reliquis autem, quocunque in libris inveniuntur, pro dentibus firmandis, iis, „ demque & gingivis a putrefactione conservandis, nec non oris fetore „ præcavendo, non datur præstantius remedium quam Masticatio foliorum „ *Nicotianæ* modica quantitate; eo etenim sufficiunt grana quatuor pro „ una vice, idque tantum semel in die usurpandum, per horæ quadrantem in ore detinendo. Interim super omnia improbandus est „ turpissimus quorundam mos totis diebus masticandi, non ad hos laudabiles fines consequendos, sed plane nescientium quare, forsan solummodo foedissimæ consuetudini indulgendi gratia.

(*Dolores dentium.*) Art. 1117. Oleum *Buxi* dentium dolores quosvis ad

CAP. X. *Dentium & Gingivarum Morbi.* 215

ad miraculum sedat (inquit *Riverius*) *oleum origani* est in frequentia usu. *Pix liquid.* in ore detent. dolorem tollit, ut ab amico accepi. *Rad. pyrethri* in ore manducat. pituitam evacuat & dolorem lenit. *Decoctum nicotianæ* in ore detentum dentium dolorem potenter sistit (inquit *Ettmullerus*). „ Sed ultra omnia, quæ hæcenus novi, *succus radicis iridis luteæ* dolenti denti affricatus vel ipsa *radix* in ore „ masticata in instanti quasi ex incantamento dolorem ex causa quacunque oriundum fugat. Communicator affirmat se quadragies ad „ minimum pari successu tentasse; ego etiam ipse sæpius expertus sum, „ & plurimi ex meo suasu idem fecerunt: si dentis cavitas sit magna, imponi potest plumbum foliatum.

(*Nota bene.*) Art. 1118. Nonnunquam (inquit *Sennertus*, & ipse idem plus semel observavi) per dentium radices & maxillæ foramina, per quæ vasa in eas subeunt, sensim extra effluit sanies e dente corrupto & tubercula in mala vel mento excitat, quæ nullo modo curantur, nisi dens extrahatur. Vide locum p. 262. Vide etiam *Cheselden. Anat. p. 19.*

(*Vermes dentium.*) Art. 1119. *Decoctum sabinae* in ore detentum vermes dentium elicit, ut auctor est *Ettmullerus*.

AURIUM MORBI.

Ettmulleri sententia.

(*Inflammatio & ulcus aurium.*) Art. 1120. In inflammatione & ulcere aurium adest insignis ardor in aure, & dolor tensivus, & pulsatilis vehemens cum rubore, quandoque conjuncta est febris, interdum delirium, & motus convulsivi.

(*Methodus curandi.*) Art. 1121. Insensibiliter discutitur, vel suppuratur; convenit *venesectio*, item *sudorifera* tanquam in aliis inflammationibus. Externa non nisi cum cautela sunt usurpanda, fomenta tamen ex *emollientibus* & *discutientibus* sunt proficua. Si discuti nequeat, ad *suppurantia* accedendum est, ut *cepæ sub cineribus* assat. *pulv. rad. lilior. alb. caric. ping. ol. cham. amygd. amar. &c.* Ulcere rupto, si pus effluens sit album, æquale, &c. melius est, quam si sordidum, saniosum, &c. fuerit: sufficit, si modo mundus servetur meatus auditorius, id quod optime mediante *urina humana* assequimur; si ulcus fuerit sordidissimum *urinæ* addi possunt *succus cepæ & mel ros.*

(*Otalgia curatio.*) Art. 1122. Otalgia, five auris doloris causa frequentissime est inflammatio, de qua modo dictum est; interdum vero ab acri humore provenit, ubi non est adeo insignis ardor & pulsatio. Fumus *nicotianæ* cum fistula inversa auri immixtus valet ad dolorem compescendum, item *millepedes in ol. communi* vel *amygd. amar. infusi*, & *ol. scorpion.*

(*Vermes in auribus.*) Art. 1123. Si dolor autem a vermibus fuerit, dolor tunc vage lancinans, hinc inde rodens percipitur: educendi sunt vivi, aut intus enecandi;

(*Quid agendum sit.*) *Lac tepidum* auribus immixtum dulcedine sua vermes allicit, ita ut prodeant: *succus absynthii* interficit, vel angit eosdem, item *oleum nucleorum persicorum*, vel *amygd. amar. diacolocynthidis quercetani* cum granis aliquot *mercur. dulc.* item *elix. propriet. argentum vivum* in aq. appropriata incoct. &c.

(*Tinnitus.*) Art. 1124. Tinnitus aurium frequentissime est affectus chronicus & valde molestus, interdum in omnimoda surditate terminatur; raro curatur, sæpe recidivat.

(*Curatio.*) Art. 1125. Præmissis universalibus, suffitus ex succino, olibano, & gum. animæ est egregius; spiritus sal. armoniac. cum bombyce in aurem immissus tanquam singulare a Lindano laudatur; item fel lucii piscis, ol. castor. zibet. &c. in usu sunt.

Riverii sententia.

(*Surditas.*) Art. 1130. Surditas & gravis auditus secundum magis & minus tantum differunt, eo affecti ægre sonum percipiunt; auris afficitur vel in exteriori vel in interiori parte.

(*Causa.*) Meatus auditorius interdum cerumine vel alia quavis forde obturatur; in interiori parte auris affici potest humoribus in cavitate collectis, qui frequentius pituitosi sunt.

(*Curatio.*) Art. 1131. Obturatio externæ aurium cavitatis oculis ipsis dignoscitur, si ad solem cavitationem introspicias. „ Pro cavitate „ externa eluenda uti licet decocto folior. salviæ & flor. rorismarin. „ in p. æ. aq. & vin. alb. facto, quod cum syphone prudenter inji- „ ciatur. “ Nihil æque conducit in surditate a causa internâ etiam post centum remediorum usum, quam ut æger præmissis præmittendis sulphureis balneis caput madefaciat; sedeat sub canali balnearum, & verso epitonio, aquam accipiat. Ova formicarum contrita & cum succo cepæ in aurem infusa quam vetustissimam surditatem perferant. Si affectus sit contumacissimus post omnia incassum tentata excitare licet pyralismum ex inunctione mercuriali.

Ettmulleri sententia.

(*Remedia externa.*) Art. 1132. Inter remedia externa in surditate præ reliquis granum moschi, vel ambre, vel zibethi cum bombyce involutum & vesperi auribus immisum est optimum remedium, præcipue in senibus; laudatur etiam fel anguillæ cum spiritu vini, & fel perdicis a Lindano, liquor ex ovis formicarum expressus, si quid aliud, admodum confert. Sunt qui valde commendant suffitum ex sulphure mediante fistula in aurem transmissum; extremum remedium est salivatio. Vapor auricularis Fulleri.

UVULÆ RELAXATIO SIVE PROCIDENTIA.

(*Uvulæ relaxatio.*) Art. 1133. Gurgulio seu uvula est glandula pendula ad formationem & modulationem vocis conferens, quæ defluxionibus, æque ac aliæ glandulæ, obnoxia est; si infra tumeat, supra gracilis evadit. E palati extremo propendit, inque fauces & gulæ caput fertur, itaque hæc loca fistillatione quadam afficit, metuque præfocationis sollicitat.

Riverii sententia.

(*Causa.*) Art. 1134. Humor pituitosus in columellam defluens, eam humectat, emollit, & relaxat, ut longior facta partem superiorem oesophagi tangat, & nauseam pariat.

(*Curatio.*) Art. 1135. Evacuantia universalia eadem esse debent ac in catarrho. In principio topica astringentia & repellentia conveniunt, quemadmodum in curatione angina, quibus postmodum resolventia & exsiccantia erunt admiscenda: Remedia autem forma pulverum potius quam liquidorum sunt ut plurimum utiliora & efficaciora, præsertim si nulla adsit inflammatio.

(*Excisio.*) Excisio est ultimum remedium, sed cum suprema cautione admolienda est; nam valde periculosa est (inquit Hippocrates Prog.) de qua operatione videantur authores chirurgici. „ Audiamus „ Tul-

„ *Tulpium*. A medicis prolapsus palati vel omnino prætermittitur, vel
 „ leviter tractatur; & tamen vitium est non minus grave quam rarum.
 „ Vidi equidem tumorem hunc in palato adeo celeri gressu exortum,
 „ ut vix licuerit cogitare de Gargarismate, ne dum de aliis auxiliis;
 „ præterquam de sola *scalpelli incisione*, qua dextre & festinanter id
 „ temporis instituta vidimus non modo effluxisse inde plurimum a-
 „ quæ, sed detumescente palato ad se rediisse hominem extinctioni
 „ jam proximum. Unum ex optimis remediis pro uvula prolapsa est
 „ *semen cannabis* in posca parum coctum pro gargarismate (inquit
Ettmullerus).

(*Remedia varia.*) „ Proficua quoque esse possunt sequentia pro ar-
 „ bitrio vel potius iudicio periti medici usurpata; *decoctum catechu*,
 „ *decoctum rad. tormentil. cum pauco sale armoniaco & alumine cru-*
 „ *do, gargarisma pro uvula, pulvis uvularis.*“

A P H T H Æ.

Boerhaavii Sententia.

(*Aphthæ quid & quas partes occupant.*) Art. 1136. Aphthæ sunt parva,
 rotunda, superficialia ulcuscula os internum occupantia; sunt enim
 exulcerationes ultimorum emissariorum, hinc occupant omnia loca,
 ubi talia emissaria hiant; adeoque labia, gingivas, genas internas,
 linguam, palatum, fauces, tonsillas, uvulam, gulam, stomachum,
 intestina tenuia, (ad anum usque) ubique fere eadem specie. Præ-
 cedere solent, febris, incipiens cum diarrhœa vel dysenteria, nausea,
 appetitus prostratus, præcordiorum anxietas, debilitas magna, eva-
 cuatio notabilis, stupor, somnolentia.

(*Varius aphtharum color.*) Varius est aphtharum color, albus, fuscus,
 flavus, lividus, niger, quorum posteriores sunt peioris notæ. Sapor
 omnis aboletur; adest plerumque oris siccitas, interdum, crustis de-
 ciduis, salivatio vel diarrhœa adoritur, imo dysenteria ex vasorum
 dilatatione.

(*Curatio.*) Art. 1137. Ut curetur optime hoc malum, exhibenda sunt
calida, diluentia, resolventia, & abstergentia, ut crusta in facilem ci-
 rumque lapsum disponatur; simulac lapsus conciliatus est, tum *anodyno*,
demulcente, & simul parum corroborante medicamento utendum, uti *ge-*
latin. C. C. vel seq. 2℥. Aq. ros. stillat. syr. papav. alb. una. ʒij. vitel-
lor. ij. Misce; hujus pauxillum ore assiduo contineatur. In fine dan-
 dum *catharticum corroborans ex rhabarbaro, &c.*

Ettmulleri Sententia.

(*Aphthæ unde.*) Art. 1138. Aphthæ succedunt frequentius febribus in-
 gentibus, aliquando oriuntur ex vitio salivæ, & cruditate ventriculi.
 Aphthas futuras in morbo cognoscimus ex sopore & singultu; qui to-
 to morbi decursu non dormiverunt, in soporem incidunt, & tunc a-
 phthæ prodeunt. Singultus accidit, si sint ex ventriculo, & tunc
 plerumque sunt deteriores.

(*Curatio.*) Art. 1139. Nil pejus quam sæpius purgare in hoc malo.
 Tota curatio consistit in *humectatione*, quæ emolliat, & leniter cale-
 faciat; optimum est *decoctum raparum cum nitro*, item *decoctum herb.*
bellidis major. cum ficibus & sal. prunel.

Farrago sententiarum.

(*Laudanum ultimum remedium.*) Art. 1140. *Spiritus vitrioli vel sulph.*
melli rosaceo permixtus in pueris ac adultis a *Riverio* commendatur; si

vero morbus sit valde pertinax (inquit idem) & humorum fluxus copiosus, adeo ut vita sit in summo periculo, extremum remedium est *Laudanum*, quod dolorem sedat, & humorum fluxum inhibet.

(*Cortex Peruv.*) Art. 1141. Post febrem aphthæ, vel singultus, vel horum utervis, si non sponte faceffat, sed in longum tempus decurrat, facile fugatur usu *corticis Peruv.* Usurpari potest ad os colluendum *garisima* sequens ℥℥. *Suc. pomorum agrestium* (omnium opt. *Cochagee*) ℥ss. *Syr. de rub. idæ.* ℥j. m. *Sydenham sched. men.*

(*Remedium singulare.*) Art. 1142. „ Sequens omnibus remediis, quæ
„ hætenus expertus sum, multis *parafangiis* antecellit in hoc morbo
„ vincendo ℥℥. *Terr. japon. pulverisat.* ℥ij. *coq. in aq. calc.* ℥xij. ad ter-
„ tiæ partis consumptionem, colaturæ add. *sacchar. saturn.* ℥j. *met.*
„ *ros.* ℥ij. capiat æger *coch. j.* singulis horis vel sæpius, teneatque
„ paulisper in ore & sensim deglutiat: est remedium vere aureum.
„ Videantur plura in cap. de infantum morbis. (1559.)

G U T T A R O S A C E A.

Ettmulleri Sententia.

(*Gutta rosacea.*) Art. 1143. *Gutta rosacea* est rubor faciei tuberosus, pustulosus, guttis interdum sanguineis similis, qui nasum sæpe & genas inæqualiter & valde tingit, potatoribus satis frequens est; ut plurimum ad mortem usque comitatur. Præmissis universalibus conveniunt *saturnina*, &c.

Turneri Sententia.

(*Morbi nomina & descriptio.*) Art. 1144. *Gutta rosea* seu *rosacea* ita dicitur a parvis rubicundis quasi guttulis, sive tuberculis igneis per universam faciem, & præcipue nasum hinc inde sparsis. Appellatur etiam *rubedo maculosa*. „ Rectius vero, me iudice, **INSIGNIA BAC-**
„ **CHANTIUM FLAGRANTI FULGORE RADIANTIA.** Est mor-
„ bus profecto apud *Damnonios* & *Belgas* maxime familiaris & fere
„ *Endemius* ob pravam bibendi consuetudinem. „ Tres gradus a quibus-
„ dam numerantur, viz. *Rubedo simplex*, *rubedo pustulosa*, & *rubedo*
„ *ulcerosa*; „ facies & nasus aliquando in molem prodigiosam supercre-
„ scunt, adeo ut vultus aspectu horrifico plane tremendus & mon-
„ struosus evadat.

(*Ad gradum eminentem provectus.*) „ Novi quendam hoc morbo glo-
„ riose affectum, cui inter pocula, quibus liberrime indulgit, sanguis
„ per ipsam cutem variis in locis exilire consuevit, & ubertim con-
„ fluere, quod per aliquot momenta potationis negotio impedimen-
„ to esse solebat; mox vero suppressa hæmorrhagia, ut canis immu-
„ dus vel amica luto fus ad sordem & illuviem se recipere solent, ita
„ ille ad charissimam computationem lætus redibat, ibique commo-
„ rari solitus, donec vultum in *torrem* accenderet, tantum non ignem
„ undequaque spargentem, ipsis tenebris fulgentem. „

(*Sobriis raro accidit.*) Art. 1145. Agnoscendum est interim hunc morbum maxime abstemiis & temperatis interdum, sed rarius accidere; ut plurimum enim spirituosorum liquorum ingurgitatione accersitur.

(*Curatio.*) Art. 1146. Ut ad curam sternatur via, imperandus est *victus humectans & refrigerans*, & idem regimen observandum ac in *psora*, vel in *eruptionibus scorbuticis*; sed maxima adhibenda est cautela in his mutationibus faciendis; a liquoribus calidis & spirituosus ad

victum tenuem & potum refrigerantem non est facilis transitus. Ex *antimonio* & *mercurio præparata* tam interne quam externe sunt maxime proficua. Author noster more solito quamplurima remedia ex *Sennerio*, *Mayernio*, &c. accumulavit, sed in calce monet se multoties opem tulisse singularem remediis facile parabilibus & minus pomposis, nimirum cum *sale tartari*, *nitri*, *sacchar. saturni pomato* admist. *albumine ovarum* cum *frusto aluminis*, aut cum *granis aliquot camphoræ* & *sublimat.* item *ol. myrrhæ*, sequens valde efficax perhibetur, 2℥. *ovum duriuscule coctum*, *eximatur vitellum* & cum *pulv. myrrh. elect.* suppleatur locus, & in cellaria suspendatur, ut per deliquium fluat: hoc etiam est *cosmeticum* insigne, ut & *unguentum faciale Bat.*

(*Remedia varia.*) Art. 1147. „ In eruptionibus pustulosis levioribus „ linimento sequente feliciter usus sum; 2℥. *Ung. diapomphol.* 3℔. „ *mercur. dulc.* 3j. *alum. ust.* 3℔. *ol. rhod. gut.* iij. *ol. ros. qu. f. mi-* „ *sce.* In graviore casu linimento & lotione sequentibus præmissis rite „ præmittendis; 2℥. *Litharg. auri* 3j. *sacchar. saturn.* 5j. *ung. pomat.* „ *fragrantissim.* 3j. *ol. rhod. gut.* iv. *amygd. dulc.* q. f. m. f. linimen- „ tum pro locis in facie maxime affectis sing. diebus vesperi illinen- „ dis. 2℥. *Aq. plantag.* 3vj. *succ. limon.* 3ij. *mercur. sublimat. gr.* xij. „ *camphor.* 5j. *infund. clausæ* & calide per horæ dimidium, colatura „ sit pro lotione bis vel ter in die usurpanda. Hæc ultima est *Aq. di-* „ *vina Fernelii*, & sequens *Pitcarnii.* „ 2℥. *Litharg. aur.* 3ij. *mercur.* „ *sublimat corrosiv.* 3j. *acet.* 3x. *infund. per hor. 12. in vase stanneo sæ-* „ *pius agitando*; post subsidentiam effundatur liquor limpidus. Usus tempo- „ re instillantur guttæ aliquot *ol. tart. per deliquium*, donec lactescat. „ In „ eundem finem adhiberi potest etiam *Aluminatum Bateanum* præmis- „ sis rite præmittendis.

C A P. XI.

Sive Fasciculus Morborum undecimus.

M O R B I C U T A N E I.

Ettmulleri sententia.

(*Cutis nigredo.*) **C**UTIS nigredo est vel *nativa*, vel *accidentalis*, prior est incurabilis; posterior, quæ ab ardore solis contrahitur, succo citri tollitur; idem facit spiritus vini camphoratus, item tinctura benzoës.

(*Curatio.*) Interdum saponēs odorati cosmetici a delicatis expetuntur, qualis est sequens; 2℥. *Sapon. Venet.* 1℔j. *amygd. amar. nucleor. persic. excort. ana* 3ij. *pulv. rad. iveros flor. Aron. ana* 3j. *sal. tart.* 3℔. *ambræ gris. mosch. cum spiritu rosar. solut. ana* 3℔. *zibet. gr. v. cum q. f. essentia benzoës f. massa saponiformis.* „ Sequens est cosmeticum insigne 2℥. *Flor. bismut.* 3ij. *ung. pomat. albiss. & fragrantiss.* 3vj. *ol. rhod. gut. ij. misce.* Ut etiam *arcanum cosmeticum.* „

(*Lentigines.*) Art. 1149. Lentigines sunt maculæ obscure flavescentes magnitudine lentis, faciem, collum, & manus defœdantes; cuti pertinacissime adhærent, nec facile curantur in iis, quibus per aliquod tempus effloruerunt.

(*Curatio.*) Lac virginale, *ol. tart. per deliquium*, *ol. myrrhæ per deliquium cum albumine ovi parat.* &c. ad lentigines tollendas a quibusdam usurpantur.

(*Ephæ-*

(*Ephelides* .) Art. 1150. *Ephelides* sunt maculæ cutaneæ fuscæ & interdum asperæ, mulieribus communes, quæ potissimum frontem, interdum genas, imo collum & manus deturpantes, in longum & latum sæpe ad palmæ magnitudinem se explicant; gravidas in specie afficiunt, in quibus etiam per reliqua ingravidationis signa dignoscuntur.

(*Maculæ hepaticæ* .) Art. 1151. *Maculæ hepaticæ* sunt obscure flavi coloris interdum ad palmæ fere magnitudinem, nunc minores cum cutis aliquali asperitate; occupant imprimis collum, pectus, atque dorsum, interdum manus cum singulari pruritu. Curantur ut *Lentiginēs* (1149.)

(*Sudamina* .) Art. 1152. , *Sudamina* sunt papulæ sudorum in collo, pectore, brachiis, &c. oriuntur a sudore bilioso cutem exasperant, te. , *Schmitz*, Milii granis similia sunt, causa proxima est serum plus minus acre. *Ettmüller*.

Effere .

(*Effere* .) Art. 1153. *Effere* est tuberculorum genus in *Græcorum* & *Latīnorum* scriptis non occurrens; sed ab *Avicenna* & *Arabibus* describitur, & in nostris regionibus frequenter reperitur. Vocatur *Effere*, *Sora* & *Sare*; erumpunt tubercula parva ad rubrum vergentia, duriuscula, cum insigni pruritu, subito universum corpus occupant, non secus ac si ab *Apibus*, vel *Vespis*, vel *Culicibus* homo demorsus, aut *Urticis* percussus esset, ex biliosis & falsis humoribus oriuntur. Tubercula hæc plerumque brevi temporis spatio, etiam nulla cura adhibita, sponte evanescere solent; & fortasse morbus est paulo lenior & benignior, quam eruptio illa quam nos vocamus *a Rash*, vel quam *Erysipelatis* secunda species *Sydenhami* (1168.) In opere practico circumspeditione & cautela opus est, præcipue si cum eo febricula conjuncta fuerit; nam in hujusmodi eruptionum diagnosi, prognosi, & curatione primæ notæ medicos deceptos novimus.

(*Phlyctænæ* .) Art. 1154. *Phlyctænæ* seu *Phlyctenes* sunt vesiculæ parvæ pruriginosæ & ferventes, sero limpidio repletæ, quæ intra digitos & circa carpos oriri solent: Interdum in scabiem & serpiginem degenerant, curantur ut aliæ eruptiones cutaneæ.

(*Sirones* .) Art. 1155. *Sirones* sunt pustulæ in volis manuum & plantis pedum æstivo tempore emergentes, & cum insigni pruritu molestantes, in quibus latent subtilissimi *vermes Sirones* dicti; acû effodiendi sunt; usurpanda sunt *unguenta* & *lotiones mercuriales*.

(*Vari* .) Art. 1156. *Vari* sunt tumores parvi & duri ex rubedine in summitate tandem albescentes, ut plurimum in facie & collo oriuntur magnitudine seminis canthabis. Juvenes utriusque sexus ad venerationem aptos præ cæteris molestant; ubi rubor intensus conjunctus est, difficilis est satis curationis, & licet pustulæ removeantur, rubedo tamen permanet, cui si inflammatio & raucedo jungantur *Lepræ* imminens signum est. *Lac virginis*, *sachar. saturn. essentia benzoes*, *camphorata*, &c. usurpari possunt.

(*Curatio* .) Art. 1157. *Lichen*, *serpigo* & *Herpes* sunt affectus sibi ipsis cognati, gradibus vero a se invicem distantes.

Art. 1158. In *Lichene* cutis est aspera cum pustulis hinc inde erodentibus, crustis furfuraceis & cum summo pruritu ad partes vicinas serpentibus.

HERPES.

Turneri sententia.

(*Herpes simplex.*) Art. 1159. Herpes simplex est cum pustulæ singulæ (plerumque in facie) oriuntur; sunt albidæ, aut flavæ, & acuminatæ cum basi inflammata; a puris guttula, quam continent, exoneratæ sponte exarescunt.

(*Serpigo.*) Art. 1160. Herpetis species secunda est *Serpigo*, nos Angli vocamus a *Tetter*, vel a *Ringworm*. Pustulæ minutæ accumulatim exurgunt, quandoque figura rotunda vel annulari cum dolore & pruritu insigni. *Serpigo* ad digestionem nunquam pervenit, tantum ex scalpura humore tenui defluit.

(*Curatio.*) Art. 1161. Difficillime curatur, postquam enim penitus extincta videtur, certis anni temporibus repullulare solet. Vulgus uti solet atramento; sed in morbo pertinaci præmitti debent universalia; egregie faciunt *aque minerales cathartice* & postea sequens linimentum.

℞. Unguent. rosat. ℥j. mercur. præcip. ℥j. Arcan. corallin. ℥ss. ol. Rhod. gr. ij. m. efficax etiam est *lac sublimat.* ut aliquoties expertus sum, sed usurpandum est cum cautela, ne inflammationem inducat. Lotio sequens a *Pargo* commendatur, ℞. Sulph. calcanth. alum. ana ℥j. macerentur in q. s. *aceti fortis*, & coletur liquor pro lotione.

(*Herpes miliaris.*) Art. 1162. Herpetis species tertia est *Herpes miliaris*, idiomate nostro audit *the Shingles*. Ex innumeris parvis pustulis constat variis in corporis partibus erumpentibus, viz. Cervice, pectore, lumbis, femoribus, &c. Locus affectus nonnihil inflammatur, æger leviter febricitat, assurgunt pustulæ albidæ & suppurantur, succedunt parvæ rotundæ crusticulæ semina milii referentes, unde nomen.

(*Curatio.*) Art. 1163. In hoc morbo tractando indicationes curativæ quoad remedia interna eadem omnino sunt ac in *Erysipelate*; cavendum est primario, ne repercutiantur pustulæ; conveniunt ergo discutientia: pustulæ eminentiores forcipe scindantur, & applicetur *ceratum ex oleo & cera*, ut vestimentis minus hæreant. In declinatione adhibere licet *exsiccantia*, ut *unguentum diapomphol. tutiæ*, vel potius nostrum *ceratum de lapide calaminari*. „ Applicatio sequens valde efficax perhibetur. ℞. Sem. sinap. contus. ℥i℥. vitriol. virid. in q. s. „ aq. plantag. solut. ℥ij. misce. Unguentum Herpeticum Bateanum usui „ esse potest. „

Art. 1164. „ Herpes miliaris ad naturam *Psoæ* proxime accedit (inquit *Wiseman*) quapropter *cathartica mercurialia*, nec non *alterantia*, ad curam rationalem exposcit. “

Schmitzii sententia.

(*Herpes exedens.*) Art. 1165. Herpes exedens est pustulosa inflammatio cum pruritu & rubedine, partem, in quam serpit, exulcerans; oritur a bile ardentissima; facile summum corpus ad epidermidem usque penetrat, ubi cum retinetur, nec ultra expirat, eam partem exedit.

(*Curatio.*) Art. 1166. Frequens *catharticorum* usus adhibendus est. Profunt *unguentum Diapomphol. & alb. Rbas.* nec non *plumbi lamina in aqua aluminosa diu macerat*. Si tumor usque adeo acris, ut *ulcus phagedænicum* excitet, quod mitioribus nequaquam cedit medicamentis, ad valentiora recurrendum; ad *Arsenic. sublimat. optime trit.* & cum *unguento alb. mixt.* Denique si magis magisque serpant *ulcus*, ad *ferrum ignitum* accedendum.

E R Y S I P E L A S.

Sydenhami sententia.

(*Erysipelas.*) Art. 1167. Erysipelas seu ignis sacer quamcunque partem corporis occupat, at præ reliquis faciem; ex improvise corripitur æger, dum sub dio versatur (*rusticis syderatio audit*); pars affecta paulisper intumescit cum dolore & rubore summis, (ac ingenti æstu, & denso minimarum pustularum ordine distinguitur; quæ aucta magis inflammatione in vesiculas subinde faceffunt. Sensim latius serpit malum, & de loco in locum progreditur & febrem habet conjunctam.

(*Alia species.*) Art. 1168. Alia est etiam species, licet rarius occurrens, ex nimia spirituosorum liquorum computatione plerumque orta; febriculam, quæ agmen ducit, mox excipit pustularum per universum fere corpus eruptio, quæ *urticarum puncturas* referunt, & nonnunquam in *vesiculas* attolluntur, mox recedunt cum pruritu vix tolerando, quoties scalpturam subeunt, denuo apparent.

(*Curatio.*) Art. 1169. *Venæsectio* convenit & postero die lene catharticum, & paregoricum hora somni. Pro usu externo fots *discutiens*, & mistura sequens, ℞. *Spir. vin. ℞℞. theriac. Andr. ℥ij. pulv. piper. long. garyoph. ana ℥ij.* misce, charta emporctica hac mistura madefacta parti circumvolvatur. Sanguis in hoc affectu est pleuriticorum similis, & quandoque secunda, vel tertia *Venæsectio* postulat.

Art. 1170. Altera species pari fere modo amollienda est, nisi quod remediis externis minus egeat.

Etzmulleri sententia.

(*Differentia ab inflammatione.*) Art. 1171. Erysipelas digito leviter pressum maculam albam ostendit & subito rursus rubescit, quod non fit in inflammatione, nisi fortius prematur. *Scorbutici* huic morbo sunt obnoxii.

(*Curatio.*) Art. 1172. Purgatio est summe vitanda: *venæsectio* est periculosissima: Est enim morbus *cutaneus*; ideoque interne *diaphoreticis* cura est inchoanda & absolvenda, inter quæ *Rob. Sambuci* eminet, est potens *sudoriferum*. Externe omnia unctuosa astringentia & actu frigida sunt fugienda. *Spiritus Theriacalis camphoratus* est remedium laudabile.

(*Curatio.*) Erysipelata per unguenta oleosa aut mucilaginoso inepte tractata subito serpentem inducunt *gangrænam*.

Freindii sententia.

(*Catharsis in Erysipelate capitis.*) Art. 1173. De purgatione in Erysipelate haud convenit inter authores, sed omnia dubitanter proponunt, & in ultimo morbi discrimine, vel nulla dant consilia, vel timiditatis atque hæitationis plena; mihi vero satis experimentis esse edoctus videor, ut pronuntiem in *capitis Erysipelate*, si quando cerebro tentato oboriatur Coma, delirium, nervorum distentio, aut nullam subesse salutis spem, aut *purgantia* maxime profectura. Neque in his rerum angustiis expectandum esse, quod & in variolis experimur, dum vel febris lenita sit, vel tumor planè subsederit. Nam cardiacis refrigerantibusve remediis contra febrem pugnare, topica admove, quid demum aliud est, quam nugas agere, donec in medio curationis cursu æger intercidat? Exemplum singulare hujus praxeos in medium profert doctissimus author *De Feb. commentar. vij. p. 117.* quod vide.

Farrago sententiarum.

Art. 1174. Erysipelas foris intro verti non bonum: intus vero foras bonum (inquit *Hippocr.*)

(Epi-

(*Epithema.*) Art. 1175. *Epithema sequens a Barbette commendatur.* ʒʒ. *Trochisc. alb. rhas.* ʒj. *camphor.* ʒj. *sp. vin.* ʒj. *aq. sambuc.* ʒvj. f. *mistura*, cum hac madescent lintea, & calide applicentur, & sæpius renouentur, quoties siccescunt.

(*Vindicatio mixturæ Sydenhami.*) Art. 1176. D. Turner valde commendat *misturam* ex *ol. sambuc.* & *aq. calcis* cum paucis *spiritu vini camphorat.* Existimat *misturam Sydenhami* esse nimis calidam, sed (credo) inexpertus loquitur; est enim profecto medicamentum in hoc affectu omnem laudem exuperans, ut per vicennium multiplici experientia comprobavi. *Cataplasma fimi vaccini* est valde proficuum ad dolorem leniendum.

(*Erysipelas symptomaticum.*) Art. 1177. In *Erysipelate symptomatico* convenit linimentum seq. ʒʒ. *ol. sambucin.* lixiv. ten. ana p. æ. agitentur invicem diutissime in phiala, donec in unguentum coalescant: valet etiam *lotio ad Erysipelas Fulleri*, quam ex experientia sua author laudat. (Vid. *Essere* 1153.)

P S O R A.

Ettmulleri sententia.

(*Scabies humida & sicca.*) Art. 1178. *Scabies* est vel *humida*, quæ apparet sub forma ulcusculorum cutaneorum; vel *sicca*, quæ saniem exsiccatam & incrustatam repræsentat.

(*Curatio.*) Art. 1179. *Humida* facilius curatur quam *sicca*; purgandum est cum *belleboro* & *mercurialibus*; conducunt *absorbentia* & *sudorifera* ex *antimonio* præparata, decoct. e *lignis*; *viperina*, rob. *sambuc.* &c. externe conveniunt remedia ex *saturno*, *mercurio*, *sulphure*, *calce viv.* *camphora*, *nicotiana*, *litharg.* &c. ʒʒ. *Ung. nicotian.* ʒʒ. *flor. sulph.* ʒij. *mercur. dulc.* ʒj. *ol. hyperic.* q. s. m. conveniunt etiam balnea ex *herbis* & *radicibus appropriatis* (in lixivio tenui coctis) Vide plura in cap. de morbis infantum. (1561.)

Celsi sententia.

(*Psoa quid.*) Art. 1180. *Scabies* (sive *Psoa*) est durities cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies; fitque ex his continuata exulceratio pruriens, serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis vero certo tempore anni revertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur; itaque eam, quæ talis est, ἀγρία Græci appellant, id est *feram*.

(*Prognosis.*) 33 In juvenili ætate sæpe ab aliis morbis præservat, vel 33 eos sanat; diuturnior in lepram migrare potest; in senibus contumax & curatu difficilis; *sicca* difficilior curatu, quam *humida*; quæ 33 ex interno humorum vel viscerum vitio oritur; & plerumque cruce erumpit; minime impedienda, nec intus repellenda.

Willisi sententia.

(*Quas partes obsidet.*) Art. 1181. *Psoa* sive *Scabies* est pustularum in corpore sparsim eruptio, præcipue circa juncturas artuum, & inter digitos, ab humore acri & falso procedens, ob pruritus insignem calpendi necessitatem inducens.

(*Contagiosa.*) Nullius certe morbi labes (*peste* tantum excepta) facilius aut certius quam *Psoa* propagatur.

(*Curatio.*) Art. 1182. Præmissa *venæsectione* utilissimi me propinatur *cevisia medicata* sequens, ʒʒ. *Rad. polypod. querc. lapath.* ana ʒiij. sen. opt.

opt. ℥iv. *epithym.* *turbith.* *mechoacan.* ana ℥ij. *santal.* *citr.* ℥j. *sem. co-*
riandr. ℥vj. *præpara* f. a. & f. *faccul.* pro *cerevis.* cong. iv. post dies
 v. vel vj. hauriatur & sumatur ℥xij. plus minus omni mane per viij.
 vel x. dies. Pro usu externo *sulphur* in hoc morbo virtutem quandam
 specificam habere videtur; & linimentorum fere omnium est basis.
 2℥. *Axung.* *porcin.* ℥iv. *flor. sulph.* ℥ss. *pulv. zinzib.* ℥ss. *ol. iart.*
per deliq. q. f. m. f. unguentum, cui odoris gratia addi possunt gut-
 tæ aliquot. *ol. rhod.* Unguenta ex hydrargyro sunt periculosa.

(*Alia Methodus curationis.*) Restat adhuc alius facilior & multo ele-
 gantior pruritus sanandi modus; nempe, ut indusium *aq. font. cum sul-*
phure pulverisat. incoct. & *exsiccatum super nudum corpus* per 4. vel 5. dies
gestetur; ita namque morbus iste sine balneatione, aut litus squalore, aut
 malo odore curari solet. Pauperes *flores sulphuris* cum lacte intus fumant.

Farrago sententiarum.

(*Sapo niger.*) Art. 1183. *Borellus* pro pauperibus & militibus com-
 mendat solam *saponis nigri* lotionem, sed cito abluenda est, ne cutem
 excoriet.

(*Radix bellebori albi.*) Art. 1184. 2℥. *Pulp. subtilissim. rad. belle-*
bori albi q. v. *flor. lact.* q. f. m. f. *Unguentum.* Acrem dolorem ex-
 citat, & interdum inflammationem; ideoque omnibus minus conve-
 nit: morbum vero, ubi usurpari liceat, fere semper certo sanat. De-
coctum ejusdem radice est forsan medicamentum tutius & elegantius.

(*Animalcula.*) Art. 1185. Ex pruritu intolerabili hunc affectum
 jugiter comitante *animacula* in causa esse, & morbi essentiam consti-
 tuere quidam suspicati fuerunt; unde etiam ejusdem *contagium* adeo
 prompte communicari crediderunt: sed nondum aliquid de hac re
 compertum habemus, nisi quod a Dre. *Bononio* traditum invenimus
Philos. Transact. N. 283. qui (si ei fides adhibenda sit) rem extra du-
 bium posuit: ille enim loco citato animalculum descripsit figura ex-
 terna instar testudinis, ejusdemque iconem exhibuit; ova quoque fa-
 cto scrutinio reperit, unde generatione citissima quemadmodum pe-
 diculi producuntur. Curiosus videat locum.

(*Salvatio.*) Art. 1186. In morbo inveterato & remediis aliis haud
 cedenti excitare licet *Ptyalismum*.

(*Remedia potentiora.*) Art. 1187. In officinis optimum remedium
 est *unguentum ex oxylapatho*. Potentissima sunt balneum & linimentum
 ex *Barbette*. Interne *athiop. mineral. bezoar. mineral. carn. viperin. an-*
timon. diaphor. tinct. antimon. decoct. e lignis gum. guajac. &c. exter-
 ne *unguentum herpeticum, unguentum psoricum mercuriale, lotio mer-*
curialis; hæc postrema cum cautione sunt usurpanda.

I M P E T I G O.

Willisii sententia.

(*Impetigo quid, ejusdem graphica descriptio.*) Art. 1188. Impeti-
 go varia sortitur nomina, appellatur *Lichen, vitiligo, lepra grecorum,*
 &c. Imprimis papillæ sive pustulæ rubræ, modo singulares, modo plu-
 res simul congestæ in variis corporis partibus, præsertim vero in bra-
 chiis aut cruribus exoriuntur; quibus singulis novæ adjunguntur, &
 laties serpentes sese in orbem diffundunt, cujusque harum superficies
 & nonnihil albida & squamosa apparet, unde, si scalpatur, squamæ
 decidunt, & ichor sæpe tenuis exsudat, qui tamen mox exsiccatus,
 in squamam rursus crustaceam indurescit.

(*Diffe-*

(*Differentia hujus morbi a Psora & Lepra.*) Hic affectus quandoque membra singularia infestat, reliquis partibus intactis; & est naturæ mediæ inter *scabiem* & *lepram*; differt a priori, quoad pustularum formulas; namque in *Psora* ubique fere singulares, & spatiis licet exiguis, ab invicem remotæ existunt, *hic* plures conglobatim, & quasi per racemos magnis intervallis sejunctos erumpunt. *Lepra* multo immanior est & horrenda, viz. crustacea & squamosa, ubique continua, & per totum corpus diffusa.

(*Curatio.*) Art. 1189. Impetigo difficulter admodum curatur, & si in affectionem quasi leprosam transeat, incurabilis ut plurimum evadit.

(*Per remedia magna.*) Remedia fere tantum magna in curando hoc affectu valent, cujusmodi sunt *venesectio*, *cathartica mercurialia*, *serum lactis* (medicatum) *acidulæ chalybeatæ*, *herbarum expressiones succulent.* *Decoct. e lignis*, *medicamenta chalybeata*, *salivatio*, &c. Sæpius lui venereæ aut scorbuti supervenit. Balneatio interdum nocet; novi plures haud graviter impetiginosos *Bathoniam* profectos, inde prorsus leprosos rediisse. *Acidulæ purgantes* contra impetiginem leviolem juvare aliquoties comprobavi, sed plus valent *aquæ Tunbrigenses*, &c. sed præ reliquis remedia *viperina* in hoc affectu, ut & in *elephantiasi* & ipsa *lepra* insignem habent virtutem. Inter topica balnea aut linimenta e *pice liquida* confecta, cæteris quibusque longe præstant; formulæ utriusque apud authorem subduntur. Fortissima sunt *unguenta mercurialia*.

(*Lepra.*) Art. 1190. „ Quantum confert ad hunc morbum curandum corpus in ipso mari frequenter abluere & aquas marinas sæpissime ac diutissime innatare est experimentum satis notum & peritissimis medicis comprobatum.

Ettmulleri sententia.

(*Lepra.*) Art. 1191. Lepra convenit cum scorbuto confirmato; est etenim summus & contumacissimus *scabiei scorbuticæ* gradus; in lepra vero longe major est succi nutritii corruptio, quam in scabie, quatenus non tantum cutis, sed etiam subjacentes partes carnosæ exulcerantur; scabies ferina & inveterata in lepram degenerare solet.

(*Signa diagnostica.*) Contagium ad tertiam vel quartam generationem interdum propagari solet. Inter signa externa apparet cutis nunc ad colorem lividum & nigrum vergens; nunc flavescent & ex rubro nigricans. Aeri exposita mox corrugatur, exasperatur & infrigescit, tota apparet unctiosa, ut aqua ipsi inspersa vix hæreat, sensim crassescit, rugosa & asperior redditur; fursure nunc albicante, ac si calce incrustata esset, imprimis in facie adspersa videtur, multisque nodositatibus, tuberculis mobilibus & indolentibus, potissimum pone aures, circa frontem, mentum, & artus defœdatur, & morphæa, impetigine, & scabie sicca pertinaci, aliisque pustulis afficitur (de reliquis signis diagnosticis consulatur auctor. (pagin. 587.))

(*Prognosis.* Art. 1192. Lepra inveterata incurabilis est, sanguis in lepra foetidus est & nigrescens; serpigo, & impetigo in manuum ac pedum digitis, cum pilis parvis ascendentibus est malum signum.

(*Curatio.*) Art. 1193. Tanquam *Lues Venerea* curanda est. *Viperina* maxime conducunt. *Balnea*, *Thermæ*, &c. in usu sunt.

Turneri sententia.

(*Quibus regionibus frequentior est.*) Art. 1194. Lepra Græcorum apud nos saltem non est adeo frequens, aut maligna, ac apud exteros, ubi comparata sunt *Nosocomia Sti. Lazari*, ut ob funestam morbi contagionem infecti

infecti ab humano genere prorsus dissociantur. *Ambrosius Paræus* animadvertit in nonnullis *Germaniæ* regionibus eam inveniri, sed frequentius in *Hispania*, & per totam *Africam*, & quibusdam locis in *Gallia*.

Art. 1195. Lepra ut plurimum circa cubitos & genua primo erumpit, mox latius serpit; & per universum fere corpus sensim caput attollit.

(*Curatio.*) Art. 1196. Lepra hæreditaria & inveterata est prorsus incurabilis. Ad hunc affectum curandum veteres & recentiores quoque commendant remedia *viperina*, item ex *antimonio*, *mercurio*, & *sulphure* præparata, *guajacum*, *radices oxylapathi*, *polypodi*, *epithemi*, &c. *Jacobus Dornynetus* virtutes decocti corticis ulmi magnopere extollit cum vino albo diutius propinati, asseritque remedium esse certum; extat in *Pharm. Bat.* Etiam si omnes fere scriptores in viperarum laudibus tanti sunt, *Fernelius* tamen & *Palmarius* eas esse omnino inutiles affirmant, præcipue in corporibus calidioribus.

(*Salivatio.*) Ipse *ptyalismus* ad hunc morbum contumacissimum penitus eradicandum impar frequentissime invenitur. Inter cætera linimentum sequens in usum adhibere soleo, ℞. Unguent. e flor. aurant. ℥j. mercur. præcip. alb. ℥jss. camphor. ℥ss. vitriol. alb. ust. ℥j. misce. Author noster copiosa formularum segete ex optimis scriptoribus collectarum abundat, & revera de morbis cutaneis erudite ac pulchre scripsit.

Ex Cl. Deodato apud Fabricium Hildanum.

(*Elephantiasis descriptio.*) Art. 1197. Elephantiasis Græcorum, seu Lepra Arabum, est affectus contagiosus plurium vitiorum congeries corpus defœdans. In cute vel faciei, vel frontis, vel genarum, cubiti, femorum, manuum, pedumve tubercula facile mobilia, indolentia, & ex livore ad rubedinem tendentia, horridumque aspectum præbentia epullulant; in ore, in palato, in faucibus circa linguæ radicem, tubercula nunc flavescentia, nunc sublivida exoriuntur; in pedum digitorum interstitiis, vel in plantis, in crassa præsertim & dura illius parte, item in aliis artuum locis ulcera efflorescunt, hæc ulcera & fissuræ veram cutem penetrant, lata sunt, & ulterius serpunt labiis callosis ac pertumidis, atque læsa facile cruentant, indolentia licet: ulcera quoque nares depascunt, adsunt tumores in aurium ambitu, crassescunt labia, pedes manusque valde inflatæ ac tumidæ sunt.

Ettmulleri sententia.

Art. 1198. Elephantiasis Arabum ita vocatur, quia cutis tumida, rugosa, & aspera apparet. Senes vino liberalius indulgentes quandoque invadit.

(*Morbus describitur.*) Est tumor pedum (crurumque) rubicundus, lividus seu nigricans cum ulceribus varicosis, e quibus serum acre limpidum effluit; interdum etiam solæ crustæ fursuracæ totos pedes occupant (*Lepra est universalis*). Affectus ut plurimum est criticus, ideoque cavendum est ab externis repellentibus, ne gravius malum excitetur.

Turneri sententia.

(*In nostris regionibus vix occurrens.*) Art. 1199. Elephantiasis sive Lepra Arabum est morbus in nostris regionibus, saltem nunc dierum vix cognitus. Ab *Aretæo* eleganter describitur; nomen accipit (inquit ille) ab aspectu foedo & deformi, ex partium inæquali protuberantia, & cutis densitate ac scabritie, hinc inde rugis & fissuris, labiis tumidis interspersæ, elephantis cutem quodammodo referentis. Mendicantem in agro

agro prope Londinum jacentem vidimus morbo huic maxime affini miserrime laborantem.

(*Est incurabilis affectus.*) Art. 1200. Hic affectus apud authores *Leontiasis* & *Satyriasis* appellatur; & ob magnitudinem morbi a plerisque medicis plane incurabilis merito agnoscitur. *Remedia ad lepram Græcorum*, si quæ alia, hic locum habent. *Decoctum ulmi Pharin. Bat.* potanti graveolentissimos movet sudores (inquit author) & cum vino albo epotum ab *Elephantiasi* & *Lepra Græcorum* liberat.

Towneri sententia.

(*Æthiopibus familiaris.*) Art. 1201. In Insulis Caribarum *Æthiopes* servituti mancipati (& etiam inter incolas alterius coloris nonnulli) *Elephantiasi* sunt obnoxii; graviore alicui morbo ut plurimum est succedanea, iis præcipue, quibus ex dura necessitate infortunium est vitu insalubri sustentari, accidere solet. Hic sequitur morbi hujusce *graphica descriptio*, quam videre licet apud authorem, eadem fere cum modo ab *Aretæo* memorata. Morbo jam plene formato homo cæteroquin bene se habet, neque incommoditatem ullam sentit, nisi molestum onus monstrofi cruris, quocum tamen per viginti annos duræ servitutis muneribus, quibusdam saltem, fungi novimus. *Elephantiasis amputato crure* solet statim alterum invadere.

C O M B U S T I O.

Ex Pavio apud Hildanum.

(*Combustionis definitio.*) Art. 1202. Combustio est solutio continuæ epidermidis, & cutis ut plurimum, nonnunquam etiam carnis musculosæ, venarum, arteriarum, nervorum, &c. vi ignis impressa: hanc autem combustionem sequuntur mox dolor acerbissimus, inflammatio, pustulæ; & si combustio profunda, corpusque cacoëchymicum fuerit, facillime degenerat in ulcus foetidissimum & malignum.

(*Primus gradus.*) Art. 1203. Tres sunt gradus combustionis. In primo gradu cutis rubicunda est, dolor acerbissimus & pungitivus, non aliter, ac si cutis urticis fricata esset, mox inflatur locus & elevantur pustulæ, in quibus aqua clara & alba continetur, tandem quoque epidermis separatur; primum & præcipuum negotium est ut impediamus, ne pustulæ oriantur, hocque fit, locum combustum in oleum vel aquam calidam quantocius immergendo, vel ad ignem admovendo;

(*Intentio curativa.*) Hinc cepe in mortario cum sale confusæ & paucis saponem empyreuma ad se attrahunt.

(*Gradus secundus.*) Art. 1204. In secundo gradu pars illico inflatur, rubescit, dolet, urit, & ipso momento pustulæ elevantur: est enim vi ignis contracta atque densa.

(*Curatio.*) In hoc casu ubi vera cutis combusta & contracta fuerit, non cepæ, sal, sapo, &c. applicanda sunt, sed remedia emollientia, calida & humida; toti loco ambusto imponatur sequens unguentum; 2℥. Unguent. basil. ʒj. ol. ros. lilior. alb. ana ʒss. vitel. ov. N. ij. misce, & applicato defensativo, pars affecta involvenda est fascia in oxycrato madefacta; unguento prædicto addi potest crocus, vel etiam opium in extremo dolore.

(*Gradus tertius.*) Art. 1205. In tertio gradu ipso momento, dum res ignita adhæreat corpori, cutis illico evadit nigra vel saltem livida, & obtuse sentit, si scalpello pungatur; est enim dura & exsiccata crusta, ea cum deciderit, remanet ulcus profundum & putridum.

(*Curatio.*) Art. 1206. Tertius gradus est admodum periculosus ; est enim metus gangrænæ ; quo circa *escharæ* in diversis locis ad carnem usque incidenda est , idque fieri debet primo vel secundo die ; hoc facto , *unguentum* in secundo gradu præscriptum applicari potest , *defensativum* , &c. convenit *venesectio* revulsionis gratia . Sequens autem fomentum vim habet sedandi dolorem , cutem emolliendi , & digestionem promovendi . ℞. Rad. alth. ℥ij. sem. cydon. fœnugr. ana ℥ss. flor. cham. melilot. ana Mj. coq. in aq. font. q. s. pro fotu (& add. sp. vin.) Si vero combustio adeo magna fuerit , ut in gangrænâ degeneret , caute & cum judicio procedendum est , & semper aliquid applicandum , quod putredini adversetur .

(*Vesiculæ semper incidendæ !*) Art. 1207. Pustulæ statim ab initio in omni combustionē incidendæ sunt , ut aqua acris & fervida efflueret .

(*Oculorum combustio.*) Art. 1208. In oculorum combustionibus , fluxio humorum ad partem *venesectione* & omni arte inhibenda est ; oculis continuo instilletur lac muliebre cum aq. ros. commistum , & applicetur sequens cataplasma ; ℞. Pulp. pomor. assat. ℥ij. farin. fœnugr. ℥ij. bord. ℥j. coq. in lacte vaccin. & f. cataplasma , cui add. croc. ℥ss. Interim universalia recte instituantur . In omni combustionē , ubi dolor est vehemens & ultra tolerantiam , applicari potest cataplasma ex mic. panis alb. in lacte coct. cum paucis croco & opio ad dolorem mitigandum , ad tempus saltem , sed in oculorum combustionibus cavendum est de opio , Sanguis columbinus ab animali tepidus eximium habetur anodynum .

(*De cicatrice turpi præcavenda.*) Art. 1209. Magna adhibenda est cura ne turpis cicatrix post combustionem curatam relinquatur , ut autem hoc incommodum vitetur , ab initio usque ad finem curationis emollientia sunt usurpanda , & postea applicanda est lamina plumbea spissa mercurio inuncta .

(*Facies pulvere pyrio combusta quomodo curanda.*) Art. 1210. Si facies pulvere bombardico combusta & grana pulveris cuti infixæ fuerint , illico extrahendus est pulvis , quantum fieri poterit , acu vel alio instrumento acuto ; si vero chirurgus in principio non advocatus fuerit , ita ut cutis jam cicatrizata , maculæ vero nigræ relictæ fuerint , necesse est denuo exulcerare cutem *vesicatorio* .

(*Combustio a fulmine.*) Art. 1211. Ignis a fulmine omnium vehementissimus & periculosissimus est , in se continet facultates quasdam supernaturales , quibus animal quandoque protinus extinguitur . Si partes externæ lædantur secundum gradum ustionis sunt medicandæ , sicut in aliis combustionibus , nisi quod putrefacientia & escharam relaxantia hic locum non habent ; sed escharæ statim scalpello excidendæ sunt ; & interne optima cardiaca sunt propinanda .

(*Vires sp. vini in ambustis.*) Art. 1212. Omnibus remediis quotquot adhuc inventa fuere , spiritus vini facile palmam præripit in ambustis , cum cutem subjacentem ab omni putrefactione tueatur , ac vendicet , atque eo nomine curationem quam cito absolvat , digestionem , quæ nonnisi admodum tarde sua tempora percurrit , etiam non moratus : nempe si linthea spiritu vini imbuta partibus ab aqua ferventi , pulvere pyrio , vel simili , laxis , quum primum hoc infligitur malum , applicentur , eademque spiritu dicto madefacta subinde repetantur , donec dolor ab igne penitus evanuerit , & postea solummodo bis in die .

Farrago sententiarum.

(*Remedia varia.*) Art. 1213. In ambustionibus superficialiis (inquit Turner) mihi solemne est imponere *ol. lini & aq. calc.* simul conquassat. vel *ol. sambuc. & alb. ovor.* Vesiculæ aqueæ ressecandæ sunt, & *unguent. diapomph.* vel quo melius est *ceratum nostrum de lapide calaminari* locis excoariatis applicandum. Inde *ceratum* (pluribus intentionibus satisfaciens) convenit etiam in gradu secundo ambustionis. Et revera est medicamentum omnem superans laudem, non modo in hoc casu, sed etiam in *vulneribus & ulceribus* curandis. Extat apud authorem exemplum curationis ambustionis gravissimæ, in qua tota praxis venuste illustratur. Chirurgus librum consulat. „ Ubi plures „ partes, vel totum corpus ambustum est, raro ægri convalescunt, „ sed vehementia symptomatum misere moriuntur.

(*Nonnulla vulgaria.*) „ *Wiseman* commendat cataplasma ex *finio equino* ad empyreuma extrahendum. *Calx viva* multoties lota cum „ *ol. lini vel hyperici*, item *ceratum ex cerussa & ol. lini, spirit. vin. camphorat. &c.* sunt remedia vulgaria, sed minime contemnenda. Sequens est *Boyleanum*, 2℥. *Sacchar. saturn.* 3℔. *acet. vin. alb. opt.* 3iv. f. solutio, deinde add. *ol. sambucis* q. s. ut fiat unguentum.

C A P. XII.

Sive Fasciculus Morborum duodecimus.

TUMORES IN GENERE.

(*Definitio tumoris.*) **N** Usquam unquam vidi definitionem tumoris, nisi ex aliqua parte peccantem; quocirca sequentem in medio protuli. Tumor in genere est præternaturalis alicujus partis, vel totius corporis, magnitudo mole morbosa aucta.

Ettmulleri Sententia.

(*Tumores, eorundem tres species.*) Art. 1218. Tumores proprie dicti oriuntur vel a *stagnatione*, hoc est ab impedito fluidorum transitu; vel a *congestionem* paulatina, ubi facta quasi secretionem tumores procreantur; vel denique per novi humoris in parte generationem & collectionem; Exempla primæ speciei habemus in phlegmoribus, tumores oedematosis, flatuosis, &c. Per congestionem paulatinam nascuntur tumores critici; per novi humoris in parte generationem producantur topi, cancri, ganglia, tumores omnes in cystide contenti, &c.

(*Intentiones curativæ.*) Art. 1219. Remedia quod attinet, tumoribus in genere applicanda in tres classes dividuntur (secundum totalem curationis intentiones) in *resolventia*, *discutientia*, & *suppurantia*, repellentibus a medicis sanioribus jam ex usu merito repudiatis.

(*Resolventia primi gradus.*) Art. 1220. *Resolventia*, *emollientia*, & *attenuantia primi gradus* sunt *radices & herbæ malv. alth. mercurial. violar. lilior. alb. parietar. flor. melilot. sem. lini, fœnugr. caricæ lingues, uvæ passæ, axungie, medulla, ol. amygd. dulc. lilior. alb. unguent. dialth. &c.*

(*Secundi gradus.*) Art. 1221. *Resolventia secundi gradus* sunt *radices & herb. apii, puleg. cepæ cost. chærefolii, sambuci, cicut. scabios. hyper. troci, sambuci, chamæm. adeps anserin. ursin. gum. tacamahac. styrac. liquid. terebinth. farin. fabar. spermaceti, ol. cham. amygd. amar. hyperic. laurin. empl. de cicutâ cum ammoniac. diachylon. &c.*

(*Tertii gradus.* Art. 1222. *Resolventia tertii gradus sunt radices & herb. bryon. cucumer. agrest. rapban. cepæ crud. asari, scill. absynth. centaur. min. nicotian. sem. sinap. erucæ, cymini, gum. ammoniac. galban. bdell. sagapen. popanac. elem. myrrb. nidus hirundin. spir. urinæ, ammoniaci, spir. vini, fermentum. ol. lateritium, scorpionum, terebinth. lumbricorum, nicotianæ, petroleum, bals. sulph. Unguentum martiatum, diachylon cum gummi, ox. croc. diasulphuris, de cicuta cum ammoniac. de ranis cum mercurio. Ex simplicibus prædictis varia fieri possunt composita, fomenta, cataplasmata, &c.*

(*Discutientia.*) Art. 1223. *Discutientia sunt prædictis vicina (imò pleraque simplicia composita resolventium tertii gradus sunt discutientia) talia sunt, quæ quæ sequuntur, radices fœniculi, ireos, aristolochia rotund. cucumer. asinin. pyreth. zinzib. flor. sambuci, plantæ aromatica. origan. puleg. thym. maioran. rosmarin. absynth. salvia, ruta, sabin. lavend. salv. croci, anethos, bacc. junip. lauri, N. M. mac. &c. aromata, sem. anethi, cymn. fœnic. rutæ, sinapeos, castor, camphora, ol. lumbric. cham. cymn. anisi, spice, terebinth. succini, sulphuris, stercora animalium, &c. Ex prædictis simplicibus fieri possunt fodus, cataplasmata, &c. sequens cataplasma potenter discutit; 2℥. Flor. laur. rosmarin. rut. ana Mj. flor. cham. sambuc. summit. aneth. ana M℥. coq. in aq. & vin. a. p. æ. ad mollitiem, deinde add. far. fabar. furfur. stercor. vaccin. ana ℥iij. mellis ℥iv. m. f. cataplasma. ,, Fodus sequens est ,, valde discutiens; 2℥. Summit. hyperici absynth. centaur. min. ana Mij. flor. cham. sambuc. ana p. ij. bacc. junip. laur. ana ℥i℥. coq. in livix. ten. ℔vj. ad ℔iv. in colatur. dissolv. sal. ammoniac. crud. ℥j. & usus tempore add. sp. vin. commun. ℔j. ,,*

(*Diaphoretica interne.*) Art. 1224. *Externis hisce commodissime simul adhiberi debent diaphoretica interna ex alcalium republica desumpta.*

(*Suppurantia.*) Art. 1225. *Suppurantia denique sunt medicamenta, quæ maturationem faciliorem ac promptiorem reddunt; eminentiora autem sunt, quæ sequuntur; radix alth. lilior. alb. brionia, alth. flor. melilot. chamæm. croci sem. lini, fœnugr. far. bord. tritici, mic. panis alb. carica pingues, gum. ammoniac. oleum, lilior. alb. chamæmil. unguent. alth. fermentum acre, Sapo Venetus, stercus bovinum, &c. Sequens cataplasma est valde efficax, 2℥. Rad. alth. lilior. alb. ana ℥ij. fol. malv. Mj. pulv. sem. lini ℥j. ad mollitiem coctis add. cep. sub cineribus assar. ℥vj. Unguent. basil. ol. lilior. alb. q. s. m. f. f. a. cataplasma. Præ reliquis epregium suppurans est lac, in quo coctus est Sapo Venetus, plus minus pro ratione indicationis, hoc appositum cum linteis multiplicatis mire maturat, & aperit abscessus.*

(*Phlegmone quid.*) Art. 1226. *Phlegmone sive inflammatio est tumor ad tactum renitens cum tensione, rubore, dolore pulsatorio, & ardore; nunc quidem genuina ex sanguine puro, nunc vero spuria, ad erysipelata, vel œdematosos tumores, vel scirrhus propius accedens.*

(*Prognosis.*) *Omnes inflammationes vel insensibiliter discutiuntur, vel suppurantur, vel male tractatæ in gangrænam abeunt.*

(*Curatio.*) Art. 1227. *Interne conveniunt sudorifera ex alcalibus; & omnia ea, quæ in pleuritide usitata sunt, hic commode usurpari possunt, v. g. spermaceti cum antimon. diaphoret. additis quibusdam salibus volatilibus. Externe in initio decoctum sulphuris in urina, quod a Paracelso laudatur, item stercus vaccinum, equinum, &c. Si sit erysipelata conducit spir. vin. camphorat. cum flor. sambuci incoct. In ardore*

ardore magno religiose vitanda sunt oleosa. Si discuti nequeat remediis supra memoratis, ad suppurationem producenda est medicamentis appropriatis, modo recensitis; & cum maturus fiat, nisi sponte rumpatur, aperiendus est abscessus vel lanceola vel caustico *ex livio de sapone & calce viva in lapidem simul coctis*; & postea mundificandus, & consolidandus; omnibus his intentionibus satisfacit linimentum sequens, ℞. *Terebinth. clar. ℥j. mel. ros. ℥vj. bals. Peruv. vitel. ov. solut. ℥ss.* misce f. linimentum digestivum.

(*Inflammatio mammarum.*) Art. 1228. Sæpe ex lactis coagulo in mammis, aut quod alias stagnat acescencia vitiosa, inflammatio mammarum lactantibus accidit; hæc autem aliquando est erysipelacea; adfunt tumor, dolor, rubor, &c.

(*Prognosis.*) Inflammationes omnes mammarum sunt periculosa, quia ut plurimum abeunt in *abscessus*, & hinc in ulcera saniosa, interdum etiam in *fistulas*: si non abeunt in *abscessus*, indurantur in *scirrhus*, qui levi errore abeunt in *cancros*: rarissime enim inflammationes mammarum, in specie ex lactis coagulo, discuti possunt.

(*Curatio.*) Art. 1229. In genere in omnibus mammarum affectibus observandum est, quod mamilla affecta raro ad sanitatem perducatur, nisi altera sana lacte exsicceetur; quia dum lac irruit ad unam mammam, etiam fluit ad alteram, & sic malum exasperatur. *Aqua calcis vivæ*, si quæ alia, inflammationem omnem averit, resolvit, & discutit. Unum ex expertissimis ad mammarum inflammationes remediis est cataplasma factum ex farinis, viz. *Ex farina fabarum, lupinorum, & lentium in oxycrato coctis, & subactis, & cum albuminis ovi pauco mistis*; emplastrum de *spermate ceti Mynsicht.* empl. de *cicuta*, &c. inflammationes similiter resolvunt. Sed raro discutiuntur hi tumores, ideoque tutius est suppurationem promovere.

(*Tumores duri.*) Art. 1230. Ubi tumor est durus sine inflammatione, convenit sequens ceratum. ℞. *Summit. absynth. pulv. ℥ij. sem. lentium, fœnugr. feniculi ana ℥j. succ. hyoscyam. cicut. ana ℥iiij. unguent. dialtheæ ℥ij. axung. anatis, anseris ana ℥j. sevi cervin. ℥ij. styrac. liquid. ℥ss.* ceræ q. s. f. ceratum. Cicuta per se applicata nimium incalescit, & cutem exulcerat, sed in vino cocta, & cum axungia porcina contusa, hosce tumores duros emollit. *Wisen. m.*

(*Inflammatio testium.*) Art. 1231. Inflammatio testium frequentissime oritur ex ictu vel compressione violenta inter equitandum; adfunt dolores gravissimi; & nonnunquam convulsiones, & vomitus, & interdum metus est gangrænæ, nisi cito discutiatur; aliquando in abscessum tendit.

(*Curatio.*) Art. 1232. Curam quod attinet, mittatur sanguis copiosissime quamprimum, & injiciatur enema leniens & emolliens; interna eadem esse debent, ac in aliis morbis inflammatoriis. Externe pro discutiendo tumore & resolvendo expertissimum est cataplasma ex *farina fabarum cum oxycrato cocta & applicata*, addi etiam commodè potest *sem. cymini*, item *flores chamæmeli & meliloti*, & erit magis discutiens; si tumor discuti nequeat, suppurandus est cum maturantibus mitioribus.

(*In scirrhum vel cancrum transitus.*) Inflammatio male curata plerumque in scirrhum transit, & quandoque in cancrum abit, præsertim si punctiones acutæ sentiantur: in hoc casu discutientia sunt usurpanda, maxime autem conducit *Emplastrum de cicuta cum ammoniaco*.

(*Furunculus quid.*) Art. 1233. Furunculus (quem nos vocamus

a Boil) est inflammatio parva in locis extimis orta, in acutum tuberculum tendens, ovum columbinum magnitudine non excedens, cum rubore & dolore, interdum cum ardore atrocissimo, ac si carbo igneus admotus esset.

(*Quomodo tractandus est.*) Art. 1234. „ Furunculi ut plurimum periculo vacant; demonstrant plerumque constitutionem firmiorem, materiam peccantem foras propulsantem. Repellere est nefas; discuti non possunt, nec debent; frequentius sponte sua suppurantur, & aperti ex se coalescunt, si non, tantillo balsami Peruv. consolidari possunt. Si habituales sint, internis alterantibus præcavendi sunt, in quem finem rosmarinus, item radix bardanæ a quibusdam specie, fice prodesse habentur. „

Sennerti sententia.

(*Parulis.*) Art. 1235. Gingivæ quandoque inflammatione (quæ Græcis Parulis dicitur) cum dolore corripuntur, & apostemata patiuntur, quæ in ulcera, interdum cancrum, fistulas, gangrænam desinunt.

(*Prognosis.*) Malum per se patet, quod nisi maturis præsidii succurratur, in apostemata & ulcera diuturna, imo nonnumquam in gangrænam, vel in cancrum incurabilem abit.

(*Curatio.*) Art. 1236. Per revulsionem, derivationem, & gargarismata appropriata, &c. opera danda est in initio, ut præcaveatur apostematio; si vero ad suppurationem vergat, caricæ per medium discissæ imponantur. Si abscessus sponte non aperiatur, scalpello aperiri potest. Apertus abscessus hydromelite mundetur, tandemque ulcus exsiccetur & claudatur.

Celsi sententia.

(*Epinyctis quid.*) Art. 1237. Pessima pustula est, quæ Epinyctis vocatur, ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit; circa hanc autem vehemens inflammatio est, & cum aperta est, reperitur intus exulceratio muscosa, colore humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est, neque enim ea faba major est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & fere noctu, unde nomen quoque a Græcis ei ἐπινυκτίς est impositum. „ Periculo- „ sa non sunt hæc tubercula, molesta tamen ob dolorem; noctu in- „ quietudinem pariunt, & adustum ac vitiosum succum in corpore re- „ dundare significant.

(*Quomodo tractandæ sunt.*) „ Omnino suppurandæ sunt epinyctides, „ saniem ejiciunt sanguineam, digestivis & mundificativis tractandæ „ sunt, & „ ut furunculi, curandæ. „

(*Terminthus.*) Art. 1238. Huic tuberculo cognatum esse creditur Terminthus; verum quid proprie terminthus antiquorum fuerit (inquit Sennertus) vix satis constat, nisi quantum ex Galeno habetur, qui scribit terminthorum nomen nigras quasdam pustulas in cruribus maxime orientes, a figuræ, coloris, magnitudinisque similitudine, quam cum terminthorum, id est, cicerum fructu (ut vulgo vertunt, seu ut alii, & rectius terebinthi fructu) habent, derivatum, significare. „

PHYMA, PHYGETHLON, BUBO, & PAROTIS.

Hi sunt quatuor Glandularum Tumores Inflammatorii insigniores.

Ettmulleri sententia.

(*Phyma.*) Art. 1239. Phyma est tumor glandularum (sub maxilla infe-

inferiore) rotundus, acuminatus, plus minus rubens ac dolens; statim augetur & suppuratur.

(Curatio.) „Facilius curatur in pueris, difficilius in juvenibus & adultis, sed in his rarius accidit. „In cura a repellentibus cavendum est, ideoque illius conatus adjuvandus est medicamentis *maturantibus* impositis. „Applicari potest *diachylum cum gummi*, sed præstat „cataplasma *suppurans*. „

(Phygethlon.) Art. 1240. Phygethlon, Latinis Panus ob similitudinem fungi arboris adnascens, est tumor durus, phymate major magisque rubens ac dolens.

(Curatio.) Curatur (interdum) *discutientibus*, pro quo scopo convenit *oleum tartari fetidum* vel *ligni guaiaci*, his interdum *emollientia* cum *anodynis* junctis adduntur, &c. sed frequentius suppurantur.

Sennerti sententia.

(Bubo.) Art. 1241. Bubo est tumor inflammatorius in inguine vel sub axilla; cum rubore & dolore apparet, & plerumque febris levior accidit; & quidem si per crisin accidit bubo, eodem erumpente, statim levatur alius morbus.

(Prognosis.) Bubones *benigni* (non enim hic de *venereis* & *pestilentialibus* agitur) non sunt periculosi, præcipue si statim suppurentur; si vero diu protrahantur, & tardius maturentur, periculo non vacant, cum in fistulas periculosas facile abeant.

(Curatio.) Art. 1242. Curatio bubonum & aliarum inflammationum instituenda est eadem; hoc tamen probe notandum est, quod *suppurantia*, quæ adhibentur, debeant esse *fortiora* quam in aliis inflammationibus; glandulæ etenim sunt frigidiores quam aliæ partes, neque habent adeo exquisitum sensum. „Quamobrem *cucurbitula* cum fructu „etiam applicari possunt; in hunc finem etiam conducunt *fermentum acre*, *sapo niger*, *stercus columbinum*, *sem. sinap.* *urticæ*, *caricæ*, *cepæ assatæ*, &c. „

Ettmulleri sententia.

(Parotis.) Art. 1243. Parotides sunt glandularum pone aures inflammationes: plerumque post male judicatas febres protruduntur a fausto naturæ conatu. Murationi opera danda est, & tractandi sunt sicut *bubones*, & aliæ inflammationes ad suppurationem vergentes.

(Ranula.) Art. 1244. „Ranula est tumor sublingualis, mollis, albicans, & quasi pellucidus, œdematis speciem præ se ferens, linguæ motum ac loquelam impediens. Periculo ut plurimum vacat, nisi diuturnior fuerit, vel male tractatus; tunc enim metus „est, ne *canerosus* evadat. „

(Curatio.) Art. 1245. „Aperiendus est cultro, vel potius ferro ignito, prodire solet mucus ovi albumini colore & consistentia similis. „Compertum est etiam aliquando *lapillos* ibidem generari; ideoque „a chirurgo semper explorandi sunt. Post apertionem os abluatur sæpius in die cum *decocto hordei mel rosar.* & *tinct. myrrh.* „

(Paronychia quid.) Art. 1246. Paronychia est tumor ordinatio obveniens in extremitatibus digitorum, ultimis nempe articulis, ita tamen, ut non excludantur reliqui articuli. Quandoque est erraticus, & ex uno digito in alium transit, ita ut uno persanato mox vicinus inquinetur, donec omnes successive infestaverit: tantus est dolor, ut subinde universum brachium consensu afficiatur.

(Causa.) Oritur ex humore acri admodum corrosivo, immediate perio-

periosteum, & ipsi adhærentes *tendines*, occupante; supervenit inflammatio ad apostema vergens, sed frequentius gangrænescit.

(*Curatio.*) Art. 1247. Quo citius ichor maturatur, eo minus periculum est ossis cariei, in hunc finem quidam applicant *sterquilinum*, & sic dolor & tumor optime discutitur, & sistitur: „ Cataplasma *Lumbricorum vivorum* subito atrocem dolorem sedat, uti testantur plurimi authores. „ Ubi vero paronychia altiores egerit radices, opus est incisione, quæ etiam tutissima est, & quidem usque ad ipsum os; facta incisione *theriaca* cum *spiritu vini* soluta digito applicanda est.

(*Paronychia pedis digitorum.*) Art. 1248. Huc quoque pertinet affectus perniciosissimus, qui *pollices pedum* cum doloribus atrocissimis infestat, & nihil aliud est quam *paronychia pedis digitorum*, cui gangræna & sphacelus, & eandem medendi methodum postulat. Tutissima est digiti *resectio*.

(*Duæ species.*) Art. 1249. „ Paronychia revera est malum minime contemnendum, *Latinis* dicitur *panaritium*; ejusdem duæ sunt species, una *benigna*, vulgo a *Mbitflaw* appellata; altera *maligna* a *Felon* dicta; in priori specie suppuratio facile procuratur, & materia albicante emissa facillime sanatur. Altera vero est periculosissimum malum, & fere nunquam curatur sine incisione *matura* ad os usque.

(*Pernio.*) Art. 1250. Perniones pedes & manus affligunt tempore hyemali; partes affectæ tument, & ex albedine ad aliqualem cærulescentiam inclinant, (pruriunt vehementer) dolent, & tandem, nunc cum, nunc sine exulceratione evanescunt (præmissis universalibus) Partes affectæ illinantur cum *petrolæo*, quod præservat & curat.

(*Curatio.*) Unguentum rosatum cum *ol. terebinth.* in rapo assato est remedium comprobatum (inquit *Wiseman*).

A N E U R I S M A.

Sennerti sententia.

(*Aneurisma unde sit.*) Art. 1251. Aneurisma est tumor ex tunica interioris arteriarum apertione, & exterioris dilatatione: aperitur vel venæsectione imperita, cum exterior tunica, utpote mollior, coalescit denuo, interior, ut durior, aperta manet; vel a causa externa.

Wisemani sententia.

(*Opinio nostratis Wiseman.*) Art. 1252. Noster clarissimus *Wiseman* existimat aneurismata non fieri ex dilatatione vel relaxatione tunicae exterioris arteriæ, sed potius ab *ambobus tunicis ruptis*, vel *sauciatis*, unde tumor ab effluxu sanguinis in musculorum interstitiis efformatur: hæc autem opinio multo probabilior videtur; utcunque sit tamen, eodem res redit, quoad curandi methodum.

Art. 1253. „ Aneurismata quandoque fiunt proculdubio simplici arteriæ tunicarum dilatatione (ut cum sanioribus quibusdam medicis sentiamus) quemadmodum in *venis varicosis* frequentissime accidere solet; saltem in hunc modum ab origine plerumque nascuntur, utcunque tamen diuturniora cum fuerint, & in grandem molem aucta, tunicae arteriales multis in locis rumpuntur, præcipue interna, ut ex omni sectione patuit. Accuratam hujus affectus historiam si quis velit, adeat D. *Freind Hist. Med. p. 179. &c.* Pro accuratio-re adhuc aneurismatis naturæ explicatione, Vid. *Philos. Transact. N. 402.*

(*Histo-*

(*Historia.*) Art. 1254. In Transact. Philosoph. N. 265. Insignis ex-
 „ tat Historia *Aneurismatis Aortæ*. Homo per infortunium aliquod vio-
 „ lentam pectoris concussionem passus in *Hæmoptysin* incidit, qua diu-
 „ tius perseverante tandem mortuus est. Secto cadavere *Aneurisma*
 „ *Aortæ* repertum erat adeo ingenti mole, ut totum latus Thoracis
 „ dextrum impleverit. „

Ettmulleri sententia.

(*Aneurismat. cause N. B.*) Art. 1255. Aneurisma est tumor a colle-
 ctione sanguinis arteriosi ab arteria exesa aut laxata nimis, aut rupta
 ex quacunque violentia, ab imperita in venæsectione vulneratione. Fre-
 quentia sunt aneurismata a vehementi *cordis palpitatione*, ita ut ramus
 arteriæ descendens intumescat. Aneurisma frequentius collum occu-
 pat, interdum crura & brachia, sed rarius, ex violenta commotione.

(*Diagnos.*) Est tumor mollis tactui cedens, aliquando tamen non
 cedens, alias cum, alias sine pulsu, colore a reliqua cute non variat.

(*Prognosis.*) „ Exinde maximum periculum habet „ quod inter-
 dum ab imperitis chirurgis habeatur pro abscessu suppurato; unde
 si aperiatur, subito sub manibus ægri cum sanguine animam emit-
 tunt. „ In collo ne unum quidem curatum vidi (inquit *Barbette*),
 „ palliativa cura diu vivere possunt. „

(*Curatio.*) Art. 1256. Si aneurisma sit a venæsectione inepta, mox
 ligetur pars læsa *ligatura* forti, & fiat *venæsectio* in latere opposito.
 Curiosum est quod observat *Horstius*, quod applicatio *laudani opii* ar-
 teriæ hæmorrhagiam sistat. Notum est *emplastrum Galeni ex thure*,
aloe, *pilis leprinis*, & *albumine ovi*, item multum conducunt *lamina*
plumbea, *emplastra astringentia* (cum *sacchar. saturni*). His irritis cu-
 ra per operationem chirurgicam facienda est, viz. per *deligationem* ar-
 teriæ (superne tantum). De nova *methodo Gallorum* in aneurisma-
 te vide locum p. 1246.

V A R I X.

Ettmulleri sententia.

(*Varix quid.*) Art. 1257. Varix est tumor ex laxata venarum tunica,
 unde sanguis in venis fere stagnat. Malum est frequens mulieribus in
 ultimis gestationis mensibus, uti & post partum difficilem. Hic affe-
 ctus quibusdam non parum proficius est ad conservandam sanitatem,
 in specie melancholia hypochondriaca (unde fluxus hæmorrhoidalis iis
 salutaris est.)

(*Curatio.*) Art. 1258. Cura a *ligatione* magna ex parte pendet, fo-
 tus ex *alum. fruct.*, *acac.* (*flor. ros. rub. cort. querc. &c.*) in aceto coct.
 convenit.

(*In ruptura venarum.*) In ruptura venarum, & gravi hæmorrha-
 gia optimum euporiston est *stercus suillum* forma pulveris adpersum
 cum linteis ex *astringentibus* expressis & admotis cum *fasciatione*, &c.

H Æ M O R R H O I D E S.

Wisemani sententia.

(*Hæmorrhoides quid.*) Art. 1259. Hæmorrhoides ani sunt venarum hæ-
 morrhoidalium tumores *varicosi*, morbus est *simplex*, quando venæ
 solæ intumescant, vel *compositus*, cum partes vicinæ afficiantur, vel
 cum quasi novum corpus generetur ipsis adhærens, vel appendens; unde
 (ob

(ob similitudinem aliqualem ita dicta) *ficus, crista Galli, condylomata, &c.* producuntur.

(*Apertæ vel cecæ.*) Art. 1260. Hæmorrhoides sunt vel *aperte*, i. e. sanguinem effundentes, vel *cecæ*, tumentes scilicet, sine hæmorrhagia, exquisitè tamen dolentes.

(*Curatio.*) Art. 1261. Alvus aperta sedulo servetur. Ad inflammationem, quæ sæpe accidit, valet sequens fons; ʒ℥. Fol. plantag. polygon. summit. rub. equiset. ana M℥ss. flor. verbasc. Mij. sem. lini ʒij. flor. ros. rub. cort. granat. balaust. bacc. myrt. ana ʒvj. coq. in q. f. aq. font. & vin. rub. pro fotsu.

(*In dolore magno.*) In extremitate doloris, ʒ℥. Ol. vitel. ov. ʒij. opii gr. viij. m. item bals. sulphur. Rulandi dolorem sedat.

(*In fluxu nimio.*) Art. 1262. In fluxu nimio sanguinis, *venæsectio, cucurbitule, &c.* conveniunt revulsionis gratia. Interne *astringentia & opiata*, quemadmodum in aliis hæmorrhagiis; externe *suppositoria ex cort. granat. flor. balaust. thure, mastich. &c. cum gum. tragacanth. ischycol. alb. ovor. &c.*

Ettmulleri sententia.

(*Differentiâ ab alio morbo.*) Art. 1263. Distinguendus est ante omnia fluxus hæmorrhoidalis verus, a diarrhœa cruenta scorbuticorum, alias vocata dysenteria scorbutica mendosa (636.) Hæmorrhoides veræ attritu excrementorum plerumque aperiuntur, & sanguis cum excrementis una evacuatur; sed si sanguis promiscue excernatur tam ante quam post excrementa sine dolore & torminibus, probabile est, quod sit fluxus scorbuticus. Hæmorrhoides ad venerem omnino impotentes reddunt cum magno foeminarum tædio.

(*Apertio.*) Art. 1264. Hæmorrhoides consueto fluore suppresso, si ve in cæcas degenerantes, aperiendæ sunt; de aperiendis iisdem vide locum p. 173. Remedia aloetica fluxum hæmorrhoidum promovent. „ Externe convenit *hirudinum suctio*, vel *frictio ani cum foliis ficus* „ *recentibus modice tritis*, quæ forti impressione lac acre ac fere cau- „ sticum plorant, cujus acrimonia vasa tumentia successive aperiun- „ tur; vel si hoc non sufficiat, intrudantur *suppositoria ex biera picra* „ *cum pulvere colocynthidos & melle parata*, quæ hæmorrhoides insi- „ gniter stimulant, & cataplasma ex stercore columbino, sem. staphidis „ agriæ & lupinorum applicare potest. “

(*Dolores.*) In doloribus conducit fons ex decoct. verbasc. flor. sambuc. & sem. hyoscyam. Laudatur *scrophularia*, sed *chelidonium minus* est instar omnium pro usu interno quocunque modo usurpatum. *Campbora & sacchar. saturni* pro usu externo in unguentis.

(*Varia Remedia.*) Ad hæmorrhoidum exulcerationem linimentum ex auro fulminante, & ol. amygd. dulc. est singulare experimentum apud Anglos.

Riverii sententia.

(*Fluxus immodicus.*) (Art. 1265. Mercurialis docet *tamarindos* præcipue miram potestatem habere ad compescendum hæmorrhoidum fluxum. In fluxu immodico fons ex verbasc. tapso barbato, fol. plantag. flor. ros. rub. balaust. &c. in aq. ferrat. & vin. astringent. decoct. convenit; ut & unguentum comitiss. curato hæmorrhoidum fluxu, præcavendum est, ne redeat, quod sit *victus ratione convenienti, venæsectione bis vel sæpius in anno, purgatione leni, &c.*

(*In gravi dolore.*) Art. 1266. Oleum buxi præ cæteris dolorem lenit, si illius gutta una supra hæmorrhoides apponatur, vel cum ol. sem. lini

lini misceatur, item saccharum saturni in aq. ros. pro fotu dolorem sedat.

Mayerni sententia.

(*Remedia varia externa, & interna.*) Art. 1267. Chalybs seu ferrum est specificum in hoc affectu obstructions viscerum tollens, atram bilem domans & plurimum dulcificans, viscera roborans, &c. Cerevisia parari potest cum limaturis, vel ferri rubigine, & herbis & radicibus specificis, &c. *Aque spadenses & minerales acidulae*, multum valent. *Vernix*, qua utuntur pictores est remedium singulare in curandis hæmorrhoidibus, tam apertis, quam latentibus; si apertæ fuerint, & nimis tenaciter vernix cuti adhæreat, addatur *ol. rosarum*: hujus usu sanatus est *Carolus quintus* a muliere, cum nulla ope curari posset; vernix autem præparatur ex *ol. lin. ℥xiij. tereb. Ven. ℥iv. sandarac. purissim. five gum. junip. ℥iij.* liquentur simul lento igne, &c. De suppositoriis vide locum. *℥. Unguent. popul. ℥ij. cochinel. in alcool. levigat. ℥ij. sacchar. saturn. ℥j. ol. hyperic. q. s. misceantur diuturna agitatione in mortario plumbeo, f. unguentum e bombyce applicandum & continuo gestandum.*

Farrago sententiarum.

(*Vires scrophulariæ.*) Art. 1268. Si quis hæmorrhoidum dolore insano torqueatur, (inquit *Sennertus*) minimum quid *scrophulariæ*, vel radicis vel foliorum, cum cibo aut potu capiendo, statim dolore liberatur, si ipsam plantæ substantiam siccam vel viridem, si decoctum ejus assumat.

(*Unguent. de linaria.*) Sedandis hæmorrhoidum doloribus (inquit *Chesneau*) præstantissimum est unguentum de *linaria* a *Wolphio* inventum, & pluribus medicis *Germaniæ* communicatum; simile *anodynum*, licet variis usus fuerim, nunquam inveni; sequenti modo præparatur. *℥. Herb. linar. cum floribus q. v. decoquatur cum adipe porcin. quousque adeps valde virescat fiatque unguentum, usus tempore adjiciatur vitelli ovi tantum quantum unguenti quantitas requirit.*

(*Cepæ & porri, &c.*) Art. 1269. *Cepa* vel porrum sub cineribus coctum cum *ol. ros. & paucis croco* valde laudatur a *Solenandro* (& pro certo porrum cum butyro in sartagine frixum dolorem quasi ad miraculum sedat.) De viribus *chelidon. minoris* in hoc affectu consulatur *Solenander*, qui de hoc morbo egregie scripsit. *Oleum succini* per se usurpatum dolorem atrocissimum compescit. Sequens linimentum est admodum proficuum. *℥. Balsam. sulph. terebinth. unguent. nicotian. ana p. æ. m. f. liniment. & sequens Boyleanum, ℥. Sacchar. saturn. ℥ss. acet. opt. ℥iv. ol. sambucin. q. s. m. f. linimentum. Rosmarinus* singulis auroris comestus hæmorrhoides penitus tollit. Ad dolorem & ardorem compescendum, & fluxum immoderatum lente sistendum, instar arcani (inquit *Doleus*) medicis junioribus commendo vile sed proficuum hoc remedium. *℥. Alcool. lapid. scissil. q. v. cum butyri non saliti q. s. f. unguent.* Aliquando etiam sequentia in usum adduci possunt; *Tabule divine, fots ad hæmorrhoidum dolorem, fots ad hæmorrhoidum fluxum immodicum, electuarium styptic. Cataplasma de ovis, enema de verbasco, unguentum hæmorrhoidale.*

Ettmulleri sententia.

(*Hernia varicosa.*) Art. 1270. *Hernia varicosa* est tumor varicosus venarum spermaticarum; tactu patet, quasi funiculi tensi hinc inde oblique distributi & nodi inæqualiter uvæ in modum conglomerati observantur, cum testiculi plus minus relaxatione; dolor aliqualis

(ali-

(aliquando acutus) percipitur. Difficile est malum , & quod etiam interdum cancrofi aliquid occultum habet .

(Curatio .) Art. 1271. , In genere medicamenta quæ conducunt in aliis tumoribus *varicosis* , præcipue *hemorrhoidibus cæcis* , in hoc affectu etiam sunt proficua ; *deligationem* aptam vix admittit ; opem fert *psychrolusia* vasa relaxata contrahendo firmandoque , ut & lotiones & fots astringentes frigide usurpati ; & præ reliquis sequens ,
 2℥. Liqueor. coriariorum , quo utuntur subigendis coriis ℥j. Sacchar. saturn. ℥ij. alum. ℥i℥. f. solutio quæ sit pro usu prædicto ; conveniunt *venæsectiones* , purgationes cum *Hellebor. nigr. & calomel. Rugo ferri cum gum. Ammoniac. millepedes* , *Tinctura Hellebor. nigri* , *absorbentia* , *antiscorbutica* , &c. sed ante omnia *oleum lini* frequenter intus sumptum expertus laudo .

(Oedema .) Art. 1272. Oedemata sunt tumores molles , qui digito prementi cedunt , & pressionis vestigia diutius retinent , frigidi , indolentes , & albicantes , sæpius in cruribus evenientes . In leucophlegmatia totum corpus oedematofunt videtur . , Oedema frequentissime a pituita sola originem trahit , & *perfectum oedema* nominatur ; quandoque vero cum aliis humoribus mixtum est , & *imperfectum* appellatur ; hujusmodi sunt *Oedema Phlegmonodes* , *Erysipelatodes* , *Scirrholes* , &c. Hi tumores aliis morbis plerumque supervenire solent , imprimis chronicis , interdum etiam affectibus soporosis & convulsivis , gravidis quoque familiares sunt .

(Curatio .) Art. 1273. Conveniunt interne *stomachica* , & *aromatica* , intermissis interdum *sudoriferis* & *diureticis* : externe fots & cataplasmata *discutientia* ex *absynth. roremarin. cham. salv. puleg. rut. flor. samb. melilot. cham. bacc. junip.* in lixivio & vino coct. addi potest etiam *sulphur. vivum* inter coquendum . *Stercus* quorundam animalium cum *urina humana* valde proficuum perhibetur .

Wisemani sententia .

(Prognosis .) Art. 1274. Oedema ut plurimum non est periculosum ; quidam corporis crassioris , & crapulosi cruribus oedematosis diutius vivunt ; ex hydropo aut phthisi malum caloris nativi defectum ostendit ; in abscessum tendens periculosum est ; si indurescat , in scirrhum abire solet . Quoad curam medicamenta interna eadem sunt ac in *cachexia* & *hydropo* ; externa *discutientia* , *falsiatio* . , Præ reliquis vero pro usu interno recordandum est *tincturam Hieræ* eximias vires obtinere .

Ettmulleri sententia .

(Scirrhus qualis est tumor .) Art. 1275. Scirrhus est tumor durus & qui renitens , indolens , immobilis ; ut plurimum sensim generatur in partibus mollioribus ; præter glandulas occupat alias partes , imprimis carnosas , sive internas , nempe viscera , sive externas quascunque . N. B.

(Prognosis .) Scirrhus est vel indolens & *legitimus* , vel dolens & præterea nonnihil livescens , & nothus qui subinde est cancrofus , unde si curatur periculum est , ne in cancerum degeneret . , Scirrhus , qui doloris est expers , & cui pili crescunt , incurabilis omnino habetur ; coloris lividi valde periculosus & sæpius in cancerum degenerat ; imperfectus exiguus , aliquo modo dolorificus aliquando licet rarissime curatur .

(Curatio .) Art. 1276. , Quoad curam instituenda est catharsis cum mercurio dulci & helleboro nigro , & aliquoties repetenda ; & in

„ intervallis cum fructu exhiberi possunt *pulveres absorbentes*, *antimon-*
 „ *diaphoret. cinnab. antimon. Elect. nigrum*, *decoctum e lignis*, *mille-*
 „ *ped. viv. vel præp.*, Interim externe usurpanda sunt *resolventia*
 fortiora cum *discutientibus* moderatis permista, ut tumor successive
 resolvatur. *Stercus bubulum* aceto incoctum *scirrhum* mirifice dissipat;
 item *oleum tartari rectificatum fetidum* licet, tumores duros potenter
 emollit & discutit, ut etiam *cataplasma ex brion. cum stercore caprillo*.
Scirrhus, si non potest sensim resolvi, non est suppurandus, ne can-
 crosus evadat, intactus omnino est relinquendus, aut applicatione *ni-*
 „ *tri* in aceto dissoluti in lapideam duritiem indurandus. „ *Scirrhus*,
 „ qui omni sensu destituitur, est incurabilis.

(*Scrophula.*) Art. 1277. *Strumæ* seu *scrophulæ* sunt tumores vel *in-*
dolentes & benigni, vicinis partibus colore similes, mobiles, &c. vel
dolentes fixi, colorem *subcæruleum* vel *sublividum* repræsentantes, hæ
strumæ malignæ dicuntur, vix aut ne vix quidem curabiles.

(*Curatio.* Prioris generis *strumæ discutientibus* tentandæ sunt; *em-*
plastrum de cicuta cum ammoniaco; in incipientibus convenit fots cum
spongia aqua calcis ebria, *empl. de ranis cum mercurio*. *Scrophulæ* sup-
 puratæ non sunt statim aperiendæ, sed quamdiu fieri potest, absces-
 sus clausus linquendus est, propterea, ut eo major glandulæ *stru-*
 „ *mosæ* pars per maturationem in pus abeat, nam tota, si fieri possit,
 est absumenda. Interne convenit *purgatio cum belleboro nigro & mer-*
 „ *curio dulci*, & *acidum absorbentia*, &c. ossibus adhærentes fere incur-
 „ *abiles* sunt.

Wisemani Sententia.

(*Definitio.*) Art. 1278. *Struma* seu *scrophula* est tumor, „ *durus*,
 „ *inæqualis*, rarissime *dolorificus*, reliquo corpori plerumque conco-
 „ *lor*, aliquando leviter *rubescens* aut *livescens*, „ a peculiari feri san-
 „ *guinis aciditate* ortus, quod ubicunque in *glandulas*, *musculos*, *mem-*
 „ *branas*, imò ipsa *ossa* incidit, *coagulatur* & *indurescit*. *Glandulæ* sunt
 „ *sedes* hujus morbi frequentiores, præcipue autem ac primario *glan-*
 „ *dulæ mesenterii*, quæ nunquam intactæ sunt, si morbus alicubi in
 „ *corpore* vigeat. Cernitur frequentissime in *labiis* maxime superiori,
 „ *illud* *incrassat*, & *fissura* obsignat.

(*Prognosis.*) Art. 1279. „ *Prognosis* a magnitudine morbi & reliquis
 „ *ægroti constitutionis circumstantiis* plerumque desumitur; est mor-
 „ *bus* admodum *difficilis* curatur, & ubi *hæreditarius*, *insanabilis*, ut
 „ *etiam* in *ætate* grandioribus, vix post annum *quadragesimum* cu-
 „ *ratur*.

(*Curatio.*) Art. 1280. *Medicamenta interna* sunt *cathartica*, *alteran-*
 „ *tia*, & *specificæ*, *millepedes*, *lac asininum*, *decoct. sarsæ*, *Pulv. ad stru-*
 „ *mas Batean.* *Spongia calcinata*, *paronychia cum folio rutaceo*, &c. *Su-*
 „ *doris* provocatio eodem modo ac mediis, ut in *Lue venerea*, insti-
 „ *tuta* hic plurimum facit, immo vel sola *strumas* tollit; &c. „ *Ex-*
 „ *terne* indicationes sunt *resolutio*, *suppuratio*, & *extirpatio*. *Strumæ* mol-
 „ *liores* aliquando resolvuntur; *strumæ phlegmonoides* frequenter sup-
 „ *purantur*, sed antiquæ, duræ ac crudæ raro ad perfectam *suppuratio-*
 „ *nem* perveniunt. Si *struma* sit *mobilis* & *libera*, *extirpatio* per *inci-*
 „ *sionem* est cura promptissima; sin vero *strumæ* sint *grandiores* & *pro-*
 „ *funde* *jacentes* *extirpatio* per *caustica* melius efficitur, inter *caustica*
 „ *ad hoc institutum* optimum est istud, quod conficitur ex *calce viva*
 „ *in lixivio saponis* cocta. Apertione per *causticum* facta, *struma* *escha-*
 „ *roticis* est absumenda, huic usui inservire potest *pulvis sine pari di-*
 „ *ctus*

Etus ex æquali parte *mercurii sublimat. auripigment. & calcis viv.* mitior est *mercurius præcipitatus*, cum, vel sine *alumine usto*, lente tamē operatur.

(*Consulendus est auctor.*) Art. 1281., Præstantem hunc tractatum „ *Authoris*, chirurgus juvenis iterum atque iterum diligenter evol-
vat.

Farrago sententiarum.

(*De viribus tussilaginis.*) Art. 1282. Notarunt quidam medicamen-
ta ad curandas scrophulas in ultima lunæ phasi majori cum successu
assumi, & in novilunium usque continuari debere. Decoctum *folior.*
tussilaginis interne sumptum per longum tempus ultra omnia, quæ ha-
ctenus nota sunt, hunc morbum tollit, ut experimento fidelis *Fran-*
cisci Fuller mihi quondam amicissimi constat; videatur locus medic.
in *gymnastic.* p. 93.

(*Paronychia, &c.*) Pro specifico etiam habetur *paronychia folio ru-*
taceo in cerevisia infusa, Infusum *rorismarini* instar theæ, item *rad. scro-*
phulariæ ab *Ettmullero* summe laudantur. „ *Lamium* in lacte coctum ipsum
„ coagulat; serum intus sumptum & coagulum ulceribus applicatum
„ sine alio quocunque remedio morbum sanant, ut a quodam rustico
„ accepi, qui & ipse & aliquis ejusdem vicinus, ambo deploratissime
„ strumoli, curati. „ Extat historia strumarum deletarum applicatio-
ne manus hominis mortui in *Art. Philos.* Sequens emplastrum strumas
resolvit, vel ad suppurationem deducit, & nunquam fallit, ait *Za-*
cutus cum juramento lib. 1. prax. admirand. observ. 101. 24. *rad. brion,*
magn. in taleolas ten. sect. Bß. frige in sartagine quousque contabescat,
coq. & add. terrebinth. abietis Bß. cer. 3v. f. unguentum f. a.

(*Tumores albi.*) Art. 1283. Sub strumarum nomine veniunt, aut
venire possunt, articulorum *tumores albi dicti*, & revera plerumque
sunt pessimi commatis, de his empirici, & tyrones nonnunquam gra-
viter hallucinantur, illos cum *artuum luxationibus* confundentes, unde
mille mala; quocirca cautela opus est.

(*Prognosis.*) Art. 1284. Hi tumores discuti nequeunt, aut saltem
rarissime & quam difficillime; si autem in abscessus vergant, pandoræ
pyxides sæpius includunt, ossium caries, ligamentorum putredine-
nes, ulcera fistulosa, & curatio denique non raro saltem imperfecta
erit, articulis scilicet inflexibilibus relictis, & quod adhuc pejus, tan-
dem aliquando *tabes universalis* induci solet.

(*Curatio.*) Art. 1285. Curatio interna eadem est ac in aliis stru-
mosis affectibus. *Suffusio frigida* hic multum prodest, speciatim a fide-
dignis mihi nunciatum fuit, plures curatos fuisse artum aliquandiu de-
tinendo *sub flumine molari decidentis aque*, idem experimentum ali-
quoties repetendo. Atque hic attestantem habemus *Cheyneum* hoc re-
medii genus in isto affectu esse *infallibile.* vid. *Tractat. de Arthritide*,
p. 87. Aptā deligatio parti affectæ tempestive inducta fluxionem ple-
rumque prohibet. Cunctatio periculosa est: abscessus enim hujusmodi
summam chirurgi peritiam possulant, ut supra dictum est.

S P I N A V E N T O S A.

Wisemani sententia.

(*Spina ventosa.* Art. 1286. *Spina ventosa* est scrophulæ quædam spe-
cies, quæ est ossis protuberantia cutis colore non mutato; raro acci-
dit, nisi in infantibus & junioribus. In ossibus minoribus, uti cranii,
maxillæ, digitorum, &c. est curabilis; non vero in majoribus.

(Ca-

Curatio.) Art. 1287. Aperiendus est locus juxta protuberantiæ longitudinem ac os cariosum eodem modo tractandum est, ac in ulceribus cum ossibus cariosis postea dicitur.

Art. 1288. „Chirurgus curiosus consulat D. Freind, *Hist. Med.* Vol. II. p. 54. &c. de hujus affectus natura & indole a libris *Rhasis* & *Avicenne*.

C A N C E R.

Etzmulleri sententia.

Cancer tumor singularis.) Art. 1289. Cancer est tumor plane singularis, ac omnino sui generis. Punctio ab ægro primo percipitur; a pisi magnitudine successive; modo citius modo tardius incrementum capit, & progressu temporis evadit tuberculum durum, nigricans, lividum; quando exulceratus fit, ardor est acerbissimus instar aquæ fortis corrodens & depascens cum insigni putrilagine, & foetore, venæ tumorem ambiunt hinc inde turgidæ & nigricantes, tanquam *pedes cancrini* (unde nomen sortitur.) Strumas & schirrhos male tractatos frequentius subsequitur; mammis vero per se inchoat, in genitalibus utriusque sexus interdum adoritur.

(*Noli me tangere* & *lupus*.) In partibus faciei externis, ore, naso, labiis, &c. appellatur *noli me tangere*, item *lupus*, revera sunt *cancerum species*.

(*Cura palliativa.*) Opera danda est, progressum impedire, ne exulceretur cancer. „Postquam enim cutis disrupta fuerit, certo certius hominem miserrime interimit, carnem ubique avidissime depascendo, fungos tanquam brassicas floridas ubertim protrudendo, per acrimoniam humoris causticam vasa nervosa & sanguifera destruendo & erodendo; unde ichoris copiosa effusio cum vitæ fere dispendio; hæmorrhagiæ frequentes & profusæ plerumque agmen claudunt, & mortem optatam accelerant. „Cataplasma ex *cicuta* potenter mitigat cancrum (sed cavendum est, ne cutem excoriet) *fonticuli* sunt inurendi. Interne conveniunt purgantia ex *belleboro* & *mercurio dulci*, decoctum *lignorum*, *millepedes*, „item *pulveres testacei* & *lac asininum*, &c. Cancer ulceratus vix aut ne vix quidem curatur. *Oleum stercoris humani* in ulceribus cancris est summum remedium; si enim oleo hoc illinitur, ulterior progressus præcavetur. Multum quoque faciunt medicamenta *saturnina*, acidum acre corrosivum, mire absorbentia & edulcorantia; sed cura radicalis in *arsenico* consistit (si verbis fides habenda sit).

Hildani sententia.

(*Curatio per medicamenta.*) Art. 1290. Galenus cancri curandi rationem duplicem statuit, quarum prima perficitur medicamentis humores atrabiles expurgantibus; altera consistit in extirpatione tumoris. Quantum attinet ad primam nisi statim ab initio administrata fuerit, parum aut nihil ad sanitatem posse, certum est; quandoquidem jam materia ita compacta atque indurata est, ut medicamentis purgantibus non cedat. Altera via a Galeno præscripta est extirpatione tumoris; hanc autem nonnulli ferro candente, alii medicamentis erodentibus, reliqui vero cultro incisório perficiunt.

(*Cauterium.*) Quantum ad *cauterium actuale*, illud cum *Albuca* in scirrhosis & cancris humoribus atque ulceribus suspectum habeo, quandoquidem vi ignis, qui id summo gradu caloris & siccitatis agit, magis indurescit materia atrabilis, fitque malignior.

(*Escharotica.*) Porro extirpatio quæ fit medicamentis *escharoticis*, aut *septicis*, sive quovis simili medicamento erodente, mihi quoque propter nobilitatem partis affectæ, suspecta est. Adde experientiam docuisse cancroſa ulcera huiusmodi medicamentis exacerbari, atque pejora fieri.

(*Instrumenta.*) Superest extirpatio, quæ manu & instrumentis incidentibus fit, quæ præ aliis eligenda est, & tamen sua habet incommoda & difficultates.

Farrago sententiarum.

(*Cancri occulti non medicandi.*) Art. 1291. Quibus occulti cancri fiunt (inquit *Hippocrates in Aphor.*) eos non curare melius; curati enim cito pereunt; non curati vero longius tempus perdurant, i. e. (si mentem senis recte assequor) remedia plus nocent, quam profunt, & officiosa medicatio mortem accelerat.

(*Epithema.*) Art. 1292. Certe, si quid aliud, epithema *Wisemani* cancro occulto cum fructu aliquo applicari potest, quod fit ex solutione *sacchari saturni in aq. spermat. ranarum*, cui urgente dolore graviore, addi possunt *trochisci alb. rhas. cum opio*. Emplastrum si velis, sit *de minio simpl. Pharm. Lond. edit. ult. in linteo extensum*, quod mitissimum est ac innocuum.

(*Qualis cancer extirpandus.*) Art. 1293. Cancer parvus, incipiens, liber, loco apto situs, vasis magnis non adcretus, causa externa ortus, in juvenili sanoque corpore, solus in toto corpore cum bona specurationis extirpari potest.

(*Qualis non attingendus.*) Art. 1294. Quibus sunt cancri in cavitate corporis, aut palato, sede, vel utero, si secentur, vel urantur, ulcera cicatrice induci non possunt.

(*Remedium empiricum.*) Art. 1295. Inter remedia *Empirica* valde prædicatur sequens pulvis, *℞. Verrucar. calcibus posterioribus equi masculi adherent. ℥ij.* abluantur aqua communi, deinde in vino albo per noctem infundantur, & postea exsiccentur & in pulverem reducantur. *dof. ℥ss.* bis in die in vehiculo qualicunque idoneo. *Sapo veneta aa ℥j.* bis in die exhibita, vel forma pilulari, vel in vehiculo appropriato dissoluta, cancrum operatione quadam occulta vel specifica sanare dicitur. *Vide Turneri Art. Chirurg. p. 83. Vol. I.*

(*Remedium empiricum.*) Art. 1296. Opportunum est monitum *D. Winter* in hoc usu. Cancro laborantes (inquit) incipiant, ubi plus sæpe finire solent, ad dietam lacteam & aquas *Bristolenses*, tanquam ad sacram anchoram, confugiendo, & medicamentorum farragine præcipue *mercurialium & topicorum* vitando.

(*Remedia varia.*) Art. 1297. Interne etiam exhibentur *antimonialia mercurialia, viperina, decoct. e lign. millepedes, &c. cerevisia ad cancrum, cerevisia ad scrophul.*

[TUMORES FLATULENTI.]

Sennerti & aliorum sententia.

(*Tumor flatulentus unde.*) Art. 1294. Tumores flatulenti (quos *Græci emphysemata* vocant) a flatibus seu spiritu flatuoso oriuntur: materiam flatibus producendis præbet humor crassus, pituitosus vel melancholicus. Cognoscuntur hi tumores, quod pars in maiorem nunc majorem nunc minorem attollitur, sine coloris mutatione; ex distentione autem interdum dolor aliquis excitatur, nulla tamen gravitas sentitur, digito pressi foveam nullam relinquunt, & ut plurimum periculum vacant;

vacant; accidunt frequenter in palpebris, genubus, scroto, præputio, &c.

(*Curatio.*) Art. 1299. Conveniunt interne flatus *discutientia*. Non temere aperiendi sunt hi tumores, præcipue in articulis existentes, in aliis locis punctura facillime curantur. Applicationes externæ debent esse *discutientia*. „ Emplastrum si velis, sit *de cymino cum exigua calce viva*. Plura emphysemata novi (*inquit Turner*) discussa applicatione calcis vivæ more cataplasmatidis, ut etiam linteis aqua calcis forti imbutis. Cavendum est ut accurate distinguatur ab *aneurismatibus*. Vid. Art. 1155.

(*Tumores Capsulares.*) Art. 1300. Tumores in suis propriis folliculis inclusi non sunt adeo difficiles tractatu ac strumæ: hujusmodi sunt ganglium, lupia, meliceris, atheroma, steatoma, bronchocele, &c. Observatum fuit, quod hi tumores capsulares subinde *Lunæ phases* imitantur.

(*Ganglium.*) Art. 1301. Ganglium est tumor in tendine corpori concolor, doloris periculique expers. Curatur frequenter sola *frictione* sicca diuturna, aliquando frictione cum *saliva* absque alicujus medicamentorum usu; quidam applicant *laminam plumbeam argento vivo inunctam*; „ vel sequens emplastrum tertio vel quarto quoque die renovandum, 2℥. Empl. de ranis cum mercur. 3℔. de cicuta cum ammoniac. 3ij. argenti vivi gr. xvi. min. 3j. cum styrac. liquid. q. s. f. m. f. emplastr. vel 2℥. Mercur. dulc. 3ij. Galban. colat. 3j. miscer pro emplastr. his remediis non cedens *sectio* tollendum est.

(*Lupia.*) Art. 1302. Lupia est tumor mollis & rotundus in juncturis & locis siccis oritur; a Ganglio parum, situ saltem, & mollietie, discrepans; materia frequenter in folliculo continetur; eandem fere cum Ganglio recipit curationem.

(*Meliceris, Atheroma, Steatoma.*) Art. 1303. Meliceris, Atheroma, & Steatoma sunt tumores, qui materiam habent peculiarem in propria tunica aut folliculo clausam: Si enim materia intus contenta sit mellis similis, *meliceris*, si pulvis frumentaceæ, quæ αἰθήρ dicitur, *Atheroma*; si sebo, *Steatoma* appellatur. Omnes hi tumores sunt corpori reliquo concolores, a parvulo incipiunt & diu ac paulatim excrescunt. Non sunt periculosi, diu tamen durant, & circum feruntur, interdum vero sponte in abscessum desinunt, quod si non fiat, non tam difficile ut *scrophulæ* ac *scirrhi* curantur.

(*Curatio.*) Art. 1304. Curatio eorum omnium eadem fere est, eandemque requirunt diætam ac pharmaciam cum *œdematosis*, „ ut plurimum sunt adeo benigni, ut internis vix indigeant. „ Si sponte non aperiuntur *sectio* instituenda est; ita ut cystis cum suis contentis penitus tollatur; si enim aliquid de tunica illa relinquatur, tumor regenerabitur. „ Vel ulcus fistulosum foetidissimum difficilis & tardæ curationis relinquetur, ideoque quod *cultro* nequit auferri *cauteriis* absumendum est, ne iterum repullulet.

(*Talpa seu Testudo.*) Art. 1305. Talpa seu Testudo est tumor mollis & latus, ex impuris humoribus inter cranium & cutem putrescentibus collectus, *talpæ* aut *testudinis* formam referens.

(*Prognosis.*) Art. 1306. Hujusmodi apostemata, ut & alii capitis erodentes affectus, propter cerebri viciniam & futurarum cranii proclivem in cariem lapsum periculo non vacant, quæ corruptionem cranii jam induxerunt, mala sunt.

(*Curatio.*) Art. 1307. Quoad curam, præmissis universalibus, tumor

resolventibus & discutientibus tentandus est, si discutientibus tolli non possit (quod raro fit) *suppurantia* adhibenda sunt, & quidem neque semper perfecta suppuratio expectanda est, sed si aliqua saltem suppuratōis signa adsint, tumor mature aperiendus est, ne os *cariem* contrahat.

(*Natta.*) Art. 1038. Tumor, quem *Natam*, *Nattam*, & *Naptam* appellant, est magnus & mollis sine dolore & colore, in dorso præcipue excrescens, quandoque tamen in humero & aliis partibus erumpens, a tenui quidem radice pendens, ita tamen incrementum sumens, ut aliquot libras pendat, & melonis vel cucurbitæ quantitatem æquet, qui cum non semper easdem figuras habeat, ideo etiam diversis nominibus ab authoribus appellatur. Materia quidem in eo interdum videtur carnosæ, sed non vere caro est, verum adipi similis. Non curatur nisi *exsectione*. „ In Transactionibus Philosophicis Angl. „ extat historia *ingentis Natæ* maxillæ inferiori adnascentis, viginti „ pondo pendentis, cujus basis fuit quinque digitos lata; abscissa fuit & homo perfecte sanatus.

HERNIA,

Ettmulleri sententia.

(*Herniæ quot.*) Art. 1309. Herniæ veræ sunt tantum duæ, nempe intestinorum vel omenti extra abdomen elapsus, horum posterior non est adeo molestus neque periculosus, ac prior. Nomen vero late sumptum plures alios tumores comprehendit, ut in sequentibus patebit.

(*Herniæ in genere definitio.*) Art. 1310. Hernia itaque proprie dicta in genere est prolapsus intestinorum tenuium aut omenti ex limitibus suis a vulnere aut laxatione peritonæi. Aliquando est hæreditarius, ita ut herniosi parentes herniosos generent filios, sed rarius (novi talem progeniem.)

(*Quibus in locis accidit.*) Hernia in adultis ut plurimum est incurabilis. Ex Hernia frequenter morbus *Iliacus* producitur; interdum intestina inflammantur, & gangræna corripuntur. Herniæ ordinario & frequenter fiunt in inguine, scroto aut umbilico; aliquando vero in aliis locis, nunc supra nunc infra umbilicum, nunc in lateribus longe supra inguina, nunc in superiori femoris parte musculosa, nunc juxta spinam dorsi, &c. ex observatione *Barbette*. Valde curiosa est „ observatio *M. Merx* de *Hernia vesicæ scilicet urinariæ in scrotum pro-* „ *lapsæ*, aut saltem ibidem munere suo fungentis: existimat enim hoc „ vitium malæ conformationi ortum suum semper debere, *Memair.* „ de *P Acad.* Vol. XVII. p. 146. &c.

(*Curatio.*) Art. 1311. Intestina facibus cum *enemate* carminante & emolliente prius exonerata, in loca sua cum cautela reponenda, mediante *fotu* ex emollientibus & carminativis cum *spiritu vini*, &c. & ita reposita in situ naturali omni arte & debitis subligaculis retinenda sunt, ne denuo excidant, adeo ut peritonæum ruptum aut laxatum consolidetur. Interne conveniunt *vulneraria*, speciatim commendatur *perfoliata* item *symphytum majus*; continuus in dorso decubitus est Herniarum *sanacea*, etiam in senibus. „ Quicunque *Hernia* debilita „ tur summopere debet cavere (ut prudenter admonet *D. Harris* in „ *Dissert. Med. & Chirurg.*) a ventriculo cibus incongruis implendo, „ spiritibusque furibundis nimis perturbando, & a colicis doloribus „ spasmodisque excitandis, atque a tussi importuna contrahenda, quo- „ niam

„ niam istæ corporis concussiones ac tumultus solent hernias horride
 „ amplificare :

(*Herniæ reductionem respicientes* .) Art. 1312. „ Herniæ intestinales re-
 „ ductionem respicientes periculum subitaneum minantur . Symptoma-
 „ ta quasi *Passionis Iliacæ* superveniunt , dolores gravissimi , vomitus
 „ enormes , singultus , & demum pulsus languidus , & sudores frigidi ,
 „ diagnosi indubitata instantis gangrænæ , & mortis appropinquantis .
 „ Audentes interdum *sectionem* moliuntur cum successu tamen valde
 „ ancipiti ; nam res est perquam difficilis & periculi plena , nec te-
 „ mere tentanda ; & hac præcipue de causa , quoniam , fere semper ,
 „ non nisi sero nimis operatio suscipitur .

(*Pneumatocèle* .) Art. 1313. Pneumatocèle seu Hernia ventosa , est
 tumor membranarum testium a flatibus ortus , estque saltem inflatio
 testium , nunc unius , nunc utriusque , nunc scroti quoque adest dolor
 tensivus sine gravitate .

(*Herniæ temporariæ* .) Art. 1314. „ Infantes ex eorum temperiei
 „ humiditate & fibrarum laxitate huic affectui sunt valde obnoxii , &
 „ a flatibus intra eorum intestina oclusis sæpenumero adoritur extem-
 „ poranea quedam *Hernia inguinalis* , & quandoque etiam *testiculorum* ,
 „ quæ statim facta flatuum explosione subsidit .

Curatio .) Art. 1315. Hæc Hernia flatulenta est , omnium levissima ,
 & curatu facillima ; conveniunt interne flatus *discutientia* & remedia
 ad *colicam flatulentam* ; externe *fotus discutientes* , *cataplasma ex fari-*
na fabarum , *sem. cimin. fimo vaccin. sulph. virg. &c.*

(*Hydrocèle* .) Art. 1316. Hydrocèle sive Hernia aquosa est tumor
 aquosus testium a lymphæ recessu testibus impedito ; est hydrops te-
 stium particularis , & a tumore scroti , qui in ascite accidit , distingui-
 tur ; similis est Herniæ carnosæ , sed in aquosa induci potest fovea ,
 quod non sit in carnosæ ; præterea pelluciditate se prodit .

(*Curatio* .) Art. 1317. Tentanda est cura interne cum *hydragogis &*
diureticis , externe *discutientibus* ; hic quoque valet cataplasma , & se-
 ctione de Hernia ventosa descriptum (1315.) cum additione *balsam.*
sulphuris . De operatione chirurgica vide locum , p. 99.

(*Sarcocèle* .) Art. 1318. Sarcocèle seu hernia carnosæ est tumor a car-
 ne superflua adnascens ; ex contusione vel ictu plerumque oritur , &
 ex insensibili principio sensim augetur , secus ac in aliis testium tu-
 moribus ; est fere indolens , sed ægri pondus percipiunt . „ Est revera
 „ *sarcoma* vel potius tumor *scirrhus* ; metus est , ne temporis progres-
 „ su in *cancrum* abeat : ideoque *castratio tempestiva* imperanda est
 „ de qua consulantur scriptores chirurgici . Caro superflua quandoque
 „ *tunicarum scroti communium secundæ* adnascitur , & non *testiculis* ,
 „ quo in casu sine horum læsione tolli potest .

(*Prognosis* .) Art. 1319. „ Sarcocèle (inquit *Barbette*) medicamento-
 „ rum opè vix tollitur ; chirurgiæ vero opera raro sine ablatione te-
 „ sticuli ; ad inguina ubi se extenderit fere incurabilis habetur . „

(*Curatio* .) Interne conveniunt medicamenta ad *strumas* . „ Specia-
 „ tim a scriptoribus fere omnibus commendatur *radix ononidis* intus
 „ sumpta per longum tempus . „ Externe *resolventia & discutientia* ,
 „ *emplastrum de cicuta cum ammoniaco* , *de ranis cum mercurio* , sed ex hoc
 „ vis testis periclitabitur . „ His nihil proficientibus ad auxilium chirurgi-
 „ cum deveniendum est . Fiat itaque foramen cauterio potenciali ad-
 „ hibito in *superiori tumoris parte* , & suppurantia medicamenta appli-
 „ centur , ut hoc modo , si possibile sit , caro ea tolli possit ; qua-

vis tamen visitatione omne pus non est emittendum, ut tanto melius carnis reliquiae consumi possint. Supereft *castratio*, ut ante dictum sit.

(*Hernia varicosa.*) De Hernia varicosa, vide sect. de Varice (1270.) (*Bronchocele qualis est tumor.*) Art. 1320. „ Bronchocele, sive hernia gutturalis improprie dicta, est tumor prominens in gutture, amplo spatio protuberans, corpori concolor, utcunque mollis & mobilis, & doloris expers; modo caro hebes includitur, modo humor aliquis melli aquaeve similis, interdum etiam minutis ossibus pili immixti; ut plurimum periculo vacat; quandoque vero materia putrescens malignam induit naturam, unde in cancrum degenerans mortem inferre solet.

(*Prognosis.*) „ *Alpinorum* montium incolis est morbus *endemicus*. (*Curatio.*) Art. 1321. „ Præmissis universalibus, humor peccans discutiendus & absumendus est. Inter *topica* laudat *Aetius* *bdellium* & *caprinum stercus* in aceto liquatum. Si medicamentis non cedat, ex *Rogerii* consilio admovendi sunt duo *setacei*, ut sensim humor defluat: & superfluum postea erodentibus paulatim est absumendum. Denique si venis, arteriis & nervis implicata non fuerit, *incisione* potest extrahi cum cysti; hanc operationem *Galli* feliciter molitur. De hoc tumore consulatur *Turner. Art. Chirurg. pag. 178. &c.* Vol. I. Item in Appendice p. 21. &c. Etiam si sit tumor in cysta inclusus, tamen extirpatu difficillimi eventus ex structura loci. „ Qui hanc operationem aggreditur, *Lapum auribus tenet*.

ANIPROCIDENTIA.

Ettmulleri sententia.

(*Ani procidentia.*) Art. 1322. Ani procidentia fit, quando sub sæcum excretionem intestinum rectum ita prominet & protenditur, ut non possit rursus sponte retrahi intra corpus, aut licet retrahatur, mox incipiat denuo prolabi.

(*Causa.*) Est interdum malum chronicum (præcipue quando a paralyfi ortum ducit) & difficulter curatur. Ani procidentiae causæ sunt alvi adstrictio, diarrhœa, dysenteria, vel præcipue tenesmus; difficillima est curatu, quando hæmorrhoides comites habet.

(*Curatio.*) Art. 1323. Si adsit inflammatio prius arcenda est cum fotibus mollientibus & discutientibus, & remotis impedimentis reponendus anus in situ naturali. Alvum leniter laxantia pro re nata sunt quandoque propinanda: „ Alias absente inflammatione aut tumore foveatur *astringentibus*, quæ etiam sub forma *suffitus* usurpari possunt: „ *Paræus* spongiam *astringentibus* imbutam ano applicat. Stans alvum exoneret æger, sic enim non tam facile excidet. Inter *astringentia* mihi nondum innotescit remedium efficacius quam *fotus præhernia varicosa.* (1271.) „ Tenesmus frequenter affligit, in tali casu remedia ad tenesmum adhibenda sunt.

(*Reductio.*) Art. 1324. „ Intestinum rectum foras prolapsum a frigore externo periclitatur, ne gangrænescat, quapropter citissime reducendum est. Reductio quandoque perfici potest *artificio sequente*, aliis mediis incassum tentatis, viz. nates patientis extensa manu quinquies, sexies aut pluries verberando, quo muscoli ani levatores intestinum rectum in priorem sedem attollent.

VERRUCÆ & CLAVI.

Ettmulleri sententia.

(*Verrucæ & clavi.*) Art. 1325. „ Quales tumores vel potius excre-
 „ scentia sunt verrucæ & clavi nemo non novit. Verrucæ sunt vel
 „ planæ seu sessiles, vel peniles, acrochordones appellatæ.

(*Curatio verrucarum.*) Art. 1326. Si verrucæ in sola cute sint radi-
 catae facile curantur vel tolluntur, sin vero a subjectis tendinibus ori-
 ginem ducant, vix radicitus extirpari possunt citra ingens periculum;
 idem etiam de clavis pedum verum est. Succus *chelidon. maj.* vel
esule, vel *dentis leonis*, vel *tithymali*, &c. sæpius illitus verrucas absumit.
Aqua, in qua solutum est *sal armoniacum*, est experimentum
Borelli: „ Atque hoc est medicamentum unicum certissimum, quod se
 „ cognoscere in tota medicina fassus est *D. Mapletost* haud pridem
 „ *Professor Græshamensis*: hoc quidem remedium est ut plurimum ma-
 „ xime efficax, sed non certissimum & infallibile, neque tamen ars
 „ nostra omnium nobilissima, est adeo incerta, sicut vir doctissimus
 „ suggestit.

(*Curatio clavorum.*) Art. 1327. „ Clavus (inquit *Celsus*) nonnun-
 „ quam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur,
 „ præcipue autem ex contuso, quamvis interdum aliter, doloremque
 „ movet. Clavi a *Plinio Morticini* appellantur. „ Ad curam quod at-
 tinet, *emolliendi* sunt cum *emplastro mynsicht. e galbano crocat. cum*
sale armoniaco, & postea *evellendi* sunt; eidem usui inservire potest
emplast. de ranis cum mercurio. Item recipiatur *caro bubula* recens,
 cujus frustulum instar emplastri iis alligetur, & sæpius removeatur;
 sic enim cito sponte dilabi dicuntur.

Art. 1328. De cornibus non lubet differere, quoniam pauciora sunt
 visibilia.

C A P. XIII.

Sive Fasciculus Morborum decimus tertius.

CONTUSIO, &c.

Ex observatione & inter legendum.

(*Contusio.*) **C**orpora nostra vel a casu ab alto, vel ictu violen-
 Art. 1329. to, vel compressione ponderis incumbentis, &c. sæ-
 pissime læduntur; partes carnosæ contunduntur, &
 ipsa ossa luxantur & quandoque franguntur.

(*Ecchymosis.*) Ex prædictis causis accidit plerumque *ecchymosis* cum
 vel sine tumore, quæ revera est accumulatio vulnusculorum cum at-
 tritu solidorum & vasculorum, unde liquida stagnant, coeunt, & in-
 terdum putrescunt, cohærentibus quandoque integumentis externis,
 vel iis etiam interdum hinc inde læsis.

Ettmulleri sententia.

(*Curatio.*) Art. 1330. In ecchymosi curanda imprimis opera danda
 est, ut sanguis extravasatus; congrumatus, & acore inquinatus, suc-
 cessive resolvatur, insensibiliter absumatur, & per meatus seu porulos
 corporis eliminetur. Conveniunt remedia interna *acidum absorbentia*,
 sanguinem congrumatum *resolventia*, simul & blande *diaphoretica*, emi-

fiet *sperma ceti* cum *lapillis cancrorum*, *succin. preparat.* *coral. rub. &c.* *Antimonium diaphoreticum*, & *salia volatilia* sunt egregia. Externe imprimis *resolventia*, & sanguinem grumatum insensibiliter dissipantia sunt usurpanda, huc facit *spiritus vini* nunc simplex nunc *camphoratus*, nunc *crocatus*, cum *linetis* applicatus, efficacius erit si addatur *theriaca*, & etiam *balsam.* *Peruv.* maxime in contusionibus levioribus applicatio *carnis bubulæ* in tenues lamellas sectæ optime conducit.

(*Caveatur a Gangræna.*) Quod si his & similibus remediis *ecchymosis* nequeat dissipari, opera danda est, ut sanguis extravasatus in pus convertatur; si vero metus sit gangrænæ, mox pars contusa profunde scarificetur, & sanguis congrumatus, quantum fieri potest, eximatur, & tanquam gangræna tractetur, de qua alibi (1384.) „ In „ omni contusione graviore convenit *venæsectio*.

Farrago sententiarum.

(*Remedium singulare.*) Art. 1331. Quidam adolescens ex alto ceciderat; & omnia membra admodum contusa fuerunt, ut brevi moriturus videretur. Pater ipsius accepit *favos cum melle* & coxit in vino ad consistentiam unguenti, quod extendit super corium *vervecis recentiter mactati*, eoque ægrum involvit, reiterata per triduum operatione æper omnino curatus est, ex *Riverio*.

(*Vires dulcamaræ.*) Art. 1332. ʒ℥. *Fol. solani lignosi sive dulcamar.* Miv. sem. lini subtiliter pulverisat. ʒiv. coq. in vin. *moschatellin. cretic. aut larido porcin.* ad consistentiam cataplasmatismis, quod loco contuso tepide admoveatur: unius noctis spatio tumorem capitis humani magnitudine resolvit & contusiones deploratas musculorum sanavit (inquit *D. Hulse apud Rajum*) vires quoque ejusdem plantæ pro usu interno sunt egregiæ; est enim basis *infusi traumatici* apud *Fullerum*; addit auther singulare esse experimentum ad casum ab alto & contusionem: cruorem quippe extravasatum & grumescens mirifice dissolvit, &c.

(*In simplici contusione.*) Art. 1333. In simplici contusione sufficiunt embrocationes cum *ol. rosar. myrtil. & aceto*, & applicatio cataplasmatismis sequentis vel hujusmodi ʒ℥. *Far. bord. fabar. ana* ʒiij. *pulv. nuc. cupress. balaust. alum. rup. ana* ʒß. *ros. rub. ʒiij. ol. ros. ʒiß. alb. ov. N. iij. acet. q. s. m. f. cataplasma.* Ex *Wiseman*.

(*Remedia varia.*) Art. 1334. Præter remedia modo recensita interdum in usum venire possunt sequentia; *Bolus ad casum*, *pulvis ad casum*, *oleum sem. lini* intus sumptum; *emplastrum smecticum*, &c.

Ettmulleri sententia.

(*Contusio capitis.*) Art. 1335. Gravior contusio capitis interdum cranium findit, vel in loco contuso, vel loco opposito (& vocatur *contusio fissura*), nunc penetrat utramque laminam, nunc externam illæsi interna, nunc e contra.

(*Signa fissuræ cranii.*) Signa fissuræ sunt multiplicia, ut vomitus biliosus, vertigo, sanguinis per os, nares, &c. effluxus, subitanea obmutescencia, & brevi superveniens delirium, convulsio, paralyxis; symptomata hæc superveniunt nunc mox in principio, ubi gravior fuerit læsio, nunc quarto vel septimo die, ubi levior. Si æger firmiter teneat funiculum inter maxillas & chirurgus fortiter trahat, si habeat fissuram, in loco fisso dolorem percipiet. Necessè est ut plurimum, ut perforetur cranium, ut sanguini & saniei pateat exitus. Observandum est, quod vulnera simplicia capitis interdum post quartum vel septimum diem contrahant dolores, hinc rigorem & febrem; hæc si super-

si superveniant, & alia adsint symptomata, suspitio est fissi vel fracti cranii, sin vero non adsint alia symptomata, non statim ad *trepnationem* accedendum est; febris enim ex aliis causis oriri potest. „ In „ contusionibus cranii & lésionibus meningum septimo vel undecimo „ die gravis supervenit *ophthalmia*, & est signum mortis imminentis. „ *Baglivi*. „

Boerhaavii Sententia.

(*Capitis contusionis effectus.*) Art. 1336. In capitis contusionibus, & inde ex collecta materie, interdum creantur varii tumores, erysipelas, oedema, dolores, convulsiones, ossis & periostei putredines, febres, mors. ----- Cranium in junioribus intropressum, vel in adultioribus post fracturam intropulsus, cerebrum premit; pro varietate loci pressi, pro varia magnitudine, profunditate, acutie, punctura prementis, producit hebetudines, sopores, vertigines, tinnitus, caligines, deliria, vomitum bilis, dolores capitis, convulsiones, paralytes, lotii sæcumque spontaneum exitum, apoplexias, febres, mortem.

(*Concussio vehemens.*) Concussus validus capitis interdum eadem facit, rumpendo, comprimendo &c. „ In his affectibus religiose consulatur „ laudatus author in *c. de capitis vulneribus*, qui (si quid ego iudicando „ valeo) omnium scriptorum est facile princeps. In contusionibus gravioribus semper recordandus est *aphorism. Hippocratis*, nempe omne „ quod contusum, necesse est, ut putrescat, & in pus vertatur. „

Ettmulleri Sententia.

(*Luxatio Ossium.*) Art. 1337. Luxari dicuntur ossa, quando eorum capita ex situ naturali remonentur; hæc autem luxatio fit a vi externa ut plurimum, quandoque vero oritur a causa interna; namque hoc malum iis, qui scorbuto laborant, aut qui affectibus catarrhalibus sunt obnoxii, nonnumquam accidit; in his enim funiculi nervi laxantur & resolvuntur, & fere insensiles fiunt, unde *paralyti scorbuticæ* subinde supervenire solet.

(*Duplex.*) Art. 1338. Duplex est luxatio nempe *perfecta*, quando os a sede sua omnino amoveatur, vel *imperfecta*, quando non totaliter a sinu suo extrusum sit os, sed hæreat adhuc in sui receptaculi margine.

(*Prognosis.*) Art. 1339. Præ cæteris omnibus os femoris difficillime luxatur, istius etiam luxatio est omnium curatu difficillima; in adultis raro aut nunquam restituitur sine miserrima in perpetuum claudicatione; ratio est, quoniam ligamentum fortissimum, quo in receptaculo suo illigatum est, vel ruptum sit, vel insigniter relaxatum. „ Valde probabile est (*observante Cheselden ex duobus dissectionibus Anat. pag. 33.*) „ quod os femoris nunquam vel rarissime luxetur, & quod fractura „ *cervicis istius ossis* pro luxatione frequentius accipiatur, unde femur „ decurtatur, &c. Impossibile enim est (ut cum illo dicam) quod caput „ ossis inter musculos firmum ac stabilem locum inveniat ambulationis munere obeundo, tamquam in acetabulo. „ Luxatio in talo seu pedio est omnium periculosissima, ubi sunt os tali, calcanei, tria ossa innominata, os cubiculare, &c. ibidem quoque copiosissimi sunt tendines, unde dolor atrocissimus, inflammatio, quandoque etiam convulsio. „ Os humeri (*ex observatione Barbettiana*) raro luxatur, & „ etiam ita raro reducitur, quin aliquantulum protuberet, quam ob „ causam patiens sæpenumero manum ad caput porrigere nequeat. „ Dorsi vertebrarum ad interiora luxatio malum lethale censetur; „ idem de costis ad interiora luxatis plerumque dicendum est.

(*Curatio.*) Art. 1340. Quoad curam luxationis; os luxatum, membra exten-

extenso, mature reponendum est, quo facto, nil aliud incumbit chirurgus, nisi ut commodis ligaturis os firmet, apteque collocet, ac inflammationem facile superventuram, & alios affectus mature arceat. Fasciationes non debent esse nimis *strictæ*, ne compressis vel coarctatis vasis oriantur tumores; neque tamen nimis *laxæ*, ne pars semel restituta denuo ex loco elabatur.

(*Inflammatio.*) Si adsit inflammatio, antequam membrum repositum sit, nihil prius tentandum est, quam inflammatio discussa fuerit; quandiu durat, tamdiu pars inepta est extensioni, sin vero violentius luxatio inflammata extendatur, supervenit ex nimio dolore convulsio interdum lethalis. Ut ergo inflammatio imminens præcaveatur, vel præsens discutiatur, conducit fons sequens, 2℥. *Summit. hyperic.* Miß. *beton. chamæmel. roris marin. ana* Mj. *rad. consolid. maj.* ℥iij. *aristoloch. rotund.* ℥vj. *sem. quatuor calid. maj. ana* ℥ss. coq. in aq. font. & vin. ana q. s. ad ℥ij. sit pro fotu, & in eodem humectentur fasciæ tepide circumvolvendæ: ubi major adfuerit contusio, augeatur quantitas *rad. consolid.* ubi levior, *Aristolochiæ*; ubi urgent dolores *capita papaveris* possunt addi.

(*Oedema.*) Supervenit quandoque tumor *oedematosus*, in quo casu illinantur partes affectæ cum oleo volatili penetrante, convenit etiam petroleum, item bals. *Peruvianum* cum spiritu *juniperi* temperatum. In luxationibus prodest inunctio cum oleo *hyperici* & ol. *terebinth.* Ol. distillatum foetidum *tartari* est horrendum ratione odoris, sed tamen nihilominus est nobile admodum ratione efficaciam; conveniunt ex *lumbicis* parata pro usu externo & interno. Experientia didici, ovum cum oleo *terebinthinae* & pauco aceto conquassatum in luxationibus esse remedium utilissimum, omnibus intentionibus satisfaciens. *Belloste.* Convenit etiam illud *Boyleanum* nempe *furfur critici* in aceto coctum.

(*Fractura ossium.*) Art. 1341. In fracturis ossium, vel frangitur os secundum latitudinem, hoc est transversim; vel secundum longitudinem finditur, quod proprie dicitur *fissura*. Fracturæ in senibus frequentius occurrunt, quam in junioribus, quoniam illorum ossa sunt aridiora.

(*Longitudinales.*) Art. 1342. Fracturæ ossium longitudinales, i. e. *fissuræ* difficile cognoscuntur, sed facillime curantur; neglectæ aut non rite curatæ ulcus post se trahunt; imprimis si in loco fisso ossis caries superveniat, admodum periculosa sunt, & sæpius ad membri abscissionem deducunt.

(*Transversales.*) Art. 1343. Fracturæ transversales sunt cognitu faciliores, curatu difficiliores. Os fractum in medio sui dat fracturam leviolem, quam circa articulum.

(*Prognosis.*) Fractura cum vulnere & multa partium contusione & læsione est gravius malum & perquam periculosum, ut etiam quando os in plura frustula frangatur. In adultis femur fractum rarissime aut vix unquam sine claudicatione restituitur. Minora ossa fracta intra 7. vel 14. diem fere sanantur; ossa majora intra 20. ad 40. præter propter curationem recipiunt.

(*Curatio.*) Art. 1344. In cura fracturarum duo scopi chirurgus incumbunt, nimirum ossa fracta facta extensione in situm naturalem reponere, & reposita per fascias & ferulas firmare; tunc enim natura eadem denuo firmiter conglutinat, & formatur *callus*, qui substantia quidem similis est ossi, conformatione vero sola ab eodem differt. Si adsit inflammatio, curanda est, antequam aliquid circa fracturam tentandum est, qua curata, atque osse reposito illinatur locus fractu-

ræ cum *ol. hyperic.* vel *ol. lumbricorum terrest.* cum guttis aliquot *ol. terebinth.* & applicetur emplastrum ex *tacamahac.* cum paucis *ol. distillat. rorismarini* malaxatum; applicato emplastro imponantur ferulæ tres aut quatuor ad summum, quæ postmodum jungantur per tria ligamenta; Ligationes autem debent esse moderatæ; nam si sint ar-
etæ nimis partem suffocant, & gangrænâ inferunt.

(*Vires osteocollæ.*) Experientia constat præ cæteris quibuscunque lapidem osteocollæ a ℥ss. ad ℥j. intus sumptum esse remedium singula-
rissimum in callis ossium fractorum generandis, & augmentandis, ut-
cunque obscurissimum sit, quomodo operatur.

(*Fracturæ complicatæ.*) Hactenus de fracturis simplicibus; quædam cum vulnere complicatæ sunt, post repositionem ergo ossis vulnus con-
siderandum venit, quod, ut alia vulnera, de quibus postea, tractan-
dum est; emplastrum fracturæ applicandum perforatum esse debet in
loco vulneris, ut ita beneficio foraminis vulnus commode tractari possit.
Si os iterum frangatur, non frangitur in callo, sed circa callum.

V U L N E R A .

Boerhaavii sententia .

(*Vulneris in genere historia.*) Art. 1345. Vulnus est soluta unio re-
cens, cruenta, partis mollis a corpore duro & acuto facta. Partes
vulneratæ sensim magis magisque a se mutuo recedunt; cruor plerumque
primo cum impetu effluit, dein sensim sponte sistitur; tum crusta lan-
guinea cavo vulneris innascitur, & liquor dilutus, rubellus, tenuis effluit;
labia vulneris incipiunt rubere; calere, dolere, tumere, retorqueri;
atque eodem tempore febricula cum calore & siti adest; (in magnis
vulneribus) hinc tertio, quartove die ferius vel ocyus vulnere adest
liquor tenax, albus, pinguis, æqualis, pus; eodem tempore rubor,
calor, dolor, tumor, retorsio labiorum, febricula, cessant, vel mi-
nuuntur; & sensim cavum vulneris a fundo sursum, & ab ambitu
versus centrum, crescentē carne impletur, coeunte margine albo; po-
stremo siccatur vulnus, & obducitur cicatrice.

(*Vulnera arteriarum.*) Art. 1346. Ex arteria majori tota dissecta ori-
tur hæmorrhagia lethalis; arteria vero non nimis magna transversim
dissecta, retrosiliens, atque inter solida vicina se recondens, sibimet
obturaculo est; sin vero arteria transversim vulnerata non totaliter
dissecta fuerit, oritur hæmorrhagia perpetua, ea autem sedata a te-
nuitate cicatricis cedente aneurisma.

(*Hæmorrhagiæ.*) Art. 1347., Ad hæmorrhagias vulnerum sistendas præ-
ter vasorum ligaturas & fibularum linariarum applicationes, *stypti-*
ca quamplurima in consuetudinem veniunt; usitatiora sunt, quæ se-
quuntur; Pulvis Galenicus, alum. ust. colcothar. vitrioli, muscus In-
diæ, styptic. regis, oleum terebinth. tinctura antiphtisica Ettmulleri,
vel potius Michaelis (vid. Ettmulleri Vol. I. p. 476.) præstantissimum
quidem remedium, Helvetii stypticum, viz. tinct. chalybis cum tar-
taro præparati. spir. vin. extract. atque hoc ultimum remedium eo-
rum, quæ sunt melioris notæ; nisi quis nova lumina consecrari velit,
ignes fatuos. Non deerunt Thrasones ac summi venditores, quamdiu
mundum adeo credulum invenire possint. Proh dolor! nunquid ser-
mo hic de vulgari tantum opinione movetur? Utinam ne dicam hu-
jusmodi impostores fautores habere Equites Auratos, Camerarios,
&c. Sed rogerent torquem epilepticum tempore Oribasii in usu fuisse;
ita

ita quidem majores nostri, omni aëvo, & Hippocrates ipse impudentissimis agyrtis mundum infestari conquesti sunt. *Exiguum opii frustulum* in foramen arteriæ sanguinem fundentis intrusum *hæmorrhagiam* extemplo sistere dicitur. N. B. Stypticum Doct. Eatonii idem esse vel saltem non multum diversum a styptico Helvetii apud exteros aliquamdiu obsoleto & nunc demum tanta cum ostentatione redivivo; in ambobus vim maximam a spiritu vini oriri eosdemque effectus ipsum spiritum vini solum præstare luculenter demonstravit D. Sprengellius. Transact. Philosoph. Num. 383.

(*Nervorum vulnera.*) Art. 1348. Nervi toti dissecti retrofiliunt, se recondunt, ramulos vulnere paulo superiores trahunt, & vicinis dolorem obstructionemque creant, parti vero infra vulnus positi stuporem, immobilitatem, marcoremque. Nervi puncti, vel dimidiato dissecti, dolores, aliquando primo obtusos, nonnunquam vivos excitant, primo in loco vulneris, post per omnes nervos nexos, vicinosque; hinc calores, tumores, rubores late sparsos, febres, deliria, spasmos, inflammationem, inflammati aperturam cum evacuatione acris, tenuis, & copiosissimi sæpe feri; postea insensibilitatem producunt, vel gangrenam & mortem.

(*Tendinum ac membranarum.*) Eadem fere parum mutata etiam in tendinibus diversimode læsis obtinent, & membranæ, tendinum nervorumque sæpe productæ quum sint, similiter quoque afficiuntur.

(*Sutura curandi.*) Art. 1349. Tendines magni recens abscissi vel rupti futura refarciri possunt, extremitates ita conjungendo, ut glutine naturali vel callo quodammodo uniantur, & usus artuum conservetur. Chirurghi Gallici frequenter & etiam aliqui ex nostratibus hoc præstant cum fausto eventu. Extat apud M. Petit instantia *amborum tendinum Achillis* penitis disruptorum *sola ligatione* sine ulla futura curatorum. Vid. *Memoir. de l'Acad. Anno 1722. p. 68.*

(*Curatio.*) Art. 1350. Nervorum ac tendinum vulnera (inquit Barbet) putredinem facile concipiunt, & sunt admodum periculosa; punctura est periculosior quam sectio. His vulneribus prope animadvertendum est frigida externe valde nocere; hoc non tantum de medicamentis, sed etiam de aere intelligendum est. Medicamenta debent esse moderate calefacientia & exsiccantia, minime acria; qualia sunt *oleum lumbricorum, rutaceum, hyperici, terebinthinæ, cere, sp. lavend. comp. elixir. propriet. balsamum Peruvianum, opobalsamum, gum. elemi, spiritus vini, &c.* In punctura recenti tendinis aut nervi (ut loquitur Job Mekren) illico foramini imponatur plumaceolum sequenti vel simili mistura madefactum. 2℥. Ol. terebinth. sp. vin. ana p. j. ol. cere in quo aliquid euphorbii solutum p. ij. misce, huic superimponatur plumaceolum siccum, mox spatula parum ignita applicetur, ut calor & vis mixturæ ad interiora læsa deferatur, hoc peracto, plumaceolum unguent. Basil. inunctum priore remoto admoveatur, & superimponatur Emplast. stipt. Paracels.

(*Nota bene.*) In punctura tendinis juxta observationes & ratiocinia D. Cheselden brachium in situ acclinato non extenso tenendum est.

(*Punctura tendinis.*) Art. 1351. Inter venæsectionem celebrandam homines interdum, maxime ab imperitis chirurgis, a punctura tendinum in artus amittendi, atque adeo in vitæ discrimen conjiciuntur. Qui vero hujusmodi punctura plectuntur, dolorem non statim sentiunt, sed duodecim horis post phlebotomiam se eodem affici conqueruntur, non tam in orificio nuper facto, quam in partibus

„ ad axillam tendentibus , ubi tandem dolor se figit , & tunc maxime
 „ percipitur , cum brachium extenditur ; attamen læsa pars tumore
 „ admodum insigni non afficitur , eodem avellanæ magnitudinem vix
 „ superante , sed ex orificio *humor aqueus* vel *ichor* quidam jugiter di-
 „ stillat , quod quidem præcipuum puncturæ tendinis *diagnosticum* est
 „ habendum .

(*Curatio .*) Curatur cataplasmate sequent. ut propriis oculis obser-
 „ vavi ; ℞. Rad. lilior. alb. ℥iv. coq. ad teneritudinem in lact. vaccin.
 „ ℞ij. deinde ℞. farin. lini avenac. ana ℥iij. coquantur farine ad
 „ cataplasmatidis consistentiam in q. s. lactis a radicibus prædictis colati ,
 „ & radicibus contusis misceantur ; f. cataplasma parti affectæ calide
 „ applicandum mane & vesperi . Sydenham . Ego quoque hujusce ca-
 „ taplasmatidis efficaciam semel atque iterum expertus sum . , ,

(*Vulnera qualia lethalia .*) Art. 1352. Vulnera sequentia sunt lethalia ;
 cerebelli ; item cerebri profunda adeo , ut medullam oblongatam mul-
 tum lædant , medullæ spinalis profunda vulnera , maxime in parte supe-
 riori ; cordis in cava penetrantia ; magna quoque vulnera pulmonis ,
 hepatis , lienis , renum , pancreatis , mesenterii , stomachi , intestino-
 rum , uteri in gravidis , vesiçæ circa arterias ejus majores , aortæ ,
 carotidum , & similibus arteriarum venarumque magnarum . Vulnera
 magna bronchiorum , vulnera utroque latere thoracis cavitatem pe-
 netrantia , diaphragmatis præcipue in ejus parte nervosa , vulnera ma-
 gna ventriculi , intestinorum tenuium , &c.

Ettmulleri sententia .

(*Musculi temporalis periculosa .*) Art. 1353. Vulnera musculi tempo-
 ralis sunt periculi plena , & rarius curantur , (inferunt plerumque
 spasmos horrendos .)

(*Curatio .*) Art. 1354. Cura vulnerum consistit in unione partium
 separatarum , quod opus est solius naturæ , quæ beneficio succi nutri-
 tii ad omnes partes distributi sensim sensimque easdem renovat , & re-
 ducit ; chirurgi autem opus est hic adjuvare eam , in hoc bono opere
 sequendo ejusdem ductum , removendo imprimis impedimenta externa ,
 ac applicando remedia , quæ parti sint familiaria ac amica , *vulnera-
 ria* & *balsamica* appellata . In curandis vulneribus interne prodesse
vulneraria & *alcalia* , inter quæ eminent *album græcum* , *cancer fluvia-
 lis* , *mercurialia* , &c. , Imo tota curatio interna consistit in blandiori
 „ *diaphoresi* promovenda & conservanda ; ideoque *mixtura simplex* vul-
 „ neratis optime convenit . , In vulneribus recentibus non necesse
 est , ut cura in longum protrahatur ; sed potius suppressa hæmorrhæ-
 gia , & remotis corporibus extraneis , statim instillantur guttæ aliquot
bals. Peruvian. simpl. quod interdum vulnus cito conglutinat : inter-
 dum tamen necesse est , ut , neglectis balsamicis , *digestiva* applicentur
 methodo vulgari , ubi , scilicet , conjuncta est contusio , uti in vulne-
 ribus *sclopetorum* evenit .

(*Digestiva .*) *Digestiva* (1367.) ordinario constant ex *terebinthina* &
vitello ovi tanquam basi , quibus pro re nata , nunc *mellis parum* cum
myrrha aut *bals. Peruv.* aut *gum. elemi* , &c. addendum , imprimis si circa
 partes nerveas , quæ alias facile putrescunt , suppuratio expectanda est .
Elixir proprietatis omnes nostri corporis putredines arcet ob *myrrham* , ut
 & *colcothar vitriol.* ab Helmontio laudatum , ex hoc *Felix Vuurzius* unguen-
 tum suum fuscum parabat . *Balsamum Peruvianum* reliquis balsamis præ-
 fertur , proficuum quoque est *balsamum saturni terebinthinatum* , & *bals-
 samum sulphuris cum oleo hyperici factum* ; laudatur *oleum Momordicæ* ,
 oleum

oleum Hyperici ex feminibus expressum, cui proprii flores infusi sunt, est egregium, *spiritus theriacalis* pro lavandis vulneribus recentibus, est optimum putredinem prohibens, &c.

(*Turundæ*.) Art. 1355. Turundis parce utuntur saniores practici, neque unquam sine premente necessitate; nam nimis frequenter & diu usurpatæ consolidationem impediunt, item partes cutaneas circa labia ad occallescentiam solent disponere.

Quod sequitur de turundarum usu & abusu, & de rara solutione vulnerum, ex libro valde raro & vix comparando *Johannis Baptistæ Magati* de rara medicatione vulnerum, &c. decersi.

(*Turundæ & penicilli*.) Art. 1356. Turundæ & penicilli nihil aliud sunt quam corpora extranea partis affectæ naturam infestantia, & in illis expellendis semper laborat; partem vulneratam distendunt, comprimunt, eidemque sunt oneri, & propterea fluxionis periculo eam exponunt. Veruntamen turundarum & penicillorum usus aliquando saltem admittendus est ac necessario, & in quibusdam casibus æstimandus, viz. quando ob complicatum affectum remoranda est vulneris sanatio; ut quando viscera vulnerata sunt, & in cavitate thoracis aut abdominis materia continetur aut sub cranio collecta est, & simili rerum statu olim *Romani Chirurghi*, ne sua laude fraudentur, & longa & sedula observatione novum curandi vulnera modum, quo rarissime solvuntur, adinvenere, qui cum experientiæ potius quam rationi & procerum nostrorum doctrinæ inniti videretur, eum *Cæsar Magatus*, ad methodum reducere conatus est; Modus *Ludovico Septatio* clarissimo *Italiæ* ornamento valde arrisit, ipsumque ad praxin felici successu adhibuit, & suis scriptis commendavit. Quoties vulnus solvitur ac detegitur, toties interturbatur & a proprio munere distrahitur natura: & quamvis accedat utilitas ex nova recentium medicamentorum impositione, attamen majus est detrimentum quod ex crebra solutione sequitur, quam commodum ex nova medicamentorum impositione, quorum virtute vulnus haud destituitur, *sanatio etenim est duntaxat nature opus*. Status vulneris sub tegumentis oculis mentis cognosci potest; in quibusdam vero casibus solutio & detectio vulneris est perquam necessaria, nempe, quando manualis aliqua operatio requiratur ad peregrinum corpus vel ossis aliquam portionem evellendam, &c. quando caro spongiosa supercrescat, quando ingentis putredinis, vel sordidorum excrementorum abundantia sit suspicio, quando adsit dolor vehemens vel erosio & pruritus; sub his & similibus circumstantiis detegenda sunt vulnera, ut congruis remediis his malis occurratur.

(*Ulcerum*.) Art. 1357. In medicina experientia docet eandem curandi rationem a vulneribus ad ulcera transferri posse, idque adeo felici successu, ut sæpe deplorata ulcera, & innumeris tractata remediis, facillimo negotio hac via sanabilia evadunt; corporibus solummodo prius a *cacochymia bene purgatis* & ulceribus a sordibus deterfis.

(*Vulnera sclopetorum*.) Art. 1358. Vulnera sclopetorum post extractionem globuli plumbei, sicut alia vulnera cum contusione conjuncta curanda sunt; convenit *venæ sectio*; revulsio enim (inquit *Galenus*,) quæ e directo fit, celerrimam utilitatem adfert, die proximo *enema lenitivum* injici debet, & fots sequens usurpari, ℞. *Summit. Hyperici, centaur. min. scord. absynth. ana Mj. flor. ros. rub. chamæm. melilot. sambuc. ana Mi℞. furfur. p. j. coq. in aq. font. ad ℥i℞. colatur*

tur. add. *vin. auster.* ℥j. *sp. vin.* ℥vj. pro fotu. Si pus laudabile obtineatur, nimirum album, æquale, leve, minime foetidum, &c. res in vado est; sin vero pus non fuerit secundum votum, cum unguentis admisci debet *præcipit. rub. Wiseman.*

(*Periculosa.*) Art. 1359. Sclopetorum vulnera sunt omnium pessima ac periculosissima; nam adest semper insignis contusio, & partium dilaceratio; tardius ad suppurationem perveniunt. Vix ante tertium vel quartum diem.

(*Curatio.*) Art. 1360. Ad curam quod attinet, omni extraneo ex vulnere prius exempto, loco digestivi communis, optime applicatur *balsamum Paræi*, singulariter commendatum ad curam vulnerum sclopetis infligatorum; descriptio hæc est a Sennerto & Barbette, 2℥. *Ol. lilior. alb. vel violarum* ℥iv. in hoc coq. catelli duo nuper nati ad ossium usque dissolutionem, postea add. *lumbricorum terrestrium* in vino coct. ℥j. coquantur simul colaturæ, adde *terebinth. ven.* ℥iij. *sp. vin.* ℥iss. m. & linimentum, quod egregie conducit ad sedandum doctorem, & maturanda vulnera sclopetorum. Ubi autem suppuratum est vulnus, & omne contusum separatum, *mundificativa* sunt usurpanda, & vulnus s. a. tractandum est, donec sponte caro nova succrescat.

(*Capitis vulnera.*) Art. 1361. Vulnera capitis superficialia facile curantur cum *balsamo Peruviano*, vel *oleo hyperici*, imponendo desuper *emplastrum de betonica*; sed reliquis omnibus quotcunque pro capitis vulneribus convenit *emplastrum e gum. elemi*, sive *linimentum Arcei*; vitanda sunt omnia unctuososa; convenit etiam *gum. elemi cum terebinth. mistum* in cranii vulneribus. De eximiis virtutibus hujus unguenti audi sis ipsum inventorem. Hujus linimenti a nobis inventi ea vis est ut concoquat, digerat, mundificet, atque carnem etiam inducat; hujus certissimi in omni periculo faciendo usus nunquam me pœnituit: & cui omnes ii quicunque fuerint experti, *balsami nomen* non immerito fecerint.

(*Cranium nudatum.*) Art. 1362. Pericranio læso, ut nudetur diu os, vel ut putrescat, os privatur vasis periostei adeoque & suis, stagnat in his liquor, putrefactus squamam separat, unde os flavum, fuscum, nigrum, tandem foliolum deponit. In hoc casu curatio (tuto, prompte, & expedite) fit os leviter *parva terebra* diversis vicinisque locis usque ad medium perforando, unde *exfoliatio* cavetur, periosteum inde renascitur applicando *plumaceola spiritu vin. mastichino* imbuta, & curacitissime præstabitur. Ex Boerhaave, „ quem chirurgus præcipue minus exercitatus in vulneribus capitis & calvaria læsa præ reliquis „ omnibus quibuscunque diligenter consulat, & errores in praxi evitabit. In omnibus capitis vulneribus, præcipue gravioribus, ubi „ cranium denudatum fuerit, danda est opera, inter medicandum „ partem vulneratam, quantum poterit, a frigore externo tueri. „

(*Balsamum Samaritanum.*) Art. 1363. Balsamum Samaritanum in curandis vulneribus valde commendatur a quibusdam, privatim a M. Le Clerc., quod conficitur ex *vino & oleo oliv.* diuturna coctione in balsamum redactis: est etiam aliud magis compositum, quod frequentiori usu comprobatum est; 2℥. *Vin. Hispan. ol. ana* ℥ss. *sacchar. cand. mel. violar. ana* ℥ij. coquantur simul lento igne & f. balsamum, *Bellose.*

(*Inflammatio vulnerum.*) Art. 1364. Inflammationem vulnerum præ reliquis sistit *aqua calcis*, vel per se, vel cum *camphora*, aut *sacchar. Saturni* sociat.

(*Synovia.*) Art. 1365. Synovia est fluxus aquæ albicantis ex articulis vulneratis, estque periculosum symptoma, & subinde partium atrophiam relinquit; ut compescatur, inspergatur pulvis astringens; quidam chirurgus recepit *usneam cran. human. & laccam pictorum ana.*

(*Curatio.*) Alias singulare experimentum est *stercus porcinum* cum sanguine vulneris invicem mistum, ac coctum, & ita vulnere applicatum instar cataplasmati. *Ettmuller.*

U L C E R A.

Ettmulleri sententia.

(*Ulcus quid.*) Art. 1366. Ulcus est solutio continui ab acredine corrodeute cum partium quarundam ablatione; corrodens hoc in ulceribus est acre acidum, alimentum parti proprium in excrementum acre, sive in saniem immutans; ulcus autem est vel simplex vel complicatum, sinuosum, fistulosum, cariosum, &c. Ulcera antiqua maciem, febres lentas, aliaque mala æque excitant, ac ulcera pulmonum.

(*Curatio.*) Art. 1367. Ulcera diuturniora sine internorum usu rarissime curantur; interna autem debent esse *acidum absorbentia & destruentia*, & *sudorifera*, præcipue decocta *lignorum*, *antimonialia*, *viperina*, & *volatilia*; inter purgantia optimum est *extractum bellebor. nigr. cum mercurio dulci*, sed omnibus præferenda sunt vomitoria, sæpius repetita, ad facilem ulcerum curationem reddendam: His etenim & huiusmodi internis omnino neglectis, frustra frequentissime chirurgicum imploratur auxilium. In ulceribus ipsa *salivatio mercurialis* in auxilium vocanda est. Antiqua ulcera interdum claudi non possunt, nisi in loco opposito fiat *fonticulus*. Quoad remedia externa, in genere sunt *digestiva*, *mundificantia*, *sarcotica*, & *epulotica*, quæ pro varietate conditionis ulceris curandi a prudenti chirurgo usurpanda sunt.

(*Digestiva.*) Sequens est *digestivum* probatissimum, ℥℥. *Terebinth. Venet.* ℥j. *vitel. ovi unius*, *mel. ros.* ℥vj. *ol. hyperic.* ℥j. fiat unguentum; interdum addantur *gum. elemi*, *unguentum basilic. thus*, *maſtiche*, *farina bordei*, &c.

(*Mundificantia.*) *Mundificantia* a chirurgis usurpata quamplurima sunt, insigniora tamen, quæ sequuntur; *radix apii*, *aristolochiæ utriusque*, *fol. nicotianæ*, *flor. hyperici*, *album græcum*, *camphora*, *balsamum Peruvian.* *myrrha*, *aloe*, *euphorbium*, *ex sulphure præparata*, *saturina*, *es viride*, *arsenicum*, *aqua calcis vivæ*, *mercurius dulcis*, *mercurius præcipitatus*, *balsamum sulphuris*, *oleum* & *unguentum nicotianæ*, *unguentum egyptiacum*, *apostolorum*, „ *item oleum camphoræ*, viz. *camphora in dupla quantitate spiritus nitri soluta*, &c. „

(*Sarcotica & Epulotica.*) *Sarcotica* & *Epulotica* gradualiter tantum differunt; sequens valde proficuum perhibetur, ℥℥. *Unguent. diapomphol. tutig. ana p. j.* *diasulph.* *Rutandi p. ij.* *ol. nicotian.* *parum M.* „ *Vix datur* „ *præstantius quam emplastrum de lapide calaminari D. Turner.* „

Art. 1368. In ulceribus vetustis emplastrum sequens est egregium, ℥℥. *Calcis vivæ bis vel ter lot.* & *parum exsiccat.* q. v. *ol. lini* q. s. *misce*, & cum *bolo Armen.* vel *bol. rub.* tingatur ad carneum quasi colorem.

(*Callus.*) Art. 1369. In ulcere diuturniore aut male tractato aliquando supervenit *callus*, qui nunc cingit simpliciter ambitum seu orificium ulceris ipsius, nunc vero totum sinum ulceratum incrustat, & occupat, & talia ulcera sinuosa cum callo interno vocantur *Fistule*, quæ

quæ difficiles sunt curatu propter callum, qui nisi auferatur, sunt incurabiles.

(*Fistula.*) Amplificandus est sinus cum *rad. gentian.* & absumendus est callus cum *pulv. alum. ust. mercurio præcipit. succ. nicotian. &c.* Aliquando necesse est, ut tota fistula cultro incidatur, & aperiatur, & deinde callus absumendus cultro vel antedictis remediis.

(*Caries.*) Art. 1370. Caries ossis frequenter accidit in ulceribus inveteratis, quæ est corrosio ipsius ossis, & quasi ejusdem ulcus; si os denudatum fuerit, primo oleosum quodammodo & pingue apparet, hinc successive flavescit, deinde nigrescit, & postea foraminulatum redditur, & quasi teredinibus perforatum; si absconditum fuerit os, specillo expiscanda est caries; tunc enim os in fundo non glabrum sed inæquale, & scabrosum percipitur, quin & quæ affluunt ex ulcere sordes & excrementa pingua oleosa & acria majorique copia, & ulcera nequeunt ad cicatricem perducì. Labia ulceris sunt dilatanda, remedia unctiosa vitanda; pulvis *euphorbii* est expertissimum remedium, huic proximum est *radix. irid. Florent. mercurius dulcis* valde commendatur, ut & *oleum caryophyllorum* ad exfoliationem promovendam.

(*Curatio.*) *Oleum camphoræ*, viz. *camphora in dupla quantitate spiritus nitri soluta* a quibusdam prædicatur. *Hist. de l' Acad. Vol. IX. p. 74.* Si hæc & similia successu careant, denudandum est os, & abradendum; & si corruptio sit profundior, terebrum, vel quod potius est, *cauterium actuale* adhibendum est: nam ultra omnia ferri igniti tactus ossis humiditatem exsiccat, idemque ad promptam desquamationem disponit.

Wisemani sententia.

(*Ulcera simplicia.*) Art. 1371. In ulceribus simplicibus tractandis non raro mihi fuit usitatum ulcus digerere, detegere, & incarnare cum *unguento basilic. & mercurio præcipit.* in proportionem majori vel minori pro re nata invicem commistis, & postea ulcus *cicatrizantibus* claudere: Sed rarissime inveniuntur ulcera simplicia; complicantur enim ut plurimum variis accidentibus, ut intemperie, dolore, fluxione, &c.

(*Intemperies.*) Art. 1372. „Ulceribus quandoque accidit *intemperies*, curationem tantopere impediens ut hanc expectare non detur, nisi illa prius corrigatur; hæc autem est quadruplex.

(*Calida.*) „In intemperie calida pus acre est, labra ulceris rubra, & adest insignis dolor. „Usurpanda sunt *refrigerantia*, moderate *astringentia*, & *repellentia*; talia sunt *fotus astringentes*, *unguentum album camphoratum*, *refrigerans Galeni*, *populon.* & *similia.*

(*Frigida.*) Art. 1373. In intemperie frigida „labia ulceris mollia sunt, albicantia, & ubi res male succedit, livida evadunt. „Conveniunt *fotus discutientes* & *attenuantes* quemadmodum in tumoribus *edematosis*, & unguenta ac emplastra debent esse *exsiccantia* & *detergentia* quæ fatis nota sunt.

(*Humida.*) Art. 1374. In intemperie humida „caro mollis est & flaccida, sæpe supercreseens, humorum fluxus copiosus; „hic indicantur *exsiccantia* & *astringentia*, qualia sunt *unguentum diapompholyg. tutiæ*, e calce lota, *nutritum*, *desiccativum rubrum*, &c.

(*Sicca.*) Art. 1375. „Ulcera cum intemperie sicca conjuncta, ubi pus paucum aut fere nullum, difficulter sanantur. „Topica debent esse *humectantia*, *fotus ex emollientibus*, unguenta & emplastra & *dissectiva* conveniunt; *unguentum basilic. & mercur. præcipit.* apprime conferunt.

ferunt. In his omnibus hætenus memoratis remedia interna non sunt negligenda.

(*Ulcera cum dolore.*) Art. 1376. In ulceribus cum ingenti dolore vix ferendo, præmissis rite internis, quæ indicantur, attendendum est ad conditionem ipsius ulceris, ut deprehendatur vera doloris causa; inspiciendum est, an humor sit crassus, qui *sordes* vocatur, vel tenuis & ichorosus, qui *sanies* appellatur; uterque peculiariter *detergentibus* corrigendus est, his rite peractis manente adhuc dolore ad *lenientia anodyna* confugiendum est; cataplasmata ex *mucilag. sem. psyllii, c. doniorum, far. bord. croc. vitel. ovi, &c.* unguentum *popul. refrigerans Galeni*, &c. refrigerant & dolorem leniunt; sed pro varietate causarum varia exurgit indicatio.

(*Fungus.*) Art. 1377. In ulceribus frequenter caro *spongiosa* si fungosa succrescere solet, a nimio humorum affluxu ortum ducens, vel a chirurgi imperitia; supprimenda est medicamentis *exsiccantibus* imo *catharticis & causticis* absumenda est; mitiora sunt *lapis tutia*, aliter usum, *mercurius præcipit.* fortiora *vitriolum Romanum, aq. lapia medicamentos. aq. viridis Fallopii*, &c., De reliquis ulcerum affectionibus & accidentibus consulatur author, qui candide & modeste scripsit.

Bellostii sententia.

(*Euporist.*) Art. 1378. Coronidis loco subnectere haud pigebit experimentum illud *M. Belloste* propter singularem illius virtutem in ulceribus curandis; quod quidem *euporiston* nihil aliud est quam *decortum foliorum juglandis in aqua cum pauca saccharo*; modus utendi est linteolum imbuendo, & ulceri imponendo, & non sæpius quam tertio cundo vel tertio quoque die eandem applicationem renovando, donec ulcus sanatur. Hoc medicamentum utcumque simplex & vulgare videatur, suppurat, detergit, incarnat, putredini resistit, &c. certius foelicius quam aliud quodcumque remedium hætenus notum, inquit author, qui multo copiosior est in illius laudibus, p. 260.

Wisemani sententia.

(*Fistula in Ano.*) Art. 1379. Ad ulcera pertinet *Fistula in Ano*, quæ est ulcus sinuosum a phymate vel hæmorrhoidibus internis ut plurimum ortum ducens.

(*A phymate.*) *Fistulæ* quæ a phymate oriuntur, sunt peiores, diu lentes admodum & curatu difficiliore, utpote in musculorum intestitiis profunde penetrantes, & cuniculos agentes, & quanto sinus in ano sunt remotiores, tanto deteriores, quoniam apertionem per incisionem non admittunt. Sic arbitratus est *author noster*; quoniam isto rerum statu necesse est, ut musculus ani sphincter discindatur. Sed *D. Berbek Chirurgus Eboracensis*, vir probus, & hac operatione speciatim celeberrimus, asseruit se sphincterem ani frequentius penitus divisisse, & etiam si ægri durante vulneris curatione facilius continere nequeant, post consolidationem facultatem sphincteris intactam redintegratam fuisse. *Vid. Cheselden Anat. pag. 63.*

(*Ab hæmorrhoidibus.*) Art. 1380. *Fistulæ* ab hæmorrhoidibus internis originem trahentes inter tunicas intestini recti sensim generantur, & perforationem exiguam habent juxta ani ambitum, unde tenuem sive ichorem sine dolore emittunt; progressu vero temporis superveniunt pruritus & excoriationes; orificia tandem callosa evadunt, & quandoque ad tempus clauduntur, & deinde certis intervallis denuo erumpunt.

Sennerti sententia.

(*Fistulæ non temere curandæ.*) Art. 1381. Fistulæ, si copioso fluxu, aut foetore, aut alio modo, nihil incommodi afferant, sed potius natura superfluos humores e corporibus *cacoehymicis* & *cacheticis* cum ægri commodo per eas evacuet, curari non debent, sed servari. Fistulæ vero simplices & recentes sine periculo curari possunt.

(*Incisio per filum.*) Art. 1382. Incisionem quod attinet, si ea sine periculo, ne scilicet musculus ani lædatur; & fæces præter voluntatem egrediantur, tentari possit, sit vel *filo seu laqueatione*, ut appellant, vel *ferro*. *Filo* ita fit; Sumatur filum ex serico, vel seta equina, aut aliud, quod non facile putrescat, id immittendum in extremitatem specilli stannei vel plumbei, instar acus perforati, & in fistulam intrudendum, digitoque, oleo rosaceo inuncto, in rectum intestinum immisso, filum apprehendendum, specillum extrahendum, & duæ extremitates ejus connectendæ, & quotidie vel a chirurgo, vel ab ipso ægro arctius constringendæ, donec tota fistula incisa sit; hinc callus absumendus, & ulcus curandum.

(*Incisio cum instrumento ferreo.*) Art. 1383. Ferro *incisio* celerius hoc modo fit; in fistulam specillum plumbeum immittendum, usque dum in intestinum rectum penetret, & hinc instrumento falcato digito in anum immisso secundum styli plumbei ductam fistula incidenda, avendo tamen, ne hæmorrhoides lædantur, & hæmorrhagia exciteur. Incisione peracta, penicillum *albumine ovi* & *pulveribus astringentibus* illitum immittere decet; die sequente Hippocrates *eris flore* conpergit, & frustulum spongiæ melle illitum intrudit, ut fistula aperta fervetur; idque diebus septem continuat, donec callus absumatur; interim spongia vino austero madida imponenda, ut humores eprimantur. De Callo absumendo alibi dictum est. (1369.)

GANGRÆNA & SPHACELUS.

Ettmulleri sententia.

(*Gangræna & Sphacelus quid.*) Art. 1384. Gangræna significat incipientem partis mortificationem, cum dolore tamen & aliquali ardore conjuncta est. Sphacelus vero seu necrosis e contra est perfecta mortificatio, in qua omnimoda vitalitatis est carentia; differunt ergo saltem gradualiter gangræna & imminens sphacelus.

(*Causa.*) Art. 1385. Interdum supervenire solet fracturis, vulnibus male tractatis, ulceribus cacoeth. & tumoribus, imprimis sanguineis; aliquando autem a causis internis oritur.

(*Diagnos.*) In partibus gangrænosus color mutatur in pallidum, obscurum, sublivescens, aut cæruleum, & tandem in nigricantem; caro autem tensa mox evadit flaccida & mollis, & sphacelo facto, partis sponte a partibus separatur, & aqua quædam decolor pravi odoris effluere solet, & pars affecta balitum cadaverosum spirare.

(*Prognosis.*) Art. 1386. Certissimum est gangrænam a causa interiore lethalem esse: Auferatur enim licet membrum, iterum regerminat malum, & necessario mortem post se trahet.

(*Curatio.*) Art. 1387. Ad Gangrænam sistendam interna omnia sunt sudorifera & alexipharmaca; externe autem decoctum calcis vivæ est mirabile, vel solitarium, vel efficacius, si in eodem incoquatur sulphur, & dissolvatur mercurius dulcis addito spiritu vini (camphoratus). In graviore gangræna, præmissa profunda scarificatione, conducit

cit finus equinus, in vino aut urina coctus, fuit experimentum & secretum Sylvii & Barbettii, (& melius esset si adijciatur spiritus sal. armoniac.) In usum quoque venire solet unguentum ægyptiacum calidum usurpatum, facta prius, ut artis est, scarificatione, &c. Chirurgis nostratibus solemne est locis scarificatis oleum terebinth. calidum cum trient. te tincturæ myrrhæ & aloë adhibere, & emplastrum e theriaca Londinensi calefactum superimponere.

Boerhaavii sententia.

(Signa gangrænæ.) Art. 1388. Signa Gangrænæ sunt phænomena inflammationis subito ablata sine correctione causæ, sensus hebes, color pallidior, cinereus, fuscus, lividus, &c. mollities, flacciditas, ad tactus vestigia non resurgens, pustulæ ichore lymphatico subflavæ vel rubello plenæ in loco inflammato; ubi a frigore, pruritus & puritæra ingens, una cum rubore intenso, quem brevi nigredo mortificatio sequitur.

(Perfecta necrosis.) Art. 1389. In perfecta necrosi sensus motusque integre tolluntur (gravitas aliqualis quodammodo in parte sentitur; color est lividus, fuscus, niger; caro est flaccida, & frigida; adeo foetor cadaverosus, corruptio mortifera profunda, omnia vicina deperiscens in ossa usque. Gangrænæ illico succurrendum; sphacelus illico extirpandus. In senio fere semper a quacunque causa lethalis est, ita in hydropicis, phthisicis, & scorbuticis.

(Curatio.) Art. 1390. Ut suppuratio acceleretur, conducit scarificatio putrefacti usque ad vivorum initia; sic enim suffocatione nimis imminuta, loco serpentis gangrænæ fit abscessus, quo cutis & adeque gangrænosa plerumque a subjectis adhuc vivis separantur. Incisa par calidis liquoribus, corruptioni resistentibus, & duritiem escharæ emollientibus fovenda; toti parti affectæ assiduo applicanda cataplasmata calida, & cum calore continuo sustentato agentia; huc etiam plurimum facit rarior partis detectio, quam vulgo fieri solet.

(A gelu gangræna.) Si ab impactu acri gelu gangræna fiat, pars nive imposita vel impositis linteis aqua gelida humectatis operienda erit, donec spiculis frigoris in nivem vel aquam receptis, iterum foras vi incipiat, redeunte vita: aliter caloris applicatu pars putrescit, & ætatis nec eductis spiculis; eo autem peracto calidis refocillandus cardiacis, & in sudorem usque calefaciendus æger est. De amputatione videatur locus N. 496. & consulantur reliqui scriptores chirurgici.

Bellostii sententia.

(Remedium singulare.) Art. 1391. Bellostius sequens unicum remedium instar omnium ad gangrænâ & sphacelum venditat. 2℥. Spirit. nitr. vel aq. fort. p. ii. argenti viv. p. j. fiat solutio; in hoc liquore madefiant lintea, & parti gangrænosa circumvolvantur, & prompte separabitur mortuum a sano, neque opus est, inquit author, ut aliud quodcumque medicamentum ad gangrænâ sistendam excogitemus; non enim reperitur aliud, quod tam cito, & tam certo pensum absolvat.

C A P. XIV.

Sive Fasciculus Morborum decimus quartus.

C H L O R O S I S.

Ettmulleri sententia.

(*Chlorosis quid. A cachexia muliebri differt.*) **C** Chlorosis five febris alba virginum longe distat a *cachexia muliebri*, hæc enim antecedit aut insequitur mensium suppressionem; chlorosis vero est affectus proprius virginibus, aut quibus menses non satisfaciunt. Hoc morbo affectæ pallent, habentque sub oculis coronam subcæruleam vel subrubescentem, tristes sunt, & adest sæpius febricula lenta, & quasi erratica, pulsus inæqualis & varius, vomitus etiam interdum infestat, ac præcordiorum anxietas, &c. Mensium suppressio est fere tantum effectus hujus morbi. Tales volunt inquit *Lindanus*) cohabitare viro.

Riverii sententia.

(*Morbi descriptio.*) Art. 1393. Pallent ægrotae, & adest gravitas corporis, segnities, intumescencia faciei & palpebrarum, palpitatio cordis, difficultas spirandi, somnolentia, rerum absurdarum appetentia &c.

(*Curatio.*) Art. 1394. Præmissis universalibus *chalybeatis* & *amaris* testuendæ sunt; & in frigidioribus decoctum *ligni guajaci* multum suvat.

M E N S T R U A T I O.

(*Mensuratio.*) Art. 1395. „Mulierum profluvii menstrui rationes expedire & theoriam exponere admodum difficile & longum esset, & professæ nostræ brevitati minus congruum; ideoque paucissimis solummodo attingam. Menstrua, perinde, ut de cæteris quibuscunque humoribus notum est, (quantumcunque a medico quodam magni nominis nuper defuncto dissentire videar) e solis excretoriis ductibus glandularum uterinarum, ibidem locatarum, & isti muneri inservientium prodire sine difficultate asserere audeo: quod satis manifestum est ex ipsa partium anotomia, ex chylo scilicet supervacaneo in humorem istiusmodi viscidum cocto, & in orbe sanguinis paulatim accumulato. Insignis est menstruorum præ eo sanguinis lentor ac visciditas; ingratum quoque ac inusitatum odorem in plerisque spirant, non qualem sanguis e venis missus, aut ex hæmorrhagiis effluens. Rubent quidem menstrua, quod & serum & sanguinis integri globuli rubei una cum isto humore transmittuntur, ob ampliatas præter modum in istis ductibus commissuras, unde materia excreta est compositum quiddam ex sanguine & prædicto humore glutinoso, crasso, & viscido. Quantitas singulis vicibus ordinario excreta, in statu sano & naturali, sit ab unciiis quinque vel sex ad octo vel decem ad summum, non a viginti ad triginta, secundum laudatum authorem. Foetus in utero chylo materno, in gremio sanguinis circulante, per vasa umbilicalia delato omnino nutritur, non sanguine menstruo; sicut idem loqui amavit. Lac in mammis a chylo, eoque non multum mutato, secernitur, non a materia per vias uterinas excerni solita; quemadmodum vir eruditus somnivit, qui tractatum de emmenologia in juventute scripsit.

Ettmulleri sententia.

(*Fœminis propria.*) Art. 1396. Fluxus menstruus est fœminis proprius; („ memorantur tamen *quædam fœminæ* menstruis prorsus immunes „) nam inter animalia nullum præter *simiam & barbum pa-*
scem similem pati fluxum dicitur: Nonnulli tamen, licet pauci, *un-*
singulis mensibus talem fluxum per penem patiuntur. „ Hujusce phænomeni
„ meni præternaturalis & rarissime accidentis in toto vitæ curriculo
„ duo tantum exempla mihi cognovisse obtigit. Viris quoque (*inqu.*
„ *Lister in dissertatione de humoribus*) menstruum chyli superpondus
„ æque ac fœminis, accrescit; sed in *urinam* convertitur, profluitque
„ menstruatim perinde ut virginibus forte ante pubertatem, & vetu-
„ lis rursus a cessatione menstruorum. Hæc opinio in *Aphor. 65. &*
„ *66. Lib. I. Sanctorii* fundatur viz. Corpora quoque virorum sana &
„ & moderatissimo victu utentia singulis mensibus sunt solito pondere
„ rofiora, unius scilicet duarumve librarum pondere, & redeunt ad
„ consuetum pondus circa finem mensis, ad instar mulierum; sed fa-
„ cta crisi, per urinam paulo copiosiore, vel turbidiorem. Ante d-
„ ctam crisin menstrualem a somno factam vel gravitas capitis, ve-
„ corporis lassitudo perferuntur, & deinde paulo copiosiore urina eva-
„ cuata omnia sedantur. „

(*Tempus erumpendi, & desinendi.*) Art. 1397. Fluxus mensium ordinario incipit quasi motu naturæ critico ad finem *secundi septenarii* & desinit similiter circa finem *septimi septenarii*; nonnunquam citius inchoat, & diutius fluit. „ Cuidam puellæ *quinto ætatis anno* mensis
„ eruperunt. Alias nonnullas novi *octennes & novennes*, quibus eorundem
„ fluxus incepit; sed in „ hujusmodi ætate præmatura, ut
„ cunque una vel altera vice fluxerunt, vix unquam (quantum ego
„ observare potui) constanter menstruatim evacuatae fuerunt. Nov
„ fœminam, adhuc viventem, nunc *septuagenariam*, si non aliquot
„ annis senio-rem, quæ ab ineunte pubertate menstruatim recte purgata
„ fuit, & jam nunc in tam provecta ætate catameniis colore
„ consistentia usitatis, periodis solitis, haud destituitur, cui per totum
„ vitæ cursum uno tenore minus interrupto cum optima valetudine
„ jugiter fluxerunt. Haud scio, an universa medicinae historia pariter
„ exemplum suppeditet, necne. Ex quo hoc scripsi aliud exemplum
„ inter legendum mihi occurrit, viz. in *Transact. Philos. N. 337.*

MENSIIUM SUPPRESSIO.

Ettmulleri sententia.

(*Mensium suppressionis curatio.*) Art. 1398. Quibus menses nunquam fluxerunt, & tamen sanæ sunt, medicamentis non sunt tentanda menstruatim enim est opus naturæ. In suppressione mensium inter purgantia *colocynthis* (ideoque *pil. ex duobus*) & *belleborus niger* mensi stimulare & uterum sollicitare solent, præsertim si *mercurius dulcis* adjunctus jungatur. *Radices angelicæ*, & *fol. marrub. alb. &c.* in vino infusa cum *aromat. quibusdam & amaris* in frequenti usu sunt. *Sabina* est fortissimum remedium, & ejus oleum est potentia stupenda ad menses sciendos & fœtum pellendum, ut etiam *borax Veneta*; *aristolochia* est fere specificum.

(*Indicationes curativæ.*) Art. 1399. Indicationes curativæ sunt quæ sequuntur. 1. Ventriculi chylosis imprimis est rectificanda. 2. Sanguinis cruditas volatilibus, salinis, aromatibus, est corrigenda. 3. Humorum visciditas vasa uterina obstruentium iisdem incidenda. 4. Hæ-

pera-

peractis, remediis appropriatis fermentatio menstrua stimulanda est. Menses stimulandi sunt stato fluxionis tempore, si cognosci possit, si non, interrogandæ sunt, an non singularem interdum in corpore percipiant sanguinis motionem, & agitationem, & insolitos dolores lumborum, & pulsationes in locis vicinis, aut febriles effervescentias &c. tunc enim temporis propinanda sunt *stimulantia*: Si vero nulla horum adsunt, movent practici, quod convenientissime dentur specifica tempore novilunii & crescente luna. „ Empiricum est (inquit *Forestus*) „ menses in extenuata provocare. „ *Rosmarinus* aliquid singulare habet in morbis mulierum a mensibus obstructis ortis. Urina nigra in mensibus suppressis est bonum signum.

Farrago sententiarum.

(*Virtutes Mercurii & auri in hoc & aliis morbis domandis.*) Art. 1400. *Mercurius* (inquit *Pitcarnius*) melius cum vi ejusdem generis & majori, fluxum menstruum provocat, quam *mars*. Idem affirmare licet de *auro*, si atteratur (& atteri potest) in partes adeo parvas, ut earum superficies, habita ratione molis tantæ sint, quæ reddant partes illas aquæ levitate pares. Morbi ut lepra, fluor albus, lues venerea, scorbutus, &c. *auro* quam *mercurio* tutius atque citius sanabuntur.

(*Radix hellebori nigri.*) Art. 1401. „ *Radix hellebori nigri* veteribus in frequenti usu *humoribus attenuandis*, & *privatim mensibus* „ *movendis* nuperis annis moderna praxi redintegratur, & non infimum locum inter *emmenagoga* obtinet, præcipue, ubi ob calorem hecticum *chalybeata* porrigere nefas esset. In mensium suppressionibus quandoque etiam locum habent externa remedia, qualia sunt *suffus*, *balnea*, *fomenta* &c. pro certo his plurimum usus est *Hippocrates*. „ (*Medicamenta alia.*) Præter dicta *emmenagoga* *cantharides* cum *camphora* (dos. ana a gr. ij. ad vj.) menses movent; *martiata omnia*, „ *ns veneris*, *extractum ecphracticum*, *tinctura martis*, *enema hystericum*, „ *enema terebinthinatum*, *electuarium martis*, *infusum chalybeatum amatum*, *mistura ecphractica*, *vinum chalybeatum*, &c.

M E N S I U M D I F F I C U L T A S.

Etzmulleri sententia.

(*Mensium difficultas.*) Art. 1402. In quibusdam mulieribus præcipue sedentariis (& quæ nunquam pepererunt) menses cum vehementi dolore & perturbatione fluunt; dolores patiuntur tanquam colici & parurientium similes, aut hystericæ affectu laborantium, &c. & si non nature succurratur, metus est ne omnino supprimantur menses.

(*Curatio.*) Art. 1403. „ Si medicus in ipso paroxysmo & præsentis dolorifica excretionis consulatur, præscribere debet *carminativa* & *stomachica*. Extra paroxysmum eadem exhibenda sunt ac in catameniorum suppressione; in paroxysmo conveniunt *clysteres carminantes* „ *et terebinth.* qui difficiles menses facilius promoveant; laudatur *sperma ceti*. Si dolores sint maxime atroces & symptomata gravissima, laudatur *propinari* debet, sed non sine *menses moventibus consociatum*. Pro *fu* externo *fotus sequens*, ʒj. Fol. *laur.* *artemis.* ana Mij. *puleg.* Mj. *or.* *cham.* *sambuc.* ana p. j. *rad. angel.* *levist.* ana ʒij. *bacc. laur.* ʒj. *unip.* ʒj. concis. & contus. coq. in q. s. vin. Hispan. vase clauso.

(*Menses per loca aliena egredientes.*) Art. 1404. Cum menses per loca aliena effluant (per oculos, aures, nares, gingivas, vias salivæ,

œsophagum , alvum , vesicam , mammas , cutim , vulnera , ulcera &c.) *sabœna* secari debet , aut *cucurbitula* inguinibus , femoribus internis vel furis applicari .

Halmitoni sententia .

(*Remedium ad dolores catameniorum .*) Art. 1403. Fœminæ nonnullæ sub tempus catameniorum corripuntur doloribus ita acerbis , ut illorum , qui parturientes excruciant , pene sint æmuli : ad quos leniendos nihil unquam novi præstantius , quam *oleum amygdalarum dulcium* vel *lini* recentem expressum ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. vel $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$. vel per se vel cum *syr. violar.* sing. noct. per menses aliquot , (hoc remedium expertus laudo , sed in majori quantitate exhiberi debet .)

M E N S I U M F L U X U S N I M I U S .

Ettmulleri sententia .

(*Fluxus mensium nimius .*) Art. 1406. In omnibus nimio mensium fluxu laborantibus ventriculi robur enervatum est , & ut plurimum adest dolor in dorso , & circa lumbos , fœminæ sunt scorbuticæ , tactu molles , & habitu quasi aquoso præditæ . In mulieribus senescentibus nimia menstruatio plerumque incurabilis est .

(*Curatio .*) Art. 1407. In curatione fluxus non est subito nimis frangendus , ne graviora mala inducantur . *Rhabarbarum* præ reliquis purgativis laudatur , quoniam pollet vi astringente ; *venæsectio* culpatur fluxum enim vehementiorem reddit . „ Quotidiana tamen experientia

„ docemur venæsectionem Revulsionis gratia celebratam plurimum

„ prodesse ; secunda est vena in Brachio , & sanguis partitis vicibus

„ mittendus digito per vices foramini imposito : ita enim multas vidimus , quæ detracto sanguine multo convalescerunt , cum nullis aliis

„ remediis posset reprimi fluxus . Conveniunt opiata speciatim *seme-*

„ *hyoscyami* (unde valet *electuarium Boyleanum*) ; item *succus plant-*

„ *aginis* , *urticæ* , *menthæ* , decoctum cort. granatorum visc. quercin. tin-

„ *ctura* & *syr. e coral. saccharum saturni* , &c. cum fructu usurpantur

Ex marte preparata , licet menses stimulant , tamen fluxum nimium

constringunt ; chalybeata enim proprie sunt astringentia . *Mercurius*

„ & *Mars* (inquit *Pitcarnius*) fluxum nimium ventris & menstruum

„ immodicum tollunt , æqualiter tollendo impedimenta aliarum fec-

„ cationum , & sic eas augendo , cum per circularem motum ad or-

„ gane corpus æqualiter ferantur . „ Sicut alias hæmorrhagias , ita in

specie uterinas sistunt *stercora animalium* , imprimis *caninum* , *asina-*

„ *rum* , & *suillum* (hoc ultimo utuntur rustici in mictu sanguineo ju-

„ *mentorum* .) Pulvis sequens vel huic similis in frequenti usu est cum

vino rubro . $\mathfrak{z}\mathfrak{f}$. *Coral. rub. præp. lapid. hæmatit. bol. Armen. ana* $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

borac. calcinat. alum. crud. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. *laudan. opiat. gr. iv. f. pulv. præ-*

chart. vj. fumatur una bis in die . Spongia cum vino rubro & aceto

imprægnata vulvæ applicari potest , vel sperma ipsum ranarum cum

pauco aceto & alumine linteis multiplicatis eodem loco usurpatum

quibusdam laudatur . Si mulier sit *bibacula* , omnia erunt frustra .

Malum hoc frequenter diuturnum est (inquit *Waldschmidius*) & vian-

„ sternit ad hydropem vel atrophiam ; & quæ semel morbo hoc gra-

„ viter laborarunt , plerumque manent valetudinariæ . Conveniunt blan-

„ *diora evacuantia* non fortiora ; *sudorifera* sunt proficua , privati-

„ *rob. sambuci* , *juniperi* , &c. *Viscus quercinus* est expertum remedium

„ *Paracelsi* ad nimium catameniorum fluxum . „

Hamiltoni sententia.

(*Remedium singulare.*) Art. 1408. In nimio mensium profluvio eminet apozema sequens. ℞. Cort. aurant. N. viij. coq. in aq. font. ℞iij. ad ℞ij. colatura edulcoretur cum sacchar. alb. dosi sit coch. x. ter quaterve in die. Hoc medicamentum magno cum successu præscripti, præcipue si nulla pars placentæ post partum vel abortum remanet: (*expertus laudo*) In nimio etiam mensium fluxu pil. cathartic. cum opio exhibere soleo, unde fluxus menstruus & ventriculi morbi diminuti sunt. p. 41.

Alia remedia. Art. 1409. „ Usnea cranii humani ad fluxum sistendum „ a quibusdam multum laudatur; sed præ omnibus quotcunque mistu- „ ra acida (16. 191.) cum vino Florentino copiose sumpta utramque „ adimplet paginam, ut frequentissime expertus sum. Sunt & alia quam- „ plurima remedia, quæ sunt usus eximii in hoc affectu, uti haustus „ japonicus, pulvis hæmoptoicus, tinctura rosarum, forus ad hæmorrhoi- „ dum fluxum immodicum, &c.

F L U O R A L B U S.

Sydenhami sententia.

(*Fluoris albi descriptio.*) Art. 1410. Quod effluit modo album, modo pallidum, modo flavum, viride, aut subnigrum, modo acre & erodens; tetrum quandoque & graveolens; decoloratur facies, dolet spina dorsi, prosternitur appetentia, oculi pedesque intumescunt. „ Animi moeror gravis & diu protractus fluorem album frequenter „ producit teste Sylvio Deleboe: „

(*Methodus medendi.*) Art. 1411. Ut cura recte incipiatur, instituenda est venesectio, & postea catharsis ad tres vices, & deinde curativæ indicationes ad sanguinem invigorandum corroborandumque omnino dirigendæ sunt; itaque ægra aggrediatur usum sequentium remedium; ℞. Theriac. Androm. ℞i℞. conserv. flaved. aurant. ℞j. diascord. ℞℞. zinzib. condit. nuc. moschat. condit. ana ℞iij. pulv. e chel. cancer. comp. ℞i℞. cort. exter. granat. rad. angelic. hispan. coral. rub. præp. trochis. de ter. lemn. ana ℞j. bol. Armen. ℞ij. gum. Arab. ℞℞. cum q. s. syr. e ros. sicc. s. elect. de quo sumat ad magnitudinem nuc. mosch. major ter in die hor. medicis per mensem integrum, superbibatque infus. sequent. coch. vi. ℞℞. Rad. enul. campan. imperator. angelic. calam. arom. ana ℞℞. fol. absynth. roman. marrub. alb. centuar. min. calaminth. vulg. salv. sicc. ana Mj. bacc. junip. ℞j. incidantur minutim, & infund. frigide in vin. Canarin. ℞iv. coletur usus tempore. Vescatur cibus euppestis, & absteineat ab usu olerum & fructuum qualiumcunque, & singulis pastibus bibat vinum Hispanicum. Eadem fere methodo, atque iisdem remediis diabetes sanatur, omittis solummodo venesectione & catharsi.

Fulleri sententia.

(*Differentia.*) Art. 1412. Fluorem album ab ulcere uteri & gonorrhœa scite distinguere operæ pretium est. In fluore albo dantur plerumque lassitudo spontanea & lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus plus minus pituitosus, & mucosus, in mali initio inodorus & mitis; pedetentim vero acrescit, & excoriat.

(*Ab ulcere uteri.*) In ulcere dolor sentitur, & mordicatio in utero, vel ejus cervice, idque a principio, materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta, alba, levis, æquabilis, & sæpe foetida. In gonorrhœa acerrimus torquet urinæ ardor, & stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur.

(*A Gonorrhœa.*) Colluvies depluens est plerumque parcius, quam in fluore albo, crassior tamen multo; alba primum, postea flava, virescens, acris, exedens, sed raro foetida. Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur; & interdum etiâ exulceratum deprehenditur. *Gonorrhœa* (quod habet *Charleton de Catameniiis*, p. 151.) certo potest ab uterino fluore internosci, quod prorumpentibus catameniiis non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis persistat: *uterinus* vero *fluor* cesset in mensium eruptione & aliquanto post tempore.

Ettmulleri sententia.

(*Qualis est morbus & quibus contingit.*) Art. 1413. Fluor albus in initio plerumque est mitis, progressu vero temporis est acris ac mordax, & a colore albo flavescit, vel viridescit, & graveolet; omnibus ætatibus contingit, puellis trium vel septem annorum natis, vetulis, &c. menstruatis & non menstruatis, ante & post mensium periodum, gravidis etiâ, typum aut periodum certam nullam observat, sed nunc copiosius nunc parcius fluit, nunc menses comitatur, nunc iisdem cessantibus aliquamdiu persistat; *circa menstruationis tempus tamen uberius ante & post scaturit*. Nihil aliud est procul dubio quam *gonorrhœa muliebris*, virili non virulentæ analoga ex glandulis prostratis effluens (de sede & ætiologia hujus morbi optime differit Auctor noster.) Quod in naribus coryza, in oculis nimia lacrymatio, in faucibus tussis & screatus, talis est fluor hicce in fœminis.

(*Curatio.*) Art. 1414. In curando hoc affectu exhibendum est vomitorium imprimis, & postea stomachica sunt propinanda, & cruditas cachectica corrigenda per *chalybeatâ & volatilia*, & postremo specificis morbus est profligandus; *purgantia* parcius administranda nisi *rhabarbarum & mercurius dulcis*; *sudorifera & diuretica* præcipue in scorbuticis sunt proficua, maxime decoctum e lignis & *terebinth*. Decoctum e *roremarino* diutius continuatum hunc morbum sanat; decoctum *nucis pineæ cum ligno visci quercini* sæpius haustum, item *lamii flore albo* pæne specifica audiunt; ut & *osteocolla*, (*camphora* teste *Greenfield*). „ Electuarium ex visco arboreo (parum enim discriminis est in qualemunque arborem crescat) cum q. s. albumine ovi & tantil. „ *Syr. de Alth.* larga dosi exhibitum diuque continuatum ex multiplici experientia fluorem album certo certius sanare compertum „ habeo. *Vires mucilaginis baccarum* nondum expertus sum. „

Farrago sententiarum.

(*Differentia inter fluorem Gallicum & non Gallicum.*) Art. 1415. Differentia inter fluorem muliebrem Gallicum & non Gallicum (inquit *Pitcarnius* in MSS.) est quod in Gallico humor sit tenuis & serosus plane; in fluore albo & non Gallico viscidus.

Art. 1416. Fluor albus etiâ si non sit virulentus (secus ac in viris) tolli non potest nisi remediis sui venereæ propriis.

(*Tanquam gonorrhœa curatur.*) De curanda gonorrhœa vide (980.) ex MSS. *Pitcarnii*.

(*Alia remedia.*) Art. 1417. Remedia quoque sequentia quandoque in usu sunt, *electuarium de colophonia*, *elect. styptic.* *emulso styptic.* *haustus contra fluorem*, *haust. japon.* *haust. saturn.* *pil. ad colluviem*, *pil. saturn.*

FUROR UTERINUS.

Sennerti sententia.

(*Furor uterinus est species maniae.*) Art. 1418. Furor uterinus pertinet ad maniam, & peculiaris ejus species est. Foeminæ in insania illa venerem potissimum appetunt; vel ea non satiari possunt. Causa est semen nimis copiosum & præservidum.

(*Curatio.*) Art. 1419. Hic insanus amor curatur, si nimius seminis proventus prohibeatur, aut legitima venere evacuetur, vel medicamentis absumatur.

CONCEPTUS & GRAVIDITAS.

Sennerti sententia.

(*Conceptionis signa.*) Art. 1420. Conceptionis signa præcipua sunt, retentio seminis in utero, suppressio mensium, ciborum fastidium, ventris tumor versus ventriculum acuminatus; motus in utero perceptio, non fluctuantis aquæ, nec flatus vagantis speciem referentis, sed motus lenis, blandus ordinatusque, tandemque mammarum intumescencia papillarumque color in lividum mutatus, & lac in mammis collectum: hæc signa si omnia adfuerint, non amplius foemina dubitet se esse gravidam. Urina est mendax. Vide plura sub titulo Mola (1426. 1429.) „ Gravidam mulierem cognosces (inquit Hippocrates de „ *superf.*) si oculi cavi videantur, & album oculorum nativum non „ habeat albedinem, sed lividum sit; necnon si cibum aversetur, oris „ ventriculi morfu torqueatur, & saliva abundet. Recensita signa „ (ut recte Sponius in locum) sunt æquivoca, tam in gravida quam in „ non gravida reperiri possunt: ex his itaque solis non licet medico graviditatem asserere, sed tantum si cum aliis multis concurrant; cumque „ intricatissima res sit graviditatis cognitio, caveat medicus, ne uno aut „ altero tantum male fretus signo, temere nimis suam de illa proferrat sententiam: debet itaque tota signorum syndrome perpendi. „

Ettmulleri sententia.

(*Alia signa.*) Art. 1421. Nonnullæ mulieres extra gravidationem libidine pruriunt, sed facta conceptione ardor videtur extinctus. Clausura uteri est signum conceptionis; exploranda est obstetricis digito. Signum conceptionis pathognomonicum non datur. Cito post conceptionem mulieres frequenter sentiunt frigus quoddam vel horrorem vel horripilationem quandam circa corporis peripheriam, saltem mulieres dicunt se sentire nescio quid: hinc succedunt symptomata varia circa stomachum ac digestionem, vomitiones, pica, &c. venter sensim attollitur, maxime circa regionem umbilicalem & sursum, imprimis circa lineam albam prominet, regiones laterales quodammodo æquales, & quasi pressæ, quod probe observandum est.

(*Nota bene.*) Art. 1422. „ Foeminæ nonnullæ, paucissimæ licet, „ *fluum regularem menstruorum* per totum gravidationis cursum patiuntur, aliis eisque frequentioribus ad quatuor vel quinque primos a „ conceptione menses minore licet singulis vicibus quantitate solent fluere; donec omnino supprimantur. Ordinario, si catameniorum fluxus „ ultra quartum mensem diutius protrahatur, fœtum imbecillum ac „ valetudinarium reddit, si ultra sextum, mulier abortione periclitatur.

(*Quomodo distinguitur ab hydrope.*) Art. 1423. Gravidatio a tumore hydropico ex signis sequentibus discernitur; color faciei vividus, vivaci-

vacitas & vigor oculorum significant gestationem ; in hydrope vero perit oculorum nitor , &c. In gravidis tumor abdominis sursum vergit , estque inæqualis ; contra in hydrope . Quo se vertunt hydropicæ , eo labitur aqua ; sitis in hydrope est major ; sentitur fluctuatio in hydrope ; ephelides (1150.) in facie apparentes est signum ingravidationis . Gravidis facies (inquit *Barbette*) aut nativa est , aut valde collapsa , morbidis tumida plerumque & decolor.

(*Sterilitas.*) Art. 1424. , Quoad sterilitatem . Adhuc in tenebris „ (inquit *Lister*) sunt generationis utriusque sexus virtutes : uteri , „ qui sani & secundum naturam se habent , prolis quidem concipien- „ dæ potes sunt ; at in quo consistit ista sanitas , quæstio est . Quan- „ do mas (inquit *Ettmullerus*) emittit genituram (debitæ consisten- „ tiæ) largiter ; & quando nullum adest vitium conformationis , mas „ absolvitur , & vitium sterilitatis est in foemina , quæ mille modis „ potest impedi .

M O L A .

Sennerti sententia .

(*Mola quid.*) Art. 1425. Mola est massa informis sine ossibus & visceribus ex imperfecta conceptione loco foetus genita ; aliquando una , nunc plures molæ excluduntur ; nonnunquam solæ , sine foetu , nunc ante , nunc cum , nunc post foetum ; nonnunquam pluribus annis in utero gestantur . (Mola nulli foeminæ accidere potest sine viri consuetudine .)

(*Quomodo distinguitur a vero conceptu.*) Art. 1426. Mola distinguitur a conceptione vera per motum : motus enim molæ est saltem tremulus & palpitans , non vero in omnem situs differentiam , ut in vero foetu accidit ; præterea si foemina de latere in latus convertitur , mola in latus , in quod decumbit , instar lapidis volvitur cum insigni ponderis sensu . Quinetiam foetus verus a mola discernitur a figura ventris , qui cum foetu præcipue versus umbilicum attollitur & acuminatur , & versus latera utrinque molliter coarctatur ; in mola vero in omnem dimensionem æqualiter intumescit . Mammæ quidem in mola intumescunt , sed lac verum in iis non generatur , sed cruda tantum materia a mensium suppressione . Molæ sunt periculosæ , si solæ , sint ; pluribus annis utero hærent , quibusdam etiam consenescent ; interdum vero nullum incommodum præter molestiam & pondus afferunt .

(*Molæ expulsio.*) Art. 1427. Ad deturbandam molam ex utero primo conducit *venæsectio* , deinde fortis *purgatio* , eaque repetenda , & ultimo *mensēs moventia* sunt exhibenda , & etiam quæ foetum mortuum vim habent expellendi , & secundinas retentas movendi ; *pessus* quoque interdum usurpatur ; his incassum tentatis ad *chirurgiam* deveniendum est .

(*Monstra.*) Interdum etiam accidit , ut foeminæ *varia monstra viventia* præter & contra naturam generent , ut passim videre est apud authores practicos .

Ettmulleri sententia .

(*Mola aquosa vesicularis.*) Art. 1428. Ex liquorum & membranularum confusione sub primis gestationis mensibus oritur mola aquosa vesicularis ex pluribus membranaceis particularibus capsulis conflata ; „ nempe ex *hydatidibus* infinitis inter se connexis varia magnitudine , „ & vasculis sanguiferis quamplurimis in immensam molem , tactu „ mollem , & undique defluentem constare solet ; hujusmodi *mola*

„vesicularem ipse vidi ex utero foeminae exclusam cum ingenti fluxu sanguinis; illa vero convaleuit, & alios liberos peperit.

UTERUS INFLATUS.

Ettmulleri sententia.

(*Uterus inflatus.*) Art. 1429. Uterus inflatus intumescit non secus ac in gravidis, & sensim augetur, menses simul supprimuntur, aut parcius fluunt, quin & lac in mammis generatur, unde tales se gravidas esse credunt; in hoc statu manent ultra gestationis tempus ad annum integrum vel diutius, & postmodum vel medicamentis, vel supervenientibus doloribus parturientium, vel interdum sine his excludunt ex utero solummodo aliquos *bombos & flatulentias*, & venter subsidet; unde hic affectus *mola ventosa* appellatur a quibusdam: interdum vero sine manifesta talium flatuum eruptione insensibiliter flatus exhalant, & venter subsidet. Videtur fieri occasione geniturae maris sine conceptione in utero contentae. Tumor non prominet praecise in medio abdominis, sed in omnes dimensiones se expandit, nunc augetur nunc diminuitur; insignis tensio dolorque sentitur, pondus est minus, quam in conceptione legitima.

(*Quomodo flatus discutiendi sunt.*) Art. 1430. Flatus uterum distendentes ejiciendi sunt aperto uteri orificio interno, item remediis internis fortiter *purgantibus & alterantibus* discutiendi sunt.

Sydenhami sententia.

(*Excrecentia carnosa in abdomine.*) Art. 1431. Sunt duae species tumorum abdominis hydropem mentientes foeminis familiares. Prima est *carnium* in partibus intra abdomen excrecentia praeternaturalis, quae ventrem in molem haud minus conspicuam attollit, quam solet inclusa aqua.

(*Flatus.*) Altera species *flatibus* ortum debet, qui non tumorem tantum, sed & alia ingravidationis signa pariunt, & veram conceptionem æmulantur, tandem vero venter, pari quo increverat, gradu, sensim detumescens spem vanam eludit. (1429.)

UTERI HYDROPS.

Boerhaavii sententia.

(*Hydrops uteri.*) Art. 1432. In cavo uterino, clauso accurate ejus ore interno, saepe colligitur tanta aquae copia, ut integrum abdomen mentiatur *ascitem*; morbus est difficulter cognoscendus ob signa fallacia graviditatis. (1423.)

(*Curatio.*) Art. 1433. Curatur laxatione oris uterini per *fomenta*, vapores, *uterina* adhibita, &c.

Ettmulleri sententia.

(*Uteri hydrops.*) Art. 1434. Uteri hydrops est tumor ejus aquosus, qui foeminas decipit, ut se gravidas aestiment; constat ex copiosa limpida aqua, rarius crocea; interdum conjunctus est hic hydrops cum gravidatione vera (quod ipse novi.) Signa sunt fluctuatio, & delapsus a latere ad latus, indolentia tumoris pressi, insignis gravitas in vulvam incumbens, & frequenter labiorum intumescencia oedematosa.

(*Quomodo distinguitur ab ascite.*) Hydrops uteri discernitur ab ascite, si color faciei sit bona, sitis nulla, tumor incipiat a parte inferiore, &c. Hydrope uteri post conceptionem

corruptis foetus intra aliquot menses abortu ejicitur. Observandum quoque est, quod post fluxum aquæ intereant mulieres.

(*Curatio.*) Art. 1435. „ Verus uteri hydrops est morbus rarissimus; „ si cum foetu jungatur parum aut nihil timendum est; nam par- „ tu incipiente *aqua hydropica* ultro effluere solet. „ In genere eadem remedia, quæ alias in *ascite* usurpari solent, hic locum habent, speciatim *elaterium cum mercurio dulci*, ut & *vomitoria* & *clysteres acres*, item *uterum stimulantia* ut *borax*, *crocus*, *extractum sabinae*, *castoreum*, *myrrha*, &c. Iniectiones uterinæ ex decoct. *mezer. thermæ sulphuræ*, &c.

HYDROPS OVARIUM.

Sydenhami sententia.

(*Hydrops ovarii unde oritur.*) Art. 1436. Hydrops ovarii oritur ab obstructione in testiculorum alterutro, quæ sensim ejusdem crasin subvertit, ubi reposita morbi minera, tunica ejusdem mirum in modum distenditur, qua jam tantum non crepante, natura humori excipiendo vesiculas quasdam suggerit, quibus tandem disruptis, & in abdominis cavitatem se exonerantibus, eadem occurrunt symptomata ac in *ascite*.

Boerhaavii sententia.

(*Quibus accidit.*) Art. 1437. Notabilis hydropis species ovaria mulierum sæpe occupat, qui morbus ut plurimum steriles annosæque mulieres obsidet, difficulter cognoscitur, & vix sine inciso cadavere; curatur vero nunquam, sed transit sæpe in *ascitem*.

(*Historia.*) Art. 1438. „ Fœmina innupta viginti quinque circiter „ annos nata ventrem sensim intumescens habuit anni spatio ad „ parturientis magnitudinem. Medicis, quos consuluerunt, graviditatis suspicio incidebat; obstetrices rem ita se habere audacter affirmabant; mulier ipsa insontem accusari constanter instabat. Ego accersitus, certiorque de rerum statu, examine prius instituto, factus, „ illam *hydrope ovarii* laborasse & morbum incurabilem esse pronuncia- „ ciavi. Post septimanas aliquot mortua est; sectoque cadavere in abdomi- „ nis cavo invenimus aquæ coloris citrini sesquicongium; in infimo ventre tumorem caput humanum æquantem ad hypogastrium dextrum aliquanto vergentem; *sinistrum tamen esse ovarium* in adeo ingentem massam turgescens, altero sano, statim agnovimus, in superficie conspiciuntur nonnullæ *hydatides*, una ovum anserinum æquans, reliquæ minores. Tota moles septem pondo pendebat. Tumorem facta incisione plane *strumosum* esse, & de specie *steatomatis* liquido deprehendimus. Uterus erat sanus, & in statu virgineo; glandulæ mesentericæ tumefactæ, tres reliquis insigniores ovum columbinum æquantes, strumosæque erant de genere *Meliceridis*. Jecur & lien parum discolorata, non vero scirrhusa. In thorace aquæ, illi in abdomine analogæ, libræ duæ repertæ sunt, alter pulmonum lobus paulisper absumptus; cor sanum; totum corpus valde emaciatur. In nosocomio D. Thomæ plusquam triginta abhinc annis cadaver fœminæ eodem morbo defunctæ sectione patefactum vidi, unde justam ac legitimam *diagnosin atque prognosin* præcedentis casus proferre mihi contigit. „

Art. 1439. „ In transactionibus Regiæ Societatis Londini N. 381. insigni & singulare exemplum habemus hujus morbi larga sectione curati per D. R. *Houfoun* in fœmina quinquagesimum octavum annum agente. Medici & chirurgi locum videant. „

(*Hydro-*

(*Hydrops in cista inclusus.*) Art. 1440. „ Hujusmodi quoque sunt „ *Hydropisies enkistées gallis* appellati , sive *hyrdopes in cistis inclusi*. In- „ tegrum abdomen quandoque adimplent visceribus coarctatis , & in „ angustias detrusis , sacco ab ovario, vel partibus circa ovarium ori- „ ginem ducente . Admodum curiosa est historia hujus affectus apud „ *Du Verney Memoir. de l' Acad. p. 187. lectu dignissima.* „

A B O R T U S.

Riverii sententia.

(*Abortus signa.*) Art. 1441. Abortus est immaturi foetus exclusio . Signa antecedentia sunt lumborum coxarumque gravitas insolita , & ad motum segnities , appetentia dejecta , rigor aut horror per vices recurrens , capitis dolor , præsertim circa oculorum radices , laterum ventrisque superioris constrictio , mammarum detumescencia & extenuatio .

(*Signa imminentis & instantis abortus.*) Si vero dolores frequentes & fere continui renes & lumbos excrucient , qui versus pubem & os sacrum exporrigantur , cum quodam ex utero egerendi conatu , certum imminentis abortus indicium est ; si autem dolores illos & conatus sanguis purus vel serosus vel aqua ex utero profluens subsequatur , abortum instare , & disrupta vasa & membranas , atque os uteri apertum esse significat . „ In genere quicquid foetui in utero mortem affert , id abortus quoque causa est ; quippe foetus emortuus citra corruptionem in utero diutius retineri nequit , & quanquam insolita quædam dentur exempla foetuum emortuorum in utero diu detentorum , ibique fere consumptorum , hæc admodum rara sunt . *Deventer.*

(*Prognosis.*) „ *Aretæus* testatur se nullas vidisse servatas ex iis , quibus in abortu vel post abortum *convulsiones* supervenerunt . Abortus in primipara periculosior est . „

(*Præcautio.*) Art. 1442. Ad abortum præcavendum maximo in usu sunt *radices tormentil. massiches* , & *grana kermes* . Circa *emplastra* hoc animadvertendum est , ea non diu esse gestanda , sed per intervalla removenda ; alioqui diutius lumbis affixa renes adeo calefaciunt , ut miseræ mulieres aliquando urinæ ardore afficiantur , vel arenulas aut sanguinem mingant .

(*Venesectione aliquoties repetita.*) Art. 1443. Mulier quædam , quæ tres abortus consequentes passa erat , a duobus mensibus gravida patiebatur dolores circa umbilicum & lumbos , qui abortum minabantur , *venesectionem* imperavi , statim liberata est ; sed eadem *symptomata* accesserunt eo prorsus tempore , quo menstruas purgationes pati consueverat extra graviditatem , ideoque iterata fuit *venesectione* mense 3. 4. 5. 6. 7. & 8. recurrentibus doloribus ; & tandem mense 9. peperit filium , &c.

Ettmulleri sententia.

(*Effluxus aquarum immaturus.*) Art. 1444. Interdum per aliquot septimanas aut per mensem fit aquarum ex utero effluxus immaturus , quod periculosum est ; metus enim est , ne foetus moriatur ; hoc vero aliquando evenit citra ullam noxam .

(*Ad præcavendum abortum.*) Art. 1445. Ad abortum præcavendum commendatur *decoctum verben.* item *grana kermes* ; ex regno animali *canceri fluviatiles* , *tinctura coral.* *succus cydon.* *citri* , *pulvis pelliculi ex ventriculo gallinarum exsicc.* Externe *panis tostus vino generoso madefactus* , & aromatibus conspersus abdomini & lumbis applicatus . Abortus a serosa *cachexia* metuendus *decocto ligni guaiaci* optime præcavetur .

(*Vomitus in gravidis.*) Art. 1446. Vomitus in gravidis, si diutius continuatur circa medium gestationis tempus, potius *phlebotomia*, quam aliis remediis compescendus est: ultimis mensibus est admodum periculosus, tunc blande *laxantia* sunt exhibenda, & appropriata *stomachica*: externe *emplastr. stomachicum magistral.* Vomitus in gravidis, (inquit *Hamilton*) quæ sitim excitat, & linguam aridam reddit; *leni catharsi* (viz. cum pil. tartar. *Quercetan.* ʒʒ. vel ʒij.) felicissime sanatur; propinari etiam debet *oleum amygdalarum dulcium.* p. 13. & 48.

Farrago sententiarum.

(*Prognosis.*) Art. 1447. „ Quæ abortum consequuntur symptomata, enixarum communia sunt; periculosior tamen est abortus quam partus maturus; periculosior quoque est 6. 7. & 8. mense.

(*Remedium singulare.*) Art. 1448. Sequens est medicamentum *Solenandri*, ʒʒ. *Mastich. thur. alb. ana* ʒʒ. *myrtil. bol. Armen. orient. lacrym. sang. dracon. ana* ʒʒ. m. f. pulv. ʒʒ. *Hujus pulv.* ʒj. infarcitur *dactylus*, ejecto nucleo ligno, involvatur charta, madescat deinde vino clareto, & calefiat sub cineribus, deinde edatur. Hoc remedium in fluxu nimio mensium, & etiam in foetu retinendo efficax esse experientia didici (inquit author) primum *Bononiæ* a præceptoribus edoctus.

(*Alia remedia.*) Art. 1449. *Oleum sem. lini* contra abortum est singulare experimentum auctore D. *Hamilton.* p. 42. In usu quandoque sunt *emplastr. smectic. tabulæ embryonum* (instar omnium) *fotus astringens*, *fotus stomachic. electuarium* contra abortum, *mistura consolans*, *mistura acida*, *tinctura rosarum*, &c.

PARTUS DIFFICILIS.

(*Termini partus.*) Art. 1450. Experientia constat (inquit *La Motte*) mulieres alias aliis diutius foetum in utero gestare. Usitatissimus partus terminus ad finem noni mensis accidere solet; nonnullæ vero mense 7. 8. 10. 11. immo, addit author, non ante integrum annum pariunt. „ Ex observatione liquet infantes 8. mense natos frequentius mori, quam qui 7. nascuntur, quod valde obscurum est.

Ettmulleri sententia.

(*Dolores parturientium legitimi.*) Art. 1451. Dolores parturientium legitimi & optimi sunt, qui continuo ex lumbis incipientes secundum abdomen deorsum protenduntur ad regionem pubis usque; hinc clunes & coxas occupant, & ita tremorem genuum inferunt, qui *spasmodum* est effectus. „ Si quando dolores ad pedes & brachia tendunt, male ominantur. Ex observatione constat quod foeminae, quæ partum primum facile absolvunt, de partu in partum difficilius habent, & sæpe vel in partu vel in puerperio moriuntur, quo vero laboriosius pariunt primiparæ, eo melius habent de partu in partum. „

(*Dolores nothi.*) Art. 1451. Dolores nothi, qui foeminis aliquando accidunt sunt plerumque *colici*, *iliaci*, aut *hysterici*; at a veris parturientium distingui possunt; quandoque vero cum veris conjuncti sunt.

(*De disruptione membranarum.*) Art. 1453. Non semper consultum est membranas discindere, & non faciendum, nisi indicia imminentis partus sufficientia adsint, & foetus legitimum habeat situm.

(*Partus difficilis causa.*) Art. 1454. Tres sunt circumstantiæ præ reliquis, quæ partum difficilem & periculosum reddunt; foetus mortuus, hæmorrhagia partum præcedens, aut convulsiones. Funiculus umbilicalis foetus

foetus frontem communiter cingit; quando vero aliquot gyris circa collum aliamve partem circumvolvatur, casus est periculosus.

(*Situs vitiosus.*) Art. 1455. Situs foetus vitiosus est maxime periculosus, quando pedibus primo prodit infans, ita ut etiam manus deorsum inclinent: Nam sic fit, ut egresso corpore orificium uteri internum circa collum se stringat, ita ut caput adhuc in utero hæreat (tales foetus dicuntur *Agrippæ*; ubi non potest emendari talis positura, obstetrix saltem alterutrum brachium eo dirigat, ut sursum versus ad caput vergat, &c.

(*Enema quandoque injiciendum.*) Art. 1456. Alvo existente clausa, vel intestinis statu turgidis enema carminativo-emolliens ad facilitandum partum optime conducit, imo in ipso partu.

„ De agendis instante partu; & de officio obstetricis ex sequentibus „ colligere licet.

Stricture quaedam breves perfectam obstetricandi artis ideam complementes, maxime ex Deventerio depromptæ, qui ultra omnes hanc chirurgiæ partem luculentissime tractavit, partus difficilis causas clarissime demonstravit, & modum partus incommoda arte removendi significanter indicavit.

(*Pelvis cognitio necessaria.*) Art. 1457. Cognitio ossium pelvem constituentium, ejusdemque pelvis figuræ obstetricibus imprimis utilis est, immo necessaria; aliter enim cæcutientes, temere, & inconsulto auxiliatrices acturæ sunt; atque ut *distinctam pelvis ideam* concipiant, *Sceleton* iterum iterumque conspiciere debent; ubi observare licet in sceleton muliebri partes infimas ossium sedentariorum magis plerumque distare, neque adeo deorsum versus ossis coccygis acumen inflecti, quam in masculo sceleton, id quod sapientissimus atque benignissimus Creator ita constituit, ratumque habuit ad evitacionem plurimum adhuc partuum difficultium, qui tamen satis frequentes sunt.

(*Figura & capacitas varia.*) Art. 1458. Capacitas & figura pelvis in mulieribus varia est. Magni interest qualis sit pelvis forma sive conformatio in gravidis æque ac in parturientibus; linea recta est norma sui & obliquæ; ita pelvem bene formatam qui cognoverit, pravam dispositionem facile deprehendet. Pelvis in quibusdam est *nimis angusta*, in aliis *nimis ampla*, & patentior quam par est, in quibusdam denique non satis distantia intercedit inter ossa pubis & os sacrum, ejusdemque appendicem os coccygis, hujusmodi *pelvis plana* dicitur. Omnes hæ pelvis pravae formæ diversa incommoda afferunt in praxi occurrentia.

(*Situs oris uteri.*) Art. 1459. Obstetrices inexpertæ tangentes faminam digitos in vaginam recta protendunt secundum longitudinem foeminæ, & hoc pacto offendunt ossis sacri curvamen, unde digitis resiliens ore uteri non invento confunduntur; sed ex constructione pelvis luculenter patet (quod probe animadvertendum est) *cavitatem ejus longitudine sua non secundum longitudinem spinæ dorsi tendere, sed ab imo oblique anticam versus ascendendo progredi, quasi per eam umbilicum ventris attingere velis*, quare quærentes os uteri non recta versus curvatum os sacrum digitos intendere debent, sed ab imo sursum tendere, quasi per muliebria *umbilicum* attingere velint.

(*Quomodo se habet ante & in partu.*) Art. 1460. Uterus & vagina sibi invicem coadunata sunt, uterusque qua in acutum terminat parte, prope ipsius os, in vaginam intrusus est, vel acuminatus prominet; ita ut in foeminis non imprægnatis, immo & prioribus graviditatis mensibus, *tactu percipiatur acuminatus*: at in partu os pariter cum utero

axatum adeo & extensum est, ut vagina cum utero videatur *unicum quasi utrem* constituere, orisque uteri & vaginæ differentia sentiatnr nulla, nisi quod vagina tenuior molliorque: Os vero uteri callosius sit, nec tum *acuminatum* quid tactu percipiatur. Ex hac rerum mutatione, si opus fuerit, optime conjecturare licet *propinquitatem & longinquitatem temporis pariendi*; certum autem tempus inde infallibiliter præfiri non potest.

(*Uteri positura variæ.*) Art. 1461. Certissimum est veras difficillimorum partuum causas non adeo dependere a *pravis posituris* infantum in utero quam a *perverso ipsius uteri situ*. Quo majorem gravidæ foetum gestant, eo altius uterus in ventrem assurgit, cum enim cavitas pelvis non sufficiat ad capiendum prægrandem uterum, uno vel pluribus infantibus ex omni parte absolutis una cum secundinis & humoribus repletum, exinde necessario sequitur, ultra oram pelvis in cavitatem ventris, uterum ascendere; atque tum posituram naturalem aut retinet, aut non; si retineat, vocatur *uterus rectus & bene situs*, atque tunc acuminata ejus pars recta tendit in *cavitatem pelvis*, fundus vero circa *umbilicum* versatur. Positura autem mutata, huc vel illuc aliquantulum inclinatus *uterus obliquus vel prave situs* appellatur, quorum insigniores sunt quatuor; *Primus*, quando os uteri nimis suspensum ab antica parte ad ossa pubis adigitur, & infans capite in ossa pubis facile impingens hæret immobilis, aut quod deterius est, capite super ista ossa transfertur. *Secundus* pravus uteri situs est, quando in ventrosis mulieribus uterus pronus propendet, ore ad os sacrum converso. *Tertius*, quando fundus uteri in latere sinistro paulo altius vel demissius ponitur, ore ad spinam dextri ossis ilii vel pubis converso; huic contrarius est *quartus & ultimus*. Ex his & hujusmodi obliquis uteri posituris oriuntur partus difficiles, unde matris vel infantuli vel utriusque interitus sequitur, nisi solertis obstetricantis opera servantur.

(*Uteri descensus ante puerperium.*) Art. 1462. Aliquot diebus ante puerperium Prægnantis venter aliquantulum extenuatur, quod tunc temporis bene situs infans in cavitatem pelvis *prono capite delabitur*, quod felicitis partus est præsagium: Infans enim prave situs vel uterus obliquatus in cavitatem pelvis haud ita prompte illabitur. Sed isthæc descensio plerumque gravidis *aliquid incommodi* affert sive eundo, sive mingendo, sive dejiciendo, sive hæmorrhoides producendo, &c. scilicet a pressione capitis infantis, immo interdum muliebria intumescere facit. Hæc incommoda non facile nisi post partum evanescent.

(*Signa instantis partus.*) Art. 1463. Tandem tempore partus jamjam imminente dolores lumborum ac inguinum cum *vi deprimente* per vias ingruentes sentiuntur, & humor aliqualis glutinosus profluit; qui, cum rubescere incipiat, certissimum partus indicium est. Callida obstetrix genuinos dolores a spuris *tactu facile dignoscet*; hi enim os uteri arctius costringunt, genuini vero illud dilatant. Adest insuper sanguinis vehemens commotio, faciei rubor, concussio & tremor totius corporis, maxime genuum, aliis concitatur vomitus, &c.

(*Partus naturalis.*) Art. 1464. Partus naturalis (ubi scilicet recta datur uteri ac infantis positura) est, qui *sola naturæ vi* sine arte vel alieno auxilio perficitur, obstetrice haud indigens, nisi ut infantulum excipiat, & funem umbilicalem abscindat &c.

(*In difficili partu quomodo parturiens adjuvanda est.*) In quibusdam vero maxime in mulieribus annosis res non adeo facile expeditur. Ideoque instante partu, obstetrix, ut laboranti opem quam maximam ferat,

rat, altera manu in vaginam immissa & dorso conversa, digitorum apices quousque potest, subter caput infantis insinuet, caute tamen, manum ibi tenens immotam, donec dolor irruat: alteram manum extrinsecus abdomini imponat, super fundum uteri; deinde doloribus irruentibus ipsa simul incipiat utraque manu cooperari; manu scilicet intra corpus deprimat contra ossis sacri acumen, quod retrorsum pre-nendum est; altera manu extrinsecus uterum deorsum leniter premat. V. B. Maxima apertio & amplificatio pelvis, qua pateat foetui via, retrocessu ossis sacri vel totali vel quoad acumen ejus sive ossis coccygis expectanda est. In ipso parturiendi articulo, præcipue pelvi plana existente, optimum ad partum facilitandum adjumentum datur osse coccygis fortissime detrudendo, idemque singulis dolorum paroxysmis irruentibus repetendo.

(*Dolores naturales & genuini.*) Art. 1465. Ad partum felicem facilemque requiruntur dolores naturales, suo tempore & modo, *instar nimbi irruentes*, quibus ventris & intestinorum muscoli adstricti tantam depressionem impetumque in uterum faciunt, quasi a corpore expellendus esset; atque horum dolorum impulsu aperitur uterus, foetusque in ostium expellitur & mulier partum edit.

(*Dolores tergiversantes.*) Hi vero dolores quandoque *pravi vel irriti* sunt, quos vocant aut vocare possunt *feroces aut tergiversantes dolores*, quodammodo irruentes quidem, sed non penetrantes, neque veram depressionem facientes, sed tandem re infecta cessant, ac in cruciatum aut spasmodicum laborandique impotentiam mutantur. In hujusmodi tergiversantibus doloribus medicamentis propellentibus non est utendum, quia inde cruciatus ingravescent; sed contra lenientibus & anodynis.

(*Parturiens tactu exploranda.*) Art. 1466. Obstetrix parturienti adlocata, habito brevi examine, illam sine mora *tactu explorare* debet; scitus autem fit duobus prioribus digitis ut eo melius singula sensu distinguantur. Ex quo cognitionem *situs uteri* assequetur: certior facta erit, an os uteri situm sit *super mediam pelvim*, an in *antica ad pubem*, an in *postica ad os sacrum*, an in *dextero*, an in *sinistro* latere, an os uteri *apertum sit*, & *quam late pateat*, & *quid in eo præseminetur*, caputne an aliud membrum, seu aque protuberantes. Si os uteri sit in media pelvi & vertex infantis in ostio oris uteri, tunc nullo negotio opus est, & solum expectandum, dum natura parturientem dolorum impetu ad laborandum concitet.

(*Indicia partus difficilis.*) Art. 1467. Sin vero, ore uteri in pelvim introfecto, obstetrix tactu nec caput, nec nates possit sentire, nihil in ostio se exhibente præter aquas quæ coeperunt exuberare, ista *partus difficilis* indicia sunt, & obstetrici incumbit non otiosam esse, & nisi sperabilis sit *ad peritum chirurgum obstetricantem confugiendum* est; in-teritus enim transversus prodit, quare mox post *aquarum effluvium* caput in ostium producendum est, aut infans pedibus extrahendus.

(*Prava infantis versio.*) Art. 1468. Si loco capitis altera solum manus, pes, genu, cubitus, vena umbilicalis, aut manus una cum pede prædeant, idem periculum imminet. Si podex prævius exhibeatur, tunc minus periculi, siquidem infans cum valentioribus doloribus complicatus excludi potest, at vero si obstetrix egregie callet ar-tem, *sub aquarum effluvium* infantis situm facile mutare potest, pedemque in ostium producere, unde facilior adhuc enixus. Si pes unus prædeat, alter adjungendus est, aliter metus est, ne *coxa luxetur*.

(*Positura uteri tactu exploranda.*) Art. 1469. Si obstetricis tactu depre-

hendatur, quod os uteri super mediam pelvim non situm sit, sed antica in osse pubis, aut in postica ad os sacrum, aut in latere ad os coxendicis nimis conversum sit; grave periculum imminet, præcipue quanto magis uterus a recta positura declinat: tunc a natura enix non sperandus est; cunctatio nihil commodi sed multum mali inferre potest; ideoque maturato opus est; istiusmodi enim uteri positum mortem asserre solent infanti, & parturienti etiam, si soli naturæ negotii committatur, aut non nisi vulgares suppetiæ ferantur. Partu experto chirurgo excludendus est, periculum subinde ingravescit, opus fit difficilior, cruciatus parturientis aggravantur, viresque ad ferendos dolores deficiunt; cunctando remisque velisque plenissimis discrimen fertur parturiens, sed maturata partu exclusione periculum subterfugit.

(*Difficultas ex mala uteri positura, & pravo infantis situ.*) Art. 1470. Licet uteri positura sit percommoda, si foetus in illo prave sese verset, difficilem partum sequi necesse est: & vice versa utut infans recte a exclusionem situs sit, uteri tamen perversa positura partum dabit difficilem, major difficultas parienti e prava hac uteri positura resultat quam a pravo infantis situ, sed maxima omnium adhuc & fere insuperabilis difficultas ex ambobus simul conjunctis exoritur.

(*Nota bene.*) Art. 1471. Utero denique seu recte seu plus minus oblique posito, si aquis effusis, membrum aliquod (sive manus sive pes, &c.) exclusum sit, id indicat partum confestim ac sine mora excludendum esse.

(*Vis Uteri contractiva.*) Art. 1472. Mirabilis est vis uteri contractiva instante partu, cum aquæ effluxerunt, illico uterus decrescit, & stricte adeo coangustatur, ut infantem compressæ concludat: quare mox post defluvium aquarum infantem excludi necessum est, vel partus difficilis expectandus est. Si foetum exclusum non statim secundina extrahitur, fundo adhuc adhærens, uterus mox contrahitur; & nisi quæ sanguinis concreti remanserit, post aliquot horulas non nisi multo labore potest recludi ad secundinam extrahendam. Partu jam edito, secundina exclusa, si manus aliquandiu in utero retineatur (quod obstetricantium est officium) sentiet uterum circa manum contrahi & recludi, quod semper evenit nisi corpus quoddam heterogeneum contractioni obstat.

(*Quid faciendum sit partu excluso.*) Art. 1473. Quocirca protinus a exclusionem infantis manus utero immittenda est extrahendæ secundinæ causa; quoniam, si hoc sit sine mora, sine ullo puerperæ dolore vel incommodo fieri potest ore uteri adhuc patente; hoc modo puerperium tutissime ac certissime penitus absolvitur; ex hoc enim optimo scrutinio obstetrix certior facta est, non solum an secundina libera vel cohæreat. & num unus adhuc vel plures infantes adhuc vivi vel mortui restent, vel si quid alienum excludendum sit, sed etiam num fruscula quædam secundinæ, aut membranarum residua sint in utero aut sanguinis grumi, &c.

(*Procidencia uteri præcavenda est.*) Art. 1474. In pelvi ampliore periculum est; ne inter parturiendum uterus ipse vel vagina ligamentum nimium laxatis una cum foetu prolabatur: ad hoc grave malum præcavendum obstetricis est diligenter operam navare manibus suis uteri fortiter sustinendo.

(*Effluxis aquis urgendus est partus.*) Art. 1475. Si funiculus umbilicalis solus, vel cum manu, cubito, humero vel genu prodeat obstetrici a cura-

curate observandum est *momentum effluvi humorum*, ut immediate nas-
nu immissa in situm infantis inquirat, secum dijudicans, an consultius sit
caput in osium dirigere, aut infantem pedibus extrahere; & quod tutius
censet & commodius, efficiendum: præstat enim infantem sine mora
pedibus extrahere, quam capiti in osium dirigendo diutius immorari;
& nihilominus vel tandem ad pedes quærendos necessitate adigi.

(*In omni fere difficultate tutior methodus est infantem pedibus extrahere.*)

Art. 1476. In genere in qualicumque uteri obliqua positura, vel infan-
tis prava versione methodus tutissima, promptissima; minusque dolo-
rica partum accelerandi, est *infantem pedibus extrahere*, idque in prin-
cipio laborum, mox post effluviū aquarum, quamprimum constat
parturientem genuinis parientium doloribus laborare; hoc pacto plu-
res mulieres ac infantes aliter perituri servarentur.

(*Clysterum usus.*) Art. 1477. Parturientibus solemne est vel *clysterem*
emollientem adhibere ad intestina crassioribus excrementis exonera-
da, & meatus laxiores reddendos, vel nonnunquam *stimulantem*, ut
pigri dolores excitentur. Insuper nonnulli chirurgi obstetricantes ma-
xime commendant *syphonem*, quo inter labores oleum in internos
corporis meatus quaquaversum injiciatur, sed hoc tanquam necessa-
rium non est judicandum.

(*Instrumenta.*) Art. 1478. Instrumenta ad partum educendum quod
attinet, rarissime dicam, immo ne unquam quidem usui esse possunt,
præterquam infantibus incuria neglectis, vel monstris excludendis.

(*Infans in utero mortuus.*) Art. 1479. Pro certo cognosci vix potest
vivine an emortui sint infantes in utero: ex tactu maxime signum
omnium certissimum obtinetur, viz. *cuticulæ capitis supremæ dissolu-
tio*, quæ non nisi post obitum infantis contingit.

(*Instantibus magnis hæmorrhagiis fœtus exclusio arte præstanda est.*)

Art. 1480. Prægnantes quandoque ex vehementi animi affectu, casu,
collisione vel nimia extensione hæmorrhagia facile corripuntur, quæ
profluvia immodica & continua ex avulsione secundinæ oriuntur, nec
fieri possunt, adeo ut sanguis conglobatim distillans deliquia tandem
inferat, & nisi fœtus excludatur, convulsiones sequuntur, & mors;
quocirca in hoc casu extrema non expectanda, sed in tempore fœtus
extrahendus est.

(*Fœtus mortuus.*) Art. 1481. Inter signa fœtus mortuus in utero ab
auctoribus recensita certissimum (inquit *Baglivius*) & fere infalli-
bile est *Tenesmus*, sive crebra voluntas fæces dejiciendi mulieri su-
perveniens.

(*Aneurisma internum.*) Puerperæ sæpius inopinato moriuntur, (in-
quit *Waldschmidius*) quatenus ob nimium parturiendi conatum
aneurisma internum rumpitur, & sanguis in cavitatem nobiliorem
effunditur, cujus causam sæpe non cognoscunt adstantes & medici,
nisi post mortem aperto cadavere.

(*Remedia pellentia.*) Art. 1482. Non conveniunt remedia *pellentia*
si in partu naturali, in præternaturali ab iisdem abstinendum. Præter
remedia usitata ad partum facilitandum, & fœtum pellendum commen-
datur decoctum *stercoris equini*, item *aurum fulminans*, tanquam singu-
lare & ultimum remedium; *pulvis testiculorum equin.* a practicis laudatur.
ernutatoria aliquando fœtus exclusionem adjuvant. In casu desperato,
tu mortuo, vomitoria fortiora sunt exhibenda, privatim *mercurius tri-*
ad expellendum fœtum. Quidam exhibent *ol. succin. a gr. xii. ad*
x. usurpantur etiam quandoque *balnea emollientia & laxantia*.

mistura hysterica spiritiuosa, trochisci hysterici, trochisci de myrrha, &

SECUNDINA RETENTA.

Waldschmidii sententia.

(*Secundina retenta.*) Art. 1483. Obstetrices & adstantes sæpius nimis indulgent parturientibus, easque post enixum partum e fella dimittunt, utut *secundinae* nondum extractæ sint; verum in eo errant gravissime, quandoquidem parturiens nunquam dimitti, vel in lectum deduci debet, nisi prius secundinas reddiderit. Hæ autem tutius ac commodius manu perita ab utero divelluntur, & extrahuntur, ubi funiculus umbilicalis, qui indicis loco est, recens adhuc est: Quod si officium uteri jam clausum sit, debet apice unius digiti iterum aperiri & digitis prudenter circumduci, donec & alter inferi potest: Jam digitos ad fundum uteri usque exporrigere possis, quærendus est locus, ubi secundinae utero adhærent, & digito inter uterum & placenta inserto caute hæc divellenda: cavendum vero ne forte ipsum apprehendas uterum, quem facile dignoscēs, cum placenta ob vasorum congeriem admodum inæqualis & durioris sit superficiei.

(*Symptomata secundinae retentæ.*) „ Secundina retenta brevi post partum trescit, hinc febris & dolor ventris insignis & tormina infra umbilicum cum circa uteri regionem superveniunt; sin. frustulatum prodeat aliquando crudelem hæmorrhagiam excitat, adest difficultas anhelitus, halitus foetens intolerabilis, lipothymia, & tandem convulsiones. Quæ per genitalia excernuntur, post aliquot dies sunt sanguinolenta, & horrende foetida, unde etiã lochia foetorem cadaverosum referentia partem secundinarum in utero relictam indicant, quæ successive sub putrilaginis forma ex utero effluit.

(*Remedia pellentia.*) Art. 1484. „ Remedia secundinas pellentia eadem fere sunt ac ea, quæ in partu difficili & foetum mortuo usurpantur, solent, speciatim *pulvis secundinae humanæ præparatus* item *pulvis sabinae cum croco*. Et ut & *oleum succin. borax, castoreum*, &c. &c. Et poriston vulgare pro usu externo est cataplasma ex *sem. lini in oleo lini coct.* De injectionibus & pessis vide locum p. 1128.

L O C H I A .

Ettmulleri sententia.

(*Lochiorum fluxus ratio.*) Art. 1485. Post partum uterus denuo fibrarum suarum beneficio se contrahit, sicque spongiæ instar compressæ liquorem contentos exprimit, unde purgamenta seu lochia succedunt. Effluit primo sanguis fere purus, hinc dilutior, & postremo materia mucosa alba: quantitas & tempus durationis hujus purgationis varium est nonnullæ ad dies quindecim purgantur, aliæ ad octo solummodo.

(*Sudor.*) Art. 1486. Sudor puerperis est promiscuus usque ad diem septimum vel nonum; & si hoc eveniat, incolumes fiunt, aliter vi sine febre aut aliis gravioribus symptomatibus puerperium transigunt sed cavendum est, ne nimius sudor lochiorum fluxum sistat.

(*Cautela.*) Art. 1487. Cautus sit medicus, ne turbet motum naturæ, cum lochia per aliena loca excernantur; sit enim aliquando cum euphoria. „

(*De lochiorum suppressione.*) „ Si quando cum lochiorum suppressione ne sanguinis perturbatio insignis cum vomitu, siti, & vigiliis adfuerit, sæpe *laudanum croco* admistum cum felici successu exhibitum novum (inquit *Willisius*.) Dolentibus mammas post partum lactis causa, lochia

chia supprimuntur frequentissime : remittente mammarum dolore
lochiae libertati restituantur, ut recte observavit Baglivius.

(*Remedia ad fluxum promovendum.*) Art. 1488. Ad lochiorum fluxum promovendum conducunt sequentia, ex myrrha preparata, crocus, borax, castoreum, radix zedoariae, antimonium diaphoreticum, spermaceti, ad sanguinem fluidum reddendum in symptomatibus gravioribus laudatum, emmenagoga omnia, aristolochia fere praeter ceteris foetum mortuum, secundinas, & lochia, potenter movet.

(*In fluxu nimio.*) Art. 1489. Ad fluxum lochiorum nimium conducunt cydoniata, tinctura & syrupus e coralliis, lapis haematitis, crocus martis astringens, blanda acida, trochisci de carrabe, Alumen ad ℥j. in conserv. ros. rub.

DOLORES POST PARTUM.

Ettmulleri sententia.

(*Remedia ad dolores post partum.*) Art. 1490. Dolores post partum sunt quasi tenesmus uterinus, & cum vehementiores sint, fluxum lochiorum impedire solent. Herb. chærefol. & spermaceti a practicis valde laudantur, & praecipue oleum amygdalarum dulc. item decoctum flor. channem. antihysterica & nervina (anodyna cum cautela adjunctis antihystericis & croco), Tinctura succini cum aq. cinnamon. extracta & cum exigua cinnamon. quantitate temperata est specificum (inquit Baglivius) egregius etiam est bolus ad casum. Cepæ cum vino coctæ, & postea cum oleo in sartagine frixæ, contusæ, & supra ventrem calide more cataplasmatitis applicatæ statim dolorem sedant (inquit Bayrius.)

DE ACCIDENTIBUS QUIBUSDAM ALIIS, QUIBUS ALIQUANDO OBNOXIAE SUNT GRAVIDÆ & PARTURIENTES.

Ettmulleri sententia.

(*Tumores oedematosi.*) Art. 1491. Gravidæ aliquando circa labia pudendorum oedematose intumescunt; in tali casu fœtus discutiens ex calce viva est egregius, teste Lysero. Item convenit fœtus ex decoct. fol. cham. & sambuc. in vino & aq. (vel potius in vino & lixivio ten. coct.) item flor. melilot. & sem. fœnugr.

(*Alia accidentia.*) Art. 1492. In pudendorum excoriatione vel ruptione prodest oleum hyperici & rosar. cum ovis contus. In fissuris decoctum raparum aut linimentum sequens, ℥℥. cer. alb. ℥℥. ol. amygd. dulc. ℥j. balsam. Peruv. ℥iv. M. De ruptura Perinæ & curatione per futuram vide locum p. 1140.

(*Ruptura Perinæ.*) Ruptura Perinæ est malum miserabile & valde molestum, & si non tempestive curatur, admodum indecorum futurum: ideoque obstetricis est officium (quandocunque istud infortunium acciderit) rem non celare, (uti pessimus mos obtinuit) sed statim auxilium periti chirurgi advocare, ut partes disruptæ sutura, ut artis est, jungantur.

(*De lacte fugando & mammarum affectibus.*) Art. 1493. Ad lac fugandum applicetur mammis emplastrum de cicuta, lac imminuet, & indurationem prohibebit, item diachyl. simpl. & emulsio lactis in ferrum candens. Solemne est etiam mulierculis lintea duplicata spiritu vi-

, *ni intincta* auxillis supponere in eundem usum., In genere in omnibus mammarum affectibus mammilla affecta raro ad sanitatem perducitur, nisi altera sana lacte exsiccetur. Inflammationes mammarum rarissime discutiuntur; aqua *calcis vivæ* si quæ alia) forsan cum *sae armoniaco*) inflammationem resolvit, & discutit; prodest etiam *cataplasma ex farinis*, *emplast. e spermate ceti*, *de cicuta*, &c. De tumore duro indolente scirrhuso periculum est, ne in cancrum degeneret, *discutientibus* & *penetrantibus* tractandus est, ut *empl. de ranis cum mercurio*, *de cicuta cum ammoniaco*, &c.

FEBRIS LACTEA.

Ettmulleri sententia.

(*Febris lactea facillime curatur.*) Art. 1494. Circa tertium vel quartum a partu diem supervenire solet febris, quam vocant *lacteam*. biddum vel triduum durans, dum lac perfectum in mammis generetur, circa septimum aut nonum a partu diem sudore blando terminatur, & raro sub praxin medicam cadit. *Pulveres testacei*, & *blanda diaphoretica* indicationi satisfaciunt, promovendus est quoque *lochiorum fluxus*, eodem tempore, si non sufficienter fluant.

(*Febres malignæ puerperarum.*) Art. 1495. In omnibus febribus acutis & malignis puerperarum respiciendum est ad *lochiorum fluxum*, & ad symptomata in primis viis. Admodum periculosa sunt hæ febres, nisi statim in principio diarrhoea, lochiorum fluxu, aut simili evacuatione solvantur. In specie tinnitus aurium & gravitas capitis tertio aut quarto die supervenientes generis nervosi symptomata graviora innuunt; quibus si accedant summa præcordiorum anxietas, respiratio difficilis cum pulsu debili & inæquali, res desperata est.

(*Curatio.*) Art. 1496. In his febribus summa habenda est ratio lochiorum; nam si suppressa fuerint, fluxus eorum est provocandus; si vero non amplius fluant, & antea rite fluxerint, febres hæ, *ut aliæ*, curandæ sunt. Puerperarum febres sunt plerumque *malignæ*; in quibus *sal. volat. C. C. succin. cinnabaris antimonii, antihæticum Poterii, tinctura coral.* &c. sunt valde proficua.

FEBRIS MILIARIS.

Hamiltoni sententia.

(*Ratio nominis, & accurata morbi descriptio.*) Art. 1497. Febris *miliaris* a pustulis five vesiculis feminis milii speciem referentibus nomen accepit; febris *vesicularis* etiam appellari licet. Vesiculæ primo sunt plenæ sero limbo deinceps subflavo, perlarum colore non absimili. Hæc febris est specie duplex, viz. *simplex*, quoties hæ pustulæ erumpunt solæ; *composita*, cum pustulæ papillares rubræ miliaribus sunt interspersæ, quæ ubi solitariae sunt, vuleo appellantur a *Rasb.*

(*Historia.*) Hanc febrem sæpe comitantur dolores colici, nephritici, pleuritici, rheumatismatici, vel parturientis amuli; nec non oppressio pectoris cum depressione spirituum, vigiliæ, & spirituum commotio a *Hurry in the Head* vulgo dicta, quoties aëræ ad somnum se componunt, pulsus frequens & debilis, &c. Hæ pustulæ plerumque in pectore, collo & digitorum interstitiis, interdum etiam in toto corpore sunt conspicuæ. Difficillimum est eruptionis diem assignare; quantum autem assequi possum, eas opinor decimo aut undecimo die a principio

plerumque pullulare; si modo febris habet progressum regularem; & circa decimum octavum, vel, ubi materia morbifica abundat, circa vigesimum primum vel secundum diem desiccari.

(*Puerperis frequenter accidit.*) Art. 1498. Est morbus usitatissimus in puerperis (vocatur ab *Ettmullero* febris *purpurata*, p. 401.) a primo calore interno vel dolore ante partum, ad eruptionem a partu, frequenter dies n. undecim. In puerperis hac febre correptis diarrhoea est symptoma periculosum eruptionem & lochiorum fluxum impediens. Respiratio difficilis, vox faucibus hærens, & linguæ tremor, præcipue dy spnoea nervosa periculosa sunt.

(*Curatio.*) Art. 1499. Ad curationem quod attinet, *testacea* sunt exhibenda, quæ calorem foveant mediocrem, simul & edulcorant, & *diaphoresin* promovent; *vesicatoria* sunt applicanda alia post alia per totum fere morbi decursum. ℞. *Sperm. cet. pulv. e chel. cancror. comp. ana* ℥j. *croc. gr. v. syr. paralys. q. s. m. f.* bolus sexta quaque hora sumendus. Spirituum defectus & pectoris oppressio cum suspiriis sunt hujus febris signa pathognomonica. *Antimonium diaphoreticum* est medicamentum ad pustulas miliares emittendas, nec non ad levandum delirium a me sæpissime comprobatum dos. ℥j. sexta quaque hora.

DELIRIUM IN PUERPERIO.

(*Delirium in puerperis.*) Art. 1500. „ Delirium in puerperis est symptoma gravissimum in morte sæpissime desinens, vel in maniam diuturnam aliquando perpetuam transiens.

(*Curatio.*) Art. 1501. „ Remediis internis fluxus lochiorum, si opus sit, est sedulo promovendus; tibiis applicanda sunt *emplastra epispastica*, & plantis pedum cataplasma sequens. ℞. *Capit. papav. cum seminibus contus. ℥iv. sal. armoniac. ℥ss. stercoris bovis recent. ℔i. sp. vini q. s. m. f.* cataplasma.

UTERI PROCIDENTIA.

Ettmulleri sententia.

(*Uteri procidentia.*) Art. 1503. Uteri procidentia vel magis proprie prolapsus sinus pudoris, seu vaginae in initio est tantum exiguus tumor foras propendens inter pudendi labia, in majorem molem concreescere solet ad magnitudinem ovi anserini, aliquando capitis infantis, & ad genua usque propendens; interdum ulceratur, immo gangrænescit. Ortum plerumque ducit a fluore albo vel a partu difficili, vel ab impetu obstetricis; hæc postrema est fere incurabilis.

(*Curatio.*) Art. 1503. Pars prolapsa convenienter in situm naturalem reponenda est; *fotus astringentes* sunt usurpandi in vino rubro & aqua ferri decoct. quemadmodum in ano prolapso (1323.) item *fotus metropoetoticus* Sydenhami sequens; ℞. *Cort. quer. ℥iv. coq. in aq. font. ℔iv. ad dimid. sub finem addendo cort. granat. contus. ℥j. Ros. rub. flor. granat. ana Mij. deinde add. vin. rub. ℔ss. colatura sit pro foru.* „ *Pess. suberei* syndone involuti interdum adhibentur. Interna sunt *Rhabbarum*, *calomel. chalybeata & amara*, & ut verbo dicam remedia ad *cachexiam & fluorem album*. Decubitus in lecto ad aliquot septimanas nonnullas hoc malo liberavit. „ Abscindi potest imminente *Gangræna*, de qua operatione consulantur scriptores chirurgi. „ Utcunque recordandum est *peritissimi Barbeti* effatum. Uterum (inquit ille) sine vitæ periculo posse excindi, quemadmodum multi medici scribere ausi fuerunt, perito anatomico intolerabile censetur. „

Sive Fasciculus Morborum decimus quintus.

MORBI INFANTUM IN GENERE.

Harrisii Sententia.

(*Infantum morbi ab una causa nempe acido plerumque oriuntur.*) Art. 1504.

TEMPERIES infantum humidissima est, & morbi eorum universi ejusdem generis sunt, & ab una eademque causa ut plurimum producuntur: quemcumque enim affectum pati deprehenduntur infantes, hoc vel illo nomine insignitum, raro aut nunquam iis deesse *fæces acidum redolentes*, & maxime ab initio ructuum acidorum copiam observare potui; ergo symptomata infantum singula, *acido*, ut parenti, ortum suum debent. „ *Αἴτια δὲ τῶν μὲν ἀνεπιτηδεύσας τῶν λοιπῶν μέλιστα ἐστὶ* (inquit Hippocrates de vet. med.)

(*Diagnosis morborum quibus criteriis investiganda est.*) Art. 1505. Facillime in morbos dilabuntur infantes, & nisi imperitius tractentur, facillime in sanitatem restituantur. Percunctandum est, an nausea & vomitu, & quandiu laborarint, an lac vel cibum coagulatum ejece- rint; an importuni vagitus, vigiliæ & inquietudo torminibus ventris eos excruciaci indicarint; an ructus acidi vel singultus emittantur; an tussis adsit; an fæces vel pauciores quam par est, vel frequentiores fuerint; quo colore demum inficiantur, an albidæ, viridescentes, vel bile sint admodum saturatæ; an sitiant & febricitent; an sint ulcuscula in ore (*Aphthæ dictæ*;) an iis solemnis sit ichor depluens pone aures; an epileptici sint; an tempus sit dentitionis; an tumescat abdomen: an color sit ictericus, vel phlegmonoides, &c.

(*Nulla pulsus aut urinæ habenda est ratio.*) Art. 1506. Totidem sunt, quæ infantum pulsum accelerant, vel alias immutant, ut sententia exinde lata ut plurimum fallax futura sit. Urinæ infantum sanitate recta gaudentium sunt crassissimæ; adeo ut fere nulla exinde exsur- gat indicatio.

(*Causæ procatasticæ morborum infantilium.*) Art. 1507. Causæ pro- catasticæ morborum infantilium sunt variæ, nimirum interdum præ- existunt diatheses morbosæ hæreditariæ a principiorum generationis con- ditione ac statu deductæ, aut a matre gravida plurimum pendentes; post has, causæ eorum affectus propius respicientes ad quatuor capita referri possunt. 1. Ad frigus susceptum quod affectibus febrilibus infantes disponet, &c. 2. Nutricis lac magis crassum, quod debetur vel intemperantiæ lactan- tium circa liquores spirituosos, vel circa amplexus venereos (unde moven- tur menses,) vel passioni hysterica, si nutrix sit hysterica. 3. Ad præ- maturam carniū deglutitionem, quæ cruditates parit, exinde lumbrici & plurima incommoda. 4. Ad potum liquorum spiritibus abundantium concessum. Venterculus infantum, a quacunque causa id primario pen- deat, in acidam intemperiem nunquam non facessit, unde fit, quod alimentum suum nequaquam in homogineam chyli substantiam rite conteratur, verum in quoddam coagulatum transeat, ex quo morbi fere omnes iis contingunt; quodque istiusmodi coagulatio aut cuiusdam aciditatis gradui jugiter innitatur, aut saltem exinde proficiscatur mul- to sæpius, quam ab alia quavis causa, luculentissime constabit, si quæ sensibus ipsis, aut demum curationi (quæ acidum obtundentibus, & coagu-

coagulationes solventibus optime instituitur) fides certo adhibere possit.

(*Hypothesis de acido confirmatur ex curationis methodo per absorbentia.*) Art. 1508. Saltem si omnimodo vera non sit nostra hypothesis de acido in omnibus puerorum affectibus prædominium habente, votis nostris abunde sufficiet, si per *testacea & remedia absorbentia* dicta curationis methodus efficacior ac certior, quam ea, quæ hætenus passim obtinuit, evadat (quod experturo facile patebit.)

(*Prognosis ex conformatione, & corporis habitu, &c.*) Art. 1509. *Corpulenti & obesi infantes*, pituita diffuentes, verticis regionem mollem (*pulpæ adinstar tremulæ*) & apertam, quam dicunt, Anglice *an open Mould*, ab anteriore ad posteriorem cranii futuram per sæpe excurrentem diutius retinentes, Rachitidi, tussi convulsivæ, aphthis difficulter cedentibus, ac tandem scrophulis maxime sunt obnoxii. *Macilenti & strigosi* sunt omnium tenerrimi, acerrimo calore aduruntur, & in febres pessimi moris, hoc est, summe inflammatorias (*pro ratione ætatlæ*) & nervoso generi adversas, sunt ut plurimum proclives. ----- Pueri ex matribus hystericeis, teneris, morbosus, &c. orti a graviore aliquo morbo difficiliter convalescunt.

(*Curatio.*) Art. 1510. Quod ad infantilium affectuum curationem attinet, in genere semper eorum imbecillitatem naturalem præ oculis habere imprimis oportet; & eligenda sunt medicamenta, quæ tenerimis maxime conveniunt, etenim quo mitiora ac tutiora sunt remedia, quæ adhibemus, eo certius ex animi sententia succedet eventus.

(*Pblebotomia raro necessaria.*) Art. 1511. Quod ad *venæsectionem* puerorum attinet, quamvis materiæ febrilis in pulmones metathesis insignior, & tusses convulsivæ eam in minimis infantibus quandoque exigant, tamen aperte constat eam non esse medicinam iis natura consentaneam neque magis huic tenerrimæ, quam decrepitæ ætati accommodam. Et proinde minime necessarium duco ejus auxilium implorare in quibuscunque infantum affectibus, nisi in *tussibus istis convulsivis*, vel ubi *febrim subito exortam tussis importuna* concomitari solet: vel in *contusionibus* gravioribus, quæ nonnunquam contingunt.

Etmulleri sententia.

(*Vires mercurii dulcis & auri fulminantis.*) Art. 1512. In infantum cura latet quid singulare in *mercurio dulci*, sed adhuc melius est *aurum fulminans*, dosis lactantibus est gr. j. vel gr. iſſ. pro dos. ij. horrendas dejectiones efficit, interdum etiam vomitus movet. In epilepsia, asthma convulsivo, torminibus, convulsionibus, &c. *aurum fulminans* est sacra anchora. pag. 1177. & 1179.

(*De meconii purgatione.*) Art. 1513. Infans recens natus purgetur cum *ol. amygd. dulc. & syr. violar.* vel de *rhabarbaro*, vel e *spin. cervin.* quod est optimum, idque toties, & tamdiu repetatur, donec liberetur a fero mucilaginoso ventriculum occupante, & a *meconio* nigricante & spisso excremento in intestinis stabulante. *Colostrum* seu lac primum est alimentum medicamentosum, quod natura eum in finem generavit, ut modice nutriendo leviter pro infantis imbecillitate purget per aliquot dies.

Art. 1514. „ *Syrupus flor. malorum persicor.* est optimum, lenissimum, „ ac tutissimum emeticum pro infantulis; alvum quoque blande laxat. Infantibus recens natis apprime propinatur loco *ol. amygd. „ dulc. & syr. violar. dos. a ʒij. ad ʒj.* Est medicamentum praxi moderna comprobatum. „

EFFLORESCENTIA PURPUREA.

Ettmulleri sententia.

(*Efflorescentia purpurea.*) Art. 1515. Infantes tertio vel quarto a partu die (aliquando tardius) *efflorescentia cutis miliari purpurea* (Anglice *the Red Gum*) affliguntur quæ cito evanescit. Mulierculæ pulv. Gasconicum, confect. alkerm. crocum in vino generoso, &c. solent exhibere; ope medica raro indiget.

FEBRES INFANTUM.

Harrisi sententia.

(*In febribus curandis dæ indicationes humorum, præparatio & expurgatio.*) Art. 1516. Prima indicatio in curandis febribus est *acidum* rite præparare, quo melius id eliminetur; hoc autem necessarium videtur antequam humores acidi poterint cum *euφopia* expurgari: nam secundum Hippocratem cocta, non cruda, sunt medicanda; hæc præparatio, non aggregiendæ est sudoriferis proprie dictis, sed potius *absorbentibus*, scilicet, pulveribus *testaceis*; *salia volatilia*, aut *spiritus volatiles*, in tenellis non sunt usurpanda, utpote ipsorum ætatulæ tærrimæ minus congruentia.

(*Methodus medendi.*) Art. 1517. Infanti anniculo febricitanti, aut torminibus (ut plerumque fit) excruciato in hunc fere modum succurrere soleo, quarta quaque hora exhibeo chartam pulv. testac. ex fequentium nonnullis, ocul. & chel. cancerorum, test. ovorum, ostrearum, cancerorum, os. sepia, cret. coral. corallin. margar. matr. perlarum, lap. bezoar. pulv. Gascon. spec. de hyacinth. &c. dosis circiter ℥j. cum julap. sequent. exhibere soleo, ℥℥. Aq. lact. ℥iv. ceras. nigr. ℥ij. pæon. comp. epidem. ana ℥ij. sacchar. perlat. q. s. m. f. julap. facillime variari potest formula, servata semper eadem intentione. Convenit interdum emulsio ex amygd. dulc. &c. ad sitim extinguendam, & humores contemperandos.

(*Catharsis instituenda.*) Art. 1518. Tertio die a quo sum advocatus, nisi variolæ, morbilli, aut febris scarlatina, caput attollant, purgandum esse præcipio, infantem unius anni in hunc fere modum: ℥℥. Syr. de cichor. cum rheo ℥ij. rhabarb. elect. pulv. gr. xv. vel ℥j. aq. lact. alexiter. cinnam. ten. ana q. s. ad diluendum, misce. Vel ℥℥. Syr. de rhamn. cathartic. ℥ij. pulv. diasen. gr. iij. m. vel ℥℥. Pulv. cornachin. gr. vj. sumat in coch. aq. ceras. nigror. nullum vero medicamentum magis accommodatum est ætati puerili ac rhabarbarum. Ad vim purgationis accelerandam crystal. tart. genuin. ℥j. aut ℥ij. in haustul. juscul. avenac. exhiberi potest, & catharsis repeti debet alia atque alia vice pro re nata. „ Sed oportet medicum cavere: Febres etenim infantum „ tumoribus criticis terminari non raro aptæ natæ sunt, quales sunt „ phyma vel phygethlon sub mento, parotis pone aures, &c. Ideoque „ in isto rerum statu catharsis omnino differenda est, & suppuratio „ promovenda. „

(*Quid faciendum in symptomatis dissonis.*) Art. 1519. In symptomatis *ἀτότοις*, ex summa humorum putredine oriundis sæpe ex usu est *Æthiopis mineralis* gr. vj. (imo ad ℥j. vel ℥℥.) vel *mercurii dulcis* gr. iv. cum flor. sulph. tantundem admixta in syr. alicujus grati cochleari parvo, nocte catharsin præcedente exhibere. His rite peractis plerumque cessant graviora symptomata, vel saltem multum leniuntur, ut proinde in vado jam res sit, quæ in extremo discrimine paulo ante fuerat.

ICTERUS.

Sylvii sententia.

(*Icterus.*) Art. 1520. Icterus plerisque infantibus mox a partu so-

let supervenire, immo nonnunquam illo infecti nascuntur, adeoque ipsius causam quandoque ante nativitatem in se continent; probabile est, quod ab humore glutinoso, pituita scilicet viscosa, ortum ducat. Existimo in his infantibus icterum sæpe fieri posse absque ductus biliarii obstructione, a bilis scilicet spirituositate, & ideo ad effervesendum ineptitudine.

(*Curatio.*) Art. 1521. Omnia remedia icterum curantia infantibus non ita tuto exhibentur, quam adultioribus; pulvis sequens ex lacte materno exhibitus semel aut bis in die intra paucos dies icterum infantum curare solet, 2℥. Pulv. croc. angl. bezoar. min. ana gr. j. m. quoties alvus est adstrictior, commode sollicitatur ac laxatur rhabarbaro, ac imprimis syrupo de cicbor. cum rheo; prodest etiam pulvis viperarum (item millepedes, sal succin. &c.

(*Plures hoc morbo pereunt.*) Art. 1522. „ Rara est mentio hujus affectus in practicum libris, nihilominus tamen plures sane infantiuli recens nati hoc morbo intereunt, ex muliercularum plerumque negligentia; ajunt enim, flavescent, & moriuntur, neque ullas suppetias aut quærunt aut explorant.

T O R M I N A V E N T R I S.

Ettmulleri sententia.

(*Tormina ventris.*) Art. 1523. Tormina ventris frequenter mirum in modum affligunt recens natos, continuo plorant, pedibus calcitrant, crepitus copiosi emittuntur, excrementa sunt viridia; sunt plane motus convulsivi intestinorum; aliquando Hernia producitur.

(*Curatio.*) Art. 1524. Præmissis enemate & aliis laxantibus & pulveribus absorbentibus, sperma ceti cum ol. anisi est egregium; externe ol. cham. & rut. cum gutt. aliquot ol. anisi, junip. nuc. moschat. cui addi potest fel. bubul. q. s. pro linimento. Enema ad tormina Fulleri.

(*N. B.*) Art. 1525. „ Hoc duntaxat serio admoneo (inquit Harris) „ tormina omnia, inquietudines, & vigilias infantum testaceis apte „ exhibitis æque certo demulceri, ac dolores ac vigilias adultorum „ ipsis narcoticis ad tempus tolli. „

V O M I T U S.

Ettmulleri sententia.

(*Vomitus.*) Art. 1526. Vomitus est utilis in infantibus, ex quacunque causa oriatur, nisi sit nimius; in culpa est lac frequentissime.

(*Curatio.*) Art. 1527. Si sit nimius, & discolorata rejiciantur, clyisma injiciendum est, & per os carminativa, nux moschat. &c. sunt exhibenda; externe stomacho frustulum paris tost. in vino generoso madefacti & cum aromatibus conspersi applicandum, &c.

ALVI ADSTRICTIO, & DIARRHŒA.

Ettmulleri sententia.

(*Alvi adstrictio.*) Art. 1528. Alvus infantum ordinario est laxa, saltem bis in die exonerari debet; adstrictio plerumque oritur ex vitio lactis vel pultis.

(*Curatio.*) Præter usitata laxantia in hoc affectu præstantissimum remedium est muscerda a N. ij. ad vj. pro ratione ætatis in pulculla exhibitæ; usurpari etiam possunt linimenta laxativa ex colocynth. scammon. &c. „ In tenellis sufficit inunctio ventris cum butyro ante focum; „ item ablutio quotidiana clunium & femorum, cum aqua frigida.

(*Diarrhœa.*) Art. 1529. „ Diarrhœa infantum (inquit Harris) non

„ non astringentibus aut narcoticis cohibenda est, sed potius humores
 „ ferocientes cum pulveribus testaceis compescendi sunt, & contempe-
 „ randi, ut demum rhabarbaro expurgentur.

(*Dysenteria.*) „ Dysenteria infantibus (inquit *Barbette*) sæpius per-
 „ benigna reperitur; illa enim ad menses aliquot quandoque afficiun-
 „ tur sine quovis incommodo, modo res naturæ permittatur.

A T R O P H I A I N F A N T U M .

Ettmulleri sententia.

(*Macies & atrophia quomodo fit.*) Art. 1530. Macies & atrophia in-
 fantum ex denegato nutrimenti transitu ab obstructione lacteorum &
 glandularum mesenterii accidit. Membra macilenta evadunt, venter
 tumet, & indurescit, ut plurimum secessus liquidi & copiosi observantur;
 causa ut plurimum est viscositas ingestorum; periculosum est malum.

„ Quotquot hoc affectu extinctos aperui (inquit *Doleus*) in iis glan-
 „ dulas mesenterii tumidas & obstructas reperi; denegato enim sic
 „ nutrimenti transitu, necessario partes nectare suo rorido privantur.

(*Curatio.*) Art. 1531. Alimentum debet esse tenuissimum & sub-
 tilissimum; conveniunt volatilia & martiata mitiora; externe linimen-
 tum ex gum. ammoniac. &c. „ Marasmus seu extenuatio infantum (in-
 „ quit *Sydenhamus* in sched. mon. pag. 55.) quasi phthifica curatur ex-
 „ hibitione infus. rhabarbari in cerevisia ten. quod ipsum ego quoque a-
 „ liquoties expertus sum. *Reusnerus* affirmat *Hillerum* infantes atro-
 „ phia laborantes cum tussilagine ad instar hormini frixa frequenter
 „ restituisse (Succus quoque ejusdem plantæ est maxime efficax.

Art. 1532. (*Aridura partium.*) Pro aridura partium valde commen-
 datur arcanum aluminis *Fœlicis Wurzii* pag. 473. Valet etiam unguen-
 tum ad atrophiam ut & remedia ad Rachitidem.

T U S S I S C O N V U L S I V A .

Ettmulleri sententia.

(*Tussis convulsiva.*) Art. 1533. Frequens est tussis infantum ferina,
 in qua multum ac diu tussunt, donec per vomitum rejiciant muco-
 sum quid ex ventriculo, postea ad tempus cessat per dimidium præter
 propter diem, tum revertit simili modo. Ex ventriculo oritur, ut
 etiam asthma infantum, quod est anhelosa & sibilosa respiratio.

(*Asthma.*) Tussis infantum (ut recte observavit *Waldschmidius*)
 „ est fere semper stomachalis.

(*Causæ.*) „ Materia acida, mucilaginosa & tenax (inquit *Doleus*)
 „ in ventriculo hospitans sæpissime est causa hujus affectus; interdum
 „ vero causa ferox advenire videtur, & nihil aliud esse, quam sal
 „ quoddam mediante aere corporibus tenellulis communicatum lym-
 „ phamque coagulans, a qua acriori & stagnante vel præterfluente la-
 „ rynx afficitur, unde tussis illa oritur convulsiva.

(*Catarrhus.*) Frequentissime infantibus accidunt catarrhi cum ster-
 „ tore in pectore, a quo malo plures intereunt; febricitant enim, &
 „ suffocantur: quare muniendi sunt infantes ab aere frigido; si enim
 „ ventis frigidis exponantur ex incuria nutricum vel matrum, facile
 „ in hunc morbum incidunt, & dein difficulter curantur.

(*Curatio.*) Art. 1534. Quoad curam hujus tussis furibundæ semper
 ad stomachum erit respiciendum; absque vomitu vix curari potest,
 cum

cum eo tamen facile depellitur, ut & *asthma* dictum; provocari potest cum penna oleo tincta, &c. Jusculum *raparum* est mulierum euporiston, *sperma ceti* in jusculo est egregium.

(*Venæ sectio.*) „ Ingens solatium (inquit *Sydenhamus*) adfert *venæ sectio* infantibus tussi convulsiva laborantibus, & remedia quælibet pectori dicata longo post se linquit intervallo *method.* p. 207.

(*Catharsis.*) *Plebotomia* & repetita *catharsis*, eaque sola expugnatur hæc tussis, sed leniora cathartica hic conveniunt, eaque sunt cochleatim ingerenda pro ratione ætatis *Ep.* p. 29. Potus & alimenta liquida (inquit *Willisius* in) quantitate solito minori sumantur, istius vice *bochetum* ex *sarsa*, *chin.* *santal.* *ras.* *ebor.* *C. C.* cum ingredientibus diureticis & antispasmodicis usurpetur;

(*Decoctum e lignis.*) „ *Decoctum* vel *sy.* ex *castor.* & *croco.* „ item *decoct.* *rad.* *pæon.* *mar.* *visc.* *quercin.* *hyssop.* multos juvarunt.

Farrago sententiarum.

(*Remedia nonnulla alia.*) *Art.* 1535. *Caro murium* frigoribus commissa vulgo specificum audit; sed super omnia *muscus pyxidatus*, quocunque modo sumptus, est remedium probatissimum, & raro fallax. *Decoctio* ex *musco arboris* (inquit *Baglivius*) præsertim a *quercu* pendente omnium præstantissima est, ut nos experti sumus, valet quoque in aliis morbis convulsivis. *Aurum Mosaicum* (in aliis morbis convulsivis maxime efficax) in paulo ætate provecioribus tentari meretur, ut & *ol. sulph.* per *campan.* *serum lactis* recens a caseo pro potu ordinario bibatur. *Expressio millepedum* ad tussim *julap.* *moschat.* ad tussim convulsivam, &c. quandoque cum fructu usurpantur. *℥ss.* *Milleped.* in *vin. alb.* demers. *q. v.* exprime succum, & add. *sacchar. alb. q. s.* & *f. s. a.* *syrupus*; hic *syrupus* cochleatim sumptus (inquit *D. Cheyne* in tractatu de *Arthritide* pag. 116.) tussim convulsivam infallibiliter tollit.

EPILEPSIA.

Willisii sententia.

(*Epilepsia quando potissimum accidit & a qua causa.*) *Art.* 1536. *Epilepsia* puerorum circa duo potissimum tempora in pueris convulsio- nibus maxime obnoxiiis reperiri solet, viz. intra primum a partu men- sem, & circa dentium eruptiones; quanquam hujus morbi insultus et- iam aliis temporibus, & quibusdam aliis de causis, non raro eveniant; cujusmodi sunt nutrix invaletudinaria, aut prægnans, lac in ventri- culo coagulatum, aut in putrilaginem acidam aut amaram degenerans, antemperies febrilis, capitis aliarumque partium ulcera, aut exanthe- mata, subito evanescentia, aeris mutationes, lunationis periodi, &c.

(*Signa præsagientia.*) „ Quando in infantibus (inquit *Dolæus*) „ frequentes oscitationes, pandiculationes, oculorum & palpebrarum „ leves motus, manuum commotiones, brachiorum extensiones, pa- „ vores & tremores, vigilias nimias observamus; epilepsia timenda „ est, quia sunt ejusdem prodromi.

(*Curatio.*) *Art.* 1537. *Antispasmodica* medicamenta nutrici exhibean- tur; sumat mane & vesperi *rad.* & *sem. pæon. mar.* & *sem. fœnic.* *dulc.* in haust. *ser. lact. coct.* Linimentum sequens circa nares, tempo- ra & cervicem infantis epileptici usurpari potest, *℥ss.* *Ol. capivi.* *ca-* *stor. ana* *℥ij.* *succin.* *℥ss.* *m.* nuper mihi retulit medicus eruditus se novisse plures hoc remedio curatos, viz, *℥ss.* *Fol. cham.* minutim in-
cis.

cis. Mij. includantur in duobus sacculis e lino tenui aut serico confectis, qui lacti calido intincti & expressi abdomini successive applicentur. *Untzerus* valde commendat *fel catelli* lactantis nempe ut totus succus cisti fellea exemptus puerulo cum pauca *aq. flor. tilia* propinetur. *Harrisii sententia.*

Ad convulsiones testacea optima remedia.) Art. 1538. Ad convulsiones seu insultus epilepticos tollendos apprime etiam valent *pulveres testacei*, maxime si *castoreum* iis adjiciatur. In convulsionibus quamplurima pro specificis vulgo habita tam ab auctoribus gravissimis quam a practicis celeberrimis decantari solent: veruntamen virtutes eorum (quantum observare licuit) nostram de se expectationem videntur vix ac ne vix quidem explevisse. In paroxysmis infantum convulsivis, utpote a torminum prægredientium materia acri nervos omnes vellicanti jugiter obortis; ea, quæ *acidum* obtundunt, contemperant, aut infringunt, idque sine corporis novo æstu aut calefactione, quæque aciditatem sic infractam atque aculeis orbatam *per inferiora* deducunt, post alia infinita incassum tentata, veras vires huic symptomati horrendo debellando pares tandem agnoscentur.

(*Causæ.*) Art. 1539. Epilepsia infantum plerumque ex his sex causis originem ducit. 1. A meconio retento. 2. A lactis vitio. 3. A dentitione difficili. 4. Ab immoderato animi affectu nutricis. 5. Ab excrementis cohibitis. 6. A lumbricis.

(*Aurum fulminans.*) Art. 1540. Mirabilis est vis *sulphuris antimonii* & *auri fulminantis* in epilepsia dos. gr. j. vel in imbecillibus gr. iß. pro dos. ij. cum aliis appropriati. (1512.)

(*Alia remedia.*) „ *Ol. succin.* gr. ij. vel iij. cum pari quantitate „ *spiritus vitrioli* in *aq. ceras. nigr.* exhibiti puerulos a paroxysmo statim plerumque liberant: sed præ omnibus quotcunque mihi hactenus innotescunt *oleum sulph. per campan.* hunc morbum in infantibus præcipue primo mense feliciter expugnat: sumi potest in julepis cephalicis ad sufficientem aciditatem. *Pulvis de gutet.* utilis est ad præcavendam recidivam.

D E N T I T I O.

Hippocratis sententia.

(*Dentitio.*) Art. 1541. Ad dentitionem accedentibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, & maxime ubi caninos dentes producant, & iis qui inter pueros sunt crassissimi, qui alvos duras habent. „ De plumis exuendis & novis nascentibus (inquit *Liber* in locum) idem gravis dolor atque febricula avibus contingit: „ unde mutæ sunt, & canere desinunt. Idem quoque erucis in veteribus cuticulis deponendis accidit.

(*Modus eruptionis.*) „ Germen dentis (inquit *Dolæus*) in maxillis est instar albuminis ovi, mucosi & tenuis, in cellulis eorum contenti, quod de die in diem durius redditur, usque dum illa materia indurata gingivam perrumpat: in hac perruptione miseri tenelli plurimis affliguntur symptomatibus: adfunt enim comites gingivarum pruritus, superflua caro, vesiculæ, fungi; maxillarum inflammationes, terrores, insomnia, vigilæ, salivatio, vomitus, epilepsia, pavores; diarrhœæ, febres, convulsiones gingivarum, tubercula, deinde abscessus, & non raro mors ipsa.

(*Tempus eruptionis.*) Art. 1542. „ Licet nihil certi (inquit *Bonettus*)

de termino eruptionis dentium statui queat, quippe in quibusdam citius, in aliis tardius prodeunt; tamen communiter observatum est dentes successive biennii spatio exire; ita ut primo septimo mense incisores, deinde maxillares, tum 15. aut 17. mense canini vel oculares prorumpant. (Vide Art. 1544.)

Harrisi sententia.

(*Symptomata varia inter dentiendum.*) Art. 1553. Nullus affectus infantibus tot gravia symptomata progenerare solet, quot dentitio difficilis & laboriosa; inter dentiendum enim ex inflammatione gingivarum non raro oriuntur tormina ventris, vigiliæ, inquietudines, proluvium alvi aut ejusdem constipatio, dejectiones & vomitus virides, phthæ, febres, convulsiones; &c. Atque hæc accidentia (ut recte observat Baglivius) vitio solidi tantummodo succedunt, solidi nempe gingivarum irritati, puncti, crispatique a quibus ad intestina oscillatione producta graves oriuntur diarrhœæ, quæ si non veniant, pejora veniunt mala (antedicta.)

(*Duo dentitionis sunt tempora.*) Art. 1544. Dentitionis tempus est duplex; unum, quo dens osse maxillari primum emergere nititur, & quo gingivæ pars externa & superior absque aliquo ejusdem tumore, albedo quodam circulo circumscribi ut plurimum solet; alterum est, quo dens mole jam auctior gingivam tumidam reddit, atque eam perumpere omni vi conatur, atque hoc solummodo postremo casu quandoque licet gingivas incidere. Quatuor, quinque vel sex mensibus a natiuitate elapsis dentes ordinario incipiunt erumpere, primo incisores, deinde canini, & postremo molares; circa septimum ætatis annum nova series producitur, & circa vigesimum primum dentes sapientiæ dicti, nimirum duo postremi molares egrediuntur. (Vid. Art. 1542.) Nonnulli, licet paucissimi, cum dentibus aliquot eruptis nascuntur. Ego novi foeminam sine dentibus, non modo in infantia, sed per totum vitæ stadium edentulam mansisse.

(*Curatio.*) Art. 1545. Symptomata dentientium universa eidem fere methodo, remediis nempe acidum absorbentibus, & contemperantibus, ac deinde leniter expurgantibus plerumque cedunt.

(*Nota bene.*) Art. 1546. Ordinario copiose salivant infantes dentibus erumpentibus, & adest plerumque diarrhœa; hæc si eveniant, bene præfagiunt: quocirca commode fricandus est dens erumpens cum folio tabaci circa nutricis digitum obvoluto & cerevisia parum madefacto, quod salivam & alvum leniter movet. Alvus lubrica perpetuo servanda est; & si adsint convulsiones pulvis sequens Willisi locum habet, ʒ℥. Ocul. cancr. margar. præparat. coral. rub. ana ʒij. ol. sulph. quantum pulvis imbibendo excipiet f. pulvis. Spiritus C. C. (inquit Sydenhamus in sched. mon. p. 54.) ut ut tritum & plane contemptum remedium (dos. gr. iij. vel iv. in aq. ceras. nigr.) præ ceteris, quæ mihi innotescunt, medicamenti votis respondet in dentitione laborantibus. Convulsiones hinc oriundas minuta spiritus C. C. dosis foeliciter tollit (inquit Boerhaave.) In ventris torminibus apprime convenit enema ad tormina seq. ʒ℥. Cret. pulv. ʒij. herb. rut. flor. cham. ana Mʒ. coq. in q. s. aq. font. ad ʒiv. colatur. add. tinct. castor. diascord. ana ʒij. syr. de mecon. ʒij. ol. anis. gut. x. m.

L U M B R I C I.

Ettmulleri sententia.

(*Lumbrici.*) Art. 1547. Lumbrici sponte prodeunt vel per alvum

vel per os raro sunt sine periculo; nam *malignitatem* in morbis d
notant, unde fœca sibi volunt consulere. Authores practici studio
monent in omnibus affectibus semper ad *lumbricos* esse attendendum

(*Signa lumbricorum.*) Art. 1548. *Primaria signa lumbricorum* sunt
in ore copiosa saliva jejuno stomacho, scalptura narium, pavor i
somno, stridor dentium, ventris tumor, tussis sicca, sitis, alvus li
brica, tormina ventris jejunis, rubor & pallor faciei alternatim.

(*Remedia ad lumbricos.*) Art. 1549. 2℥. *Argenti vivi* ʒj. coq.
aq. simpl. (vel quod melius est in decoct. alb.) ℥ss. vel probe ag
tentur invicem in lagenâ vitrea, post subsidentiam *Mercurii* decantetur
liquor, & detur infantibus pro potu ordinario. Est experimentum ce
tissimum ad enecandos lumbricos. „ Eiusmodi quoque est medicamen
„ tum istud per universam *Italiam* celebratum. 2℥. *Argent. viv.* ʒ
infund. per noctem in aq. galegæ ʒij. decantetur liquor & propin
„ tur mane. Boyle. „ Externe utile est linimentum sequens, 2℥. *Al.*
ʒij. *myrrh.* ʒss. (ol. *absyth.* gr. vj.) fel. *taurin.* q. s. m. f. linimen
tum, cui addi possunt ad acuendum ol. *colocynthidos* guttæ aliquot
de aliis vermifugis alibi (684.) „ *Cinnabaris nativâ* est remedium
„ valde efficax, ac tutissimum, vermibus necandis. *Pulvis stamni*, nem
„ pe *stamnum* calcinatum est adhuc efficacius medicamentum, & fe
„ inter specifica cœsetur; hinc pulv. *vermifugus* sequens *Quincii*. 2
„ *Stamni calcinat.* musc. corallin. sem. *sancton.* ana ʒj. *sabin.* croc. an
„ ʒj. m. f. pulv. dos. a ʒss. ad ʒj. alvum non movet. Author
„ ejusdem laudibus copiosior est: vid. locum. *Emplast. vermifug.* B
„ *tean.* & *Syrupus vermifugus* ejusdem interdum usui esse possunt. I
„ extremis utor aliquando *Hydrargyro* (inquit Chesneau) quod in ve
„ mibus necandis non habet simile. Ad pisi magnitudinem ex c
„ chleari cum lacte parvulis sine noxa propinare soleo.

(*Crinones seu comedones.*) Art. 1550. *Crinones* seu comedones sunt
vermiculi subcutanei infantes ad *atrophiam* disponentes; occupant pl
rumque loca musculosa, imprimis dorsi, scapularum humeri, cruru
ac furarum; pruritum molestum excitant, indeque inquietos & vig
lēs reddunt infantes, tandemque in rabem adducunt. Cum lotione me
curiali sunt enecandi. „ Hi forte sunt vermes, quos *Artius* describit,
„ dracunculos vocat; *Æthiopes* & *Indos* quandoque infestare solent
„ rarissime apud nos inveniuntur.

R A C H I T I S.

Boerhaavii Sententia.

(*Rachitis est morbus novus.*) Art. 1551. *Medio* fere labente seculi
decimo sexto in *Mediterraneis* *Britanniæ* primo, deinde per totam *Ge
maniam*, denique & per omnia *Europæ borealis* loca, ortus est morbu
novus, hodie frequentissimus, qui *Rachitis* appellatur; infantibus nu
quam connatus est, raro ante nonum ætatis mensem, vix unquam
post biennium vitæ, sed spatio hoc medio frequens accidit.

(*Methodus medendi.*) Art. 1552. *Curatio optima* fit cibo levi, eup
pto, sicciori, minus pingui, aromatibus mitioribus condito, sæpe dato
copia moderata; Potu paucò, meraco ex *cerevisia*, imprimis non ver
ri quidem, at diu cocta ac spissa: aere sicco, & calidiusculo; vestiu
accurate sicco, ex lana confecto; gestatione, concussione, oscillatione, v
tione in rheda, frictione multa, calida, sicca, pannis fumo aromatizato
persusis instituta maxime ad abdomen & spinam; *cantharidum* iterat
quan-

quandoque applicatione; vomitoriis lenibus aliquoties cum prudentia repetitis; purgantibus deinde roborantibus per aliquot dies successivos adhibitis; denique usu diu continuato medicamentorum roborantium, exsiccantium, antiscorbuticorum, & spiritus excitantium.

(*Psychrolusia.*) An immersio in aquam frigidam prodest? „ Immo „ *psychrolusia* in hoc affectu est valde efficax, ut ex quotidiana experientia docemur, de qua videatur *Floyer*, pag. 112. 145. 222.

Glissonii sententia.

(*Signa diagnost.*) Art. 1553. Signa diagnostica rachitidis sunt laxitas & mollities partium, debilitas & languor, ignavia & torpor; est in hoc affectu inæqualis partium nutritio: caput iusto majus, facies plenior & floridior, partes carnosæ infra caput in progressu morbi magis magisque in dies extenuantur; adiunt protuberantiæ quædam, & nodi circa nonnullos articulos, maximeque in carpis conspicuæ, paulo minus in talis observantur; similes quoque tumores in costarum extremitatibus, quibus cum sterni cartilaginibus committuntur; ossa nonnulla incurvantur, præcipue tibiæ & fibulæ, hinc ossa ulni & radii, sed paulo minus & infrequentius, aliquando etiam ossa femoris & humeri, aliquando decurtatio quædam ossium, & deficiens eorum accretio secundum longitudinem, demum irregularis quædam capitis protuberantia, maxime ossis frontis antrosum, huc quoque referri potest; dentes tum tardius tum molestius erumpunt, levi occasione vacillant, aliquando nigrescunt, aut etiam frustulatim excidunt; pectus in ulteriori morbi gressu a lateribus angustius redditur, anteriùs acuminatur; adest quoque subtumida quædam abdominis repletio & hypochondriorum tensio; frequenter etiam tussis, respiratio difficilis multaue alia pulmonum vitia inducuntur. Hoc morbo afflicti sæpe lateralem decubitus modo sinistram avertantur ob coalescentiam pulmonum cum pleura vel tumorem in adverso latere.

(*Partes internæ affectæ.*) Art. 1554. „ Interius hepar iusto majus „ est, ventriculus & intestina in maiorem molem assurgunt; mesenterium glandulis iusto majoribus, si non strumis afficiatur; pulmones infarcti & tumidi cernuntur, nonnunquam purulenti strumosi, & pleuræ adhaerentes. Venæ jugulares & arteriæ carotides solito ampliores, denique partium fere omnium enervatio, item torpor, quidam & ad motum segnities.

(*Prognosis.*) „ Hic affectus plerumque ex se non est mortalis: „ nonnunquam tamen ingravescentibus symptomatibus in tabem, hydropem pulmonum, aut ascitem degenerat; quo citius a partu ægrum invadit, eo periculosior est, quo major morbus eo deterior. Qui ante annum quintum non curantur, postea per totum vitæ spatium valetudinarii sunt. Scabies aut pruritus huic morbo supervenientes ad curationem multum conferunt. *Mayovv.*

(*Remedia simplicia.*) Art. 1555. Ex materia medica in hoc affectu ant herbæ omnes capillares; imprimis *tricomanes*, *radix osmund. regal. emmæ* dum vix erumpent *flicis maris*, *lingua cervina*, *veronica mas*, *filago*, *radix rubiæ tinctorum*, *curcum*, *sarsaparilla*, *chin. lignum guaiaci* & ejusdem gummi, *chalybs*, *sperma ceti*, *vermes terrestres*, *milbedes*.

(*Laus rhabarbari.*) *Rhabarbarum* præ aliis simplicibus commendatus; est enim medicamentum moderate calidum & siccum, spiritibus sitis omnium partium satis familiare & amicum, torporem spirituum benigne excutit, mollitiem laxitatemque partium firmat, internam

lubricitatem nonnihil corrigit, pulsum ad artus evocat, calorem externarum partium auget, internarum & imprimis earum, quæ nutritioni inserviunt, vigorem & activitatem fovet, est medicamentum profecto omni ætati & complexioni satis tutum.

(*Curatio.*) Art. 1556. Cathartica appropriata præcipue ex rhabarbaro debitis intervallis repetita in hoc morbo profunt; fonticuli & vesicatoria sunt utilia: enema sequens est valde proficuum, 2℥. Fimi equi non castrati ʒi℥ sem. anis. fœniculi malv. contus. ana ʒi℥. flor. cham. p. j. conq. in q. l. ser. lact. incolatur. ʒiv. solv. syr. violar. ʒx. sacchar. rub. ol. ros. ana ʒ℥. m. f. enema.

(*De frictione.*) De Frictione hoc observandum est, abstinendum esse a frictione, qua parte ossa prominent, & liberalius fricandum esse partibus eorum cavis; non continuandam esse hanc actionem ultra levem ruborem in partibus excitatum. Quantum valet frictio in hoc morbo, ut etiam de viribus tussilaginis speciatim in hoc effectu & atrophia curandis: vide Fulleri medicinam gymnastic. p. 96.

Mayowii sententia.

(*Methodus medendi.*) Art. 1557. Quandoquidem Rachitidis causa in obstructione spinalis medullæ, nervorumque inde oriundorum imbecillitate consistit, præcipuæ indicationes curatoria sunt, ut nervi roborentur & obstructions tollantur; in hunc finem venæsectionem, medicamentum cathartica, item digestiva, diuretica, diaphoretica & specifica in usum vocentur. Enemata laxantia injici possunt, nonnumquam corroborantia ex decoct. fimi equin. flor. rosmarin. &c. Enem. terebinth. cum expressione milleped. viv. &c. Catharsis institui potest cum rhabarbaro item cum calomel. Fonticuli insuper opem egregiam præstant, præcipue, si inter primam & secundam colli vertebra excitentur. Præter specifica vegetabilia laudatur ens veneris, inventum nobilis Boylei, ut & salia volatilia, elixir proprietatis, balsamum sulphuris, nonnumquam etiam chalybis usus convenit, utpote qui virtute insigniter aperiente donatur, idemque non tantum concoctionem juvat, sed etiam viscerum tantum firmat roboratque: verum illius usus non sine cautione instituentus est: etenim in tussi, pleuritide, infarctu pulmonum, febre hectica, morbisque id genus aliis a chalybis usu omnino abstinendum est. Ad abdominis intumescuntiam sequens fomentatio multum confert nempe ægro in vase satis amplo collato hordeum fermentatum, quod in aqua cocta aliquandiu infusum est (ut in cerevisia conficienda fieri affolet) eidem circumcirca tepide apponatur, maneatque æger eodem pene opertus ad sudoris provocationem.

(*Alia remedia*) Art. 1558. Succus e limacibus cum testis parum coctus exstillans, vulgo, sed perperam, oleum limacum vocatus, hoc affectu pro usu interno & externo valde celebratur, præcipue in infantibus hæticis & phthisicis. Virtutes & usus remediorum & quantum lector ipse expendat; Flores salis armoniac. martiati Bontean. Cervisia ad Rachitidem, aq. limacum pectoralis, emplastr. spinale, linimentum spinale, omnium Fulleri. Consulatur etiam denhamus de Rachitide Epist. p. 148.

A P H T H Æ.

Sylvii sententia.

(*Aphtha.*) Art. 1559. Aphthæ sunt ulcuscula (satis nota) totamque ris superficiem occupantia, neque parcunt oesophago, ipsive ventriculo.

culo, quantum conjectura assequi possumus; ut plurimum albicantes sunt, subinde flavescentes, quandoque nigricantes, quæ postremæ sunt periculosiores. „ Aphthæ (inquit *Doleus*) quæ vulgo, sed perperam, „ *ulcuscula* judicantur sunt revera *escharæ* quædam sed *leviusculæ*; „ quæ in summitate pustularum quarundam in ore, &c. oriuntur.

(*Causæ & Curatio*) Art. 1560. Aphthæ nobis videntur ortum habere ab acidis humoribus halitibusque ad os delatis; quocirca curatio consistit in acidorum humorum halituumque correctione ac emendatione, & in partium affectarum ab aphthis liberatione, mundatione, ac consolidatione; *testacea & pulveres absorbentes* primario indicantur, & postea leniter expurgandi sunt humores *syrupo de cichor. cum rhabarb.*

(*Remedia varia.*) „ *Mucilago sem. cydon.* (inquit *Ettmullerus*) cum succo *sempervivi majoris* subactus linimentum præbet non inconveniens pro illinendis aphthis; præ ceteris vero *succus raparum* super ignem vase tecto sine aqua assatarum expressus sine saccharo est optimus; egregium est *album grecum & spiritus sulphuris cum melle rosaceo*. In pueris aphthis laborantibus (inquit *Bonetus*) nihil est quod tam præsentaneam afferat opem, quam *oleum raparum* cum paucis saccharo. Sequens valde commendatur a *D. Boyle*, & pro tecto votis interdum respondet; 2℥ *Succi semperviv. maj. mellis opt. ana* p. æ. coq. s. ad clarificand. deinde add. *alum. rup. q. s.* ad saporem mediocriter austerum *M.* cum pluma illinentur os & guttur singulis horis vel sæpius. Anthor hoc remedium tamquam specificum venditat. *Decoctum corticis interioris ulmi cum paulo melle rosacei* est revera optimum aphthis curandis gargarisma. Non debemus in hoc affectu (inquit *Doleus*) proclives esse ad purgandum; quia facile diarrhœa sequeretur, quæ pessima est. Sed de aphthis plura alibi (1136.)

MORBI CUTANEI.

(*Scabies &c.*) Art. 1561. „ *Crusta lactea*, scabies (1178.) *Tinea* (995.) &c. sunt affectus, quibus infantes sæpius tentantur. Eruptionibus scabiosis frequenter infestari solent in variis corporis partibus, præsertim facies eorum sicca ac foedissima scabie incrustari solet. *Hildanus* monet hos effectus non temere curandos esse, sed potius naturæ aliquandiu relinquendos, nisi periclitantur partes musculosæ & nervosæ subjacentes. Usurpare licet *leniter purgantia & alterantia*; *antimonium diaphoreticum*, *æthiops minerale*, &c. sunt proficua.

Ettmulleri sententia.

(*Curatio.*) Art. 1562. Pro his affectibus internè conveniunt medicamenta *fumaria*, *tinctura coral.* *Rob. sambuci*, *diaphoretica*, *viperina*, *cinnamomum*, *antimonii*, *mercurius dulcis*. *Crusta* est *humida & manans*, vel *crassa & sicca*; in priori casu inspergendum est cum *lapide calaminari* separato, *tutia*, *ceruss. flor. sulph. camphora*, &c. In posteriori uti licet *eo amigd. dulc.* cum guttis aliquot *ol. tart. per deliquium*, vel *bals. sulph. lixiv. vulgar.* &c. est in usurpandis remediis ex *nicotiana*; *mercurius dulcis* est tutior quam reliqua mercurialia; sequens est unguentum non inelegans contra tinea, 2℥. *Litharg. ceruss. ana* ʒij. *flor. sulph. mercur. viv. ana* ʒi. *ol. ros. q. s.* Instituatür cura tinea decrescente luna. De his affectibus alibi (1178.) plura.

Head. mould-schot and Horse shoe-head.

Art. 1563. „ In catalago nostro Londinensi septimanatim morientium
 „ duo insignia morborum nomina sive titulos invenimus, viz. *Head*
 „ *mould-schot*. & *Horse-shoe-head*, quos medici scriptores neutiquam
 „ quod scio, tractarunt; plures tamen infantes his affectibus obeunt
 „ ut ex prædicto calculo constat.

Art. 1564. „ *Head mouldschot* est affectus infantulis jugiter con-
 „ tus, in quo ossum cranii margines ad futuras, maxime coronæ
 „ lem, alii super alios obvolvuntur, unde meningium fibræ tendun-
 „ tur & distrahuntur, nec non cerebrum ipsum comprimitur, & in-
 „ fantes convulsionibus non raro corripuntur.

Art. 1565. „ *Horse shoe head* est affectus in quo cranii futurae sur-
 „ nimis patentes, & spatia dehiscencia inter ossum margines interce-
 „ dunt, quæ hiulca quandoque non nisi annis aliquot suppleantur. Sa-
 „ gnum est frequenter *inbecillitatis ac brevis vitæ*. Nutrices loca a-
 „ fecta *spiritu vini vel spiritu sacchari* perfricare solent, cui nonnu-
 „ la addunt *albumen ovi & ol. palmæ*.

L U E S V E N E R E A.

Harrisi sententia.

(*Infantes quomodo curantur.*) Art. 1566. Infantes a nutricibus in-
 „ fantibus infecti, quanquam maculis, pustulis ulceribusque scatent
 „ quanquam & nocturnis illis doloribus erunt excruciat, facillime
 „ mnium restituuntur. *Farina sarsaparillæ* fere insipida, saltem nulli
 „ gustu ingrato, panatellis aut pulciculis suis, ut par est commista
 „ addito etiam ventriculi gratia *santali citrini* polline, *catharticis* debi-
 „ tis intercalatis, tenerrimæ ætati, ut late nonnunquam observavi, sa-
 „ lutem perfectam reddidit.

P H T H I R I A S I S.

Ettmulleri sententia.

(*Morbi pedicularis curatio.*) Art. 1567. Phthiriasis est morbus pe-
 „ dicularis, cui plerumque obnoxii sunt pueri: Abluatur caput cum
 „ *xivio*, in quo coctum fuit *sem. staphisagr.* & inungatur cum linime-
 „ to sequente, *℥℥. Ol. spic. ℥ij. amygd. dulc. ℥ss. unguent. nicotianæ*
 „ *℥vj.* misce; pediculi omnes interibunt spatio unius noctis.

(*Cocculus indicus.*) Art. 1568. „ Pulvis baccharum *Cocculi Indi-*
 „ „ capiti inspersus cexto certius pediculos interimit. *Condrochius* (qui p-
 „ „ culiarem de iis tractatum scripsit) millies expertum in pueris tri-
 „ „ dit hunc pulverem etiam in exigua quantitate cum adipe suilla v-
 „ „ pomo cocto & similibus permixtum, & capiti appositum egregie p-
 „ „ diculos interficere, & felicius, quam *staphidem agriam*, tutiusq-
 „ „ quam *hydrargyrum*.

(*Pediculi inguinales.*) Art. 1569. „ In adultis, pro pediculis ca-
 „ „ *crofis* inguina incolentibus necandis *sapo nigra* inuncta est remedi-
 „ „ infallibile, neque opus est ut aliud quodcunque exquiramus.
 „ *Turner lac. sublimat.* proponit; sed est medicamentum non adeo
 „ „ tum genitalibus usurpandum.

(*The Bugge.*) Art. 1570. „ Est animalculum quoddam foedissimu-
 „ „ ac maxime invisum, cujus nemo *Græcorum vel Romanorum* auth-
 „ „ rum, quod scio, meminit, nomine vernaculo a *Bugg*, civibus Lo-
 „ „ dinen-

dinentibus doloroso & venenoso morfu satis superque notum, *Ricinus*, infectio livido cruoris pleno, qui canibus, ovibus, & bobus valde inestus est, non multum dissimile est. Nescio an supradictus *Pulvis cocculi Indici* (Art. 1568.) circa spondas & stragula conspersus, hoc animalculum maxime detestandum interimeret, necne. D. *Sbarw* asseruit, quod, si locus demorsus statim cum alumine rupeo saliva soluto fricetur, virus illico suspenditur, & dolor evanescet.

C A P. XVI.

Sive Fasciculus Morborum decimus sextus.

TRACTATUS DE VENENIS.

Ex pluribus, iisque optimis scriptoribus, more nostro collatio, non sine propriis aliquot symbolis, quibusdam in locis interjectis, concinnatus.

Proœmium.) **V**itam hominum, quibus venenum aliquod illatum sit, in ancipiti esse & in angustiis versari experientia nimis frequenti satis compertum est, venenatorumque symptomata nullam pati cunctationem, sed medelam citam ac promptissimam exposcere. Ideoque ne opusculum hocce manuale in tanta rerum præcipatione ac difficultate subsidio tam necessario plane destituatur, schedulam hanc de venenis, tanquam quid desideratum, adjeci.

(*Venenum quid.*) Art. 1572. Utrum quidpiam in se & absolute venenum sit, multum ambigitur: e contra omnia venena esse, nec sine veneno quicquam existere asserere non dubitavit *Paracelsus*, dosis forma (inquit ille) facit, ut venenum sit, vel non: cibus enim vel potus quilibet quantitate majori æqua assumptus, attestante eventu, scilicet venenum fit, vel, quod ad idem redit, mortem violentam avert. Sed quum de venenis loquamur, intelligenda sunt illa, quæ in minutissima ut plurimum sui quantitate corporibus nostris insigniter nocent.

(*Veneni definitio.*) Art. 1573. Venenum in genere definiri potest, id, quod intus assumptum, vel extrinsecus admissum qualitate quadam vel agendi ratione corporibus nostris vehementer nocere aptum est: non enim est de veneni essentia, ut hominem semper interimat; sed satis est, si illum arcana quadam facultate vehementer lædat; posteriores generis sunt omnia illa, quæ in insaniam, stoliditatem vel fatuitatem inducunt, homines non penitus interficientia.

(*Venena quomodo perimunt.*) Art. 1574. Non est hujus instituti inani speculationi tempus impendere de variis venenorum modis agendi, ut litem movere, utrum venena perimant nimio calore vel frigore, varum erosione, vel humorum putrefactione, lancinante nervorum irritatione, vel vehementi spirituum animalium in furorem agitatione, &c. est enim maxima varietas. Interim tamen operæ pretium erit id adnotare, quod scribit *Sylvius*; quamvis (inquit ille) acrimonia omnis usum caloris producere videatur in partibus sensibilibus, reperiuntur tamen in nostris corporibus duo acria effervescentiam diversam proficientia, tum calidam tum calore destitutam, non tantum sensui manifestam & ideo ab invicem distinctam, sed diversis remediis cedentem. Si quis venenorum effecta & symptomata, quæ in homine so-

lent excitare attentamente consideraverit, agnoscet illa omnia ortum suum ac efficaciam debere alterutri vel utrique acri, cujus acrimonia vel patet vel latet; quoties patet veneni acrimonia, prompta est ipsius actio humorumque corruptio, sentiturque confestim ejus noxa; quoties latet, lenta & tarda est ejusdem actio, humorumque corruptio, nisi paulatim observatur ejus noxa.

(*Venenorum duo genera*) Art. 1575. Quandoquidem duobus modis corpora nostra venenis afficiuntur, nimirum ore sumptis vel extra in corpus immixtis, de utrisque seorsim agendum est, & primo de veneni ore sumptis.

(*Signa veneni sumpti*) Art. 1576. Signa veneno intus assumpto supervenientia sunt quæ sequuntur: ructus foetidi & mali saporis, mox pulsus & cordis motus insignis mutatio, virium lapsus, cordis angustia, palpitatio, lipothymia, syncope, interdum vertigo, visus obfuscatio, tremores, convulsiones, singultus, stupor, mordicatio & dolores, & quandoque erosiones ventriculi & intestinorum, sitis, urinæ suppressio, vomitus materiæ pravae, interdum & alvi profluvium, extremorum refrigeratio, sudores frigidi, linguæ intumescencia, labia tumefacta & nigricantia, ventriculi & hypochondriorum intumescencia atque extensio, interdum totum corpus intumescit & inflatur maculis passim in corpore erumpentibus, & postremo mors ipsa. Verum non omnia hæc symptomata in omnibus accidunt.

(*Prognosis*) Art. 1577. Magna est venenorum differentia; alia aliis sunt magis perniciofa, alia citius, alia tardius pro ratione quantitatis, qualitatis & reliquis eorum circumstantiis hominem enecant. Prognosis potissimum a copia & vehementia symptomatum petenda est, si idonea medicamenta statim adhibita fuerint, & ex eorum usu melius sperare habeat, de vita non est desperandum. In convalescentibus vero saepius accidit, quod a veneno maligna diathesis corpori imprimatur, quæ pertinaciter hæret, & longo post tempore sese exerit, & diuturno ac periculosos morbos parit. Opinio ista vulgaris ficta est ac falsa, quæ Indos ab usque Italos ita artem veneficam statuit calluisse, ut in statum diem aut tempus prædeterminatum, siue fuerit septimana, siue mensis, siue annus, venenatos omnes certo conficere possint: natura enim quilibet venenis huic aut altero æque totis viribus se opponit, & lethali virus reprimat aut frustratur.

(*Curatio*) Art. 1578. Quoad curationem venenorum in genere indicationes communes sunt tantum duæ, nempe ut venenum per viam per quam in corpus ingressum est, (si possibile) revocetur & expellatur & deinde ut idoneis alexipharmacis expugnetur. Ex natura & ratione alexipharmacorum & bezoardicorum, quæ magna ex parte cardiaci audiunt, proclives sumus conjecturam facere illa non proprie in venenum ipsum agere, sed saltem corpus roborare; ut ad venenum expellendum sufficiat, atque ita saltem per accidens in venenatis prodesse. Ex prædictis luculenter patet, quod danda sit opera, ut venena ore sumpta quamprimum e corpore evacuentur: atque ut id commodissime fiat per vomitum, vomitoria autem non debent esse fortiora acria aut corrosiva; sed leniora, & parata ex iis, quæ lentorem obtinent, & naturam mucilaginosam vel oleosam habent, quæ veneni acrimoniam aliquo modo obtundere possunt. In his casibus festinandum est nullaque interposita mora quæ ad manum sunt exhibenda. In hoc negotio, quod cunctationem non patitur, aqua tepida cum multo oleo permixta reliquis omnibus quocunque viribus fere æquæ pollet;

pollet; deficiente oleo butyrum ejus vices supplere potest; valent etiam juscula mucilaginosa & pingua, &c. Non autem satis est semel vomitum provocare, sed tamdiu is continuandus est, donec nulla amplius veneni in ventriculo indicia ex sapore, odore, nausea, dolore, & morfu deprehendantur. Si venenum a ventriculo ad intestina descenderit, quod sæpius accidit, iterata clysterum injectione illuenda est alvus, & e veneno emundanda; purgantia quoque lenia propinanda sunt, ut intestina superiora liberentur, conveniunt *cassia*, *manna*, *rhabarbarum* & similia; utiles sunt *emulsiones ex amygd. dulc. sem. melon. cydon. gum. Arab. &c. cum syr. de althæa*. Tandem si quæ reliquæ veneni in corpore supersint, a corde & visceribus avertendæ sunt & ad ambitum corporis pellendæ, & per sudorem evacuandæ, quod alexipharmaca itidem præstant, & omnino utile & necessarium est ab alexipharmacorum usu non statim desistere, sed ea aliquandiu continuare, donec maligna dispositio corpori impressa expugnata sit. *Tberiaca Andromachi* contra omnia venena cujuscunque generis præ reliquis quotcunque remediis optimam esse *antidotum* jure merito communi suffragio censetur; sed majori solita dosi ad drachmas duas vel tres exhibenda est (inquit D. Harris in *Pharmacolog. Antiempir.* p. 285.) ab hac vero regula interdum declinandum est; nam de opio cautione opus est, quando cum venenis narcoticis remi habeamus. Interim instituendus est conveniens victus; lac in cibo & potu a quamplurimis authoribus valde commendatur; reliqui cibi sint pingues & unctuosi; utilia sunt juscula gelatinosæ pedibus vitulinis, rasuris eboris, C. C. &c.

Art. 1579. Venenorum in specie divisio maxime naturalis a differentia corporum, quibus insunt, petenda est; existunt enim venena *vegetabilia*, *mineralia*, & *animalia*: ex his sufficiet eminentiora quædam tractare, unde ex istis exemplaribus ante oculos positis praxis de reliquis facili negotio derivari potest.

VENENA VEGETABILIA.

(*Cicuta & Aconitum*.) Art. 1580. Ex plantarum classe *cicuta & aconitum* primas obtinent, utpote apud antiquos scriptores frequentissime memoratæ. Cicutam plantam esse venenatam foliis, radicibus, & succo expresso, pluribus exemplis passim apud authores probari potest. Folia interdum errore pernicioso loco chærefolii & petroselini colliguntur, & inter acetaria devorantur, radices pro pastinacis incaute comessæ quosdam interemerunt; succum esse exitialem ex *Atheniensium* consuetudine satis constat, qui mortis sententia damnatis propinabant; ex hoc lethali pharmaco occubuisse dicitur *Socrates ille philosophorum sapientissimus*; verum enim vero quodnam fuisset istud venenum *Atticum*, an merus cicutæ succus, vel ex hoc & aliis pharmacis compositum, haud satis constat, quin in dubium vocari possit; sed hic non est disputandi locus.

(*Cicuta calida & acris*.) Art. 1581. Rationibus & experimentis deprehenditur cicutam esse calidam & acrem (quod contra universæ antiquitatis suffragium doctissimus *Wepfferus* indubitate comprobavit) suisque aculeis membranam nerveam potissimum ventriculi ferire ac fibras ejus ad violentam constrictionem irritare, unde tum ob vellicationis vehementiam, tum ob constrictionis atrocitatem maxime circa orificia ventriculi, ubi nervi insigniores disseminantur, præsidem systematis nervosi in furorem agit, unde convulsiones, &c. & cerebrum & cor in consensum rapiuntur.

(*Effectus cicutæ intus sumptæ.*) Art. 1582. Effectus cicutæ intus sumptæ sunt præcordiorum & ventriculi dolor cum sensu punitionis & ardoris ibidem; quasi temulentia aliqualis; vertigo, epilepsia cum sensuum abolitione, & mira capitis, artuum & totius corporis succussione & torsione, spalmi universales, affluxus sanguinis ex auribus, tumor pigni virilis magnitudine circa scrobiculum cordis, singultus, inanes vomendi conatus, faciei & abdominis intumescencia, fluxus spumæ viridis ex ore post mortem.

(*Curatio.*) Art. 1583. Indicationes itaque curativæ erunt cicutam quantocius ex ventriculo educendam esse, ejusque acrimoniam infringendam, ipiritus vitales consumptos a vehementia symptomatum instaurandos, aut ob motum sanguinis varium vel interceptum oppressos excitandos, labem ventriculo vel intestinis impressam, sive inflammatio sive denudatio membranae nervæ, sive exulceratio sit, emendandam, & vires laudabili victus ratione restituendas & conservandas. Cicuta brevior, tutior & certior via exturbabitur e ventriculo vomitu tempestive concitato, neque necessum est, ut vomitoris fortioribus utamur, ut ventriculum vehementer irritent & stimulent, cum jam alias ad constrictionem a cicuta pellectus sit; sufficiunt aquæ & olei tepidi largi & iterati haustus. Ad vomitum quoque in hoc casu ciendum valent juscula pingua, decoctum hordei cum oleo simplici, aqua tepida cum butyro, lac cum oleo & butyro, sincerum aut aqua dilutum, cerevisia cum oleo & butyro; oleum lini vel nucis per se nauseabunda sunt, ideoque commodiora ad vomitum facilitandum aqua tepida, lacti, decocto, hordei, cerevisiæ, aut jusculis cujuscunque generis permixta, quæ una opera cicutæ acrimoniam demulcent & obtundunt. Pergendum est in hoc opere, donec omnis cicuta e ventriculo pulsa sit. Si vero ventriculus his in expellendo adjutus voto non respondeat, & vomitus tardetur, ad fortiora vomitoria recurrendum est, ad oxymel scilliticum, sal vitrioli, decoctum cort. virid. jugland. decoctum fol. nicotianæ, &c. Dum hæc tentantur pingua enemata injiciantur & ano suppositoria intrudantur ex mele & sale coctis hier. picr. sapone sal. gem. vel alumine, &c. Clysteres enim & suppositoria motum peristalticum intestinorum sursum vergentem deorsum prolicipiant. Vix licitum est catharticum propinare nisi lenissimum. Educta ita e ventriculo & intestinis cicuta omni vel maxima parte, tum demum ad vinum generosum & alexipharmaca deveniendum est. Antidoti magnæ, Theriaca. Mithridatium, & electuarium, Orvietanum, &c. profunt, quatenus dissolvunt sanguinem & lympham alicubi stagnantes. Huc pertinent etiam aquæ cordiales dictæ, confectioes de byacinth. alkermes, lapis bezoardicus, item tinctura bezoardica, salia volatilia, mixtura simplex Paracelsi. Cum suspicio sit tunicas ventriculi aut intestinorum erosas esse, aut ulcerosas, haud consultum est cibos aromatibus condire, multo minus aceto, neque vino nimium indulgere; magis prodest decoctum hordei cum passulis, sem. anisi aut decoctum rad. chin. sassafr. &c.

(*Cicuta, ænanthe & cicutaria.*) Art. 1584. Probabile est (inquit clarissimus D. Mead) cicutam antiquorum, de qua Wepfferus tractatum edidit, fuisse nostram ænanthem cicutæ facie succo viroso, quæ cicuta vulgari multo exitiosior est. Raius vero noster, rei herbariæ peritissimus, cicutam majorem vulgarem venenum fuisse Atheniense asserit, & cicutam aquaticam, de qua Wepfferus integrum librum conscripsit, fuisse cicutariam palustrem. vid. Hist. Plant. Vol. I. p. 451. 452. Oenanthem autem cicutæ facie esse plantam ab ambobus diversam, vid. eandem

dem p. 441. Doctissimus vero laudatus author forsā conjecturam suam sustinere potest, &, per me licet, sustineat; non est mihi litigandi otium, nec animus. Interim agnoscendum est has plantas cognatas esse, nec viribus aut facie valde dissimiles.

(*Oenanthes aquat. descriptio.*) Art. 1585. *Oenanthem aquaticam* cicuta facie apud *Raium* loco citato ad hunc modum descriptam invenimus; „ *Paludapio* foliis non abſimilis est rutæ pratensi similior (non „ ſtra ſententia apio aut petroſelino similior quam *Thaliſtro*) multo „ pullulatu, virore tetro colore & facie cicuta. Caulēs bicubitales spar- „ git e radice in pares *asphodeli* albi bulbos multipartita & quasi bra- „ chiata nullius fibræ vinculo aut interventu continuos, teneros, gustu „ acres & ingratos, succo lacteo primum, deinde flavescente viroſo & „ exulcerante prægnantes. In rivulis non in ſeptentrionalibus dunta- „ xat, ſed & meridionalibus *Angliæ* provinciis copioſe provenit. „ An radices hujus plantæ ſint venenatæ & malignæ vel ſalubres *Raius* dubitat, & rem in medio relinquit ulteriori examini ſubjiciendam. Sed de earundem malignitate ſequens hiſtoria omnem tollit dubitandi anſam.

(*Hiſtoria oenanthes comeſæ.*) Art. 1586. Adtertium lapidem ab oppido ubi jam pluribus annis commoratus ſum medicinam faciens, ſeptem circiter abhinc annos, a quatuor pueris comeſæ fuerunt radices *œnanthes*, quod in hunc modum eveniebat; hi pueri hora undecima antemeridiana e ſcola alphabetica egreſſi, per prata palantes, ad ripam rivuli has radices reperiēbant, & cum candelabri fragmento, quod ad manum fuit, effodiebant; opere egregie delectabantur, & plures jam naſti aiebant alii aliis, hæ ſunt radices dauci teneræ, *ynung Carrots*, ſtatim mutuis incitamentis, non ſamis, ſed petulantis luxuriæ cauſa, illas avidè devorabant. Quid ſit? domum abeunt, ægrota-re incipiunt, quod factum fuit, celabant. Hi liberi fuerunt tres filii & una filia ex iſdem parentibus orti, patre vero tunc temporis ſolo ſuperſtite; eorum nātū minimus quartum annum nondum compleverat, & maximus nonum non attigerat; filius medius quintum, & puella ſextum aut ſeptimum agebat annum. Vagiebant, ejulabant; pater natorum aſpectu conterritus, quid mali ſit, nesciebat. Porro obtumeſcebant, vertigine corripiebantur, proni in terram cadebant, ſuperveniebant ſpaſmi horrendi cum tota ſenſuum abolitione, vomēbant omnes, puellā ſupra ac infra violenter purgata eſt, ſubinde vero in lucidis intercapedinibus edebant & bibebant. Pater lacrymans miſerabilis & ſubitaneæ natorum omnium metamorphoſi vehementer percuſus varia in animo volvebat; ſecundum vulgi opinionem incantamentis vel malis artibus admiranda hæc ſymptomata inducta fuiſſe credebat. In lucidis intervallis rogabat, nunquid comediſſent? rem nondum agnoſcunt; deinde in oculis facto ſcrutinio inventa ſunt fruſtula quædam cujuſdam radicis, hoc detecto, qui loqui potuerunt, veritatem fatentur omnes de iſthac radice eſtaſſe, unde ſtatim de veneno ſuſcepto orta eſt ſuſpicio: & extemplo nuncius cum radice ad me deſertur; forte fortuna radicem facie agnovi; ipſe autem tunc temporis alias occupatus pharmacopolam conſilio & ſubſidiis idoneis inſtructum mox demiſi, qui miſellos invenit veneno fere conſectos; nunc omnes, nunc hunc, nunc alium paroxyſmis epilepticis cum graviffimis ſpaſmis & ſpuma oris laborantes. Juſſu meo multum oleum cum aqua tepidæ crebris hauſtibus larga manu propinavit. Exantlato ita ventriculo, medicamentum, quod mihi maxime arridebat, fuit vinclura

Bezoartica, qua fretus alia ascisci fore supervacuum credidi, nisi quod iis modico vino in languoribus indulsi. Dosis tincturæ maximo natu fuit coch. iſſ. & parvulis diminuta quantitate pro ratione ætatum sexta vel octava quaque hora cum haustulo cerevisiæ; interim brodiis & lacticiiniis nutriebantur. Post 24. horas duo ex iis pristinae sanitati restituti sunt multo tamen debilitati; reliqui duo tardius convalescebant, nec ante quintam vel sextam diem excussa est veneni labe; iis *clysteres* sæpius injici curavi, & fortasse alia nonnulla remedia exhibui, quorum jam mihi excidit memoria; evasere omnes, sed non sine maxima difficultate; & jam, dum hæc scribo, vivi sunt.

(*Porcus ex esu ænanthes interfectus.*) Art. 1587. Idem paterfamilias, vir fidei integerrimæ, mihi narravit se biennio post habuisse *porcum*, qui e propugnaculis prorepens vagus per agros aberravit, & in idem pratum incidit, ubi more istorum animalium ruspantem credibile est has radices gustasse & devorasse: nam post paucas horas vehementer ægrotabat; accersebatur *veterinarius* quidam e vicinio, qui manus auxiliares porrexit, sed frustra; nam animal moriebatur convulsus spumosa ex ore saliva effluente.

(*Corona imperialis, esula, euphorbium, helleborus.*) Art. 1588. Radix bulbosa *coronæ imperialis* intus sumpta affectus fere eisdem habet ac *cicuta* attestante *Jobanne Rhodio apud Wepfferum*; ideoque eandem exigit medendi methodum. *Esula* sive *tithymali* quoque fere omnes sunt acres & maligni, intro assumpti violenter admodum purgant, ventriculum & intestina excoriant, adurendi vim obtinent, & *cicutæ* viribus perniciosius propemodum æquipollent. De *Euphorbio* & *Helleboro* idem dicendum est, si in nimia quantitate exhibeantur, & etiam quibusdam aliis pharmacis emeticis & catharticis usu vulgari nimis frequenter adhibitis.

(*Aconitum sive napellus.*) Art. 1589. Quod *aconitum* sive *napellus* a tota substantia sua summum sit venenum & perniciosum in necandis hominibus & quadrupedibus, ut vix etiam approbatissimis *antidotis* succurri possit, nisi confectum applicentur præsidia, ex sententia medicorum fere omnium notum est. *Napellus* in jugis montium *Alpinorum* nutritus vires admodum noxias obtinet, adeo ut inter venena vegetabilia jure merito princeps censeatur, delatus vero in hortos in locis humidioribus malignitatem magna ex parte deponit.

(*Effectus intus sumpti.*) Art. 1590. Symptomata ab assumpto *Napello* sunt quæ sequuntur, intumescencia labiorum, linguæ & totius faciei, oculorum prominentia, pectoris gravitas, compressiones cordis, tremor partium, vertigines, syncopes, horror, mania, & lethargus, quæ omnia accidunt, & si intoxicatus evaserit, febre hectica tamen miser corripitur.

(*Curatio.*) Art. 1591. De remediis adversus perniciosum hoc venenum (veneno ipso prius vomitione reddito & reliquis de curando veneno in genere (1578.) recte observatis) commendatur radix *contrayerv. a. ʒj. ad ʒi. cum Theriaca vel Mithridatio* exhibita. Sunt qui succum *Raphani* intus sumptum tanquam certissimum remedium decantant; plurimum prodesse aliqui volunt *lapidem bezoar. orient.* ex *Matthioli experimento in duobus reis comprobato, lib. iv. cap. 73. in Dioscorid.*

(*Coccula officinarum.*) Art. 1592. *Cocculæ* officinarum sive *baccæ coci Indici* inter venena merito numerantur; in bestiis etenim (ex experimentis *Wepfferi* constat) symptomata invasionis ordine & sævitia non disparia iis quæ *cicuta aquatica* in hominibus efficit; certum est iis in-

esse vim deleteriam impense irritantem *belleboro albo* similem. Quamobrem qualis sit medendi methodus ab hoc veneno assumpto supra in sectione de *cicuta* (1583.) percipienda sit.

(*Taxus.*) Art. 1593. *Taxus* arbor foliis, succo, & baccis, hominibus & jumentis lethalis est. Hoc veneno infecti frigus in toto corpore percipiunt, strangulationis metum incurrunt, & alvi profluvium dysentericum patiuntur, & plerumque repentina morte moriuntur. Facta per vomitum necessaria evacuatione propinandum est vinum generosum in quo infusa sunt *folia absynthii, flores rorismarini, rad. zedoarie, serpent. virgin. sem. cardamom. cum aliis aromatibus*. Ad febrem & alvi profluvium conducunt *terra sigillata, bolus Armenus, lapis bezoar. coral. rub. rad. tormentill. &c.*

(*Opium.*) Art. 1594. *Opium*, quod vi sua polychresta, nunquam satis laudata, qua & somni nobis dulcedinem conciliat, & doloris suave lenimen præstat, & quævis in republica nostra microcosmica turbata pacatiora reddit, in dosi plus justo exhibitum venenum evadere nemini non notum est, in quantum verissimum est, quod etiamsi illius facies una sit *Angelica*, altera tamen sit *Diabolica*; quamobrem prudentia summa & maxima cautela in opiatibus exhibendis omnino requiruntur; eorum usus promiscuus & profusus *cane pejus & angue* vitandus est. *Narcotica* enim, quæ stuporem sensui inferunt, non temere in usum ducenda sunt, nec nisi in vehementissimis doloribus, ubi vires dolorum acerbitate concidunt, ut cessantibus doloribus vires recolligant. Adulatoris est medici, aut auram popularem captantis ea ob levissimam aliquam causam nimis frequenter & manu supra modum liberali propinare. Sed hoc obiter dictum sit; de opio veneno dicturus sum.

(*Effectus opii in nimia quantitate.*) Art. 1595. Effectus opii in nimia quantitate sumpti sunt, qui sequuntur, ardor ventriculi, ponderis sensus ibidem, alacritas aliqualis in initio cum risu *Sardonico*, partium omnium relaxatio ac debilitas, mentis alienatio, memoriæ lapsus, oculorum obfuscatio ex tunicarum relaxatione variis coloribus coram oculis apparentibus, ipsa cæcitas, linguæ balbuties, sopor, pulsus rarus, efflorescens faciei rubor, maxillæ inferioris laxitas, labiorum intumescencia, spirandi difficultas, furor & mania, salacitas, cuti pruritus vehemens, nausea, vertigo, affectiones comatosæ, apoplecticæ, vomitus, singultus, pulsus turbatus, spasmi, sudores frigidi, syncopes, & lipothymia, expiratio frigida, mors. Omnia hæc symptomata in omnibus vix occurrunt, sed quædam in his, quædam in aliis pro diversitate constitutionum, pharmaci quantitatis, &c.

(*Curatio.*) Art. 1596. Curatio in hoc primario consistit, ut (quod in omnibus venenis faciendum) vomitus provocetur, at, si ad intestina jam penetraverit venenum, clysteres acriores injiciantur, ac demum dosis cremoris tartari propinetur. Et postea *opii antidoti* exhibeantur, inter quas *salia lixivialia* aliis supereminet, ut & *sapo albus vel potius tartareus*, si comparari possit. Commendatur haustus *vini veteris vel spiritus vini cum vitello ovi* ad noxiam resinam, opii partem perniciosissimam, ventriculo adhærentem subigendam. Postremo ad medicamenta acida deveniendum est; excitandus est æger omni arte, & se labore aliquo exerceat; aeri frigido se nondum exponat; immo in graviore casu commendatur *immersio in aqua frigida*.

(*Hyoscyamus.*) Art. 1597. *Hyoscyamus* niger vulgaris est planta soporifera & venenosa odore foetido facile se prodens. Ex esu *radicis*,
fo-

foliorum, vel *seminum* oriuntur symptomata sequentia, ariditas faucium & linguæ; artuum stupefactio, spirituum languor, pruritus universalis, mentis alienatio, vociferatio, delirium, vertigo, visus depravatio aut abolitio, dyspnœa, suffocatio. Quoad curam vid. opium, Art. præcedenti.

(*Solanum*.) Art. 1598. *Solanum* lethale, *Bella Donna*, est planta maligna & stupefaciens; illius baccae quandoque a pueris incaute comeduntur, quas vocant *cerasa sylvestria*: symptomata ex his comestis sunt sitis intensa, raucitas, cardialgia, sopor gravis, cæcitas, mentis alienatio, delirium, hypochondriorum tensio, convulsiones, affectus apoplectici, mors.

(*Mandragora* & *coriandrum*.) Art. 1599. Eiusdem commatis *narcotici* est *Mandragora*, ut etiam *coriandrum*, sicut a quibusdam affirmatur; sed de hoc haud satis convenit inter *Botanicos* & *Medicos*.

(*Nux vomica*.) Art. 1600. *Nux vomica* *narcotica* est & *virulenta*, ea utuntur ad canes & feles interimendos: hæc animalia *nux vomica* devorata intra paucas horas convulsi moriuntur. Neque dubitandum est quin eisdem in homine haberet effectus. *Avibus* certe non minus perniciosam esse ex frequenti nostratium experientia constat qui ejus pulvere carnibus insperso corvos, cornices, aliasque aves noxias inficere & perdere solent. Vide opium quoad curam. (1596.)

(*Plantæ narcotice*.) Art. 1601. Hæ plantæ *narcotice* ultimo recitatae naturæ fere ejusdem cum opio sunt quoad malignitatis speciem & operandi modum: ideoque non opus est hisce diutius immorari, sed brevitatibus causa remittendus est lector ad sectionem de opio. (Art. 1595.)

(*Fungi*.) Art. 1602. *Fungi* sunt infimum & ignobilissimum vegetabilium genus, quorum etsi aliqui simpliciter venenati sunt, & in cibum non veniunt, alii tamen a nimis delicatulis edules sunt: omnes facile nocere possunt, ut non sine causa *Seneca* fungos voluptuarium venenum nominaverit, & *Plinius* cibum *ancipitem* illos dixerit. *Athanasius Kircherus* in lib. de peste hæc habet; *Fungus*, qualiscunque sit, semper malignus est, semper exitiale, qualitatibus apparatus instructus: & si non statim sentiatur, frequenter tamen comesus nescio quid successu temporis occultæ machinationis interiore viscerum administratione molitur. Apagete ergo perniciofa isthæc gulæ blandimenta. Quæ tanta voluptas ancipitis cibi? An usque adeo vitæ tadet, ut eam tam vili offa permitemus, mortemque semper in procinctu stantem ultro sollicitemus? ita vitam nostram, quam non accepimus, facimus brevem, nec inopes ejus sed prodigi sumus.

(*Effectus fungorum*.) Art. 1603. *Fungi* (præcipue species venenatae) comesti sensum suffocationis & strangulationis in faucibus inducunt, ventriculum inflant, singultum excitant, cholera morbum producunt, interdum epilepsiam, syncopen, sudorem frigidum, somnum profundum, &c. immo mortem ipsam, sicut ex plurimis historiis in authoribus fide dignis videre licet.

(*Historia*.) Ego ipse ex improvise imprudenti esu fungorum aliquando in diarrhoeam mali moris incidi cum gravissimo Tenesmo, & perpetuo mejendi desiderio, quod Tenesmus vesicæ urinariæ appellari potest. Diarrhoeam naturæ prius reliquendam esse, causam ejusdem tunc temporis ignorans judicavi (nulla enim aderat nausea vel ventriculi gravamen) quam die 3. malo persistente & crescente de esu fungorum animo revolventi cogitabam. Quocirca dosin rhababari masticaui, ex

qua tamen nullum juvamen accepi. Die 4. ingravescente morbo cum insigni virium jactura, nec non aliquali affectu virginesco, & anæxcoriatione dolorifica vesperi emeticum ex infuso *radicis ipecacuanæ* propinavi, ex quo ter vel quater evomui, & deinde hora decubitus dosim *Confectionis Fracastorii* deglutivi, unde feliciter omnino liberatus sum.

(*Curatio.*) *Art. 1604.* Quoad curationem, fungi (si fieri possit) statim vomitu rejiciendi sunt, & reliqua de veneno in genere curando jam dicta probe observanda. *Salia lixivialia* ægros mirabiliter juvant, speciatim *lixivium ex cineribus sarmentorum vitis*. Contra nocumenta fungorum nil præstantius invenitur quam *Theriaca Andromachi cum oxymelite simpl. vel scillitic. gallinarum finum duntaxat candidum decoctum mulso venena fungorum boletorumque astringit ex Plinio, Lister de Humoribus p. 392.*

V E N E N A M I N E R A L I A.

(*Venena mineralia.*) *Art. 1605.* Postquam de venenis e plantis, lectio- nibus præcedentibus actum est, proximo loco per eminentiora quædam venena in classe *mineralium tum naturalium tum arte factorum* percur- rendum est; ac primo de arsenico.

(*Arsenicum.*) *Art. 1606.* Arsenicum primi subfellii esse venenum lip- pis & tonsoribus notum est; duplex est, nativum, & factitium: nati- vum iterum est duplex, nempe, *auripigmentum*, seu *arsenicum aureum, citrinum & sandaracha*, seu *arsenicum rubrum*: factitium itidem du- plex ex his per sublimationem conficitur, alterum ex auripigmento, & appellatur *arsenicum album crystallinum*, alterum ex sandaracha, & vocatur simpliciter *arsenicum*. Intra corpus assumpta alterutra arseni- ci species eadem fere gravissima symptomata insert: sandaracha ta- men mitior est auripigmento, auripigmentum arsenico albo crystalli- no: quod omnium est perniciosissimum.

(*Effectus intus sumpti.*) *Art. 1607.* Arsenicum intra corpus admis- sum virulentiam suam primum exerit pungendo, vellicando, irritan- do, urendo: unde ventriculi ardor & dolor atrocissimus, intestinorum cruciatus vehementissimus, vomitus, sitis inextinguibilis, linguæ, fau- cium, & gulæ ariditas & asperitas, singultus; sequuntur anxietates gra- vissimæ, cordis palpitatio, lypothymia, extremorum frigus, superv- niunt interdum vomitus & dejectiones nigrae, foetidae, cadaverosae, ven- triculi & intestinorum gangrana aut sphacelus, postremo mors violenta.

(*Curatio.*) *Art. 1608.* Quoad curationem, præmissis universalibus *ἀνακατα* evacuantibus, quemadmodum in curatione venenorum in genere jam dictum est (1578.) hic valde conferunt diluentia, oleosa, mucilaginosa, &c. Insuper ex observatione *Wepfferi* constat *bezoarti- cum minerale cum butyro permixtum* acrimoniam hujus veneni infrin- gere.

(*Inunctio.*) *Art. 1609.* Inunctio ejus externa est etiam valde pe- riculosa & perniciosa: extant etenim historiae in scriptoribus medicis nonnullorum, qui unguento, cui arsenicum commixtum est, sese ille- verunt, extinctorum, aliorum insanientium, aliorum perpetuo clau- dicantium, &c.

(*Argentum vivum.*) *Art. 1610.* Argentum vivum in venenorum nu- merum vix referendum est; notum est enim, quod in quibusdam ca- sibus innoxie hauriatur ad aliquot uncias: peioris vero pernicipiei mul- toties existit ejus usus externus, ut videre est in iis, qui in Luc
Vene-

Venerea vel scabie *unguentis mercurialibus* utuntur; quamplurimis exitio inopinato fuit; tremorem, stuporem, paralyfin, claudicationem perpetuam, &c. intulit, aliis pravam corporis diathesin vix unquam sanabilem produxit.

(*Historia.* Novi quendam, qui scabie laborans curandi gratia *cingulum mercurialem* circa lumbos adhibuit; partes omnes infra cingulum stupebant, & paralyticæ evasere: pro illo restituendo variæ methodi incassum tentatæ fuerunt; tandem ad *Thermas Bathonienses* missus est, sed reducem parum in melius mutatum, irritis omnibus aliis, *salivatione mercurio excitata* & decocto e lignis a morbo penitus liberavi.

(*Mercurius præcipitatus & sublimatus.*) Art. 1611. Tametsi argentum vivum virulentum non sit, nonnulla tamen ex illo præparata sunt maxime venenosa, ut *mercurius præcipitatus varius*; ast omnium gravissima symptomata & damna infert *mercurius sublimatus corrosivus* intus sumptus; suo contactu instar ignis adurentis omnia corrumpit; hinc si sumptus sit, statim lingua & fauces vehementer exasperantur; oriuntur dolores ventriculi tormentosi cum abdominis distentione, vomitus vehementissimi cum maximo nixu, ejicitur materia mucosa, spumea, interdum cruenta, istiusmodi quoque sunt dejectiones alvinæ, quæ frequentes sunt cum doloribus acerbissimis, adest sitis ardentissima, infatiabilis, accidit gravissima inflammatio ac intumescencia linguæ ac faucium; superveniunt deliquia, sudores frigidi, tremores, convulsiones; brevi ventriculo & intestinis grangrænam patientibus æger dicto citius obitu miserabili cadit.

(*Curatio.*) Art. 1612. Proh dolor! tam ingenti malo haud datur *par remedium*. Basis curæ in summa festinatione maxime fundatur; quod factum opus est omni procrastinatione sublata suscipiendum est; quantum præstare possumus, adnitendum est, ut ventriculus a veneno vomitione provocata liberetur. Non est vir fortis, cui animus non crescit in ipsa rerum difficultate. Armamenta, quæ præ manibus præsto sunt usurpanda. Quid vulgarius oleo, butyro, & aqua tepida, quibus raro pauperum casæ carent; attamen & hæc præstantissima sunt ad muniendas partes internas contra veneni aculeos; hæc si quæ alia hostis exturbationem citissimam promovent, hæc demulcent, hæc denique magnis *Antidotis* viam sternunt, illarum usum tutiorem efficiunt, ut venenosa labes impressa emendetur. Extra corpus nostrum vidimus in præcipitatione magisteriorum per oleum tartari a corporibus solutis omnem vim corrosivam tolli, unde sperare licet *oleum tartari per deliquium*, vel *sal tartari*, vel *absynthii*, & similia *salia fixa alcalia & lixivialia* ad virulentiam hujus veneni domandam aliquid præstare posse; & revera opem præstant ultra omnia alia *antidota*; quæ hætenus novimus, quod enim scribunt de viribus *crystalli*, & *similibus*, ego illis vix fidem habeo.

Art. 1613. Sublimatum corrosivum vel aliud quodvis venenum intra ventriculum admissum statim emetico aliquo propinato ejiciendum est (inquit D. Shaw) ideoque *æruginem æris ad gr. i. vel ij.* exhiberi suadeo; quoniam promptissime ac sine mora operabitur: hoc vero esset venenum ingerere ad aliud expellendum; quod tamen quibusdam fortasse minus incongruum videatur; clavus enim clavo pellitur, & ignis igne expellitur; sed ego malim *tutioribus remediis* malum aggredi. De *Ærugine æris* proximo articulo.

(*Æs viride & ex antimonio male præparatum.*) Art. 1614. *Æs viride* intra corpus sumptum perniciosissimum est venenum, & etiam nonnulla ex an-

Simonio male preparata sunt aque virulenta. Hæc sunt ejusdem fere naturæ cum arsenico, licet gradu paulo inferiori, similiaque symptomata excitare solent; eandemque itaque curationis methodum requirunt; ideoque non opus est ut de his singulatim differam.

(*Spiritus acidi aq. fortis &c.*) Art. 1615. Spiritus acidi, ut *aqua fortis*, *spiritus nitri*, *spiritus & oleum vitrioli & similia* vulgo venena audiunt; verum quicquid præstant, potius corrosione quam venenositate facere videntur. Per imprudentiam vel errorem quandocunque in ventriculum dimittantur, statim instar ignis faucium & linguæ, ventriculi ac intestinorum tunicas cum diris cruciatibus erodunt, & suffocationem instantaneam minantur, & hominem in extremum vitæ periculum conjiciunt.

(*Curatio.*) Art. 1616. Cito ac mature idonea auxilia adhiberi debent, lenientia & viscida opem ferunt, item pingua, oleosa, & mucilaginosa plurimum valent, privatim *mucilago seminum cydoniorum*, *gum. tragacanth.* &c. magnam utilitatem præstant. Sumptis venenis erodentibus (inquit *Montanus*) non est præstantius remedium *lacte bovino*, si bibatur in magna quantitate ad exigentiam sitis, quia semper sequitur sitis ingens tali sumpto veneno; hic quoque *salia fixa* corrosiōnem minuunt, ut & *pulveres testacei* &c.

(*Lithargyrum, cerussa & minium.*) Art. 1617. Sunt etiam *recremata quædam metallica ex plumbo, & alia ex illo factitia*, quæ inter venena numerantur, viz. *Lithargyrum utrumque, cerussa & minium*: hæc vires *Arsenici* quodammodo æmulantur, sed non adeo exitiosas possident. Qui hæc venena sumpserunt, eodem modo curandi sunt, ac ii qui ipsum *Arsenicum* hauserunt. (1608)

V E N E N A A N I M A L I A .

(*Venena animalia.*) Art. 1618. Restant jam venena, quæ venenosa animalia homini communicant, tractanda: atque hæc *ex morfu, ictu, vel ipsorum esu* corporibus nostris nocumento sunt.

(*Serpentes & angues.*) Art. 1619. E venenosorum animalium numero *serpentes* imprimis sunt. In omnibus cujuscunque generis serpentum sive anguium, sive viperarum moribus virus morsus tempore in vulnus infunditur, unde funesta omnia symptomata consequentia excitantur. Authores venenum *viperæ* inter ea quæ, statim enecant, & ea quæ tardius interimunt, medium esse constituunt. Ideoque pro exemplo reliquorum istius generis sit *vipera*.

(*Vipera.*) Art. 1620. Vipera est animal *viviparum*, reliqui serpentes sunt *ovipari*. Demorfi nonnunquam septem horarum spatio, interdum non ante tertium diem intereunt. Viperæ plurimum iratæ, & tempore æstivo sunt magis lethales, item in regionibus calidioribus sunt magis nocivæ, quam in frigidioribus, quod omnino verum est *de omnibus serpentum & anguium generibus*. Culter anatomicus detexit liquorē quendam subflavum a viperarum sanguine fecerni glandulis duabus conglomeratis, parte anteriore sincipitis locatis, ex diversis aliis minoribus conflatis, quæ communi membrana teguntur quorum singulæ vas excretorium exhibent, quæ vasa se uniendo ductum formant ad radices dentium incisorum perforatorum decurrentem; ibique in vesicula liquidum hoc deponunt, vix guttulam quantitate superans, constat *ex microscopica observatione* *Clax. D. Mead* partibus salinis egregie minutis, quasi spiculorum instar hoc liquidum scaturire.

(*Symptomata morsum viperæ consequentia.*) Art. 1621. Symptomata morsum viperæ consequentia sunt dolor acutus & punctorius in loco vulnerato, tumorque primo ruber & postea livescens, sensim in partes vicinas latius serpens; cutis æstuat erumpentibus vesiculis; progressu temporis supervenit insignis languor, pulsus celer, debilis, & quandoque intermittens; cordis palpitatio, sensuum stupefactio, præcordiorum anxietas, ventriculi ægritudo summa cum vomitu bilioso, oculorum hebetudo, interdum dolores circa umbilicum, vel circa hepatis regionem, respiratio difficilis, singultus, tremores, convulsiones, sudores gelidi, extremorum frigus, mors ipsa tragoediâ claudens, nisi malo remediis succurratur, vel peculiaris vulnerati vigor, & innatum robur venenum vincant. Si demorsus superstes sit, tumor cum inflammatione aliquandiu manet; interdum sanies e vulnuscule manat, & pustulæ quædam circa idem herpetis exedentis ad instar erumpunt; cutis universa flavescit, tanquam in ictericis.

(*Curatio generalis & particularis.*) Art. 1622. Venenorum extra in corpus admissorum curandi ratio a tribus potissimum indicationibus pendet; primo ut venenum statim extrahatur; secundo ut inhibeatur, ne ad interiora serpat; & tertio ut si quid veneni jam in arterias & venas penetraverit, alexipharmacis expugnetur, eodem plane modo ac in venenis ore sumptis. Id quod habet *Celsus* de serpentum morfu, quicquid fuit in præxi antiquorum, complectitur; imprimis (*inquit ille*) membrum supra vulnus deligandum est, non tamen nimium vehementer, ne torpeat; dein venenum extrahendum est *cucurbitula* applicata facta prius scarificatione profunda, vel alterius hominis in ore ulcus non habentis exsuctione; venena enim serpentum non gustu sed in vulnere nocent (*sed ab hoc experimento sanos cavere sùadeo*) neque alienum est circa vulnus scalpello incidere. „ Plaga postea *spiritu vini in quo Theriaca vel Mithridatum dissolutum sit*, abluenda est. Vivum etiam gallinaceum pullum per medium divisum vulnere imponere proficit; huc etiam facit hœdi agnive caro calida loco vulnerato applicata. Necessarium est quoque demorsum exsorbere potionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quod calori movendo par est, nec humorem intus coire patitur: nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt. Quoad praxin recentiorum animadvertendum est, quod testatur *Boyleus*, scilicet, quod si statim a morfu paulo eminus a parte *ferrum bene ignitum* teneatur, venenum adeo enervat, ut demorsum sospitem & incolumem conservet, ne quid mali nisi dolorem in parte cito evanescentem patiatur: longe vero melius & tutius videtur quod alii docent, locum profunde exurere *cauterio actuali*. Sed præ omnibus quotcunque *axungiam viperinam* vulnere affrictam (modo extemplo fiat) esse præsentaneum remedium sine ulla internorum ope quam plurimis experimentis constat; sed quoniam hæc axungia non semper in promptu sit, & virus celeriter transiens massam sanguineam contaminare possit, topicis aliis appropriatis, quæ præ manibus sunt non neglectis remedia interna quam ocissime exhibenda sunt, inter quæ instar omnium eminet *sal viperarum*, quod agro in lecto decumbenti sufficienti quantitate datum, & aliquoties repetitum ad levem sudorem suscitandum sine alio auxilio curam absolvit. Quæ veneno in genere adversantur, hic conferunt; ut *Cardiaca, bezoartica, Theriacalia, alexiteria*, &c. Generale *Antitoxicon prophylacticum* nullum omnino hætenus cognoscitur, quin & repugnat tale esse.

(*Aspis.*) Art. 1623. *Aspis* omnium serpentum est longe vehementissimus; tam exiguum infligit vulnus, ut omnem fere oculorum aciem effugiat, vix puncturam acus æquans, per illud tamen tantæ perniciæ venenum infundit, quod intra paucas horas totum corpus pervadit, hominemque citissime e medio tollit, nec tamen dolorem multum infert, sed supervenit capitis gravitas, oculorum caligo, sensuum hebetudo, stupor, segnities, somnolentia, faciei pallor, corporis refrigeratio, crebræ oscitationes, spasmi, & tandem, nisi cito succurratur, *trium horarum spatio ipsa mors.* Ab *Aspide* demorsi eodem modo curantur, ac a vipera, vel aliis serpentibus læsi.

(*Aranei.*) Art. 1624. Araneorum licet plures species reperiuntur, alii aliis venenosiores, omnes tamen uno eodemque modo nocent, viz. *ictu* per vulnusculum venenum in corpus infundunt, vel *in esculenta vel potulenta* illapsi & ingesti hominem lædunt, in parte demorsa stupor cum frigoris sensu & horrore, ventris intumescencia, flatus in intestinis, faciei pallor, lacrymæ involuntariæ, partium extremarum tremor, & affectiones spasmodicæ, sudor frigidus, perpetua & vana mingendi cupiditas, membri virilis tensio.

(*Curatio.*) Art. 1625. Ad ictum araneorum eadem observanda est methodus ac in moribus aliorum animalium venenatorum; privatim autem plane admirandæ sunt vires *foliorum ficus* ad hoc venenum domandum; si icti statim lac ex foliis manans bis aut ter in vulnus instillent, venenum omnino extinguit, & dolores tollit, & reliquorum symptomatum ingruentium occasionem præscindit. Ad *araneos deglutitos* propinandum est vomitorium sicut in aliis venenis intra corpus sumptis, neque omittenda sunt alexipharmaca ordinaria, speciatim vero *resina abietis sicca* multum præstare dicitur; commendatur etiam *allium* frequenter comestum, vinumque aromatizatum &c.

(*Scorpionis ictus.*) Art. 1626. Ab ictu scorpionis acerbissimus dolor non solum in parte affecta, sed & in toto corpore sentitur; locus vulneratus inflammatur & tumet, circa plagam emergunt pustulæ; adest tremor, pallor, frigidus, singultus, vomitiones &c.

(*Curatio.*) Art. 1627. Ad scorpionis ictum *scorpio ipse* est pulcherri-
mum medicamentum (inquit *Celsus*;) quidam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt; quidam super prunas eo imposito vulnus suffumigant, & carbonem ejus super vulnus deligant; quidam *allium cum ruta mistum oleoque contritum* adhibent. Sed præ reliquis externis, quemadmodum *axungia*, viperina morsum viperæ sanat, ita *oleum scorpionum* eorundem ictui medetur. Interna eadem sunt ac in aliis venenatorum animalium moribus.

(*Bufo.*) Art. 1628. Bufo sive rubeta est animal veneno plenum, ut non immerito *terrestriis toxicis & contagiosæ virulentie bursa* appelletur. Maximo in hominem odio est bufo, & vicissim in bufonem homo. Et si bufones dentibus careant, gingivis tamen, quas perduras & scabras habent, partem cui adhæserint, sic recte constringunt, ut venenum suum in partem indeque totum corpus per constrictæ partis poros adigant. Venenositas *bufonum* non videtur in alio consistere, quam vel in eorum furore, vel in eorum excrementis, speciatim *urina* acri caustico volatili sale imprægnata; quam acrimoniam obtinere videtur ex alimentis, nempe minutulis istis *scarabæis*, qui in eorum ventriculo & collo reperiuntur: bufones enim mortui omni veneno carere dicuntur. Venenum suum mictu, saliva & vomitu,

in herbas eructant, præsertim vero in *fraga*, quæ vehementer appetescuntur. Bufonum venenum non modo intus ingestum perniciosum, sed etiam *cuti aspersum*, nisi locus statim urina vel aqua salia abluitur.

(*Bufonis veneni effectus & curatio.*) Art. 1629. Admisso bufonis veneno æri flavescent, toto corpore intumescunt, labris linguaque nigricantibus balbutiunt, dyspnœa asthmatica corripuntur, vomitu, sudore frigido, vertigine, convulsione, syncope, & tandem morte prehenduntur. Ideoque procurare vomitum quamprimum medicum oportebit, præsertim si venenum ore sumptum fuerit, *clysterem* injicere, veneni vim omnibus alexiteriis calidis & attenuantibus infringere, ut *Thebriaca & Mithridato in vino generoso dissolutis*; tandem vero balneis æstuariis, & valido multoque exercitio ipsum digerere.

(*Cantharides.*) Art. 1630. Cantharides extra corpori applicatæ interdum vesicæ nocent, stranguriam faciunt, immo sanguinis mictionem excitant. Intus sumptæ omnes fere ab ore ad anum usque humani corporis partes internas arrodunt, inflammant, atque exulcerant, unde febris ardens; in ore resinæ cedri vel pini sapor percipitur, imprimis verò partibus urinæ dicatis sua natura insensæ sunt, unde in illis ardorem inflammatorium, excoriationem, penis continuam erectionem, cruentam & dolorificam stranguriam, vel omnimodam ischuriam excitant, quæ tandem vasorum urinariorum gangræna & ipsa mors consequuntur.

(*Curatio.*) Art. 1631. Ad curam primo loco opera danda est, ut *Cantharides* e corpore quamprimum ejiciantur, idque per vomitorium cum aqua tepida vel jure pingui; *clysteres* quoque ex diluentibus & oleosis injiciendi sunt; ad acrimoniam etiam obtundendam æger copiose bibat *lacticia*, *emulsiones*, *oleosa*, & *mucilaginosas*; commendatur etiam *terra Lemniæ*, & præ omnibus aliis (attestante D. Gronvelt) *camphora*.

(*Venena mechanica.*) Art. 1632. Pulvis *adamantis*, *crystalli*, *vitri*, *metallorum variorum limaturæ*, & similia dici possunt *venena mechanica*, quæ intra corpus admissa, quasi tot *cultelli*, viscera lancinant & incidunt; atque ita mortem vel subitanam vel lentiores inducunt, artemque nostram illudunt.

(*Venena distillatoria.*) Art. 1633. Superest adhuc alia venenorum familia, nimirum *spiritus vinosi & potus inebriantes stillatitii*, horum enim nimis frequens & profusa ingurgitatio (uti pessima consuetudo obtinet) tot hominum *Myriades*, quot sunt in cælo *stellæ*, trucidavit; immo plures *decies centenis millibus* ex hoc quam ab omnibus reliquis quocunque venenis occubere, minime dubitandum est; unde hoc malum perniciosissimum vocare soleo κατ' ἔξοχην *The Harm*, jocose an serio dicam. Quamplurimis non tantum morbos gravissimos parit, sed aliquando etiam quibudam ipsam mortem subito affert, quo nomine, si non *veneni* appellationem mereatur, quo alio id possit, ego saltem assequi vel conjicere nequeo. (vid. Art. 1572. 1573.) Spiritus vini intus sumptum omnibus fere animantibus vitam adimit; immo vegetabilibus quibuscunque more pabuli exhibitus, ne parente vite exempta, mortem inserit.

(*Malum vix curabile.*) Art. 1634. Ingratum onus medicis generosis incumbit. Istiusmodi spirituum ardentium belluones noctes atque dies juxta suum cacoethes detestabile ignem liquidum perpetuo pitissantes, quum coctiones omnes deleverunt, solida universa enervarunt, & liquida corruerunt; cum fabrica jamjam diu vacillans collapsura est,

est, nostram opem petunt. Quid fit? *Scabinorum* munere fungendum est; & forte fortuna exantlatione peracta & lasanis ac scaphis in sentinam decapulatis, & labe quodammodo refarcita rursus actum acere statim satagunt, & ut canis immundus vel amica luto sus, ad sordem & illuviem se protinus recipiunt; atque ita vitæ suæ non inopes sed prodigi, quam non acceperunt illam faciunt brevem. Quid faciamus *Medici*, vel quid faciant *Theologi*? medicamenta nihil valere possunt, & consiliis auscultare nolunt. Omnia incassum erunt, in impii veneni amplexus ruunt, stupidi & obcæcati evadunt, rationibus & consiliis *Marpessæ cautibus* surdiores; in æternum sitiunt, & sitientes bibunt quasi *dipsade mors*, & quo plus potæ plus sitiuntur aquæ, *aque istæ stillatitiæ mortifera*, quibuscum, qua testinatione possunt, scenam claudunt in ipso mortis articulo *lagenam exposcentes*. Proh Dolor!

(*Encomium temperantiæ.*) Art. 1635. O beatam temperantiam! nunquam satis laudandam, nunquam satis admirandam! primævæ ætatis, quam fecisti auream, decus & tutamen! tui ipsius suadelam utique & pretium, lætis aliquando *Saturni* temporibus visam! puris piisque animis in omni ævo cultam usque & colendam. Tu es, si quod uspiam in terris, *verum Archæi sedativum*, & conservatrix mentis sanæ in corpore sano. Tu recta deducis tui cultores ad longam & jucundam senectutem vultu placido & juvenili, grato & amabili. Tu demique tui ipsius inimicorum laudibus ornaris, & amabilis etiam ab ipsis diceris, quibus, te imprudentissime repudiata, manet *Satyrici maledictio*; ut, *virtutem hanc videant intabelcantque relicta*.

JUDICIUM DE DEFUNCTO VENENATO.

(*Judicium de defuncto Venenato.*) Art. 1636. Adumbratis sic pro instituti ratione venenorum (præcipuorum saltem) natura, agendi modo, & medendi methodo; operæ pretium erit paucis attingere, *quomodo Medicus suum iudicium ferat*, si quando vocatus fuerit ad defuncti cadaver inspiciendum, ubi ex repentina morte & aliis circumstantiis de veneno clanculum dato inciderit suspicio. Hoc autem ex supradictis magna ex parte ediscendum est, si ad singula venenorum genera probe attendatur. Testimonia eminentiora hominis veneno corrosivo metallico vel vegetabili enecati, sunt quæ sequuntur, *externus superficiali tumor, maculaque nigra, fusca vel livida, linguae tumor nigricans, unguis nigri, vel lutei, facile labentes, capillorum spontaneus manipularisque casus*. In aperto cadavere *viscerum livor, colorque citrinus, vel nigredo, ventriculi ac intestinorum gangrena & sphaceli*; hæc sunt manifesta veneni indicia, si adfuerint signa antegressa, nimirum *vomitibus, alvi defectionibus cruentæ, urinae ardores, oscitationes, convulsionibus, syncope, sudores frigidi, palpitatio cordis, obmutescencia, & alia id genus dira symptomata in superioribus passim enumerata*. Narcotica & opiata (quantum ego scio) nullum omnino externum sui signum relinquunt, præter *horridum oculorum obtutum*; signa antegressa in Art. 1595. recensentur. Sed in iudicio ferendo ex signis supradictis summam inter prudentiam & edicendi parsimoniam medicus versari necessum habeat: namque ea omnia indicia, quæ ex erosio forte per venenam visceribus colligi poterit, ex humore acri intra ipsum hominem generato fieri queunt. Consultius proinde erit, reum, nullo certo ipsam convincente argumento, accusati criminis absolvere, quam infonem morti adjudicare, quod jura divina & humana voluisse patet: dantur tamen interdum casus tam extra dubium positi, ut alia ratione iudicandum esse necesse sit.

E P I L O G U S.

ATQUE jam tandem ventum est ad umbilicum. Æquum est igitur, ut lector benevolus serio admoneatur hæc commentariola negligenter, confuse, ruditer, ac memoriæ tantum causa, usui privato primario conscripta fuisse: & nullus dubito, quin omnes fere, qui in praxi medica aliquandiu versati fuerunt, præstantioribus adminiculis ex propriis adversariis suppedientur; sed quoniam rerum facies obscura multo major est quam illuminata; & de rebus non omnes eodem modo cogitamus; haud incongruum mihi videtur alios fructum aliquem ex hisce meis laboribus percepturos esse, sicut invicem ego me ex aliorum lucubrationibus uberrimum emolumentum consecutum esse libenter agnosco.

De unico tantum me hoc loco hortari sufficiat, scilicet, ne quis brevibus hisce stricturis nimiam fidem adhibeat, sed potius authores ipsos ubicunque consulat: nam in transferendis eorum sententiis verisimile est me frequenter errasse, aut saltem sensum obscure aut imperfecte tradidisse. *Dulcius ex ipso fonte bibuntur aque.*

Deus optimus maximus, a quo tanquam fonte æternum inexhausto omnia bona ac fausta continuo descendunt, a cujus gratia felix medicæ artis successus, præ aliis quibuscunque, jugiter pendet, his quæ sincero animo ex aliorum operibus fideliter collegi, & quæ ex observatione propria & experientia scripsi, pro sua bonitate favere dignetur, quo in publici commodum, privato semper anteferendum, cedant.

Δέξα τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῷ.



Typographus ad Lectorem.

BREVITATIS causa, ne Liber in molem nimis ingentem cresceret, remediorum formulas, in impressione priori editas, *Pharmacopœjæ Londinensis, Bateanae, & Fulleri*, nemini fere, ut credidit, ignotas, earundem nuda solummodo recitatione facta, authorumque designatione, in tertia hujus Operis editione omittendas duxit Author. Cum autem omissio ista non parum incommodi Lectoribus afferat, qui usum remediorum hic discunt, formulas vero aliunde quærere coguntur, & sæpe deficientibus citatis libris habere non possunt; formulas ipsas describendas curavi, relicta tamen Authorum designatione, ut si forte aliquis typographicus error irrepit, facile corrigatur, utque cum libris, a quibus desumuntur, si cui libeat, conferri queant. Aliquas Author ipse Operi suo inseruit, hasque, indicatis articulis ubi leguntur, non repetendas judicavi.

Sciat itaque Lector, quod per literam capitalem B *Pharmacopœjæ Bateana* designetur, & per reliquas literas initiales, ut infra, indicantur Authorum nomina, viz.

B. *Pharmacopœjæ Bat.*

Bar. Barbette

Bo. Boerhaave

D. Diemerbroek

E. Ettmuller

F. Fuller

G. Greenfield

H. Harris

L. Lister

M. Morton

Mu. Musgrave

P. Pitcarnius

Pu. Purcell.

P. L. Pharm. Lond.

R. Radcliff

S. Sydenham

Syl. Sylvius

T. Turner

W. Willis.

Acetum Pestilentielle. B.

℞. Rad. angel. zedoar. ana onc. j. bacc. junip. unc. ij. rut. Mlij. acet. opt. lib. iij. macera, ac cola. *Pro suffitu, & oris collutione grassante peste.*

Æthiops mineralis. B.

℞. Fl. sulphur. p. ij. mercurii crud. p. j. exactiss. mixta incende, ut f. Pulvis nigerrimus s. a. *Usus in Lue Venerea, Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.*

Aluminatum. B.

℞. Succ. limon. lib. j. alumin. unc. sem. coque & despuma. *Valet in rubore faciei, pustulis, &c.*

Antibæcticum Poterii. B.

℞. Fit ex regul. antimonii martiati & stan. angl. ana colliquatis cum triplo nitr. detonatis, & aqua edulcoratis s. a.

Apozema Diureticum. G. Vide Art. 735.

Aqua Balsamica. F.

℞. Heder. terrest. marrhub. alb. hyssop. puleg. ana M. iij. rad. enul. irid. Florent. ana unc. ij. terebinth. Venet. (cum ol. tart. dissolut.) unc. iv. lact. lib. vj. sp. vin. lib. sem. destillantur in arena. *Apprime convenit in tussi pulmonali & phtisi incipiente.*

Aqua Benedicta . F.

℥℥. Calcis viv. elect. lib. j. superaffund. aq. fluvial. bullient. lib. viij. post debitam ebullitionem & residentiam filtra ad usum.

*Aqua Cosmetica . P. Art. 1147.**Aqua Divina Fernelii . Art. 1147.**Aqua Limacum scorbutica . F.*

℥℥. Limac. cum testis contus. lib. iij. cort. aurant. recent. unc. iij. herb. becabung. nasturt. aquat. aparin. ana M. iij. ser. lact. lib. vj. Rat distillatio, &c.

Aqua Limacum pectoralis . F.

℥℥. Limac. contus. lib. iij. mic. panis alb. unc. xij. nuc. mosch. dram. vj. herb. heder. terrest. M. vj. ser. lact. lib. vj. distil.

Aqua omnium florum . B.

℥℥. Fit ex stercore vaccino Majore collect. cum vin. alb. 3ia parte distillato, vel ex stercore vaccini & limac. cum testis contus. distillatis.

Aqua Ophthalmica Sapphirina . B.

℥℥. Fit ex aqua calcis viv. lib. j. salis armoniac. dram. iij. in pelvis anea maceratis, donec colorem sapphirinum acquirant. In quamplurimis oculorum affectibus valet.

*Aqua Prophylactica . Art. 192.**Aqua Scelotyrbica . F.*

℥℥. Rad. raphan. sylv. ari, cort. aurant. recent. ana unc. iij. herb. cochlear. hortens. persicar. ana M. iv. nasturt. aquat. becabung. salve menth. ana M. iij. nuc. Mosch. dram. iij. cerevis. annos. lib. xij. distill.

*Aqua Theriacalis . D. Art. 192.**Arcanum Cosmeticum . B.*

℥℥. Talchi ven. subtilissime pulv. p. j. ol. camphor. p. j. digere in B. M. ad summam albedinem.

Aurum Fulminans . B.

Fit ex auro in aqua reg. solut. & cum oleo tart. præcipitat. edulcando, siccandoque, f. a.

Aurum Mosaicum . B.

Fit ex stanno, mercurio, sale armoniaco, & sulphure mixtis & sublimatis f. a.

Balneum Psoricum . Bar.

℥℥. Rad. lapath. acut. brion. ana unc. vj. fol. fumar. M. vj. flor. cham. M. iij. furfur. lib. j. sulphur. crud. unc. ij. nitri unc. j. alum. unc. j. sem. fal. commun. unc. ij. aq. font. q. f. ad balneum.

Balsamum Rhamelii .

℥℥. Sapon. Venet. unc. ij. camphor. dram. ij. ad unc. sem. sp. vin. q. f. f. a. balsamum.

Balsamum Saturninum . B.

Fit ex sacchar. saturn. unc. iv. spir. terebinth. unc. xij. f. a. digestis.

Balsamum sulph. Anisatum . B.

℥℥. Flor. sulphur. p. i. ol. Anis. p. iv. digere (lenissimo calore) donec sulphur solvatur, ut fiat balsamum rubicundum.

Bezoarticum mineral . B.

Fit ex butyro antimonii lib. j. & sp. salis lib. iij. vel q. f. mixtis ternis cohobis distillatis.

Bolus ad Casum . F.

℥℥. Sperm. cet. Scrup. j. sal. volat. CC. gr. v. balsam. Peruv. gr. v.
theriac. Ven. dram. sem. syr. de mecon. q. s. m.

Cataplasma Anginosum . F.

℥℥. Ficum unc. iv. alb. canis unc. sem. flor. sulph. piger. long. ana
dram. j. sp. vin. commun. unc. ij. ol. absynth. chym. gut. xvj. diacod. q. s. m.

Cataplasma de Cymino . F.

℥℥. Cepar. sub ciner. assat. unc. j. & sem. croc. gr. xv. ol. succin. gt. xij.
pulv. sem. cym. ungt. dialth. ana dram. iij. m.

Cataplasma de Halecibus . F.

℥℥. Rad. brion. alb. unc. ij. sapon. nigr. unc. iij. carn. halec. (vel encra-
ficularum) ex muria unc. iv. sal. com. unc. j. & sem. m.

Cataplasma Hydropicum . F.

℥℥. Sterc. bovin. recent. lib. ij. bacc. laur. pulv. lib. sem. rad. brion. alb.
rec. lib. j. sem. cym. pulv. flor. sulph. ana unc. iv. cum aq. calcis (vel
lixiv. fort.) f. cataplasma addendo axung. porc. unc. iv.

Cataplasma ex nido Hirundinis . Art. 207.

Cataplasma de Ovis . F.

℥℥. Vitel. ov. ad duritiem coct. N. iv. ol. succin. scrup. ij. & sem.
lin. q. s. m.

Cataplasma Pestilentielle . F.

℥℥. Sterc. columb. unc. iv. croc. unc. sem. mithridat. theriac. Lond.
sem. sinap. ana unc. j. tereb. q. s. m. *Pro bubonibus rumpendis .*

Cataplasma de Pomis . F.

℥℥. Pulp. pom. (non auster.) assat. unc. j. panis alb. (in lact. coct. &
express.) unc. sem. alb. ov. i. troch. alb. rhas. pulv. dram. ij. m.

Cataplasma de Rapis . F.

℥℥. Rad. rapar. in furno coct. unc. viij. herb. rut. contus. M. iv.
sem. sinap. contus. unc. ij. ol. junip. dram. ij. unguent. nervin. q. s.
m. f. cataplasma pulv. euphorb. aspergend.

Cataplasma soleare . F.

℥℥. Fol. rut. virid. unc. ij. rad. brion. rec. unc. iv. ferment. acerrim.
sal. sapon. nigr. ana unc. j. sem. mustard. unc. iij. contus. add. acet. q. s.

Cataplasma stomachicum . F.

℥℥. Theriac. Ven. dram. vj. cinnam. garyoph. pulv. ana dram. j. ol.
cinnam. menth. gt. vj. absynth. gt. ij. acet. q. s. m.

Cataplasma Suppedale . Mu. Art. 934.

Ceratum de Lapide calaminare . T.

℥℥. Butyr. recent. mense Maii collect. insals. cer. citrin. ana lib.
iij. & sem. ol. oliv. puriss. lib. iv. lapid. calamin. select. subtilissime trit.
& cribat. lib. ij. unc. x. liquecant cera & butyrum super ignem len-
tum una cum oleo, & colatis statim insperge pulverem gradatim, con-
tinuo agitando mixturam e fundo vasis, donec frigescere incipiat, &
pulvis non amplius subsidere possit.

Cerevisia ad Cancrum . F.

℥℥. Lign. guaiac. unc. iv. saffr. rad. farsap. oxylap. filipend. cy-
noglos. cort. jugland. ana unc. ij. herb. Robert. Lamii, ana M. iv. mil-
leped. pint. j. præp. pro cong. iv. cerevis.

Cerevisia de Dauco . F.

℥℥. Sem. dauc. sylv. unc. vj. passul. maj. unc. xij. f. saccul. pro cong.
iv. cerevis.

Cerevisia Hydropica . F.

℥℥. Ciner. genist. cribrat. lib. sem. rad. raphan. sylv. unc. iv. irid.
Flo-

Florent. calam. arom. enul. ana unc. ij. lign. guaiac. fassafr. bacc. junip. sem. dauc. sylv. ana unc. j. sem. sinap. unc. ij. præp. pro cerevis. cong. iv.

Cerevisia Hysterica. F.

℞. Rasur. lign. buxi lib. sem. fol. visc. querc. concis. M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vj. ad iv. & in doliolo suspend. faccul. seq.

℞. Rad. pæon. mar. recent. lib. sem. brion. alb. unc. iv. herb. artemis. melis. ana M. vj. puleg. rut. ana M. ij. sem. dauc. sylv. angel. (vel pastin. sylv. ana unc. ij. rasur. stanni (in nod. liget.) lib. sem. præp. f. a.

Cerevisia IctERICA. F.

℞. Ras. ebor. unc. j. marhub. alb. M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vj. ad iv. colatur. suspend. faccul. seq.

℞. Rad. oxylap. lib. sem. curcum. rub. tinct. ana unc. ij. urtic. unc. iv. herb. chelidon. maj. aparin. fragar. cum toto, cort. berber. ana M. iv. sterc. ovil. (in nodul.) unc. iv. milleped. viv. pint. j. limatur. chalyb. lib. j. præp. ut artis est.

Cerevisia melanagoga. Art. 443. Ceresia ad Melancholiam. Art. 443.

Cerevisia Purgans Hydropica. F.

℞. Rad. irid. nostrat. unc. iv. raphan. sylv. unc. ij. enul. seil. ana unc. j. sem. sinap. bacc. junip. lign. fassafr. ana unc. ij. cort. vvinter. unc. sem. cort. interior. sambuc. ebul. ana unc. ij. fen. unc. iv. rad. hel-lebor. nigr. jalap. agar. ana unc. sem. præp. pro cong. iv.

Cerevisia ad Rachitidem, F.

℞. Rad. osmund. reg. (vel ejus defectu filic. mar.) glycyrrhiz. lign. fassafr. ana unc. j. cort. fraxin. heder. arbor. ana unc. sem. summit. tamarisci, herb. ling. cervin. ana M. iv. milleped. viv. N. 250. passul. fol. unc. iv. præp. faccul. pro cong. j.

Cerevisia Scorbutica. F.

℞. Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ cong. v. ad iii. sem. in doliol. reposit. affunde Succ. Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana lib. j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso. ℞. Rad. Oxylap. unc. iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. junip. ana unc. ij. Ras. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ana unc. j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ana M. ij. Antimon. crudi lib. j. Præp. f. a.

Cerevisia ad Scrophulas. F.

℞. Rasur. guaiac. fassafr. cort. jugland. arbor. rad. oxylap. filipend. cynoglos. ana unc. ij. herb. geran. Robert. Lamii, ana M. iv. passul. fol. lib. j. milleped. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Chalybs sine acido. B.

Paratur humectando limaturam martis decies sale absynth. in aq. cichor. solut. & siccando in aere sicco ac tepido, postea f. pulv. subtilissimus.

Chalybs Tartarizatus. B.

℞. Limatur. mart. mund. tart. alb. pulverisat. ana unc. vi. aq. fumar. q. f. f. massa, coq. in vase fictili in clibano (calore lento) ad siccitatem f. pulv. deind. add. aq. fumar. ut ante & coq. iterum ut ante, & ad 3. vicem, & postremo f. pulv. ad usum reservand.

Cinnabaris Antimonii. B.

Fit sublimando caput mortuum post distillationem butyri antimonii relictum, & rectificando f. a.

Collyrium Boyleanum.

℞. Aqua rorismarin. lib. ii. aloë subtilissime pulv. unc. sem. vitriol. alb.

b. vitr. antimon. croc. metallor. ana dram. vi. digere leni calore per
ensem; decantetur liquor purus. *In omnibus fere oculorum affectibus*
ex datur par remedium.

Collyrium certum R.

2℥. Aq. plantag. euphras. ros. ana unc. j. trochisc. alb. rhas. unc. ii.
pid. tut. scrup. ii. vitriol. Roman. gr. ii. m. pro collyrio.

Decoctum amarum febrifugum. M. Art. 36.

Decoctum catechu compositum. F.

2℥. Rasur. guajac. sassaf. ana dram. iii. santal. citr. & rub. ana
ram. ii. terræ Japon. pulv. dram. sem. glycyrrhiz. dram. j. saliv. ficc.
. j. coq. in aq. hord. lib. iii. ad lib. ii. colatur. add. diacod. unc.
ol. anis. gr. j. m.

Decoctum Coccineum. F.

2℥. Nitri unc. j. sacchar. alb. unc. iv. coccinel. gr. xvi. f. pulv.
ii conjiciatur in aq. font. (vel potius decoct. alb.) bullientis lib.
coq. & despuma, & per residentiam depuretur.

Decoctum Ictericum. F.

2℥. Rad. curcum. rub. tinct. ana unc. j. herb. chelidon. maj. cum
to M. ij. lumbric. mundat. N. xx. coq. in aq. & vin. Rhenan. ana
b. j. & sem. ad lib. ij. colatur. add. tinct. croc. (aq. theriac. parat.)
unc. j. syr. e 5. rad. unc. ij. m.

Decoctum Incrassans. F.

2℥. Gum. Arab. crasse pulv. unc. iiij. coq. in aq. hord. q. f. ad lib.
colatur. add. syr. de alth. unc. iiij. m.

Decoctum ad morsum canis rabidi. B.

2℥. Fol. rut. unc. vj. rad. allii. theriac. Lond. ana unc. iv. lima-
ur. flanni unc. iv. cerevis. lupulat. veter. lib. iv. coq. ad consum-
tion. dimid. & macera, & cola. Demorsus capiat coch. vj. bis in die
per dies ix. & applicetur magma loco affecto.

Decoctum Nephriticum. F.

2℥. Rad. alth. unc. j. & sem. liquirit. unc. sem. herb. virg. aur.
l. ij. alth. parietar. ana N. j. sic N. iv. bacc. junip. sem. petrosel. ma-
edon. bardan. milii sol. (sub med. coction. addit.) ana dram. j. coq.
in liquor. possit. vin. alb. alterat. lib. iiij. ad tertiæ partis con-
sumption. colatur. add. syr. de alth. unc. iiij. vel iv. m.

Decoctum Nigrum. Art. 48.

Decoctum Phthisicum. F.

2℥. Flor. bellid. maj. M. j. limac. mundat. N. iiij. rad. eryng. con-
it. unc. sem. hord. perlat. dram. iiij. coq. in aq. font. lib. j. sem. ad
b. j. cola.

Decoctum Sistens. F.

2℥. Pulv. bol. Armen. unc. j. cret. puriss. unc. iiij. coq. in aq. font.
b. iiij. ad lib. ij. colaturæ per resident. depurat. add. diascord. unc.
sem. aq. cinnam. fort. syr. cydon. e ros. ficc. ana unc. ij. ol. nuc.
mosch. gr. ij. m.

Decoctum ad Sitim. B.

2℥. Fol. acetos. M. ij. coq. in aq. font. q. f. ad lib. j. colatur. add.
acc. 12. limon. vin. Rhenan. lib. ij. sacchar. alb. q. f. ad gratiam, m.

Decoctum Stypticum. F.

2℥. Rad. urtic. consol. maj. ana unc. j. & sem. herb. millef. plant. ana
l. j. cort. granat. gum. Arab. ana dram. ij. & sem. papav. alb. hyosciam.
na dram. iiij. coq. in aq. font. lib. iiij. ad lib. ij. colatur. add. syr. e
os. ficc. unc. iv. sacchar. saturn. scrup. j. croc. mart. astring. scrup.
iv.

iv. m. dos. unc. iv. bis in die.

Decoctum Variolosum. F.

℞. Rad. scorzon. unc. j. & sem. glycyrrhiz. unc. sem. fic. N. passul. sol. exacinat. unc. j. ras. CC. dram. ij. coccinel. integr. sub fil. add. scrup. iv. coq. in aq. hord. lib. iij. ad lib. ij. colatur. add. caryoph. limon. ana unc. j. m.

Decoctum Ulmi. B.

℞. Cort. interior. ulmi rec. unc. iv. coq. in aq. font. lib. iij. ad mid. colaturæ rubicundæ (instar. vin. rubelli) add. syr. de rub. Ida de mor. ana unc. j. & sem. m. f. gargarism. elegantiss.

Electuarium contra Abortum. F.

℞. Conserv. ros. rub. cydon. nuc. mosch. cond. succ. chermes, cydon. syr. e coral. ana unc. sem. spec. de hyacinth. dram. iij. are ros. croc. mart. astring. ana dram. ii. sacch. saturn. dram. i. ol. m. mosch. gut. iv. m.

Electuarium Boyleanum. F.

℞. Sem. papav. alb. pulverifat. hyosciam. alb. ana unc. sem. f. papav. errat. conserv. ros. rub. ana unc. i. & sem. m. f. elect. quant. jugland. bis in die.

Electuarium Cephalicum. F.

℞. Rad. pæon. mar. pulv. unc. sem. cran. human. cinnab. an mon. ana dram. ij. nuc. moschat. concis. unc. sem. syr. pæon. com unc. ij. ol. rorismarin. salv. ana gr. iv. m. f. electuarium.

Electuarium Chalybeatum. Pu. Art. 405.

Electuarium de Colophoniu. F.

℞. Conserv. flor. Lamii. alb. unc. j. & sem. diafcond. zinzib. condit. pulv. colophon. ana unc. sem. ol. cinnam. gut. iv. syr. e ros. sic q. f. m.

Electuarium Epilepticum. B.

℞. Sterc. albissim. pavon. ficc. rad. pæon. mar. ana unc. ij. rad. valerian. unc. j. sem. pæon. excort. unc. iij. carvi unc. sem. p. pulverisatis add. mel anthosat. q. f. m. f. electuarium.

Electuarium Hydragogum. Syl. Art. 825.

Electuarium Hystericum. F.

℞. Conserv. atriplic. olid. unc. iv. ol. succin. gut. 48. m.

Electuarium Martis. F.

℞. Conserv. absynth. Roman. cochlear. hortens. ana unc. iij. zinzib. cond. unc. j. & sem. rubig. chalyb. (in subtilem pollinem redact. dram. vi. ol. caryoph. ol. fassafr. ana gut. vi. syr. e s. rad. unc. j. m.

Electuarium Peruvianum astring. F.

℞. Curt. Peruv. pulv. unc. j. bals. de tolu, terr. Japon. pulv. an dram. j. syr. Boyleanum q. f. m. f. elect. pro dos. x.

Electuarium Peruv. epilepticum. F.

℞. Cort. Peruv. pulv. dram. vi. rad. serpent. virgin. pulv. unc. i cum q. f. syr. pæon. comp. f. elect.

Electuarium Stypticum. F.

℞. Conserv. ros. rub. unc. iij. croc. mart. astring. unc. iii. sacch. saturn. dram. j. syr. cydon. vel e ros. ficc. unc. sem. m. f. elect.

Electuarium e zinzibere. F.

℞. Conserv. ros. rub. unc. iii. zinzib. cond. unc. j. ol. cinam. gut. iv. ol. caryoph. gut. ij. m.

Emplastrum Cephalicum. F.

℞. Empl. de beton. unc. sem. gum. caran. tacamah. ana unc. iii. al. tolutan. scrup. j. balsam. Peruv. vel copaiv. scrup. j. f. empl.

Emplastrum Ischiaticum. F.

℞. Pic. Burgung. unc. ii. galban. unc. j. sulph. viv. dram. ii. succin. dram. j. hermodact. rad. ireos florent. sem. cymin. flor. cham. na dram. sem. petrol. q. f. m. f. empl.

Emplastrum Mamillare. F.

℞. Sperm. cet. unc. j. cer. alb. unc. ii. galban. aceto præp. unc. sem. ol. ambuc. q. f. f. empl.

Emplastrum Pleuriticum. F.

℞. Empl. Paracel. de sapon. ana unc. j. unguent. popul. unc. i. sem. camphor. dram. iii. m. liquefiant lento igne perpetuo agitando cum spatula, quando frigescente incipiant, addatur camphora & i. empl. molle.

Emplastrum de Pyrethro. F.

℞. Galban. colat. sagapen. ammoniac. (vin. alb. solut. & colat.) ana unc. i. pulv. rad. pyreth. sem. sinap. ana unc. sem. tereb. Ven. q. f. m.

Emplastrum Roborans. F.

℞. empl. stomach. magistral. dram. iii. oxycroc. (rite præp.) dram. i. gum. caran. tacamah. ana dram. i. balsam. tolutan. scrup. ii. bals. Peruv. scrup. i. ol. innam. caryoph. nuc. mosch. ana gut. ii. menth. absynth. ana gut. i. f. empl.

Emplastrum Smeeticum. B.

℞. Minii lib. i. & sem. ol. oliv. lib. ii. sapon. alb. unc. iv. ceræ dram. i. coq. f. a. & f. empl.

Emplastrum ad Strumas. 1. B.

℞. Empl. de cicuta cum ammoniac. unc. iv. gum. elem. unc. sem. mercur. sublimat. corrosiv. dram. x. m. f. empl.

Emplastrum ad Strumas. 2. Bar.

℞. Empl. de ranis cum mercur. unc. sem. galban. dram. ij. sacchar. saturn. sal. volat. ammoniac. ana dram. sem. ol. rub. q. f. f. empl.

Emulsio Asthmata. F.

℞. Milleped. viv. N. 120. contus. sensim. affund. aq. puleg. unc. vj. in liquore fortiter expresso dissolv. gum. ammoniac. dram. iii. colatur. add. tinct. benzo. dram. iii. m. dos. coch. j. ex haust. decoct. pectoral. sepe in die.

Emulsio Brunneri. F.

℞. Gum. ammoniac. dram. i. & sem. dissolv. (in mortar.) in aq. hyssop. frigid. unc. iv. & vin. Rhenan. unc. ij. colatura fit pro haust. ij. urgente suffocationis periculo in asthmate capiend.

Emulsio Pæoniata. B.

℞. Sem. pæon. decort. unc. j. contus. affund. aq. rut. ceras. nigr. pæon. comp. ana unc. vj. f. emulsio, add. sacchar. perlat. q. f.

Emulsio Styptica. F.

℞. Rad. consolid. maj. unc. iv. coq. in aq. font. lib. iij. ad lib. ij. cum colatura & sem. papav. alb. hyoscyam. amygd. dulc. excort. ana unc. sem. sal. prunel. dram. sem. sacchar. saturn. scrup. j. & sacchar. alb. unc. j. f. emulsio.

Enema acre. Bo.

℞. Pulv. colocynth. dram. sem. fol. tabac. dram. i. sem. coq. in aq. font. q. f. ad unc. x. admisce sal. gem. dram. ij. f. enema.

Enema amarum.

℞. Rad. serpent. virg. contus. dram. j. pulp. colocynth. (in nodula ligat.)

ligat.) scrup. j. herb. tanacet. summit. fabin. ana M. sem. coq. in aq. font. q. s. ad unc. vj. colatur. add. ol. hyperic. unc. sem. ol. absynth. chydram. sem. spec. hier. picr. scrup. sem. m.

Enema Apoplecticum. F.

℞. Rad. pyreth. unc. sem. herb. rut. Mij. pulp. colocynth. (in m. dul. ligat.) dram. sem. coq. in aq. font. q. s. ad unc. xij. colatur. add. i. fus. croc. metallor. unc. iij. tinct. castor. unc. sem. ol. succin. sal. gem. an. dram. ij. f. enema.

Enema Balsamicum. F.

℞. Rad. alth. unc. j. herb. malv. parietar. mercurial. ana M. i. sem. lin. unc. sem. coq. in q. s. aq. font. ad unc. xij. colatur. add. tereb. vitel. ov. solut. unc. sem. ol. lin. unc. ii. elect. linitiv. unc. j. m. f. enema.

Enema Emolliens. C. Art. 735.

Enema Febrifugum.

℞. Cort. Peruv. subtilissime pulv. unc. ij. coq. multiplici coctione in aq. font. donec redeat ad lib. sem. colaturæ turbidæ add. diascord. un. sem. ol. anis. gut. j. m.

Enema Hystericum. F.

℞. Rad. aristol. rotund. bryon. alb. ana unc. sem. herb. rut. matricar. puleg. flor. cham. ana M. sem. coq. in q. s. aq. font. ad unc. xij. in colatura dissolv. aſæ foetid. dram. j. ol. succin. dram. ii. sacchari rub. unc. j. m.

Enema e quatuor Oleis. F.

℞. Ol. lin. cham. ana unc. vj. ol. scorp. unc. ii. tereb. dram. ii. m.

Enema Terebinthinatum. F.

℞. Urin. fani lib. i. terebinth. Venet. vitel. ov. solut. unc. i. ol. anis. dram. i. theriac. januens. unc. i. m.

Enema ad tormina. F.

℞. Cret. pulv. unc. sem. herb. rut. flor. cham. ana M. sem. coq. in q. s. aq. font. ad unc. iv. colatur. add. tinct. castor. diascord. ana unc. ii. syr. de mecon. unc. sem. ol. anis. gut. x. m.

Enema de Verbasco. F.

℞. Herb. cicut. hyoscyam. ana M. j. verbasco. flor. sambuc. ana M. sem. coq. in aq. ferrat. q. s. ad unc. xii. in colatura dissolv. vitel. ov. N. j. ol. lin. unc. ii. ol. succin. dr. sem. bals. sulph. dr. ii. m.

Ens Veneris. B.

℞. Vitriol. mart. reverberat. & lot. p. j. sal. armoniac. p. ii. sublimentur s. a. cum tribus cohobis.

Epithema de Calce. F.

℞. Calc. viv. unc. ii. mellis liquid. q. s. f. mistura; aliquando sapon. vulgaris addatur.

Epithema de saccharo Saturni. F.

℞. Acet. lib. sem. sacchar. saturn. unc. i. m. Huic immergatur petia lineæ dupla, & frigide cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur; ad narium hæmorrhagiam expertus laudo.

Epithema Saponaceum. F.

℞. Spirit. lumbricor. magistr. unc. vj. sp. cochlear. dram. ij. sp. sal. armoniac. dram. vj. sapon Venet. unc. i. sem. camphor. dram. vj. opii dram. j. croc. dram. sem. digere aliquot dies & cola.

Epithema Stomachicum. F.

℞. Sp. vin. camphorat. unc. iv. theriac. Androm. dram. ij. ol. caryoph. gut. xvj. ol. nuc. mosch. gut. viij. ol. menth. gut. iv. anis. absynth. ana gut. ij.

Expressio Asthmatica . F.

℥℥. Milleped. viv. N. 128. contus. effund. aq. hyssop. unc. iv. puleg. unc. ij. pæon. comp. unc. j. in liquore expresso dissolv. gum. ammoniac. gr. xxxij. colatur. add. tinct. benzo. dram. ij. syr. balsam. unc. j. ol. anis. gr. j. sp. sal. armoniac. q. s. ad justum acorem conciliandum. Detur co-
chleatim in paroxysmo.

Expressio Diuretica . W.

℥℥. Milleped. viv. tinct. sal. tart. ana unc. ij. contunde & fortiter
exprime. Dos. gr. xl. vel l.

Expressio Millepedum Simplex . F.

℥℥. Milleped. viv. unc. iij. sacchar. alb. unc. ij. simul contus. af-
fund. vin. alb. j. probe misceantur, & coletur liquor.

Expressio Millepedum Isterica . F.

℥℥. Milleped. viv. N. 100. croc. scrup. sem. nuc. mosch. dram. sem. sac-
char. alb. unc. sem. contus. affund. aq. chelidon. unc. iv. lumbricor. magi-
stral. unc. j. f. expressio.

Expressio Millepedum ad tussim . F.

℥℥. Milleped. viv. mund. unc. ij. pulv. sem. anis. dram. j. nuc. mosch.
dram. sem. sacchar. alb. unc. j. contus. affund. aq. puleg. unc. vj. bryon.
comp. pæon. comp. ana unc. j. f. expressio.

Expressio scorbutica calida . F.

℥℥. Herb. cochlear. hortens. nasturt. aquat. beccabung. chelidon. maj.
sana M. iv. contus. add. vin. alb. lib. sem. aq. raphan. comp. lumbricor.
magistr. ana unc. iv. f. expressio, cui add. sp. cochlear. dram. ij. sac-
char. alb. unc. ij. m.

Expressio scorbutica temperata . F.

℥℥. Herb. beccabung. nasturt. aquat. tarax. aparin. ana M. iv. mal. au-
rant. (cum corticibus) N. iv. contus. affund. vin. alb. aq. flor. sambuc. ana
lib. j. per subfidentiam clarificetur & cum sacchar. ad libitum edulcetur.

Extractum Pectorale . F.

℥℥. Maltæ opt. ex cerev. cong. i. sem. aq. cong. ij. alæ s. a. cong. j. huic cla-
ræ & non fermentatæ add. passul. solis exacinat. & concis. lib. sem. glycy-
rhiz. unc. j. ter. japon. unc. j. coq. donec lib. iv. sint evaporatæ: post-
modum exprimendo coletur; denique (additis coccinel. scrup. iv.)
percoq. ad mellaginem. Est egregium incrassans.

Flores salis Armoniaci martiati . B.

Fit ex limaturis martis & sale armoniaco ana sublimatis, aeri ex-
ponendo caput mortuum, miscendo cum dimid. quant. sal. armoniac. sic-
cando, & sublimando s. a.

Fotus Astringens . F.

℥℥. Cort. querc. unc. ij. granat. unc. sem. flor. balauft. ros. rub. ana M.
j. coq. in aq. lib. iv. ad lib. ij. colatur. add. vin. rub. Lisbon. lib. sem. m.
addi possunt alum. dram. ij.

Fotus ad Calculum . G. Art. 735.

Fotus ad Hemorrhoidum dolorem . F.

℥℥. Rad. capar. unc. ij. sem. lin. unc. j. herb. hyoscyam. verbasco. linar.
millefol. ana M. ij. coq. in aq. font. lib. vj. ad lib. iv. in colatura dissolv.
opii dram. ij. m.

Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum . F.

℥℥. Herb. verbasco. millefol. plantag. fol. sambuc. ana M. iv. cort. gra-
nat. unc. j. coq. in aq. & vin. rub. astring. ana lib. iij. ad tertiæ par-
tis consumption. in colatura dissolv. alum. unc. sem. secchare saturn.
dram. ij.

Fotus lateralis . F.

℞. Rad. alth. capit. papav. alb. (scif. & cum sem. contus.) ana unc. ij. sem. lin. fœnugr. cymin. bacc. lauri ana unc. j. herb. malv. matricar. ana M. iij. coq. in aq. lib. viij. ad dimid. cola .

Fotus Podagricus . F.

℞. Herb. chamæpit. abrot. ana M. iv. coq. in aq. font. lib. vj. ad lib. iv. in colatura dissol. sal. tartar. sal. armoniac. ana unc. iv. m.

Fotus Spirituosus . F.

℞. Aq. regin. Hungar. unc. vj. sp. lavend. comp. cochlear. ana unc. j. & sem. sp. sal. armoniac. unc. sem. camphor. scrup. v. ol. terebinth. gut. 80. m. digerantur .

Fotus Stomachicus . F.

℞. Vin. rub. lib. j. sp. vin. commun. acet. vin. ana lib. sem. ab. synth. menth. ana M. sem. rad. bistort. unc. sem. cort. granat. dram. ij. garyoph. mac. nuc. mosch. cinnam. ana dram. j. theriac. Ven. unc. sem. macerentur clause in baln. mar. duas horas ; colatura sit pro fotu .

Fotus ad Tympanitidem . F.

℞. Nitri unc. ij. sal. armoniac. unc. j. sp. vin. tenuioris multo phlegmate imbuti lib. ij. m. & dissolve in vitro .

Galbanetum Sennerti . B.

℞. Gum. galban. p. j. sp. terebinth. p. ij. ol. lavend. p. sem. digere & distilla ex retorta f. a.

Gargarisma Anginosum . F.

℞. Herb. aquileg. M. ij. cort. inter. ulmi unc. j. fung. sambuc. glycyrrhiz. alb. canis ana unc. sem. coq. in q. f. aq. font. ad lib. ij. in colatura dissolv. sal. armoniac. dram. ij. de rub. idæ. mel. ros. ana unc. ij. m.

Gargarisma Commune . F.

℞. Aq. plantag. unc. x. ros. rub. unc. iij. syr. e mor. unc. ij. mell. ros. unc. j. ol. vitriol. q. f. ad aptam aciditatem m.

Gargarisma contra Fœtorem . F.

℞. Myrrh. dram. ij. rad. irid. Florent. cyperi calam. aromat. angel. Hispan. ana dram. i. caryoph. dram. sem. flor. rorismarin. M. j. infund. clause & calide duas horas in aq. font. lib. sem. vin. alb. unc. iv. colatur. add. aq. regin. Hungar. dram. vj. tinct. benzo. dram. ii. m.

Gargarisma Myrrhisatum 1. F.

℞. Vin. rub. astring. lib. j. myrrh. pulv. dram. ij. m.

Gargarisma Myrrhisatum . 2. F.

℞. Myrrh. pulv. dram. j. dissolv. in mortar. cum vitel. ov. dram. ij. add. mel. ros. unc. ii. vin. alb. lib. sem. m.

Gargarisma ad pituitam . F.

℞. Aq. Hyssop. unc. x. sp. vin. rectificat. unc. j. sp. cochlear. unc. sem. sp. castor. dram. ii. sp. sal. armonian. scrup. iv. pulv. rad. pyrethr. dram. j. mel. unc. iv. m.

Gargarisma Prunellorum . F.

℞. Cort. prunellor. sylvestr. unc. ij. coq. in q. f. aq. font. ad lib. ij. in colatura dissolve alumin. scrup. iv. acet. unc. ij. mel. ros. unc. iv. m.

*Gargarisma in Variolis . S. Art. 134.**Gargarisma Variolosum . 1. M. Art. 139.**Gargarisma Variolosum . 2. F.*

℞. Hord. perlut. glycyrrhiz. ana unc. sem. rad. alth. viciar. ana unc. j. ficuum N. xij. fung. sambuc. M. j. coq. in q. f. aq. font. ad lib. ij. colatur. add. oxymel. scillit. mel. ros. ana unc. ij. m.

Gargarisma pro Uvula . F.

℞. Herb. aquileg. M. iv. flor. ros. rub. balauft. ana M. sem. piper. long. scrup. iv. myrrh. dram. ij. coq. in aq. font. lib. ij. & vin. alb. lib. sem. ad tertiæ partis consumption. colatur. add. sp. vin. syr. e mor. de rub. de idæ, ana unc. ij. m.

Hauftus Diaphoreticus . F.

℞. Aq. card. ben. unc. ii. & sem. epidem. theriacal. syr. de mecon. ana unc. sem. antimon. diaphor. scrup. j. theriac. Androm. scrup. ij. sp. sal. armoniac. gut. xij. m.

Hauftus Diureticus Acidus . F.

℞. Aq. raphan. comp. unc. i. & sem. sp. vin. gallic. succ. limon. ana unc. sem. syr. violar. unc. j. m. f. haust.

Hauftus contra Fluorem . F.

℞. Alb. ov. N. j. conquassato add. aq. cinnam. fort. unc. i. sem. m.

Hauftus Hydragogus . F.

℞. Gum. gamand. crem. tart. pulv. ana gr. xiv. ol. junip. gut. iij. dissolv. diligenter in mortar. in vin. alb. unc. iij. addendo sacchar. alb. dram. i. & sem. m.

Hauftus Japonicus . F.

℞. Aq. spermat. ranar. unc. ij. syr. e ros. sicc. dram. ij. ter. Japon. pulv. scrup. j. sacchar. saturn. gr. iv. ol. cinnam. chym. gut. j. laudan. liquid. gut. xx. m.

Hauftus Pleuriticus .

℞. Ol. sem. lini frigide extract. unc. ii. & sem. sperm. cet. scrup. ij. ol. nuc. mosch. gut. ij. aq. cinnam. hord. syr. papav. errat. ana dram. vj. m. f. haust. quam calidissime sumend.

Hauftus Saponaceus . F.

℞. Sapon. Venet. ras. a scrup. ij. ad scrup. iv. coq. in lact. unc. vj. ad unc. iv. colaturæ add. sacchar. alb. tantillum.

Hauftus Saturninus . F.

℞. Aq. spermat. ranar. unc. i. sem. acer. unc. sem. succ. urticæ dram. ij. syr. de mecon. dram. vj. sacchar. saturn. gut. vj. alum. gr. iij. sang. dracon. dram. sem. m.

Infusum Cephalicum . F.

℞. Sterc. pavonis alb. unc. iv. milleped. contus. unc. j. aq. ceras. nigr. vin. alb. ana lib. i. & sem. infund. per 24. horas frigide, colaturæ per manicam clarificatæ add. aq. Langii unc. iij. sp. lavend. comp. dram. i. & sem. ol. nuc. mosch. gut. iij. syr. pæon. comp. unc. vj. m.

Infusum Chalybeatum Amarum . Art. 48.

Infusum Fracastorii .

℞. Theriac. Androm. dram. ij. diascord. unc. sem. coccinel. scrup. sem. infund. clausæ & calide per horæ quadrant. in aq. lact. alex. unc. vj. colatur. add. aq. cinnam. fort. syr. cydon. ana unc. j. m. *dosis coch. iv. quarta vel sexta quaque hora pro re nata.*

Infusum Traumaticum . F.

℞. Caulium virid. solani lignosi concis. unc. iv. cocinel. scrup. j. vin. alb. lib. ii. infund. calide & clausæ per noctem, colatur. add. syr. heder. terrest. unc. iv. theriac. Ven. unc. sem. m.

Injeſtio ad Gonorrhœam . F.

℞. Aq. calc. viv. unc. iv. merc. dulc. dram. sem. sacchar. saturn. scrup. j. m. pro injeſtione. *Usurpetur liquor per residentiam depuratus.*

Julapium Moscatum . F.

℞. Aq. rosar. damascen. unc. vi. naptæ unc. i. cinnam. hord. unc. ii. pæon.

com. unc. i. sem. mosch. ambre grise. (cum sal. C. C. trit.) ana gr. ii. croci (scissi & in nodul. ligat.) scrup. j. ol. caryoph. gut. j. confect. alkerm. dram. ii. syr. caryoph. unc. i. sem. m.

Julapium Stomachicum. F.

℞. Vin. Xeroensis, aq. cinnamom. hord. unc. iv. aq. menth. gent. comp. syr. cydon. ana unc. ii. ol. caryoph. nuc. mosch. ana gut. ii. m. addi possint theriac. Ven. dram. ii.

Lac Sublimatum.

℞. Aq. calc. viv. unc. iv. mercur. sublimat. corrosiv. gr. xii. dissolv. in vitro leni calore. *Potest augeri vel minui quantitas sublimati, prout fortius aut debilius medicamentum efficere volueris.*

Lac Virginale P. L.

℞. Alumin. rupei unc. iv. coq. in aq. font. lib. ii. ad tertias; tum ℞. Litharg. auri lib. sem. vin. alb. lib. i. sem. decoquantur ad lib. i. colentur, ambæque aquæ commisceantur, & agitentur donec albescant.

Linimentum Anodynum. R. Art. 236.

℞. Unguent. martiat. unc. ii. petrol. ol. spicæ, ana dram. iii. pulv. euphorb. scrup. j. ol. succin. dram. i. sem. ol. rorismarin. dram. sem. m.

Linimentum Paralyticum. F.

℞. Sulph. crud. dram. ii. sapon. Venet. dram. i. sem. nitri præp. dram. sem. litharg. aur. dram. ii. mercur. dulc. dram. i. sem. unguent. alb. camphorat. unc. j. ol. lign. Rhod. gut. iv. m. f. linimentum.

Loboch Myrrhisatum. F.

℞. Myrrh. pulv. dram. ii. croc. scrup. sem. nuc. mosch. dram. sem. mellis unc. ii. M.

Loboch ad Raucedinem. F.

℞. Sperm. ceti unc. sem. sacchar. alb. unc. i. optime simul contus. in mortario sensim add. syr. balsam. q. f. m.

Loboch Rubrum. F.

℞. Conserv. fruct. cynosbat. unc. sem. syr. bac. sambuc. ol. amygd. dulc. ana unc. j. m.

Loboch Viride. F.

℞. Sapon. Venet. ras. scrup. ii. ol. amygd. dulc. syr. violar. ana unc. j. m.

Loboch Vitellinum. F.

℞. Sperm. cet. dram. ii. sem. subigatur in mortario cum vitel. ov. N. i. & add. ol. amygd. dulc. syr. de alth. ana unc. j. m.

Lotio Lanfranci. Art. 984.

Mistura Acida.

℞. Aq. plantag. syr. papav. erratic. ana unc. i. sem. ol. vitriol. dram. ii. misce.

Mistura Balsamica Nephritica. F.

℞. Balsam. copaiv. unc. sem. ol. junip. chym. dram. sem. vitel. v. N. ij. syr. de alth. unc. ii. sem. aq. persicar unc. x. m.

Mistura Consolans. F.

℞. Vin. Xeroens. lib. sem. aq. cinnam. fort. unc. iv. aq. ros. sacchar. cand. alb. ana unc. ij. succ. chermes colat. unc. j. spec. lætif. Galeni dram. ii. fol. auri N. iv. ol. nuc. moschat. gut. iv. m.

Mistura Corallata. F.

℞. Coral. rub. subtilissime lævigat. dram. ii. sal. absynth. scrup. iv. succ. limon. unc. iv. aq. cinnam. fort. unc. ii. M. stent in vitro capaci.

Mistura Ecphrastica. F.

℞. Summit. pini concis. M. vj. coq. in aq. font. lib. iv. ad lib. ij. colatu-

laturæ fortiter expressæ add. succ. depurat. cochlear. hortens. lib. i. beccabung. nasturt. aquat. tarax. ana lib. sem. aq. raphan. comp. lib. i. sem. huic misturæ dissolve vitriol. Mart. scrup. viij. per noctem reponatur, ut subsideat sæx lutea; dein liquori claro effuso adde sal. absynth. scrup. iv. sacchar. alb. unc. xij. m.

Mistura Expectorans. F.

℞. Tinctur. benzo. unc. sem. tinct. croc. tinct. myrrh. tinctur. gum. ammoniac. sp. sal. armoniac. ana dram. j. aq. hyssop. unc. vj. lumbricor. magistral. unc. iii. syr. de prassio unc. ij. m.

Mistura simplex Paracelsi. Art. 78.

Mistura Stomachica. F.

℞. Aq. cinnam. fort. unc. j. ol. vitriol. dram. j. ol. caryoph. gut. xxiv. m.

Nitrum Saturnisatum. B.

℞. Sacchar. saturni. nitri ana p. æ. Solve in aceto distillato & crystallisa f. a.

Nodulus Hystericus. B.

℞. Castor. pulv. dram. sem. asæ foetid. scrup. j. ol. succin. scrup. sem. misce, & in serico involve, ut fiat nodulus, &c.

Ol. Ranarum. B.

Coque ranas vivas N. 12. in ol. olivar. lib. i. sem. per horam & deinde exprime. *In cantro specificum perhibetur.*

Oximel Asthmaticum. F.

℞. Rad. zedoar. unc. j. coq. in aq. font. lib. ii. ad lib. i. sem. colaturæ add. gum. ammoniac. (in acet. unc. iv. dissolut.) unc. j. colaturæ add. mellis unc. iv. coq. despuma & cola: *Dentur coch. iij. mane & vesperi per menses aliquot.*

Phenigmus. Mu. Art. 934.

Pilule Balsamicæ. M.

℞. Milleped. præp. dram. iii. gum. ammoniac. purissim. dram. i. sem. flor. benzoin. scrup. ij. vel dram. j. extract. croc. balsam. Peruv. ana scrup. i. balsam. sulph. terebinth. vel anisat. q. f. f. massa.

Pilule Catharticæ in Scorbuto.

℞. Gum. ammoniac. dram. j. calomel. scrup. ij. extract. hellebor. nigr. dram. ij. balsam. Peruv. parum m. f. massa pil. dos. scrup. ij.

Pilule ad Colluviem. F.

℞. Calomel. dram. ij. sacchar. saturni. dram. j. camphor. amyl. ana dram. sem. balsam. copaiv. q. f. m. f. pil. pro dos. xij.

Pilule de Creta Palmarii. B.

℞. Aloes opt. unc. j. cret. albis. succin. alb. gentian. mirrh. rad. fraxinel. ana dram. j. mithridat. scrup. iv. tereb. lor. dram. ii. syr. de alth. q. f. f. massa pil. *Sunt qui addunt calomel. unc. sem. vel. dram. vj. Dos. scrup. ij. vel dram. j. omni nocte ad dies xv.*

Pilule Diuretice. F.

℞. Test. ovar. calcinat. dram. sem. camphor. scrup. j. cantuarid. scrup. sem. tereb. Ven. q. f. f. pil. pro dos. iij.

Pilule Hydragogæ. F.

℞. Gambog. pulv. a. gr. xii. ad gr. xvi. ol. junip. gut. ij. mithridat. q. f. f. pil. pro una dosi.

Pilule Hydropicæ Bontii. Art. 825.

Pilule Hystericæ. F.

℞. Galban. colat. asæ foetid. myrr. ana dram. j. castor. camphor. sal. succin. ana scrup. sem. ol. succin. gut. iv. balsam. Peruv. q. f. f. massa, qui (quoties res postulaverit) adjici possunt sal. chalyb. scrup. ij. exindeque dicantur pil. hyst. chalyb.

Pilulae Volatiles.

2℥. Sal. volat. C.C. vel sal. volat. ammoniac. dram. ij. gum. ammon. dram. j. extract. croc. pulv. carn. viper. ana scrup. j. bals. Peruv. q. s. m. f. massa pil.

Pulvis Diureticus. G. Art. 735.*Pulvis Epilepticus de gutteta dictus.* B.

2℥. Rad. fraxinel. visc. quercin. contrayerv. serpent. virgin. pæon. mar. (debito tempore collect.) sem. pæon. mar. magist. C.C. magist. ungu. al. cis ana dram. ij. rad. valerian. sylv. unc. j. coral. rub. cran. human. ana dram. iij. lapid. hyacinth. dram. j. bezoar. occident. dram. i. sem. orient. scrup. j. m. f. pulvis subtilis; adde mosch. gr. v. fol. auri N. 30. m.

Pulvis Hemoptoicus. F.

2℥. Sem. hyoscyam. papav. alb. ana dram. ij. ter. sigil. lapid. hæmatit. ana dram. j. sacchar. ros. dram. vj. m. f. pulv.

Pulvis Pleuriticus. B.

2℥. Flor. sulph. unc. ij. dent. apri, mandib. lucii piscis ana unc. j. flor. papav. rhœad. unc. sem. m. f. pulvis Dos. dram. i.

Pulvis Uvularis. 1. F.

2℥. Ter. Japon. flor. balauft. ana scrup. j. alum. piper. long. ana scrup. sem. m. f. pulvis. *Modus usurpandi est, ut lingua speculo oris depressa, pulvis (ope fistulae) insuffletur uvulae, & operatio pro re nata repetenda.*

Pulvis Uvularis. 2. B.

2℥. Flor. balauft. rad. bistort. tormentil. ana dram. ij. alum. dram. j. m. f. pulv.

Semicupium Hildani. Art. 988.

2℥. Rad. & fol. alth. rad. & fol. malv. rad. fœnicul. apii, petroselin. eryng. marin. ana unc. ij. (rad. raparum lib. ij.) herb. parietar. violar. veronic. flor. cham. melilot. genist. sambuc. ana M. j. sem. lin. fœnugr. ana unc. j. petroselin. anis. fœnic. genist. ana unc. ii. coq. in q. s. aq. font. pro semicupio.

Stypticum Regis. B.

Vitriolo soluto, filtrato, cum aceto distillato præcipitato, edulcato, & siccato affunde oleum vitrioli, & distilla ex retorta ad siccitatem; caput mortuum digere cum spiritu vini, filtra calide ac abstrahere. Solve salem in fundo remanentem cum quadruplo aquæ per digestionem, & f. stypticum.

Succi Antiscorbutici.

2℥. Fol. cochlear. hortens. beccabung. nasturt. aquat. ana p. æ. contundantur & exprimatur succus ad lib. ij. deinde add. vin. alb. vel Rhe. nan. lib. j. aq. raphan. comp. succ. aurant. acid. ana lib. sem. misce dos. unc. iij. bis in die sine vel cum pauco saccharo.

Suffitus ad Catarrhum. F.

2℥. Oliban. succin. benzo. styrac calam. gum. guaiac. balsam. to. lutan. ana scrup. ii. f. pulvis crassus pro suffumigio capitis.

Syrupus de Peto. F.

2℥. Succ. peti Anglic. lib. iv. oxymel. simpl. unc. iv. hydromel. lib. ii. misce & digere quatuor dies, ut optime defæcetur: tunc decanta, iterum que digere ut supra, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit, adde postea sacchar. lib. ii. & coq. in syrup. f. a.

Syrupus Vermifugus. B.

2℥. Fol. helleborastr. rec. unc. ii. Hagiospermi unc. i. sem. rad. bryon. rec. unc. sem. absynth. Roman. M. ij. coq. in aq. font. q. s. ad lib. j. colatur. add. sacchar. alb. lib. j. & coq. ad syrup. f. a.

Tabellæ Domestice. S. Art. 488.*Tabellæ Embryonum.* B.

2℥. Fulv. rad. bistort. ebor. coral. rub. coriandr. præp. ana unc. sem. succin. alb. crystal. bacc. cherm. ana dram. ij. sacchar. alb. unc.

xvj. aq. cydon. q. f. a. coq. f. a. addendo ol. cinnam. gut. vi. affund. & f. tab. f. a.

Tinctura Antiphthifica . F.

℥℥. Sacchar. saturn. vitriol. mart. ana unc. j. sp. vin. rectific. unc. viii. repone in frigido donec rubescat spiritus.

Tinctura Bezoartica . B.

℥℥. Rad. enul. angel. zedoar. serpent. virg. ana unc. i. sem. croc. opt. unc. i. myrrh. cinnam. cort. citr. sicc. ana dram. vj. fol. scord. rut. ana M. sem. theriac. Androm. unc. iii. opii Thebaic. dram. ii. sp. tart. rectific. unc. xv. sp. vitriol. unc. iii. sp. bacc. sambuc. & sp. bacc. junip. rectific. ana unc. xviii. digere f. a. ac filtra, tum add. sal. succin. unc. i. camphor. dram. ii. digere iterum ad usum. Dos. a dram. iii. ad unc. i.

Tinctura Cantharidum , G.

℥℥. Pulv. cantharid. unc. i. sp. nitri fortissim. unc. ii. digere simul horas 24. Si cantharides plane dissolventur, & liquor rubicundus erit; huic superaffund. sp. vin. unc. vi. digere simul, quo diutius eo melius; postea filtretur tinctura, & ad usum reservetur. Dos. a gut. xii. ad xl. bis in die in haustul. vin. alb. vel Rhenan.

Tinctura Epileptica . B.

℥℥. Castor. opt. unc. sem. succin. flav. in tenuissim. pulverem redact. croc. Angl. ana dram. ij. flor. recent. lil. conval. unc. i. his affund. sp. vin. camphorat. sp. lavend. comp. sp. sal. armoniac. ana unc. iv. digerantur absque calore dies vi. in vitro clauso; postea filtretur tinctura, vel decantetur a facibus per colum. Dos. a scrup. ad dram. i. in aq. ceras. nigr.

Tinctura Gum. Laccae . F.

℥℥. Pulv. gum. lacc. unc. sem. alum. ust. dram. j. sp. cochlear. ultimo extillant. unc. vii. phiala arcte inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Vapor ad Anginam . F.

℥℥. Piper. pulv. unc. i. lact. lib. ii. coq. ad lib. i. sem. dein ponatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiat.

Vinum Chalybeatum . P. L.

℥℥. Chalyb. præpar. unc. i. Croci pulverisati & in nodulo inclusi gr. viii. Vini albi odori lib. ii. infunde frigide per triduum, aut quatriiduum, sæpe interea agitando, inverso vase. Tum F. colatura per manicam Hipp. serveturque usui.

Vinum chalybeatum . 2. F.

℥℥. Limatur. chalyb. unc. ii. succ. aurant. acid. N. viii. (vel potius unc. iv.) stent simul horas 24. Dein add. vin. alb. lib. v. cinnam. unc. sem. caryoph. dram. ii. mac. scrup. iv. stent tepide dies iv. dos. unc. iii. bis in die.

Vinum Hydropicum . F.

℥℥. Rad. irid. florent. unc. ii. enul. scill. ana unc. sem. cort. sambuc. ebul. ana unc. i. cort. winteran. unc. ij. fennæ unc. ii. hellebor. nigr. agar. jalap. ana dram. ii. vin. alb. lib. iv. Infunde frigide. Dos. unc. iv.

Vinum Viperinum . B.

℥℥. Viperas foemellas vivas tempore verno collect. N. vi. vin. Hispan. opt. lib. vi. macera (vase optime clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt qui macerant viperas excoriatas (rejectis interaneis, cauda, ac capite) in vin. Hispan. per aliquot dies. Dos. unc. iii. vel iv. bis in die ad longum tempus.

Vitriolum Martis . B.

℥℥. Alcoh. vin. unc. iv. ol. vitriol. unc. ij. serva simul in vase ferreo ad dies xv. vel ad siccitatem, Dos. a gr. ij. ad vj.

Unguentum Digitale . B.

℥℥. Butyr. majal. lib. iij. flor. digitalis rec. contus. quot infarciri possunt, insolentur dies 20. deinde coq. f. a. & f. expressio.

Unguentum Hæmorrhoidale . F.

℥℥. Unguent. popul. unc. j. ol. succin. dram. ij. m. f. unguent.

Unguentum Pleuriticum . F.

℥℥. Unguent. dialth. unc. j. ol. lin. unc. sem. ol. cymin. dram. sem. camphor. scrup. sem. sp. sal. armoniac. dram. i. sem. m.

Unguentum ad ulcera Venerea . P.

℥℥. Mercur. præcipit. rub. dram. ij. mercur. præcipit. alb. unc. j. ol. tart. per deliq. scrup. ij. unguent. pomat. unc. ij. m.

S Y L L A B U S

Symptomatum Morborum,

S I V E

Egrotorum passiones variæ enumeratæ, & ad calculum redactæ, in hunc finem, ut Morbos eorumque Causas Medicus facilius, promptius & certius inveniat, introspiciat & cognoscat, unice constructus.

Usus hujus Indicis neminem latere potest.

MEDICUS juvenis & in Praxi minus exercitatus ægrum suum de omnibus apte interroget, atque ex ipsius, vel cohabitantium ministrantiumve ore Symptomata & Querimonias omnes sedulo expiscetur: hoc facto singula Symptomata in Indice investiget; & librum ipsum (quoties opus sit) variis in locis consulat; indeque de natura Morbi, utcunque obscuri, complicati, judicium iustum & raro fallax formare valeat.

Symptoma .	A	Morbus .	Art.
Abdominis dolores	{	<i>Alvi Retentio</i>	611
Vid. ventris dolores & tormina			
Abdominis intumescencia Vid. ven-	{	<i>Hydros ascites</i>	801
tris intumescencia		<i>Vesicalis</i>	815
Tumor	{	<i>Empyema</i>	240
Vid. Ventris Tumor			
Absumptio corporis	{	<i>Phthisis nervosa</i>	513
Ægrotudo gravissima		<i>Arthritis</i>	911
	{	<i>Ventriculi morbus</i>	581
		<i>Arthritis</i>	925
Alvus adstricta	{	<i>Colica</i>	643
		<i>Iliaca passio</i>	666
Alvi excrementa albicantia	{	<i>Celiaca</i>	629
Grisea vel pallida			
Cineritii coloris	{	<i>Icterus</i>	843
Levia & ventosa			
Instar stercoris bovini	{	<i>Colica</i>	646
Viridia			
Alvi fluxus	{	<i>Tormina ventris</i>	1523
Chylosus		<i>Diarrhœa</i>	617
Vid. Dejectiones, diarrhœa.	{	<i>Coeliaca</i>	629
Alvus lubrica vel soluta Vid. Diar-			
rhœa.	{	<i>Lumbrici</i>	1548
Alvi retentio		<i>Ventriculi morbus</i>	585
Alvus segnior	{	<i>Ventriculi morbus</i>	581
Amor		<i>Arthritis</i>	925
Anhelatio	{	<i>Phthisis nervosa</i>	518
Vid. Dyspnœa respiratio anhelosa (
Animi deliquium .	{	<i>Peripneumon. notb.</i>	214
		<i>Affect. hyster.</i>	402
Ani pruritus	{	<i>Syncope</i>	571
Procidentia vid. procidentia ani		<i>Ascarides</i>	681
Anthrax vid. carbunculus	{	<i>Pestis</i>	170
Anxietas vid. præcordiorum anxie-		<i>Febris ardens</i>	65
tas.	{	<i>Hydrophobia</i>	445
Aphonia		<i>Pestis</i>	170
Vid. rauco	{	<i>Colica</i>	649
Aphthæ		<i>Lumbrici</i>	683
Apoplexia leviuscula	{	<i>Dysenteria</i>	636
Appetitus diminutio		<i>Febris continua</i>	61
Appetitus insuetorum	{	<i>Affectio hysterica</i>	396
		<i>Febris intermit. spur.</i>	37
	{	<i>Phthisis</i>	522
		<i>Ventriculi morbus</i>	602
	{	<i>Gravidatio</i>	1421
		<i>Ventriculi morbus</i>	603
Nimius	{	<i>Lumbricus latus</i>	678
		<i>Arthritis</i>	908
	{	<i>Ventriculi morbus</i>	603

Symptoma.	Morbus.	Art.
Aquarum ex utero fluxus imma- turus	} Abortus	1441
Ardor lumborum		695
Artuum dolores	{ Arthritis	908
		884
Lassitudo	{ Scorbutus	854
		469
Atrophia	{ Catarrhus	69
		879
Auris internæ suppuratio	{ Febris lenta	228
		961
Aurium tinnitus	{ Scorbutus	66
		83
		1495

B

Borborygmi & murmura intestino- rum	} Affectio hyster.	400
Vid. ructus, flatus		
Bulimus	{ Affectio hyster.	408
Bubo in inguine	{ Ventriculi morbus	604
Bubones	{ Lues Venerea	961
		77
	{ Febris maligna	171. 180
	{ Pestis	

C

Cachexia	Scorbutus	869
Calor & frigus se mutuo excipien- tia	} Morbilli	123
Calor hecticus		494
Calor urens	{ Phthisis	145
Capillorum defluvium	{ Post variolas	62. 65. 103
Caput justo majus	{ Febris ardens	493
		1636
Capitis dolor	{ Phthisis	832
		1553
Capitis dolor cum insigni ardore	{ Venenum	34. 58. &c.
		396
Cum aliquali frigoris sensu	{ Hydrocephalus	611
		683
Capitis dolor gravativus	{ Rachitis	194
Capitis dolor punctorius & grava- tivus	{ Febr. fere omnes	280. 281
	{ Affectio hysterica	280
	{ Alvi retentio	280
	{ Lumbrici	280
	{ Sudor Anglicus	37
	{ Cephalalgia	869
	{ Cephalalgia	
	{ Cephalalgia	
	{ Febris intermittens	
	{ Scorbutus	

Symptoma.	Morbus.	Art.
Capitis & dorſi dolor	<i>Variola</i>	131
Capitis gravitas	<i>Catarrhus</i>	469
Capitis tumor aquoſus	<i>Hydrocephalus</i>	832
Carbunculus	<i>Peſtis</i>	171. 181
Cardialgia	<i>Lumbrici</i>	683
Caries oſſium	<i>Post variolas</i>	145
Carunculæ in Urethra	<i>Lues venerea</i>	990
Catarrhus	<i>Febris lenta</i>	69
Cervicis dolor	<i>Phthiſis</i>	491
Cholera morbus	<i>Febris ardens</i>	66
Chyli per alvum fluxus	<i>Febris intermittens</i>	37
Per Urinam	<i>Cæliaca</i>	629
Circumrotatio objectorum viſibilium	<i>Diabetes</i>	697
Claudicatio fatuorum more	<i>Vertigo</i>	300
	<i>Chorea Sancti Viti</i>	391
	<i>In variolarum apparatu</i>	137
	<i>Febris intermittens</i>	37
	<i>Febris remittens</i>	50
	<i>In parturientibus</i>	1452
	<i>Calculus renum</i>	739
	<i>Affectio hyſterica</i>	396
Color purpureus ſub concavo oculorum	<i>Chloroſis</i>	1392
Colliquatio humorum	<i>Scorbutus</i>	889
	<i>Febris colliquativa</i>	73
	<i>Febris ardens</i>	65. 114
	<i>Febris eruptiva</i>	118
Coma	<i>Hæmorrhoides</i>	1259
Condylomata circa anum	<i>Lues venerea</i>	961
Congelatio	<i>Catalepsiſ</i>	350. 351
Contractura partium	<i>Convulſio tonica</i>	365
Convulſio	<i>Febris ardens</i>	65. 116
	<i>Febris eruptiva</i>	118
	<i>Dentitio</i>	1543
Convulſiones infantum	<i>Lumbrici</i>	1548
	<i>Epilepſia</i>	375. 379
Convulſivi motus	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Chloroſis</i>	1393
	<i>Affectio hyſterica</i>	396
	<i>Scorbutus</i>	869
Cordis palpitatio	<i>Sudor Anglicus</i>	194
	<i>Venenum</i>	1576
Corona ſubcærulea vel ſubrubeſcens ſub oculis	<i>Chloroſis</i>	1392
Coryza	<i>Febris lenta</i>	69
Criſes febrium	<i>Febris continua</i>	58. 59. 91
Cruris ſupor	<i>Nephritis</i>	708
Crurum tumor frigidus	<i>Hydrops</i>	809
	<i>Pleuritis</i>	228
Cruſta alba in ſanguine	<i>Rheumatismus</i>	854

Symptoma.	Morbus.	Art.
Cutis densitas ac scabrities tumida cum rugis & fissuris; &c.	Elephantiasis	1199
Flavedo vid. flavedo cutis	Cutis siccitas vide siccitas cutis	
D		
Decubitus in unum tantum latus	Empyema	240
In latus morbosum	Pleuritis	224
In latus oppositum		
De glutitio difficilis	Angina	200
	Febris ardens	66
	Variolæ	144
Penitus impedita	Paralysis gulæ	343
Dejectiones albæ vel cineritiæ	Icterus	840
	Calculus in vesica fellea	843
Dejectiones albicantes griseæ vel pallidæ	Cæliaca	529
Aquosæ	Dysenteria	633
Membranaceæ	Dysenteria	635
Mucosæ	Dysenteria	631
Purulentæ cum carunculis	Dysenteria	636
Sanguinolentæ	Dysenteria	631
Vid. fluxus cruentus		
Ventosæ & leves instar Stercoris bovini	Colica	646
Viridis vel insoliti coloris	Colica biliosa	643
	Tormina ventris	1523
	Calentura	64
Delirium	Febris	32. 58. 65. 115.
	Lumbrici	683
Delirium furiosum sine febre.	Mania	427
Melancholicum sine febre. Ra- biosum	Melancholia	427
	Hydrophobia	450
Perpetuum & iramane	Phrenitis	245. 247
	Paraphrenitis	254
Dentium caries & vacillatio	Scorbutus	869
Hæmorrhagia		
Stridor	Epilepsia	379
	Lumbrici	1548
Ad diaphragma gravitas	Empyema	240
	Affectio hysterica	396
	Arthritis	918
Diarrhœa	Phthisis	497
	Scorbutus	870
	Variolæ	132
Diarrhœa colliquativa	Febris	109
Diarrhœa infantum	Dentitio	1543
	Lumbrici	1548
Cum dejectionibus subviridibus, vide Dejectio- nes varii coloris	Morbilli	123

Oleosa	{ Diarrhœa	619
	{ Cholera morbus	607
Tormentosa	{ Dysenteria	631
	{ Febris intermittens	37
	{ Febris remittens	50
	{ Spasmus Cynicus	362
Distortio oris		
Dolor abdominis vid. abdominis dolor		
Artuum vid. Artuum dolores		
Capitis vid. capitis dolor		
Dolor circa cordis regionem	{ Pestis	183
Circa scrobiculum cordis	{ Ventriculi morbus	592
Dorsi & capitis	Variolæ	131
Ad claviculum & mammas	{ Peripneumonia vera	216
Insignis sub costis nothis	{ Inflammatio ventriculi	258
Dolor Cervicis vid. cervicis dolor.		
In artubus ardens, pungens, lacerans, pulsans, &c.	{ Arthritis	918
Obscurus in hypochondrio dextro	{ Hepatitis	268
In hypochondrio sinistro	Inflammatio lienis	371
Intestinorum vid. intestinorum dolor		
In oculorum bulbis	Phrenitis	255
Lenis in alterutro pectoris loco	{ Vomica Pulmonis	443
Punctorius versus omoplatas	{ Pleuritis	212. 216.
In qualibet thoracis parte	{ Pleuritis	218
Medium ventrem affligens cinguli instar	{ Colica biliosa	644
Circa umbilicum intensissimus	{ Iliaca passio	666
Subter sternum	Scorbutus	880
Universalis contundens & lacerans	{ Feb. Petech.	79. 112
Erratici externum corporis habitum occupantes	{ Rheumatismus	854. 857
Nocturni	Lues venerea	961
Parturientium æmuli	{ Febris intermittens	37
	{ Colica	1452
Vagi præcipue crurum	Scorbutus	869
Dorsi & capitis dolor	Variolæ	121
Dorsi spinæ inflexibilitas	Calculus renum	728
Dyspnœa	{ Hydro†	801
Vid. Respirandi difficultas	{ Phrenitis	255
Dysenteria	Febris remittens	50
Dysuria	Ulcus renum vel vesicæ	720
	E	
	{ Erysipelatis quedam species a	
	{ Rash	1168
Efflorescentiæ maculosæ	{ Febris maligna	75
	{ Morbilli	123
	{ Variolæ	125

Symptoma.	Morbus.	Art.
Confluentes	Febris Scarlatina	112
Miliaris purpurea in infanti- bus recens natis	Red-Gum.	1515
Empyematis signa	Hydrops pectoris	836
Epileptici paroxysmi	Variolæ	131
Erysipelatosus tumor	Variolæ	142
Exanthemata	Pestis	170
	Variolæ	138
Excrementa alvina albicantia , grisea vel pallida , chylosa	Cœliaca	629
Levia & ventosa instar stercoris bovini	Colica	646
Viridia		
Vid. dejectiones coloris varii, &c.	Tormina ventris	1523
Extenuatio partium carnosarum	Atrophia infantum	1530
	Phthisis	474
	Phthisis nervosa	513
F		
Facies plenior & floridior in in- fantibus	Rachitis	1553
Scabiosa infantum	Crusta lactea	1561
Turgida & subtumida	Febris	96
Facies pallor	Chlorosis	1392
Rubor	Febris ardens	68
Rubor & pallor alternatim	Lumbrici	1548
Rubor pustulosus	Gutta rosacea	1143
Rubor post pastum	Cruditus ventriculi nidorosa	584
Faucium dolor & inflammatio	Angina	200
Febris ardens	Inflammatio alicujus visceris	62
	Inflammatio ventriculi	258
Febris lenta	Catarrhus	469
	Diabetes	695
	Empyema	240
	Cachexia	793
Febricula	Chlorosis	1392
	Rheumatismus	854. 657
	Affectio hysterica	402
Flatus in ventriculo & in intestinis	Scorbutus	869
	Ventriculi morbus	588
Flavedo cutis	Cachexia	784
	Icterus	840
Fluctuationis in Abdomine	Ascites	809
aquæ sensus in Pectore	Hydrops pectoris	801
in Utero	Hydrops uteri	1434
	Dysenteria	636
Fluxus cruentus	Hæmorrhoides	1263
	Inflammatio pancreatis	267

Symptoma.	Morbus.	Art.
Fovea a digitorum impressione	Scorbutus	1263
	Hydrops	801
	Oedema	1272
Frigus & calor superveniens	Febris intermittens	34
	& in initiis fere omnium	102
Frigeris	Affect. hysterica	396
sensus	Colica	646
in capitis vertice	Affect. hysterica	402
in abdomine per dorsum	Scorbutus	869
Furunculi	Variolæ	145
Gangræna & caries	G Post variolas	145
Genarum rubor	Phthisis	494
Genitalium tumores oedematosi	Lues venerea	985
Gesticulationes variæ	Chorea Sancti Viti	391
Gingivarum cruentatio	Scorbutus	869. 889. 892
Erosiones	(Dentitio in infantib.	1543
Laxitas	(Parulis	1235
Inflammatiô	Colica hysterica	661
Globi sensus in abdomine	Lues venerea	964
Gonorrhœa virulenta	Gonorrhœa Catarrh.	966
Non virulenta	Hydrophobia	451
Gravitas corporis	Empyema	240
Ad diaphragma	Febr. ardens	66
Ad tempora	Feb. petech.	82
Gravitas circa ventriculi regionem	Calculus Vesicæ	730
Gravitatis sensus in perinæo	Feb. Eruptiva	118
Gutturis dolor ulcerosus	Variolæ	132
Gutturis ac pectoris stridor	Angina	200
	H	
Hæmorrhagia narium	Feb. ardens	66
	Feb. continua	58
	Feb. sui generis	1096
	Variolæ	132
Hæmoptoe	Feb. sui generis	1096
	Phthisis	533. 536
Hæmorrhoidum fluxus	Vomitibus cruentis	596
Halitus foetens intolerabilis	Secundina retenta	1483
Halitus gravis	Scorbutus	869
Hebetudo visus	Cataracta incipiens	1085
	Feb. ardens	66
Hemicrania	Cephalalgia	282
	Feb. intermittentes	47
	Abortus	1441
Horripilatio	In initiis fere omnium febrium	Hu-

Symptoma.		Morbus.	Art.
Humorum colliquatio	Feb. colliquativa		73
Hypochondriorum distentio	{ Affectio Hysterica		399
	{ Colica		646
Oppressio & angustia	{ Feb. eruptiva		118
	{ Phthisis		522
I			
Icterus	{ Colica	646.	841
	{ In pregnantibus		846
Ignavia & torpor in pueris	Rachitis		553
Inappetentia	{ Phthisis nervosa		513
	{ Ventriculi morbus		602
Indigestio	{ Melancholia		426
	{ Ventriculi morbus	379. &c.	
Indigestorum per alvum excretio	Lienteria		627
Inflatio circa scrobiculum cordis	{ Asthma		547
	{ Affectio Hysterica		401
Inflatio ventriculi	{ Cholera morbus		607
	{ Febr. ardens		63
Inquietudo universalis	Febr. maligna		74
Intestinatorum dolor atrocissimus	{ Colica		643
	{ Iliaca passio		666
Vehemens pulsatorius, &c.	{ Inflammatio intestinorum		261
Ad punctum determinatus	{ Colica		643
Circa umbilicum intensissimus	{ Iliaca passio		666
Intestinatorum prolapsus	Hernia		1310
Intumescencia abdominis vid. abdominis & ventris intumescencia			
Intumescencia faciei, abdominis, totius corporis	{ Venenum	1576. 1590. &c.	
Iracundia	{ Diarrhoea.		621
	{ Hydrophobia.		445
Ischuria	{ Calculus renum vel vesic.		572
	{ Sanguinis dyscrasia		756
Iugularium venarum intumescencia	{ Apoplexia		325
L			
Labiorum intumescencia & nigrities	{ Venenum		1576
Lac in mammis collectum	Gravidatio		1420
Lactis species sed non verum	{ Mola		1487
Lacrymæ invitæ	{ Feb. ardens		66
	{ Feb. eruptiva		118
	{ Affectio Hypochondr.		400
Languores gravissimi	{ Arthritis in ventricul.		916
	{ Sudor Anglicus		194
	{ Syncope		571
Lassitudo artuum	Febr. lenta		69
	{ Icterus		840
	{ Chlorosis		1393
Lassitudo spontanea	{ Fluor albus.		1412
	{ Scorbutus		869

Syllabus Symptomatum.

335
Art.

Symptoma.

Morbus.

Totius corporis	{ Feb. ardens	65
	{ Feb. continua	58
Lateris dolor punctorius	{ Pleuritis	212
Laxitas & mollities partium in pueris	{ Feb. intermittens	37
Lingua alba	{ Rachitis	1553
	{ In febrium initiis morbilli	123
Sicca, flava, nigra, exusta	{ Feb. ardens	65
	{ Petechialis	83
	{ Pestis	170
Linguae intumescencia	{ Venenum	1576
Linguae scabrities	{ Feb. ardens	65
	{ Feb. continua	58. 107
Lipothymia vid. Syncope		
Lipyrria	Febris	104
Livor vultus	Angina	200
Lochia per aliena loca excreta	{ Lochia	1487
Foetorem cadaverosum referentia	{ Secundina retenta	1483
Lumbago	{ Feb. continua	58. 112
	{ Feb. intermittens	34
	{ Rheumatismus	854
Gravativa	Fluor albus	1413
Lumborum ardor	Diabetes	695
Dolor ardens & pungens	{ Nephritis	708
Dolor fixus gravativus	{ Calculus renum	728
	{ Rheumatismus	854
Superiorum dolor obtusus	{ Pancreatis Morbus	596
	{ Feb. petechialis	83
Lumbrici	{ Horrenda Symptomat.	686
	{ Variolae. Male ominantur.	

M

Macula albescens in oculo	Albugo	1049
Maculae cutaneae fuscae	Ephelides	1150
Maculae lividae in sanguinis superficie	{ Lues venerea	962
	{ Feb. petechialis	80
Maculae rubrae pulicum morsibus similes	{ Morbilli	123
	{ Variolae	125
Rubescens latiores	Feb. scarlatina	120
Mac. Rubrae, majusculae, rotundae, distinctae	{ Feb. petechialis	86
Flavescentes, nigrescentes	{ Feb. petechialis	83. 86
	{ Pestis	172
Lividae pallescentes	{ Feb. petechialis	80. 86
	{ Variolae	143
Nigrae, fuscae, vel lividae	{ Venenum	1636
	{ Pestis	172
Maculae purpureae	{ Scorbutus	869
	{ Variolae	132

Nigrae

Symptoma.	Morbus.	Art.
Nigræ violaceæ	} Pestis	172
Macularum rubrarum, vel purpu- rearum eruptiones	} Variolæ	144
Maculæ exiguæ more lentiginis rubræ aut flavæ in fronte, tem- poribus, &c. erumpentes	} Phthisis scorbutica	527
	} Scorbutus	869
Mammarum intumescencia	} Lues venerea	961. 962
Detumescencia	} Gravidatio	1420
	} Mola	1426
	} Uterus inflatus	1429
	} Abortus	1441
Meiendi perpetuum desiderium	} Variolæ	137
	} Calculus vesicæ	720
	} Stranguria	761
Memoriæ debilitas	} Apoplexia	314
	} Paralysis	336
Mensium suppressio	} Conceptus	1420
	} Uterus inflatus	1429
Mentis alienatio	Chorea Sancti Viti	394
Mictio dolorosa	Ulcus vesicæ	718
	Empyema	244
	Gonorrhœa	787
Mictio purulenta	Fluor albus	ibid.
	Ulcus renum vel vesicæ	720
	Calculus	787
	Febris ardens	66
	Mictus cruentus	767
Mictus sanguinis.	Pestis	170
	Variolæ	132
	Scorbutus	787
	Variolæ	137
Micturitio	Stranguria	761
	Diarrhœa	621
Mœror	Mœror	843
	Phthisis nervosa	518
Motus manuum & pedum deprava- tio	Colica pictonum	655
Motus tremulus & undulatorius objectorum visibilium	Vertigo	303
Motus in imo ventre	Affect. Hyst.	287
Motus in utero lenis blandus or- dinatusque	Conceptus	1420
Tremulus & palpitans	Mola	1426
Muscarum pilorum, &c. simula- cra ante oculos volitantia	Gutta serena	1059. 1090
N		
Narium excrescentia alba rubra vel livida	Polypus narium	1108
Pruritus	In feb. ardente	66
Scalptura	Lumbrici	1548
	Alvi retentio	611
	Calculus renum	730
	Conceptus	1421
Nausea & vomitus	Feb. intermittens	34

Symptoma.

Morbus.

Art.

Nephritici dolores

Nephritis

713

Affect. Hyst.

396

Arthritis

920

Feb. intermittens

37

Nodi & topi

Arthritis

910

Lues venerea

961

Nodi in carpis & costarum extremitatibus

Rachitis

1553

O

Objectorum visibilium circumrotatio, motus tremulus & undulatorius

Vertigo

303

Obmutescencia subitanea

Lumbrici

689

Fissura cranii

1335

Venenum

1636

Oculi cavi

Empyema

240

Phthisis

493

Oculorum horridus obtutus

Venenum ex opio

1636

Oculorum distillatio

Morbilli

123

Defluxio serosa

Epiphora

1064

Gravedo

Morbilli

123

Inflammatiō cum tumore, ardore & dolore

Ophthalmia

1021

Insolita mutatio

Febris maligna

77

Puncturæ

Febris eruptiva

118

Rubedo

Febris eruptiva

117

Splendor

Peripneumonia vera

216

Odor cadavericus

Febris

28

Gangrena

1385

Mortis signum

28

Œdematosus corporis habitus

Anasarca

799

Leucophlegmatia

797

Phthisis nervosa

513

Œdematosi tumores

Scorbutus

858

Post variolas

145

Ophthalmia

Febris intermittens

37

Oppressio pectoris

Febris eruptiva

117

Oris distortio

Spasmus Cynicus

362

Fetor

Scorbutus

889

Pruritus

Scorbutus

869

Ossium crepitus

Scorbutus

885

Incurvatio

Rachitis

1553

Tumor vel protuberantia vid.)
nodi & topi)

Rachitis

1553

Spina ventosa

1286

Ozæna

Lues venerea

961

P

Palati ulcus

Lues venerea

961

Palpebræ inversæ

Ectropium

1018

Y

Pal-

Symptoma.

Morbus. Art.

Palpebra oedematosa
Palpebrarum gravitasHydatis
Febris eruptiva

1001

118

Intumescencia

{ Chlorosis

1393

{ Morbilli

123

Tracoma

1009

Pruritus & rubor

{ Conceptus.

1420

Pupillarum color in lividum mutatus

Palpitatio cordis vid. cordis palpitatio.

{ Colica Pictorum

659

Paralysis.

{ Scorbutus

880

Parotides

Post variolas

149

Pectoris gravitas

Empyema

247

Mala conformatio

{ Asthma

549

{ Phthisis

494

Ingens oppressio

{ Febris eruptiva

117

{ Febris miliaris

1492

{ Peripneumonia notha.

22

{ Peripneumonia vera

210

Stridor

{ Hydrops pectoris

830

Pedium tumor

In penis summitate dolor exquisitus

{ Calculus vesicae

730-739-74

Pruritus & frequens erectio

{ Febris intermittens

3

Periodicus symptomatum recursus

{ Febris remittens

4

Peripneumonia

{ Arthritis

91

Pervigilium vid. vigiliæ nimia

{ Febris ardens

6

Petechiæ

{ Febris petechialis

79. 8

140. 14

Phrenitis

{ Variolæ

0

Pica

{ Febris ardens

5

{ Febris continua

142

{ Conceptus

60

{ Ventriculi morbus

3

Pleuritici dolores

{ Febris intermittens

3

{ Febris remittens

5

{ Lumbrici

68

Præcordiorum anxietas

{ Asthma

59

{ Chlorosis

139

Dolor

{ Febris eruptiva

11

Præcord. Inflatio

{ Febris maligna

7

Perturbatio

{ Febris petechialis

8

Præputii inflammatio & tumor

{ Febris puerperarum

14

Tumor sine coloris mutatione

{ Febris ardens

6

Procidentia ani

{ Febris maligna

4

Pruritus ani

{ Melancholia

6

Totius corporis

{ Colica hysterica

9

Pruritus manuum vel pedum cum

{ Tumor flatulentus

12

ardore, rubore &c.

{ Calculus vesicae

7

{ Ascarides

6

{ Icterus

8

{ Psora

11

{ Pernio

12

Mo-

339

Symptoma	Morb. Art.
Molestus in infantibus	1550
Circa juncturas	1181
Prunella	107
Ptyalismus vid. salivatio	
Pubis ardor & dolor &c.	
Pulmonum coarctatio	Inflammatio vesicæ 717
Pulsatio in abdomine	{ Asthma 545
Subtus ventriculum	{ Peripneumonia notha 214
Pulsus velox	Colica 646
Fortis uno tenore pergens	Affectio hysterica 400
Celer, debilis, vacillans	Febris in genere 20
Celer, inæqualis	(Idem 32
Debilis ac languidus	Idem 32
Durus	Sudor Anglicus 194
Fortis	Febris maligna 74
Tardus	Pleuritis 227
Pupilla angusta	Apoplexia 326
Nigrior & amplior	Scorbutus 886
Pus albo-flavescens ab oculis extil-	Cataracta 1060
lans	Gutta serena 1088
Puris viscidis creatio	{ Fistula lacrymalis 1083
Pustulæ albidæ relinquentes crustu-	{ Phthisis 527
las semina millii referentes	{ Herpes miliaris 1162
Pustulæ accumulativè exurgentes) Serpigo 1160
Densæ, dolorosæ, rubræ cum in-	(Erysipelas 1168
flammatione latius serpentes	
Pustulæ Flavæ, siccæ cum arida	(Lues venerea 962
crusta sparsim per corpus, specia-	
tim in fronte & mento, &c.	(Herpes exedens 1165
Inflammatoriæ partem exulcerantes	(Impetigo 1188
Plures congestæ, squamosæ, &c.	
Parvæ rubescences cum cutis duri-	{ Psora 1180
tie & pruritu insigni	
Subrubræ	Variolæ 131
Variæ in pene & alibi	Lues venerea 961
Urticationes referentes	Erysipelas species 1168
Pustula (vel potius tuberculum) sub-	{ Epiphytis 1237
livida, vel subnigra vel alba.	
	R
	{ Catarrh. suffocativus 479
	{ Colica 649
	{ Febris lenta 69
	{ Lues venerea 961
	{ Lumbrici 683
	{ Catarrh. suffocativus 482
	{ Febris eruptiva 118
	Variolæ 155
) Angina 200
	(Paralysis 332. 335
	(Asthma 545. 554
	Ref.

Respiratio ejusmodi in infantibus	(<i>Asthma infantum</i>	1533
	<i>Febris eruptiva</i>	118
	<i>Peripneumonia notha</i>	214
Cita & anhelosa	<i>Secundina retenta</i>	1483
	<i>Variola</i>	155
	<i>Febris ardens</i>	65
Densa	<i>Peripneumonia vera</i>	216
	<i>Angina</i>	206
	<i>Catarrh. suffocativus</i>	479. 482
	<i>Colica hysterica</i>	663
	<i>Hydrops</i>	801
	<i>Hydrops pectoris</i>	837
Difficilis	<i>Icterus</i>	840
	<i>Peripneumonia notha</i>	216. 242
	<i>Phrenitis</i>	255
	<i>Rachitis</i>	155
	<i>Scorbutus</i>	860
	<i>Vomica pulmonis</i>	541. 541
	<i>Febris remittens</i>	5
Rheumatici dolores	<i>Lues venerea</i>	96
	<i>Scorbutus</i>	86
	<i>Dysenteria</i>	63
	<i>Febris intermittens</i>	7
	<i>Febris omnis</i>	2
Rigor & horror	<i>Pestis</i>	18
	<i>Pleuritis</i>	21
	<i>Rheumatismus</i>	85
Per vices recurrens	<i>Abortus</i>	144
Rifus Sardonicus	<i>Melancholia</i>	42
Rubor genarum	<i>Phthisis</i>	49
	<i>Affectio hysterica</i>	39
Ructus	<i>Scorbutus</i>	86
Acidi	<i>Ventriculi morbus</i>	58
Affidui	<i>Nephritis</i>	70
Inspidi	<i>Asthma</i>	54
Nidiosi	<i>Ventriculi morbus</i>	58
Saporis varii	<i>Idem</i>	58
Tetri odoris	<i>Melancholia</i>	42
	<i>Venenum</i>	157
	<i>S</i>	
Saliva copiosa	<i>Lumbrici</i>	15
Spumosa	<i>Diabetes</i>	7
	<i>Febris continua</i>	
Salivatio	<i>Phthisis</i>	41
	<i>Scorbutus</i>	8
	<i>Variola</i>	11
Saltationes admirandæ	<i>Chorea Sancti Viti</i>	3
Sanguis sincerus per alvum	<i>Dysenteria</i>	6
Sapor oris ingratus, vel amarus	<i>Hæmorrhoides</i>	12
Tetrus vel putridus	<i>Febris continua</i>	7
	<i>Empyema</i>	

Symptoma.	Morbus.	Art.
Scabies ferina & inveterata cum tuberculis mollibus vel indolentibus	<i>Lepra</i>	1191
Scotomia	<i>Apoplexia</i>	314
Screatus crudus & glutinosus filamentis nigris distinctus	<i>Asthma</i>	548
Scrobiculi cordis dolor	<i>Colica hysterica</i>	653
Inflatio	<i>Asthma</i>	548
Segnities	<i>Chlorosis</i>	1393
Segnities & torpor in infantibus	<i>Icterus</i>	840
Siccitas cutis	<i>Rachitis</i>	1553
	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Icterus</i>	840
	<i>Fungorum esus</i>	1603
	<i>Hepatitis</i>	268
Singultus	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Febris ardens</i>	65. 105
	<i>Febris continua</i>	58
Sitis intensa	<i>Diabetes</i>	695
	<i>Hydrops</i>	801
	<i>Venenum</i>	1576
Somnolentia	<i>Morbilli</i>	123
	<i>Variolæ</i>	131
	<i>Apoplexia</i>	315
	<i>Coma, lethargus, carus</i>	295. 296. 297
Sopor gravis	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Pestis</i>	176
	<i>Sudor Anglieus</i>	197
	<i>Affectio hysterica</i>	396
Spasmi	<i>Epilepsia</i>	375
	<i>Febris</i>	116
Spirandi difficultas, vid. respiratio difficilis		
Spirituum depressio	<i>Febris maligna</i>	74
	<i>Febris miliaris</i>	1497
	<i>Angina</i>	200. 206
Spuma circa os	<i>Apoplexia</i>	315
Sputum sanguinis vid. hæmoptoe	<i>Epilepsia</i>	379
	<i>Febris ardens</i>	66
	<i>Peripneumonia</i>	216
	<i>Pleuritis</i>	212
Stercoris per os ejectio	<i>Iliaca passio</i>	666
Sternutatio	<i>Morbilli</i>	123
Stertor insignis	<i>Apoplexia</i>	315
Stridor dentium, vid. dentium stridor.		
Stridor pectoris vid. pectoris stridor.		
Stomachi gravedo	<i>Hydrophobia</i>	449

Symptoma.	Morbus.	Art.
Stranguria	<i>Vesicantium applicatio</i>	110
	<i>Nephritis</i>	713
	<i>Arenæ vel sabulum</i>	746
	<i>Scorbutus</i>	869
Stupor in genere	<i>Venenum</i>	1576
Stupor brachii aut pedis	<i>Apoplexia</i>	314
Cruris	<i>Nephritis</i>	708
	<i>Feb. continua</i>	58. 111
Sudores	<i>Feb. intermittens</i>	34
	<i>Scorbutus</i>	869
Colliquativi	<i>Phthisis</i>	499
Copiosi	<i>Colica biliosa</i>	649
Critici	<i>Febris</i>	91
Glutinosi	<i>Febris</i>	97
Morbifici	<i>Morbi soporosi</i>	294
Perpetui & copiosissimi	<i>Sudor Anglicus</i>	194
	<i>Scorbutus</i>	869
Suffocationis periculum	<i>Angina</i>	200
	<i>Asthma</i>	554
	<i>Catarrh. suffocativus</i>	479
	<i>Uvula procidentia</i>	1133
	<i>Gutta serena</i>	1088
Superciliorum gravitas	<i>Pleuritis</i>	228
Suppuratio auris interni	<i>Febris maligna</i>	77. 99
Surditas	<i>Ascarides</i>	681
Syncope vid. languores gravissimi	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Venenum</i>	1576
Tendinum subfultus	<i>Febris continua</i>	32
	<i>Febris eruptiva</i>	118
	<i>Ascarides</i>	681
Tenesmus	<i>Calculus vesicæ</i>	730. 741
	<i>Fœtus mortuus</i>	1481
	<i>Ulcus vesicæ</i>	718
Testium inflammatio	<i>Lues venerea</i>	961
Testiculi retractio	<i>Calculus renum</i>	728
Thoracis totius dolor	<i>Nephritis</i>	708
Gravedo	<i>Peripneumonia notha</i>	214
Tibiarum dolores	<i>Peripneumonia vera</i>	216
Timitus aurium. vid. aurium	<i>Scorbutus</i>	880
timitus		
Tonsillarum tumor	<i>Angina</i>	200. 266
Tophi & nodi vid. nodi		
Tormina ventris. vid. ventris	<i>Lumbrici</i>	683
tormina	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Febris</i>	32
	<i>Iracundia</i>	358
Tremores	<i>In senio confectis</i>	358
	<i>Secundina retenta</i>	359
	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Icterus</i>	843
Tristitia		Tuber-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Tuberculum acutum inflammato- rium	{ Carbunculus Furunculus	171 1233
Durum, lividum vel nigricans	{ Cancer Ascites	1289 801
Tumor abdominis	{ Empyema Phyma	240 1239
Acuminatus glandularum	{ Oedema	1272
Tumor albicans, frigidus, indolens	{ Hydrocephalus	832
Aquosus capitis	{ Parotis	1243
Pone aures	{ Natta	1308
Carnosus magnus in dorso	{ Anasarca	799
Corporis totius	{ Paronychia	1247. 1248
In digitorum extremis ma- nuum vel pedum	{ Scrophula	1277
Durus, indolens, mobilis, si- ne coloris mutatione	{ Scirrhus	1275
Durus, livescens, indolens	{ Cancer	1289
Durus, lividus vel nigricans, punctorius	{ Hemorrhoides	1259
In ano varicosus	{ Phlegmone	1226
Cum inflammatione & dolore pulsatorio	{ Bubo	1241
Inflammatorius in inguine vel sub axilla	{ Tumor flatulentus	1298
Levis digito degens & digito pref- sus foveam non relinquens	{ Aneurisma	1255
Tumor mollis sine coloris muta- tione plerumque pulsans	{ Talpa	1305
Mollis & latus inter cranium & cutim	{ Lupia	1302
Mollis in juncturis	{ Spina ventosa	1286
Offis vel ejusdem protube- rantia	{ Inflammatio ventric.	258
In præcordiis	{ Ganglium.	1301
In tendine doloris expers	{ Hernia varicosa	1270
Varicosus venarum sperma- ticarum	{ Varix	1257
Ex laxata venarum tunica	{ Febris ardens	65
Tussicula	{ Lumbrici	683
	{ Morbilli	123
	{ Affectio Hysterica	396
	{ Febris lenta	69
	{ Pleuritis	212
	{ Scorbutus	869
	{ Tussis stomachalis	485
	{ Peripneumonia notha	214
	{ Asthma	554
	{ Phthisis	491
	{ Asthma	554
	{ Febris eruptiva	118
	{ Hydrops	821
	{ Hydrops pectoris	836. 837

Symptoma	Morbus.	Art.
Infantum ferina	Tussis convulsiva	1533
Sicca & molesta	Empyema	240
	Lumbrici	1548
Stomachalis	Vomica pulmonis	543
Ventriculi ægritudo summa	Tussis	485
Ventriculi Æstus	Sudor Anglicus	197
Cum dolore molesto & intensissimo	Arthritis	925
Dolor gravativus	Cardialgia	600
Inflatio	Ventriculi morbus	584
Inflammatio	Scorbutus	869
	Asthma	547
Ventriculi mordicatio & dolor vehemens	Scorbutus	869
Ventris dolor	Venenum	1576
Ventris intumescencia	Scorbutus	880
Æqualiter in omnem dimensionem	Graviditas	1420
Circa umbilicum minus prominens	Uterus inflatus	1429
	Mola	1426
	Hydrops peritonæi	817
Tormina vid. tormina ventris	Colica	643
	Dysenteria	631
	Lumbrici	683
	Scorbutus	877. 880
In infantibus	Dentitio	1543
Circa umbilicum	Lumbrici	1548
Infra umbilicum	Iliaca passio	666
Ventris tensio	Secundina retenta	1483
	Scorbutus	869
	Ascites	809
	Gravidatio	1420
Ventris tumor	Hydrops ovarii	1436
	Mola	1426
	Tympanites	827
	Uterus inflatus	1429
In infantibus	Rachitis	1553
Ventris tumor durus cum corporis extenuatione	Atrophia infantum	1530
Verrucæ circa anum	Hæmorrhoides	1248
	Lues venerea	961
	Apoplexia	314
Vertigo	Peripneumonia notba	214
	Venenum	1576
Vesiculæ ambustorum similes		135
Aqueæ	Variolæ	140
Miliares		143
Serolæ subflavæ	Febris miliaris	1497
Vibices	Febris petechialis	79

Symptoma.

Morbus.

Art.

	<i>Febris continua</i>	58. 113
	<i>Febris maligna</i>	74
	<i>Febris eruptiva</i>	118
Vigiliæ pertinaces	<i>Hydrophobia</i>	445
	<i>Mania</i>	438
	<i>Morbus solitarius</i>	289
	<i>Peripneumonia notha</i>	216
	<i>Pestis</i>	179
Virium prostratio	<i>Icterus</i>	840
	<i>Febris maligna</i>	174
	<i>Febris petechialis</i>	22
Subitanea	<i>Pestis</i>	79
	<i>Sudor Anglicus</i>	194
	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Cataracta</i>	1054
Visus abolitio	<i>Gutta serena</i>	1088
	<i>Venenum</i>	1576
Obfuscatio	<i>Opium</i>	1596
Visus hebetudo. vid. hebetudo visus		
Ulcus palati. vid. palati ulcus		
Ulcus sinuosum in oculi cantho	<i>Fistula lacrymalis</i>	1083
Ulcera cancroſa & calloſa	<i>Cancer</i>	1289
	<i>Lues venerea</i>	961
Corroſiva	<i>Herpes exedens</i>	1165
	<i>Variolæ</i>	156
	<i>Empyema</i>	240
Ungues recurvi	<i>Hydrops pectoris</i>	836
	<i>Phthisis</i>	493
Ungues nigri vel lutei	<i>Venenum</i>	1636
	<i>Affectio Hysterica</i>	396
	<i>Colica</i>	643
	<i>Conceptus</i>	1421
Vomitus	<i>Febris intermittens</i>	37
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Phthisis</i>	494
	<i>Variolæ</i>	131. 137
Enormes	<i>Cholera morbus</i>	607
	<i>Pestis</i>	182
Bilioſi & pituitoſi	<i>Iliaca paſſio</i>	608
Cruenti	<i>Renum Inflammatio</i>	713
Materiæ nigrae	<i>Pancreatis morbus</i>	596
	<i>Ventriculi morbus</i>	596
Humorum diverſicolorum	<i>Melancholia</i>	426
Stercoris	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Iliaca paſſio</i>	666
Vox clangosa	<i>Catarrh. ſuffocativus</i>	479
	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Variolæ</i>	155
Vocis privatio	<i>Catarrh. ſuffocativus</i>	482
	<i>Colica</i>	649
	<i>Lumbrici</i>	683

Symptoma.	Morbus.	Art.
Voracitas nimia	{ Affectio Hypochondriaca	408
Urina sanorum similis	{ Ventriculi morbus	604
	{ Febris maligna	74
Urina alba	{ Infantum febris	776
	{ Lumbrici	776
	{ Variolæ	776
	{ Affectio hysterica	777
	{ Asthma	549
	{ Cachexia	777-793
Urina aquosa, tenuis & pallida	{ Chlorosis	777
	{ Colica nephritica vel hysterica	663
	{ Febris maligna	777
	{ Nephritis	708
	{ Variolæ	137
Chylosa	{ Diabetes	697
Copiosa	{ Diabetes	698
	{ Affectio hysterica	777
	{ Asthma	549
	{ Arthritis	907
Crassa & rubra	{ Colica	644
	{ Scorbutus	663
Crocea & flava	{ Icterus	840
	{ Hypochondr. affectio	779
	{ Scorbutus	779
Cruenta vid. mictus sanguinis	{ Calculus	787
	{ Scorbutus	787
Dulcis	{ Diabetes	663
	{ Icterus	843
Nigra & viridis	{ Febris quartana	781
	{ Morbus virulentus vel venenatus	781
Nigra & tenuis	{ Febris ardens	66
	{ Colica biliosa	646
Pauca	{ Hydrops	800
	{ Nephritis	708
	{ Diabetes	695
Urina pinguis	{ Febris ardens	784
	{ Febris colliquativa	784
	{ Febris hectica	784
	{ Uleus renum	784
	{ Ulcus renum vel vesicæ	718. 720
	{ Empyema	787
Purulenta	{ Fluor albus	787
	{ Gonorrhœa	787
	{ Pleuritis & Peripneumonia	787
	{ Arthritis	780
	{ Febris continua	58. 97
	{ Nephritis	708
	{ Peripneumonia notba	21
Rubicunda	{ Scorbutus	78
	{ Variolæ	13

Symptoma .	Morbus .	Art.
Urinae ardor	{ Colica biliosa Dysuria Lues venerea Renum inflammatio	646 763 761 713
Urinae subita mutatio a turbida & crassa in tenuem & pallidam	{ Phrenitis Stranguria	246 761
Urinae stillicidium	{ Colica biliosa	646
Suppressio	{ Ischuria Nephritis Venenum	752. &c. 713 1576
In Urina carunculæ & lamenta	{ Ulcus ren. vel vesicae	718
Cremor innatans	{ Affectio hysterica Phthisis	784 784
In Urina materia crassa vel mucilaginosâ	{ Dysuria	763
Bullæ & spuma	{ Mania	784
Sedimentum crassius farinae simile	{ Morbus diuturnus	786
Sedimentum lateritii coloris	{ Febris intermittens	37
Vultus livor	{ Angina Hydrops	200 809
Rubor insignis	{ Febris ardens Febris scarlatina Peripneumonia	66 120 216
In Utero ponderis sensus instar lapidis	{ Mola	1427



INDEX MORBORUM.

A

A Boerius
Acrochordones
Agilops
Affectus Catarrhales
Albugo seu Leucoma
Alvi adstrictio in infantibus
In adultis
Alvi Fluxus
Alvi Retentio
Amaurosis sive Gutta Serena
Embusio
Anasarca
Anchyloblepharon
Anchylops
Aneurisma
Angina
Arthritica
Notha
Sine Tumore
Asi procidentia
Animi Morbi
Anorexia
Anthracosis
Anxietas Precordiorum
Apepsia
Aphæa Adultorum
Infantum
Apoplexia
Appetentia Canina
Aridura Partium
Arthritis
Anomala
Ascarides
Ascites
Asphixia
Affodes
Asthma
Continuum
Periodicum
Convulsivum
Humidum & Siccum
Infantum
Atheroma
Atoniaonblepharon
Atrophia Infantum
Scorbutica
Oculi
Aurium Morbi

B

Bronchocele
Bubo Benignus
Bubo Pestilentialis
Venerens
Buggs
Bulimia

C

Cachexia
Calculus Renum & vesicæ
Calentura
Callus in Ulceribus
Cancer
Canis Rabiosi Morsus

Capitis Conusio
Dolor
Vulnera
Carbunculus Pestilentialis
Cardialgia
Cariæss Ossis
Caruncula in Urethra
Cavas
Catalepsis, Catache, Congelatio
Cataphora
Cataracta sive Suffus.
Catarrhus
Suffocativus
Cephalalgia
Chalazion
Chemosis
Ciorosis
Cholera Morbus
Chorea Sancti Viti
Chylificatio Lasa
Cicatrix sive Macula in Oculo
Clavi
Cæliaca
Urinalis
Colica Arthritica
Colica Biliosa
Hysterica
Pistonium
Scorbutica
Coma
Coma Vigil
Combustio
Cum pulvere pyrio
A fulmine
Comedones sive Crinones
Concusio Capitis
Congelatio
Contusio
Capitis
Convulvulus seu Chordapsen
Convulsio
Infantum
Scorbutica
Tonica
Cordis Palpitatio
Polypus
Tremor
Vermes
Corpulentia nimia
Coryza
Cranii Fissura
Crapula
Crinones seu Comedones
Crishe
Cruditæ acida & nidorosa
Crusta lactea
Cutis nigredo
Cynanche

D

Dejectiones unguinosæ in Scorbuto
Delirium in Febris
Melancholicum
In puerperio
Delirium Rabiosum

Den-

<i>Dentitio</i>	1541	<i>In ulceribus</i>	1369
<i>Dentium Morbi</i>	1112	<i>Flatus</i>	183
<i>Dolor</i>	1117	<i>Fluor Albus</i>	1419
<i>Nigredo</i>	1113	<i>Fluxus Hepaticus</i>	641
<i>Vermes</i>	1119	<i>Fractura Ossis</i>	1341
<i>Diabetes notha & vera</i>	593. 595. &c.	<i>Complicata</i>	1344
<i>Diarrhœa</i>	618	<i>Fungus</i>	1377
<i>Arthritica</i>	918. 917	<i>Furor Uterinus</i>	1418
<i>Infantum</i>	1529		
<i>Scorbutica</i>	876. 882	<i>Ganglium</i>	1301
<i>Digestio</i>	591	<i>Gangrana</i>	1134
<i>Dolor Capitis</i>	276	<i>Genitalium Tumores oedematosi in</i>	Luc
<i>Dolores nocturni Ven.</i>	979	<i>Ven</i>	985
<i>Post Partum</i>	1490	<i>Gingivarum Affectus</i>	1116
<i>Vagi Scorbutici</i>	872. 884. 894	<i>Laxitas</i>	872
<i>Dysenteria</i>	631	<i>Glaucoma</i>	1062
<i>Incruenta</i>	633	<i>Gonorrhœa vera & notha non virulen-</i>	
<i>Dyspnœa Scorbutica</i>	872. 375. 890	<i>ta</i>	565
<i>Dysuria</i>	763	<i>Virulenta</i>	564
		<i>Grando</i>	1001
<i>Echymosis</i>	1120	<i>Gula Paralysis</i>	348
<i>Ectropium</i>	1018	<i>Gustus lesiones</i>	1110
<i>Efflorescentia Purpurea in Infantibus</i>	1515	<i>Gutta Rosacea</i>	1132
<i>Elcos oculi</i>	1074	<i>Gutta serena</i>	1088
<i>Elephantiasis Græc. seu Lepra Arabum</i>	1197		
<i>Elodes</i>	62	<i>Heav-mould- shot</i>	1562
<i>Emphysema</i>	599. 1298	<i>Horse shoe-head</i>	1565
<i>Emprosthoronos</i>	361	<i>Hæmoptysis</i>	532
<i>Empyema</i>	240	<i>Hæmorrhagia Narium</i>	1096
<i>Encanthis</i>	1081	<i>Hæmorrhoides</i>	1159
<i>Enhelides</i>	1150	<i>Hæstica Febris</i>	494. 500. 504
<i>Enhaltes Ave Incubus</i>	453	<i>Hemicrania</i>	282
<i>Epilepsia</i>	375	<i>Hemiplegia</i>	312. 316. 329-
<i>Puerorum</i>	1536	<i>Hepatitis</i>	258
<i>Epinetis</i>	1237	<i>Hernia, ejusque species</i>	1309
<i>Epiphora</i>	1064	<i>Hernia aquosa</i>	1315
<i>Erysipelas</i>	1167	<i>Carnosa</i>	1318
<i>Alia species</i>	1168	<i>Varicosa</i>	1279
<i>Scorbuticum</i>	872	<i>Herpes Exedens</i>	1363
<i>Symptomaticum</i>	1157	<i>Miliaris</i>	1182
<i>Effere</i>	1133	<i>Simplex</i>	1159
<i>Exanthemata</i>	172. 121	<i>Hippos</i>	1017
<i>Excrescentie præternaturales</i>	1208	<i>Hordeolum</i>	1201
<i>Carnosa in vesica calculum mentien-</i>	731	<i>Hydatis</i>	ibid.
<i>tes</i>		<i>Hydrocele seu Hernia aquosa</i>	1316
		<i>Hydrocephalus</i>	832
<i>Fasciatio</i>	395	<i>Hydrophobia</i>	444
<i>Febres in genere 1. 2. &c.</i>		<i>Hydrops</i>	301. 809
<i>Ardens seu Causus</i>	62	<i>Ovarii</i>	1438
<i>Febris Catarrhalis</i>	69	<i>Pectoris</i>	856
<i>Colliquativa</i>	73	<i>Peritonæi</i>	817
<i>Continua</i>	10	<i>Siccus</i>	826
<i>Ephemera</i>	7	<i>Vesicalis</i>	815
<i>Eruptiva</i>	117	<i>Uteri</i>	1432
<i>Hæstica</i>	590	<i>Hypochondriaca & Hysterica affectio</i>	156
<i>Infantum</i>	1516	<i>Hypopyon</i>	1035
<i>Intermittens</i>	34. 35. &c.	<i>Hyposphagma</i>	1052
<i>Læta</i>	1494		
<i>Lenta</i>	68	<i>Icterus</i>	240
<i>Lippria</i>	104	<i>Infantum</i>	1510
<i>Maligna</i>	74	<i>Ignis Sacer</i>	1267
<i>Miliaris</i>	1497	<i>Ileos sive Iliaca Passio</i>	665
<i>Petechialis</i>	79	<i>Impetigo</i>	1188
<i>Pituitosa</i>	71	<i>Inappetentia</i>	602
<i>Cum Prunella</i>	207	<i>Incontinentia Urine</i>	765
<i>Remittens</i>	49	<i>Incubus</i>	453
<i>Scarlatina</i>	120	<i>Infantum Morbi in genere</i>	1054. &c.
<i>Scorbutica</i>	502	<i>Inflammatio in genere</i>	100
<i>Februm Symptomata</i>	102. 163	<i>Aurium</i>	1120
<i>Fissura Cranii</i>	1235	<i>Cordis</i>	360
<i>Ossis</i>	1341	<i>Hepatis</i>	268
<i>Fistula in Ano</i>	1279	<i>Intestinorum</i>	251
<i>Æmalyæ</i>	1083	<i>Lienis</i>	273

<i>Mammarum</i>	1218			N	
<i>Mesenterii</i>	263	<i>Narium Morbi</i>			1169
<i>Pancreatis</i>	267	<i>Nata, Natta seu Naptia</i>			1208
<i>Renum</i>	708. 713	<i>Nausea & Vomitus</i>			594
<i>Testium</i>	1231	<i>Necrosis</i>			1184
<i>Ventriculi</i>	258	<i>Nephritis</i>		708. &c.	
<i>Inoculatio variolarum</i>	358	<i>Arthritica</i>			920
<i>Insignia Bacchantium</i>	1144	<i>Notha Scorbutic.</i>			895
<i>Eschias</i>	931. 957	<i>Noli me tangere</i>			1289
<i>Eschuria Renalis & Vesicalis</i>	752	<i>Nyctalopia</i>			1095
				O	
<i>Lactis fagatio</i>	1493	<i>Obesitas seu Corpulentia nimia</i>			780
<i>Lagophthalmia</i>	1014	<i>Obdormitio Membr.</i>			756
<i>Lelthimigi</i>	765	<i>Oculorum Morbi</i>		997. &c.	
<i>Lentigines</i>	1149	<i>Oculorum Ulcera</i>			1073
<i>Lepra</i>	1191	<i>Oedema</i>			1272
<i>Græcorum</i>	1194	<i>Oedema Oculi</i>			1033
<i>Lechargus</i>	296	<i>Oedematosi Tumores Genital. in</i>		<i>Lue</i>	
<i>Leucoma seu Albugo</i>	1049	<i>Ven.</i>			985
<i>Leucophlegmatia</i>	797	<i>Olfactus amissus</i>			1105
<i>Lichen</i>	1157	<i>Opisthoronos</i>			361
<i>Lienis Inflammatio</i>	271	<i>Ophthalmia</i>			1021
<i>Lienteria</i>	626. 627	<i>Epidemica</i>			1029
<i>Linguae Paralysis</i>	345	<i>Humida & sicca</i>			1103
<i>Visia</i>	1110	<i>Scrophulosa</i>			1021
<i>Lipothymia</i>	571	<i>Ossium fractura</i>			1141
<i>Lippitudo sive Ophthalmia</i>	1021	<i>Luxatio</i>			1117
<i>Lipuria</i>	63. 104	<i>Otalgia</i>			1122
<i>Lithiasis</i>	743. 718	<i>Ovarii Hydrops</i>			1136
<i>Lithonriptica</i>	719	<i>Oule</i>			1049
<i>Lochia</i>	1485	<i>Ozena</i>			1106
<i>Loquela amissa</i>	1111			P	
<i>Lues Venerea</i>	961	<i>Palpebrarum Morbi</i>			998
<i>Infantum</i>	983	<i>Palpitatio Cordis</i>			563
<i>Lumbrici</i>	675	<i>Pannus, oculi vitium</i>			1041
<i>Lasi</i>	677. 678	<i>Paracynanche</i>			206
<i>In Infantibus</i>	1547	<i>Paralysis & Paresis</i>			332
<i>Lupia</i>	1302	<i>Gula</i>			343
<i>Lupus</i>	1289	<i>Lingua</i>			345
<i>Luxatio Ossium</i>	1337	<i>Oculi</i>			1078
<i>Lycanthropia</i>	429	<i>Scorbutica</i>			878
		<i>Paraphimosis</i>			986
<i>Macies Infantum</i>	1530	<i>Paraphrenitis</i>			254
<i>Macula sive Cicatrix in Oculo</i>	1049	<i>Paraplegia seu paraplexia</i>		312. 319. 312	
<i>Macula Hepatica</i>	1151	<i>Parasynanche</i>			706
<i>Scorbutica</i>	888	<i>Paronychia</i>			1246
<i>Madarosis</i>	1017	<i>Pedis digitorum</i>			1248
<i>Malacia</i>	603	<i>Parotis</i>			1243
<i>Mammarum Tumores</i>	1218. 1493	<i>Parsus difficilis</i>			1410
<i>Mania & Melanch.</i>	425	<i>Parulis</i>			1235
<i>Meconii purgatio in Infantulis</i>	1513	<i>Pediculi Inguinales</i>			1559
<i>Meiopsis</i>	1072	<i>Penis Amputatio</i>			986
<i>Melancholia</i>	425	<i>Peribrosis Oculi</i>			1076
<i>Meliceris</i>	1303	<i>Pericranii latio</i>			1362
<i>Memoria laesa</i>	414	<i>Perinaei ruptura</i>			1492
<i>Menstruatio</i>	1391	<i>Peripneumonia notha</i>			114. 115
<i>Mensum difficultas</i>	1402	<i>Vera</i>			116. 117
<i>Menses cum dolore fluentes</i>	1405	<i>Arthritica</i>			919
<i>Fluxus nimius</i>	1406	<i>Pernio</i>			1150
<i>Per loca aliena fluentes</i>	1404	<i>Pervigilium</i>			1289
<i>Suppressio</i>	1398	<i>Pestis</i>			168
<i>Mesenterii Inflamm.</i>	263	<i>Phimosis & Paraphimosis</i>			986
<i>Mistus Cruentus</i>	767	<i>Phlegmones</i>			1226
<i>Miserere mei</i>	668	<i>Phlogosis</i>			1021
<i>Mola</i>	1425	<i>Phlyctena, morbus cutaneus</i>			1154
<i>Aquosa Vesicul.</i>	1428	<i>Phlyctena, oculi vitium</i>			1017
<i>Venosa</i>	1429	<i>Phrenitis</i>			245
<i>Morbi Nervini</i>	274	<i>Phthiriasis</i>		1015. 1567	
<i>Morbilli</i>	123	<i>Phthisis ab Apostematibus & ulceribus</i>			521
<i>Morsus Canis Rabidi</i>	444	<i>Asthmatica</i>			520
<i>Mydriasis</i>	1071	<i>A Chlorosi vel mensibus obstructis</i>			518
<i>Myopia</i>	1093	<i>A Diarrhoea vel Dysenteria</i>			523
		<i>A Gonorrhoea vel fluore albo</i>			510

Index Morborum.

351

<i>Ab Hemorrhag.</i>	519	<i>Strabismus</i>	779
<i>Ab Hypochond. vel Hyster. affect.</i>	531	<i>Stranguria</i>	761
<i>Ab iſtero</i>	540	<i>Scorbutica</i>	906
<i>A Lactatu</i>	522	<i>Struma</i>	1277
<i>Nervosa</i>	511	<i>Stupor</i>	355
<i>A Pleuritide vel peripneumonia</i>	519	<i>Scorbuticus</i>	878
<i>Pulmonaris</i>	491. 494	<i>Sudamina</i>	1152
<i>Scorbutica</i>	527	<i>Sudor Anglicus</i>	194. 159
<i>Scrophularis</i>	524	<i>Suffusio five Catar.</i>	1054
<i>Varia</i>	ibid	<i>Sugillatio Oculi</i>	1052
<i>Pladuroſis</i>	1000	<i>Suppreſſio Urinae</i>	752. &c.
<i>Phygeſion</i>	1240	<i>Surditas</i>	1130
<i>Phyma</i>	1239	<i>Surſcit</i>	605
<i>Pica</i>	603	<i>Sycosis</i>	1009
<i>Plege Oculi</i>	1073	<i>Synanche</i>	206
<i>Pleuritis Arthritica</i>	519	<i>Synchysis</i>	1040
<i>Notha</i>	218. 224	<i>Syncope</i>	371. 574
<i>Occulta</i>	227	<i>Synovia</i>	1365
<i>Plica Polonica</i>	992		
<i>Pneumatocoele seu Hernia ventosa</i>	1313	<i>Talpa seu Testudo</i>	2305
<i>Podagra</i>	908	<i>Tarantismus</i>	462
<i>Polypus Cordis</i>	577	<i>Tendinis Punctura</i>	1158
<i>Narium</i>	1108	<i>Tendinum vulnera</i>	1349
<i>Polypi in Pleuritide</i>	234. 235	<i>Tenesmus</i>	640
<i>Presbytia</i>	1094	<i>Terminthus</i>	1238
<i>Procidencia Ani</i>	1322	<i>Tetanus</i>	361
<i>Proptosis</i>	1045. 1069	<i>Tinea seu ſahafari</i>	995
<i>Pruritus vid. Pſora</i>		<i>Tinnitus aurium</i>	1124
<i>Pſora five Scabies</i>	1180	<i>Tonſillarum Inflam.</i>	106
<i>Pſorophthalmia</i>	1003	<i>Tophus</i>	1601
<i>Pterygium</i>	1041	<i>Tophi Arthritici</i>	915
<i>Rudendorum Excoriatio</i>	1493	<i>Tormina Venteris Infantum</i>	1523
<i>Tumores Oedematofi</i>	1491	<i>Scorbutica</i>	872
<i>Punctura Tendinis</i>	1351	<i>Torpor</i>	355
<i>Purpurea Efflorescentia in Infantibus.</i>	1515	<i>Tortura Oris</i>	362
		<i>Tracoma</i>	1009
		<i>Tremor</i>	358
<i>Rachitis</i>	1551	<i>Cordis</i>	567
<i>Ranula</i>	472	<i>Scorbuticus</i>	878
<i>Red Gum</i>	1515	<i>Trichiaſis</i>	1011
<i>Renum Inflammatio</i>	508	<i>Tumores in genere</i>	1217
<i>Ulcus</i>	715	<i>Albi</i>	1283
<i>Rheumatismus</i>	854	<i>Capſulares</i>	1300
<i>Rheuma Oculi</i>	1068	<i>Flarulenti</i>	1798
<i>Rhexis</i>	1047	<i>Tuffis</i>	484
<i>Rubedo Maculosa</i>	1144	<i>Convulſiva</i>	1512
<i>Ruptura Perinei</i>	1492	<i>Epidemica</i>	487
		<i>Stomachalis</i>	485
<i>Sahafari seu Tinea</i>	595	<i>Tyloſis</i>	1009
<i>Salivario</i>	702	<i>Tympanitis</i>	816
<i>Sarcocoele seu Hernia carnoſa</i>	1318		
<i>Sarcoma Narium</i>	1109		
<i>Scabies Humida & Sicca</i>	1178	<i>Vari</i>	1156
<i>Scabies five Pſora</i>	1180	<i>Variola</i>	130
<i>Scirrhus</i>	1275	<i>Diſtincta</i>	131
<i>Scleriaſis</i>	1008	<i>Confluentes</i>	132
<i>Sclerophthalmia</i>	1007	<i>Maligna</i>	142
<i>Scorbutus</i>	869	<i>Variolarum Inoculatio</i>	158
<i>Scotomia</i>	303	<i>Varix</i>	1257
<i>Scrophula</i>	1277	<i>Venena in genere</i>	1571
<i>Secundina retenta</i>	1483	<i>Aconitum</i>	1489
<i>Serpigo</i>	1160	<i>Es viride</i>	1614
<i>Singultus</i>	369	<i>Angues</i>	1619
<i>Sirones</i>	1155	<i>Antimonialia</i>	1614
<i>Somnus</i>	293	<i>Aqua fortis</i>	1615
<i>Soporofi Morbi</i>	294	<i>Aranen</i>	1624
<i>Spasmi</i>	367	<i>Argentum vivum</i>	1610
<i>Spasmus Cynicus</i>	362	<i>Aſſenicum</i>	1606
<i>Sphacelus</i>	1384	<i>Aspis</i>	1622
<i>Spina ventosa</i>	1285	<i>Bella donna Vid. Corona Imperialis</i>	1628
<i>Steatoma</i>	1303	<i>Bufo</i>	1610
<i>Sterilitas</i>	1414	<i>Cantharides</i>	1617
<i>Sternutatio</i>	371	<i>Ceruſſa</i>	1380
<i>Stomachica Remedia</i>	592	<i>Cicuta</i>	61

<i>Cicuraria</i>	1584	<i>Visus Hebetudo</i>	108
<i>Cingula Mercur.</i>	1610	<i>Ulcera</i>	130
<i>Cocculæ officinarum</i>	1592	<i>Ulcus Aurium</i>	110
<i>Coriandrum</i>	1599	<i>Ulcuscula Glandis Præputii</i>	50
<i>Corona Imperial.</i>	1588	<i>Ulcus cordis</i>	559. 57
<i>Esula</i>	ibid.	<i>Ulcera Oculorum</i>	107
<i>Euphorbium</i>	ibid.	<i>Oris & Palati</i>	57
<i>Fungi</i>	1602	<i>Ulcus Renum</i>	71
<i>Helleborus</i>	1388	<i>Ulcuscula Vagina</i>	50
<i>Hyoscyamus</i>	1597	<i>Ulcera Venerea</i>	58
<i>Lithargyrum</i>	1617	<i>Ulcus Vesicæ</i>	70
<i>Mandragora</i>	1599	<i>Unguis Oculi</i>	101
<i>Mercurius præcip. & sublim.</i>	1611	<i>Vomitus</i>	59
<i>Napellus</i>	1589	<i>Cruentus</i>	59
<i>Nux vomica</i>	1600	<i>Infantum</i>	51
<i>Oenanthe</i>	1584	<i>Urinæ Ardor in Lue Venerea</i>	96
<i>Opium</i>	1594	<i>Incontinentia</i>	70
<i>Scorpio</i>	1626	<i>Suppressio</i>	78
<i>Serpentes</i>	1619	<i>Suppressio ex Sanguinis dyscrasia</i>	78
<i>Solanum</i>	1598	<i>Uroscopia sive Urinarum Prognosis</i>	77
<i>Spiritus acidî</i>	1615	<i>Uteri Hydrops</i>	143
<i>Spiritus vini</i>	1633	<i>Uteri Procidencia</i>	150
<i>Sublimatus Mercurius</i>	1611	<i>Uterus Inflatus</i>	142
<i>Taxus</i>	1507	<i>Vulnera</i>	134
<i>Tithymalus</i>	1588	<i>Arteriarum</i>	134
<i>Vipera</i>	1520	<i>Capitis</i>	136
<i>Ventriculi Inflammatio</i>	258	<i>Lethalia</i>	135
<i>Vermes</i>	675	<i>Musculi Temporalis</i>	130
<i>In auribus</i>	1123	<i>Nervorum</i>	134
<i>In Corde</i>	562	<i>Sclopetorum</i>	1358 130
<i>Verrucæ</i>	1325	<i>Tendinum ac Membranarum</i>	134
<i>Vertigo</i>	300	<i>Uvulæ Relaxatio sive Procidencia</i>	115
<i>Vesicæ Ulcus</i>	718	X	
<i>Vigilie</i>	289	<i>Xerophthalmia</i>	100



